




LA ANATOMIA
DA
G. VALVERDE

GIUNTI
VENICE
1586







20

6477(2)/D/2

D. III


16/15

S
20/6/04
820

X

50 6 15095


pt
820





IN VINETIA NELLA STAMPERIA DE GIOVNTI. MDLXXXVI.

15095



ALLA S. C. R. MAESTA DEL RE FILIPPO

Giouanni Valuerde.



A V E N D O io scritta l'historia della composition del corpo humano in lingua Spagnuola qui in Roma ad instanza della buona memoria del Cardinal san Iacomo mio patrone; et seruitomi in essa per la maggior parte delle figure del Vessalio, per parermi piu degne d'imitatione, che di biasimo: Successe dapoi, che molti non intendendo la lingua Spagnuola, et vedendo le mie figure non molto diuerse da quelle, cominciarono à dire ch'io hauea tradotta l'historia dell'Vessalio. Laqual cosa benchè à me desse poca noia ò niuna, per non hauere io scritta tale historia, accioche da essa me ne douesse accrescer reputatione; ne mi curo che sia detta mia ò d'un altro, pur che di essa se ne caui alcun profitto; non dimeno per satisfare à prieghi di molti gentilhuomini Italiani amici miei (liquali veggendo l'opera mia essere assai piu breue, che quella del Vessalio; et intendendo, che era in molte cose differente dalla sua; et parendo anche loro le mie figure alquanto piu leggiadre et accomodate, che le sue, desiderauano di uederla nella lor lingua) et anche per trouarmi con li rami intagliati, ho voluto pigliar questa fatica di ridurla in lingua Italiana. Auuenga che nel tradurla per essermi la lingua Italiana straniera mi son molto seruito della fatica di Antonio Tabo da Albenga familiar mio, giouane assai piu virtuoso, che fortunato: conferendo nondimeno sempre questa con quella, accioche nel tradurre non vi si commettesse errore alcuno; ne vi si aggiungesse, ò leuasse nulla fuor che quello, che à me pareua altrimenti. Et haureila piu volentieri fatta latina, se non mi fusse paruta la fatica inutile, per hauer scritto in quella lingua si diffusamente il Vessalio; et per esser di poca importanza al medicare (che è il fine al quale in questa historia si mira) le cose, che di nuouo oltre à quelle, che esso ha scritte, si ritrouano, Et massimamente, che Realdo Colombo, eccellente Anatomista, et mio precettore in questa facoltà, ha in ordine un'altra Anatomia medesimamente latina, laqual manderà molto presto fuori. Al che si è aggiunto, l'esser io piu tenuto alla natione Italiana che à niun'altra dalla Spagnuola in fuori. Hor volendo io mandar questo mio libro sotto un buon appoggio, non ho potuto trouare un'altro piu à proposito, che la Maesta vostra, essendo ella comun padrone et protettore dell'Italia tutta; Alla quale humilmente supplico, che accetti il buon animo, se l'opera non sarà degna d'un tanto Prencipe. La cui vita il signore Iddio conferui, et felicitì, seccndo che à tutta la Republica Christiana piu bisogna.

Di Roma alli XX. di Maggio M D LIX.

DI V. S. R. C. M. hummil. vassallo.



ALL'ILLVSTRISSIMO ET

REVERENDISSIMO MONSIGNORE

FRA GIOVANNI DA TOLETO, CARDINALE ET

ARCIVESCOVO DI SAN

IACOMO

IL DOTTORE GIOVANNI VALVERDE

SVO MEDICO.



CONSIDERANDO io Illustrissimo Monsignore la gran carestia, che ha la nation nostra d'huomini, che s'intendano di Anatomia, si per esser cosa brutta tra Spagnuoli tagliare i corpi morti, si anchora per esser pochi quelli, che venendo in Italia, doue la potrebbono imparare, non amino piu tosto occuparsi in altri essercitij, che in questo, per non esser usi à veder simili spettacoli; & vedendo ancora il danno, che dicio ne seguiva à tutta la nation Spanuola; parte perche li Chirurghi (à i quali piu mancamento fa l'esser priui di essa) intendono poco il latino; parte per hauerne il Vessalio scritto si oscuramente, che con difficultà può essere inteso, se non da quelli, che prima alcune volte hanno hauuto il corpo innanzi à gli occhi, & molto buon maestro, che lor la dichiarì; Pareami cosa molto conueneuole scriuere questa historia nella nostra lingua; accioche quelli, per li quali io la scriuo, potessero meglio godere della mia fatica. Et anche perche in latino hanno scritto tanti così lungamente, che non mi pareua esser dibisogno nuoua fatica. Ma riguardando dall'altra parte alle poche cose di dottrina, che in questa lingua sono scritte, & insieme alla poca auttorità, che tra i Spagnuoli hanno le cose volgari, non mi daua il cuore di farlo; fin che il comandamento di V.S. Illustriss. (al quale io, come suo seruitore, non potea replicare) fece che io posto da banda tutto quello, che alcun potesse di questa mia fatica inconsideratamente giudicare, guardassi solo à quello, che V.S. m'imponeua, & che alla nostra natione era piu necessario, cio è scriuere questa historia della composition del corpo humano; Il che farò nella piu breue, & succinta forma, che à me sarà possibile; poste da parte tutte le cōtraditioni, che tra quelli, che innanzi di me ne hanno scritto, sono state. Lequali sapute ancorche alcune volte giouino, assai volte ancor sogliono nuocere, iterropendo l'historya, & cōfondèdo l'animo di quelli, chela odono. Si che questo mio libro nō sarà altro ch'una semplice relatione in modo di comētario di quel, che ho veduto io ne corpi. Et se alcuno sarà tanto diligēte, che nō conteto dell'historya sola voglia anche intendere le differenze, che sono state tra coloro che di quella hanno scritto, legga insieme il Vessalio, alqual nō solo non pēso io di fare iniuria con questo mio libro, ò bandirlo di Spagna, ma piu tosto dispone re gl'intelletti che piu facilmente possano intendere (anchorche non veggano l'Anatomia) tutto quello, che egli ha scritto: Ilqual senza dubbio niuno ha superato tutti e suoi predecessori in questa cosa. Et certo penso che Dio l'habbia inspirato à questo, accioche resuscitasse questa parte della medicina si dimenticata, come necessaria. Perche, quantunque Galeno habbia aiutato pur assai à questa historya, non dimeno essendo à suoi tempi non meno brutto tagliar li corpi morti, che hora sia in Spagna, & in alcun'al tre parti, & il piu de corpi abbrusciauano, non potè in due ò tre volte, che (à caso) vide

alcun corpo, & già quasi del tutto putrido, notar tutte le parti colarità, che nell'huomo sono. Poi che ne anche hora in Italia, doue lecitamente si fa, & moolti con grandissima diligenza tutta la sua vita spendono in questo, non manca di essere assai differenza tra i piu sani Anatomisti in alcune cose; parte per la varietà de corpi; parte per la difficoltà della materia istessa. Tanto piu, che Galeno pensò al fermo, che non fusse troppa differenza tra la cōposition dell'huomo, & quella della scimia; la cui historia egli scrisse: Nella quale in vero vsò tanta diligenza, che quasi niuna cosa lasciò di quelle, che alla cōposition di lei si richiedea. Et non dubito, che s'egli hauesse hauuto commodità di fare Anatomia d'huomini, come hebbe di scimie, & altri animali bruti; ne l'Anatomia sarebbe stata tanto tempo sepolta, ne al Vessalio sarebbe stato mestieri pigliar tanta fatica. Ilquale io sempre seguirò in tutta questa historia, eccetto che nell'ordine del scriuere, nel quale è alquanto confuso per non voler dipartirsi da Galeno; & in alcune cose, nellequali in vero vsò meno diligenza di quella, che si richiedea, stanco forse della lunga fatica; lequali noterò nelli suoi luoghi, piu con intentione che à questo libro non manchi niente, che con animo di riprendere vn tant'huomo, à cui tanto tutti siamo tenuti. Anzi tutto l'utile, che di questo mio libro risulterà, non meno si ha da attribuire ad Andrea Vessalio, che à Realdo Colombo mio precettore in questa faculta; Il quale penso non sarà picciolo, massimamente essendo accompagnato dal fauore di V.S. Illustrissima; La cui vita N.S. lungo tempo conserui con accrescimento di stato, & di felicità.



A I LETTORI

GIOVANNI VALVERDE.



NCORCHE alcuni miei amici fussero di parere, ch'io douesse fare nuoue figure, senza seruirmi di quelle del Vessalio, non l'ho voluto fare, per schifare la confusione, che di cio potrebbe seguire, non si conoscendo cosi facilmente, in che cosa io mi conuenga, o discordi con lui; & perche le sue figure son cosi ben fatte, che mi parebbe inuidia, o malignità, non voler seruirmi d'esse; & tanto piu, ch'è a me è stato si ageuol cosa il migliorarle, quanto sarà difficil à chi si sia, che voglia partirsi da queste, & da quelle) farne tanto buone. Ma perche le mie sono intagliate in rame; & non possono mescolarsi con l'historia, senza gran confusione, ho posto tutte le figure, che appartengono ad ogni libro, al suo fine. Et percio bisogna sapere, che le postille, che si veggono nelle margini di dentro per tutto il volume, seruono à dimostrare in ogni figura cio che in quel luogo della facciata, che è notato con la medesima lettera di registro, con laquale è notata la postilla, si dice. Et nella postilla la prima lettera che è piu alta, che l'altre, nota quella, che è del medesimo modo dentro della facciata; la seconda si è r. nota la tauola delle figure; l'ultima, la lettera o segno, che si ha da ritrouare nella figura. Et perche interuiene dell- volte in una tauola esservi piu figure; nelle postille, che hanno dietro il numero della tauola vna, f. o fig. questi segnali noteranno la figura; & quella, che segue, il numero suo; l'ultima, il segnale, ch' in tal figura si ha da ritrouare.

Accade anche delle volte in un libro esservi di bisogno delle figure o tauole d'un altro libro; & in tal caso, o la parola, che è nella facciata, appresso la lettera del registro t'insegna in qual libro l'hai da ritrouare, o uero nella postilla si nota prima il libro, & dipoi tutto il resto, che l'habbiamo detto.

Per laqual cosa è da sapere, che nel primo libro si trata dell'ossa & cartilagini, che sono come fondamento della fabbrica del nostro corpo.

Nel secondo, delle legature dell'ossa, & della lor copertura, che sono la pellicola, la pelle, il grasso, la tela carnosu, li muscoli, & ultimamente la tela, che cuopre l'ossa, chiamata percio periostion.

Nel terzo, delle membra necessarie alla conseruatione del nostro corpo, cosi in indiuiduo come in spetie.

Nel quarto, delle membra necessarie alla vita, che sono il cuore, & l'altre membra, che si chiudono nel petto.

Nel quinto, delle membra, che seruono al senso, & moto, che sono le ceruella; & d'alcuni sensi esteriori.

Nel sesto, di due sorti di canali, medianti e quali questa fabbrica si nutrice, & viue, chiamate, le prime vene, le seconde arterie.

Nel settimo, & ultimo de gl'instrumenti, medianti i quali sentiamo, & ci mouiamo, & d'alcuni sensi esteriori.

TAVOLA DELLI CAPITOLI DELLA PRESENTE OPERA.

Il primo libro contiene cap. 39.



R OLOGO dell'opera	foglio 1
Proemio del primo libro	fo. 3
Dell'ossa	cap. 1. 3
Dell'ossa della testa	cap. 2. 4
De gli officelli dell'orecchie	ca. 3. 6
Dell'ossa della mascella superiore	
cap. 4. 7	
Dell'osso giogale	cap. 5. 8
Della mascella inferiore	cap. 6. 8
De denti	cap. 7. 8
De buchi del capo, & della mascella superiore	c. 8. 8
Dell'osso yotide	cap. 9. 9
Della schiena	cap. 10. 10
De nodi del collo	cap. 11. 10
De nodi delle spalle	cap. 12. 11
De nodi de lombi	cap. 13. 12
Dell'osso grande	cap. 14. 12
Della coda, ò codione	cap. 15. 12
Dell'ossa del petto	cap. 16. 12
Dell'osso o cartilagine del cuore	cap. 17. 15
Delle palette delle spalle	cap. 18. 15
Delle clauicole	cap. 19. 15
Dell'osso dell'omero	cap. 20. 15
De fuselli del braccio	cap. 21. 15
Dell'ossa del bracciale	cap. 22. 17
Del pettine, ò palma della mano	cap. 23. 18
Dell'ossa delle dita	cap. 24. 19
Delli officelli simili al seme del sesame chiamati per cio sesamini	cap. 25. 19
Dell'ossa del'anche, & de galloni	cap. 26. 20
Dell'osso della coscia	cap. 27. 21
De gli stinchi della gamba	cap. 28. 22
Della rotula del ginocchio	cap. 29. 23
Dell'ossa del piede	cap. 30. 23
Dell'osso del calcagno & del naucolare	cap. 31. 24
Del collo del piede	cap. 32. 24
Del pettine, ò pianta del piede	cap. 33. 24
Dell'ossa delle dita del piede	cap. 34. 25
Delle vgne	cap. 35. 25
Delle cartilagini delle palpebre de gli occhi	ca. 36. 25
Della cartilagine delle orecchie	cap. 37. 25
Delle cartilagini del naso	cap. 38. 25
Delle cartilagini del gargorozzo	cap. 39. 25

Il secondo libro contiene cap. 42.

D ELLE legature	cap. 1. 37
Della pelle, & pelliccinola, & della tela carnosà, che cuopre tutto'l corpo, & del grasso, che sta tra la pelle & la detta tela	cap. 4. 37

De muscoli, & prima, che cosa sia muscolo	cap. 3. 37
Delle differenze de muscoli	cap. 4. 37
De muscoli della fronte	cap. 5. 39
De muscoli delle palpebre de gli occhi	cap. 6. 40
De muscoli de gli occhi	cap. 7. 40
De muscoli del naso	cap. 8. 40
De muscoli delle guance	cap. 9. 40
De muscoli delle labbra	cap. 10. 41
De muscoli della mascella inferiore	cap. 11. 41
De muscoli dell'osso chiamato yotide	cap. 12. 42
De muscoli che muouono la lingua	cap. 13. 42
De muscoli che muouono el gargarozzo	cap. 14. 43
De muscoli che muouono el braccio	cap. 15. 44
Delle legature che cōgiūgon l'osso del homero	c. 16. 45
De musc. che muouono le palette delle spalle	ca. 17. 45
De muscoli che muouono la testa	cap. 18. 46
Delle legature della testa & de dua primi Nodi del collo	cap. 19. 46
De muscoli del ventre	cap. 20. 47
De muscoli de testicoli	cap. 21. 47
De muscoli che muouono il petto	cap. 22. 48
Delle legature dell'ossa del petto	cap. 23. 49
De muscoli che muouono la schiena	cap. 24. 49
Delle legature de nodi della schiena	cap. 25. 50
De muscoli che piegano & distendono el gomito	cap. 26. 51
Del muscolo che fa la tela della palma della mano	cap. 27. 52
Della carne che si ritroua nella parte di dentro della mano	cap. 28. 52
De muscoli che muouono le dita della mano	ca. 29. 52
De muscoli che muouono la mano sopra il bracciale	cap. 30. 54
De muscoli, che voltano il minor fusello in su, & in giu	cap. 31. 55
Delle legature de fuselli del braccio, & della mano	cap. 32. 55
De muscoli del membro	cap. 33. 56
Del muscul del collo della vescica	cap. 34. 56
De muscoli del fondamento	cap. 35. 56
De muscoli che muouono la gamba	cap. 36. 56
De muscoli che muouono la coscia	cap. 37. 58
De muscoli che muouono el piede	cap. 38. 59
De muscoli che muouono le dita del piede	ca. 39. 61
Delle legature della cōgiuntura del gallone, et di quel la del ginocchio, & di tutte l'altre, che sono si nella gamba come nel piede	cap. 40. 61
Del numero de muscoli	cap. 41. 62
Della tela, che rauolge l'ossa, detta periossion	c. 42. 63

Il terzo libro contiene cap. 18.

D ELLA tela che rauolge tutte queste mèbra, chiama ta	
---	--

T A V O L A

ta peritoneo	cap. 1.83
Della canna della gola	cap. 2.83
Dello stomaco	cap. 3.84
De gli intestini	cap. 4.84
Del mesenterio	cap. 5.85
Della vesicella	cap. 6.85
Del fegato	cap. 7.86
Del fiele	cap. 8.86
Della milza	cap. 9.86
De rognoni, ouero arnioni	cap. 10.87
Della vescica	cap. 11.87
De gli organi dell'huomo, che seruono alla generatione	cap. 12.88
Del membro	cap. 13.89
Della matrice & di tutte l'altre membra della, donna che seruono alla generatione	cap. 14.89
De testicoli della donna	cap. 15.91
Della creatura, & delle secondine	cap. 16.91
Di che si mantiene la creatura nel corpo	cap. 17.92
Delle poppe, ò mammelle	cap. 18.92

Il quarto libro contiene cap. 9.

IN qual parte del corpo s'ingenerino gli spiriti della vita	cap. 1.102
Della tela, che fascia le coste chiamata percio pleura	cap. 2.102
Del tramezo del petto, chiamato il mediastino	cap. 3.102
Della canna del polmone	cap. 4.103
Delle glandole della gola, dette da chirurghi le tonsille	cap. 5.103
Della campanella, ò vgola	cap. 6.104
De polmoni	cap. 7.104
Delle tele del cuore	cap. 8.104
Del cuore	cap. 9.105

Il quinto libro contiene cap. 11.

DELLE tele che fasciano queste membra	ca. 1.109
Delle ceruella & celabro	cap. 2.109
Del corpo chiamato calloso & del tramezo de ventri coli	cap. 3.110
De ventricoli della testa	cap. 4.110
Del corpo delle ceruella simile ad vna volta	ca. 5.111
Della glandola delle ceruella simile alla pina	ca. 6.111
De testicoli & natiche delle ceruella	cap. 7.111
De processi del celabro simili à i tarli	cap. 8.111
Del imbuto, & glandola, per i quali si purga la flemma del capo	cap. 9.111
De sensi steriiori	cap. 10.112

De gli occhi

cap. 11.112

Il sesto libro contiene cap. 14.

CHE cosa sia vena	cap. 1.119
Che cosa sia arteria, & che officio & sustanza habbia	cap. 2.119
Del numero delle vene & arterie	cap. 3.119
Delle glandole, che sono inui doue le vene, ò l'arterie si spartono in rami	cap. 4.120
Del nascimento, & distribuzione, della vena chiamata Porta	cap. 5.120
Della vena grande, & prima doue si congiunge nel fegato co i rami della vena Porta	cap. 6.121
La distribuzione della vena grande dal fegato in su	cap. 7.121
Della distribuzione delle vene del fegato & di quella della testa per il braccio	cap. 8.123
Della distribuzione della vena grande dal fegato in giù	cap. 9.124
Della distribuzione della vena grande per la gamba	cap. 10.126
Del nascimento dell'arteria grande, & della distribuzione sua dal cuore	cap. 11.127
Della distribuzione dell'arteria grãde dal cuore in giù	cap. 12.128
Delle vene & arterie di dentro della testa	ca. 13.130
Della vena arteriale, & della arteria venale	c. 14.131

Il settimo libro contiene cap. 15.

CHE cosa sia neruo, & delle differenze & nascimenti loro	cap. 1.141
Quante paia di nerui nascon dalle ceruella & dalla nuca innanzi, che esca pel craneo	cap. 2.141
Del primo & secondo paio de nerui delle ceruella	cap. 3.142
Del 3. & 4. paio de nerui delle ceruella	cap. 4.142
Del quinto paio de nerui delle ceruella	cap. 5.142
Del sesto paio de nerui delle ceruella	cap. 6.143
Del settimo paio de nerui delle ceruella	cap. 7.143
Della midolla spinale, et de nerui, che nascono di quella	cap. 8.143
De nerui, che nascono del collo	cap. 9.144
De nerui, che nascono de nodi delle spalle	ca. 10.145
De nerui, che escono de nodi de lombi	cap. 11.145
De nerui, che nascono dell'ossa grande	cap. 12.145
De nerui, che si distribuiscono p le braccia	ca. 13.146
De nerui, che si distribuiscono per la gamba	c. 14.147
De sentimenti dell'odorare, gustare, & toccare	cap. 15.148

TAVOLA COPIOSA DI TUTTE LE COSE, CHE
nella presente opera si contengono, doue è da notare, che cia-
cheduno foglio, ò carta si diuide in sei parti, nora-
te con li numeri. 1. 2. 3. 4. 5. 6. delli qua-
li 1. 2. 3. diuidono la prima fac-
cia 4. 5. 6. la seconda.



AQUA dètro la vescica del cuore
à che serua 105.1
Acqua perche si presto & abbon-
dantemente esca p li occhi 110.6
Acque, che si rompono nel parto,
che cosa sieno 91.6 A che serui-
no 92.1
Acromion è la punta dell'omero 15.2
Aere come si tiri dentro, & mandi fuori, & con che
instrumenti 49.3
Aere come entri nel cuore 102.2
Aere tirato dentro & mandato fuori che officij fac-
cia 103.6
Aere in che modo faccia la voce 103.6
Ala destra del cuore è piu lenta della sinistra 105.3
Ale del naso quali, & perche, chiamino gli Anato-
mist 25.4
Ale ò orecchie del cuore, & del suo officio 105.3
Allantoides è detta da i Greci la prima tunica, che fa-
scia la creatura 91.5
Amnios da i Greci è detta la seconda tela, che inuolge
la creatura 91.6
Amphiblestroides è la secòda tunica dell'occhio det-
ta altrimenti Retina 112.5
Anastomosis che significhi 125.2
Anatomia è piu necessaria alla medicina, che ad alcu-
na altra scienza 1.1
Anatomia fu scritta da Galeno, seruendosi lui della
scimmia 2.1
Anatomia per quali cause cominciò ad esercitarsi 1.5
Anatomia ne viui fu essercitata da Herosilo, & Eras-
strato 1.5
Anatomia non solo ne viui, ma ancora ne morti, per-
che fu prohibita 1.6
Anatomia quanto sia necessaria à i Pittori 66.4.5
Animali non hanno la purgatione, che le donne, & pu-
re generano 92.2
Animella delle cervuella simile à vna pina, & sua histo-
ria 111.4
Animelle son le glandole del mesenterio 120.3
Annulare cartilagine del gargarozzo 25.6
Antichi perche non meritano tanta fede, quanta gli
damno molti 2.2
Apophysis che significhi 3.5
Appendix è la giunta, che hanno le ossa 3.4
Aranea è la prima tunica delli occhi, simile à i ragna-

teli 112.5
Arnioni, vedi Rognoni.
Arteria e la vena, che batte, Arteria aspra è la can-
na del polmone 103.2
Arteria al tempo d'Hippocrate, Platone & Aristote-
le non era se non la canna del polmone, l'altre arte-
rie in che modo teneuon per vene 119.5
Arteria grande come nasca dalla parte piu alta del
ventricolo manco del cuore, & come si distribuisca
127.3
Arteria grande appresso el cuore si diuide in due par-
ti, & la historia & distributione di quella, che va
dal cuore in su 127.4
Arteria grande come si distribuisca dal cuore in giu
128.5
Arteria grande come si diuida appresso l'osso grande
129.3.4
Arteria, che va verso la prima costa, poi diuisa si di-
spensa à i tramezi delle quattro prime, coste alla mi-
dolla spinale, à i muscoli, & al capo 127.4
Arteria, che va alla piu alta parte dell'osso del petto,
poi scende verso le cartilagini delle coste et muscu-
li diritti del ventre 127.5
Arteria, che si distribuisce à i muscoli del petto, alle
glandole delle ascelle, & alli lati del petto 127.6
Arteria, che va à i muscoli di dietro del collo 127.5
Arteria, che va verso l'ascella, et si distribuisce à i mu-
sculi della palmeta, & verso la punta dell'osso del-
l'omero 127.6
Arteria, che va al braccio sinistro, & come si dispensi
insino alle dita 127.6, & 128.1. Quella, che va al
destro 128.4
Arteria, che si tocca per sentire el polso 128.1
Arteria dalla tempia sinistra, et dietro l'orecchio, che
si senton battere 128.2.4
Arteria, che va verso la testa, et sua historia 128.2
Arteria, che va alle guance 128.2
Arteria che va al braccio diritto 128.4
Arteria, che va al mesenterio 129.2. mesenterio &
intestino grasso 3
Arteria del seme donde nasca 129.3
Arteria, che passando pel buco dell'osso del pettrigno-
ne si dispensa per li muscoli vicini 129.5
Arteria, che scende per l'anguinaia, & manda rami à
i muscoli, che muouon la coscia, & per quelli, che
son nella parte sua di dietro 129.5.5

T A V O L A

Arteria sotto el tallone, che si sente battere 130.1
 Arteria come si distribuisca per lo piede variamente 130.1
 Arteria prima & seconda, & vena prima seconda & quarta, che vanno alla testa, per quali luoghi entri no 130.3.4
 Arteria terza, che va alla testa, per doue entri, & a quante parti si distribuisca 131.2
 Arteria venale che tunica habbia, & perche fu detta così 131.5
 Arteria venale donde nasca, & come si distribuisca 131.5
 Arteria venale è piena di sangue 131.5
 Arteria venale, & vena arteriale che officio habbino 131.5
 Arterie che cosa sieno, & che contenghino 119.5
 Arterie come naschino dal cuore, i nerui dal cervello, le vene dal fegato 119.2
 Arterie hanno l'origine dal cuore 127.3
 Arterie nelli huomini son due, loro nascimento & distribuzione 120.1
 Arterie hanno due particolari tuniche 119.5. Vn'altra commune 6
 Arterie che sorte di fila habbino & loro vso 119.5
 Arterie perche hanno piu fila intrauerate, che obbli- que 119.6
 Arterie in che sieno differenti dalle vene 119.5
 Arterie dette Soporali & loro historia 128.2
 Arterie soporali, o uero del sonno perche si chiamino così, & esperienza marauigliosa fatta in esse dal Realdo 128.4
 Arterie, che si dispeusan per el capo 128.3.4
 Arterie, che vanno al gargarozzo & lingua 128.2
 Arterie, che vanno alle membra della digestion 128.5
 Arterie, che vanno alla reitella, intestini, stomaco, fie- le, canna della gola, & milza 128.6. & 129.1.3
 Arterie della diaframa 128.5
 Arterie, che vanno a i muscoli delle coste, midolla spi- nale & muscoli della schiena 128.5
 Arterie, che vanno a i rognoni, & la diuersità del loro nascimento 129.2
 Arterie, che vāno a i lōbi, peritoneo, & fiāchi 129.3
 Arterie, che vanno alla vescica, et alla matrice 129.5
 Arterie, che vanno alla pelle del membro 129.5
 Arterie, che si distribuiscon per la gamba 129.6
 Arterie, che si distribuiscon per el piede & per le dita 129.6. & 130.1
 Arterie & vene quanto variamente si congiunghino et separino dentro la testa 130.3
 Arterie quante vadino alla testa 130.3
 Arterie simili alle secondine nel ventricolo destro & sinistro, di che si faccino 31.3
 Arterie et vene del bellico che andare tenghino 91.4
 Articolo primo delle quattro dita della mano, è simi- le al primo del pollice 19.6

Articolo secondo & terzo di tutte le dita della mano si coniuengono, come il secondo del pollice 19.6
 Articulatione sorte di congiuntura 3.6. & 4.1
 Articulatione, o vero congiuntura quel significhi 3.6
 Artbrodia è vna sorte di congiuntura 4.2
 Apprezza & seni dell'osso del tallone, & loro vso 23.5.6
 Astragalus è vn osso del piede 23.4

B

B ARBE de i denti, vedi Radici.
 Bellico come si faccia, et di che vasi 91.3.4
 Bellico in che modo sia nel mezo del corpo, & suo an- dare dentro la matrice 91.5
 Bocca di sopra & di sotto dello stomaco, loro nomi, si- to, & vso 84.2
 Bocca di sotto dello stomaco pche sia piu stretta 84.3
 Bocca della matrice come sia fatta 90.5
 Bocca della matrice nelle pree si chiude i modo, che niente vi puo entrare 90.5
 Bocca della matrice nō si muoue, se bene el collo si stri- gne & allarga 90.5
 Bocca della matrice si apre & chiude naturalmente, non voluntariamente 91.1
 Bocca della matrice nelle grauide & nō grauide come si chiugga & apra 91.1
 Braccio ha sette muscoli, che lo muouono 44.1
 Bracciale è fatto di otto ossa et sua historia 17.6. Per- che habbia piu ossa 18.1. Sue qualità. 6.
 Bracciale tutto par fatto d'vno osso, & sue fategge 17.6
 Bruciore grande perche hanno quelli, che hanno sco- lamento 89.3.4
 Budella, vedi intestini.
 Buco primo dell'ossa delle tempie, & sue cōcavitā 6.6
 Buco per el quale sentiamo passare vn strepito dalla bocca a gli orecchi 9.2
 Buco dell'osso del pettignone, & suo vso 21.3
 Buco per doue i beccai appiccano i buoi dal calcagno 60.2
 Buchi del capo 38 d 39, & loro historia 8.6. et 9.1
 Buchi altri del capo oltr' a i sopradetti 9.4
 Buchi due de l'osso della fronte, loro descrittione & vso 8.6
 Buchi de denti non son veramente buchi 8.3
 Buchi delle radici de i denti, & a che seruino 8.5
 Buchi due della mascella inferiore, et a che seruino 8.3
 Buchi 13 della mascella superiore, 6 proprii, et 7 cō- muni, & el loro vso 9.6
 Buchi dell'ossa delle tempie son otto, loro descrittione et vso 9.2
 Buchi due cōmuni all'osso delle tempie & a quel del- la coloitola 9.3
 Buchi sette dell'osso della coloitola, et la loro historia 9.3
 Buchi

T A V O L A

*Buchi due comuni all'osso cuneale, & à quel della col-
lottola, & à quelle delle tempie, lor sito & vso* 9.4
Buchi dell'osso cuneale son 17, loro descriptione & vso
8.6. & 9.1
*Buchi intorno al collo della paletta della spalla, & lo-
ro vso* 14.6
Buchi de nodi della schiena quanti, & quanto diuersi
10.2.3
*Buchi & tubercolo de nodi dell'osso sacro, loro descrip-
tione & vso* 12.4
Buchi dell'osso della coscia, & lor vso 21.5
Buchi della pelle detti Pori, & à che seruino 38.1
Altri buchi manifesti 2
Buchi della rotula del ginocchio, & loro vso 23.3
Buchi nell'asprezza dell'osso del tallone, & loro vso
23.6
*Buchi due, che ha la diaframa, & vna incauatura, &
loro vso* 49.1
Buchi, che ha la tela, che fascia le coste 102.5
Buchi delle tele, o vescica del cuore, & loro vso 104.6
*Buchi de i ventricoli del cuore quati sieno, & à che ser-
uino* 105.5.6
Buchi della dura madre quanti sieno 109.5
Buoi di poco castrati perche hanno generato 125.4

C

CALCAGNO, vedi osso del calcagno.
Caluaria da i Latini è detta l'osso della testa
4.5
Cambium è il liquore, del quale si nutriscon le membra
88.4
Campanella, vedi Vgola.
Campanella perche si chiami così 104.3
Canale dell'orina, & sua descriptione 89.3
Canaletto delle costole, & à che serua 13.1
Canaletto delle ossa delle dita della mano, & suo vso
19.3
*Canali da purgare le flemme delle ceruella appresso la
parte di sopra del corpo calloso* 110.3
Canali due delle ceruella per purgare la flemma 111.
6. *Canali quattro per el mcdesimo* 112.1.2
Canna della gola che cosa sia, & sua historia 83.5
Canna della gola in quanti modi si chiami 83.6
Canna della gola quante tuniche habbia 83.6
Canna della gola ha quattro glandole, lor sito & vso
84.1
Canna della gola di dentro è liscia & humida 103.5
*Canna della gola di fuori è aspra, & à che parti si con-
giunga* 103.5
Canna del polmone & sua historia 103.2
*Canna del polmone è vna sola, & ha due rami, che si
diuidon in due, & così gli altri rami* 103.2
*Canna del polmone che figura habbia, & di che si fac-
cia* 103.3

*Canna del polmone che variet à pigli dallo inghiottire
& risiatore* 103.4
Canna del polmone che officio habbia 103.6
*Capo qual sia, & la sua naturale, & le non naturali fi-
gure* 4.4
Cardinal cibo come morisse di vn vomito di sangue
121.1
Carne assai sotto i muscoli della testa 48.3
*Carne, che na sca dalla parte di dentro dell'osso del gal-
lone, & suo vso* 59.5
*Carne nella parte di dentro della mano, che sustanza
habbia, & suoi officij* 52.2
Carotides son dette le vene soporali 128.4
*Cartilagine diuersa dalle ordinarie di tutte le congiun-
ture, simile à vna corda, è nel angolo, doue s'incassa
la mascella inferiore, & nel piu delle congiunture
dell'ossa dure, donde nasca, & à che serua* 8.3
Cartilagine del petto simile à vna spada à che serua
13.6
*Cartilagine del lato maggiore delle palette delle spal-
le è molto minor nell'huomo, che in altro animale*
14.3
*Cartilagine del seno della paletta delle spalle perche
non lasci tornar in suo luogo l'omero, quando ne è
uscito* 14.5
*Cartilagine del seno, che ha el collo della paletta delle
spalle, per qual causa esce tanto in fuori, suo nasci-
mento & descriptione* 14.5
Cartilagine detta da i Latini Ensisformis 14.6
*Cartilagine, che nascendo dal minor fusello si mette
fra'l bracciale el maggior fusello senza attaccar si,
& suo vso* 17.1
*Cartilagine della giunta del minor fusello, & suo an-
dare.* 17.4
Cartilagine dl seno dell'osso dell'anche, et suo uso 21.1
*Cartilagine, che lega l'osso del pettignone con quel del
l'anche, come lo legghi, & come apparisca meno cre-
scendo l'huomo* 21.2
Cartilagine dell'orecchio, & suo officio 25.3
*Cartilagine prima del gargarozzo, che si diuide in due,
& suoi processi* 25.5
*Cartilagine prima del gargarozzo, che si diuide i due,
et sua historia* 25.4. *Seconda, suoi processi et seni* 5.
Terza, che si diuide i due 6. *Quarta detta da i Gre-
ci Epiglottis* 16.1
*Cartilagine seconda del gargarozzo è detta dal Vesse-
lio Anulare, per esser simile allo anello delli Ar-
cieri Turcheschi* 25.6
*Cartilagini delle costole che differenze habbino fra lo-
ro* 13.2
*Cartilagini, che fanno maggiori i seni del maggior stin-
co, loro congiugnimento, & historia* 22.3
Cartilagini delle palpebre come sieno, et à che seruino
25.2
Cartilagini del gargarozzo che figura habbino 103.3
Cartilagine

- Cartilagini del gargarozzo tre, & sua historia* 25.4
Cartilagini delle fauci insino à i polmoni son di figura di vna C, & per qual causa 26.2
Castrati perche non generino 125.4
Cataratta da che humore, et doue si generi nell'occhio 113.1
Cauerne dell'osso della fronte, vedi concauità
Celabro come sia grande, doue sia situato, & sua figura 109.6. & 110.1
Celabro ha certi processi, come vermi di legni, lor sito & officio 111.5.6
Ceratoides, cio è cornea, è la quarta tunica dell'occhio 112.6
Cerchio, che è tra l'humor cristallino & vitreo, quel sia 113.2
Ceruella perche sien poste nel capo 109.2
Ceruella da quante cose sien difese 109.3
Ceruella battono, come fa el cuore 109.5
Ceruella in quante parti si diuidono 109.6
Ceruella da che sien diuise in parte destra & sinistra 109.4. & 110.1
Ceruella che figura habbino 110.1
Ceruella hanno impressioni cupe & intorte, per le quali son simili à gli intestini, & à che seruino 110.1
Ceruella che colore habbino, & che sustanza 110.2
Ceruella perche non son midolla delle ossa del capo, come dicono alcuni 110.2
Ceruella non hanno in se vene manifeste 110.2
Ceruella per doue purghino la flemma 112.1
Ceruella hanno 2 canali da purgare la flemma 111.6. Canali 4 per el medesimo 112.1.2
Ceruella hanno solo 3 ventricoli, & loro historia 110.5
Ceruella hanno dentro un corpo simile à vna volta, et sua historia 111.3
Cruella non hanno sentimento, donde anche l'Autore dubita, se son principio de nervi 141.3
Chilo è vna sustanza bianca, nella quale si conuerte el cibo nello stomaco 88.2
Chilo si conuerte in sangue nel fegato, & si netta da gli humori inutili 88.4
Chirurgia parte piu antica della medicina, & per qual causa 1.3
Chondron importa cartilagine 13.2
Choroides son certe pieghe delle cernella, simili alle se condine 130.6
Choroides è la terza tunica dell'occhio detta vnea 112.6
Cibo perche si puo smaltire senza che la bocca di sotto dello stomaco si stringa si forte, come si dice 84.3
Cibo passa per 4 digestioni, nanzi che e si conuertano nella sustanza del corpo 88.1
Cibo nanzi che tutto sia cotto, che niente esca dello stomaco, non è vero 88.2
Cibo nello stomaco si conuerte in vna sustanza bianca, detta chilo 88.2
Cibo non tutto à vn tratto si conuerte in chilo 88.2
Cibo nello stomaco qual prima si cuoca, & qual poi, & per doue esca, come è cotto 88.2
Cibo se bẽ tutto si vomita, in che modo si maitien l'humor viuo 88.3
Cibo essendo preso à bastanza, come se ne nutrisca el fegato, & come essendo preso superfluo 88.3.4
Clauicole & la loro historia 15.3
Clauicole che andar tenghino, & la figura loro 15.4
Clauicole che sustanza habbino 15.5
Clauicole quante righe impressioni, asprezze, et buchi, habbino, & l'uso loro 15.5.6
Coarticulatio è spetie di congiuntura 4.1
Coccole delle secundine, & loro uso 90.3
Codione si fa ordinarimente di 4 nodi, & tal volta di 3 & loro historia 12.5
Codione finisce in vna punta, simile à vn becco di pagallo 12.5
Codione con l'osso grãde pare la coccola de i frati scap puccini 12.5
Collera per doue entri & esca del fiele 86.4
Collera aiuta à far vsire le fecce del corpo 86.5
Collo è dal fine della collottola alli homeri, ha 7 nodi, & la lor historia 10.4
Collo nell'osso che importi 4.4
Collo della paletta delle spalle, suo seno & uso 14.4
Collo del fusel minore del braccio, testicciuola, seno, & suo uso 16.6
Collo & corpo della matrice doue sieno situati 89.5
Collo della matrice come sia fatto di dentro 90.4. Sua sustanza 5
Collo della matrice è liscio & morbido di dentro nelle donzelle, nell'altre al contrario 90.5
Collo della matrice si gonfia, quando la donna è tentata da carnal appetito 90.5
Collo della vescica ha vn musculo nell'huomo, & nella donna, sua descrittione, differenza, & uso 56.4
Collo del piede è simile al bracciale, se bene ha solo 4 ossa, & sua historia 24.3
Commesure del craneo naturale communemente son 3 li nomi & sui di quelle 4.6
Commesura coronale & li suoi termini, & come si ritroui 4.6
Commesura lambdoide & sagittale 4.6
Commesure delle teste non naturali 5.1
Commesure 2 sopra gli orecchi dette scagliofo 5.1
Commesura senza nome, detta dallo Autore commesura yoide 5.1
Commesure dell'ossa del capo appariscono, quali piu, quali meno 5.3
Commesure del capo, quanto piu si va in la cõ la età, manco si reggono 5.3

Commeſſure del capo ne fanciulli ſon piu aperte & lenie 5.6
 Commeſſure & righe, d'harmonie del capo à che ſeruino 5.6
 Commeſſure del capo ſerite ſon di piu periculo, che l'oſſa 5.6
 Commeſſure proprie della maſcella ſuperiore ſon 9. per bāda 4. & vna in mezo & l'andar di quelle 7.4.5
 Compendio dell'opera 148.4
 Compendio delle parti dell'ochio 113.1
 Conarion fu detta la glandola, d'animella delle ceruella, ſimile à vna pina 111.4
 Concarità dell'oſſo della frōte diſpongon l'aere che va alle ceruella, cōe i polmoni quel che va al cuore 6.3
 Condotto del ſeme, quello dell'arteria, donde naſca 129.3
 Condotto del ſeme ſiniſtro, & deſtro donde naſchino, & che andare tenghino ne gli huomini 125.1. Nel le donne 3
 Condotto, che porta el ſeme dal teſticolò al membro, & ſua hiſtoria 125.2
 Condotti primi del ſeme in che ſieno differenti da i ſecondi 125.3.4
 Condotti ſecondi del ſeme quanto ſeme tēghino 125.4
 Condotti dell'orina & loro hiſtoria 87.6
 Congiunzione dell'oſſa detta Simphiſi, d'vnione contiene 2 ſpetie 4.3
 Congiuntura, d'articulatione che ſignificchi 3.6
 Congiuntura ha 3 ſpetie, delle quali la terza è ſenza nome 4.1
 Congiuntura del ginocchio nō ſi muoue da i lati 21.5
 Coronas ſon proceſſi del maggior fuſello del braccio 16.2
 Corpo calloſo delle ceruella doue ſituato & ſua hiſtoria 110.3
 Corpo calloſo che officio habbia 110.4
 Corpo calloſo ha dalla parte di ſopra 2 rinoli, & loro officio 110.3
 Corpo delle ceruella ſimile à vna volta, & ſua hiſtoria 111.3
 Corpo delle ceruella ſimile à i teſticolì & natiche, & ſua hiſtoria 111.5
 Corpo del muſculo è doue le fila ſtan piu appartate, & doue è piu carne 39.5
 Corpi de i nodi del collo, eccetto che del primo, ſon ouati, come ſi cōgiunghino, et pche in tal modo 111.2.3
 Corpi 2 de quali ſi fa el membro, & loro hiſt. 89.2.3
 Corda ne muſcoli di che ſi faccia, & quando ſi faccia 38.5
 Cordali ſon i denti, che naſcon, quādo comincia la barba 8.5
 Corde del primo muſculo delle dita della mano, nanzi che arriuinò al ſecondo oſſo, ſi diuidono, & per tal diuiſione paſſa la corda dell'altro muſculo 52.4.5.
 Il medefimo ne i piedi 61.1

Corona della matrice 90.2
 Coronon che ſignificchi 4.4
 Coſcia in quanti verſi ſi muoua 58.2
 Coſcia ha 14 muſcoli al piu, almeno 10. & loro hiſtoria 58.2.5
 Coſcia ſi diſtende mediante 5 muſcoli, ſi ritira con 3. ſi muoue intorno con 2 59.1.4
 Coſticciuola dell'oſſa del pettignone, & ſuo uſo 21.3
 Coſticciuola della giunta, che ha el maggior ſtenco, impreſſione di quella, & altre qualità 22.2
 Coſtole ſon da ogni lato 12 & tal volta da vn lato 13 & loro diuiſione 12.6
 Coſtole come ſon differenti in ſuſtanza, lunghezza, & larghezza, & in che conuengono 13.1
 Coſtole come ſi congiunghino dalla parte dināzi 13.1
 Coſtole doue hanno tubercoli, et aſprezze, & à che ſer uono 13.2.3
 Coſtole & cartilagini loro dalla parte di fuori ſon curve & liſcie, ma non per tutto 13.2
 Coſtole partendofi da nodi della ſchiena che andare tēghino, & poi le cartilagini 13.3
 Coſtole perche ſuron fatte, & perche altroue di oſſo, altroue di cartilagine 14.1
 Coſtole come ſi congiunghino co i nodi delle ſpalle, & le teſticciuole loro 13.3.4
 Coſtole come ſi leghino co i nodi delle ſpalle, et dell'oſſa del petto 49.3.4
 Coſtole quali ſi comettono col primo & ſecondo oſſo del petto, & come 13.3
 Coſtole non ſi legono alle cartilagini, ma ſi conuertono in loro 49.4
 Conerta del gargarozzo, accio, nō ui entri niente 26.1
 Coxendix che coſa ſia 20.3
 Cranium è l'oſſo della teſta 4.5
 Creatura come ſi ingeneri del ſeme dell'huomo & della donna 91.3
 Creatura quando riceua l'anima 91.5
 Creatura ſi nutriſce per il bellico 91.3.4
 Creatura per quali cauſe, et come ſi muoua a vſcir del ventre 90.6
 Creatura perche non ſta mai nel mezo del corpo 90.1
 Creatura ſi muoue, il maſchio in 3 meſi, la femina in 4 91.4
 Creatura quando naſca veſtita del mātò, et quādo vn braccio, d'gamba reſti rinnolta in eſſo 92.1
 Creatura, che naſce veſtita, non naſce però piu auuētūrata. Et la carta, che ſi fa della veſte, nō ha piu virtù delle altre 92.1
 Creatura piglia forma humana, il maſchio in 30 giorni, in 40 la femina 91.4
 Creatura come ſta ſituata nella matrice 91.5
 Creatura in che tele ſta rinnolta 91.6
 Creatura doue mandi el ſuo ſudore et orina, mētre ſta nel ventre 91.6. Per qual via 92.1
 Creatura uolēdo vſcire rōpe le tele, nelle quali è inuolta

ta	92.1	Didymi son i testicoli appresso i Greci	88.5
Creatura secondo i medici & filosofi si mantiene, del sangue menstruo, l'Autore mostra di no	92.2	Didymion, cio è piccol testicolo, è certa parte delle ceruella	111.5
Creatura si mantiene del piu perfetto sangue della madre	92.4	Differenza fra le legature	37.3
Creature piu à un tratto si posson generare del seme dell'huomo	90.6	Digestion del cibo come si faccia	88.1
Creature perche son partorite da alcune donne, hora una, fra un mese un'altra, & poi un'altra	90.6	Dita della mano hanno, ciascuno 3 ossa, & loro historia	19.2
Cubitus, o ulna è il maggior fusello del braccio	16.5	Dita della mano quanto sien differenti, nel muouersi, & piegarsi, & perche	19.6
Cuore hanno tutti gli animali, o cosa, che lo somiglia	102.2	Dita della mano son mosse da 28 muscoli, & loro historia	52.3
Cuore in alcuni animali ha dentro un osso, ueduto dallo autore ne castrati uecchi, da Galeno gia in un elefante	14.1	Dita del piede, eccetto il pollice, si muouon, come quei della mano	6.1
Cuore genera gli spiriti della uita	102.2	Dita del piede si fanno, ciascuno di 3 ossa, eccetto il pollice, che si fa di 2	25.1
Cuore che grandezza & sustanza habbia	105.2	Diuisione delle parti del nostro corpo	3.1
Cuore come ricena l'aere	102.2	Diuisione dell' ossa	3.4
Cuore da che tele sia fasciato	104.6	Diuisione & spartimento dell' ossa del capo	5.3
Cuore perche fu fatto si duro	105.2	Diuisione della schiena	10.3
Cuore è nel mezzo del petto dalla sua base, & la punta uerso el lato manco	105.2	Diuisione delle ceruella	109.6
Cuore che sito & figura habbia, & il resto di sua historia	105.2	Diuisione delle uene 119.6. Delle arterie	120.1
Cuore per di fuori è liscio	105.2	Donna è piu humida, che alcun altro animale perfetto	92.2
Cuore ha 2 ale, o orecchi, & l'officio loro	105.3	Donne attempate hanno le legature del corpo della matrice molto lente	89.5
Cuore è coperto da una tunica sottile, che ha molto seuo duro dalla base di quello	105.3	Donne, nellequali non si ripiega la reticella, la hanno fra'l collo della matrice & la uestica	89.5
Cuore ha 2 uentricoli, & loro historia	105.4	Donna, perche ha i uasi del seme, no per questo si puo concludere, che sparga seme	88.1
Cuore perche pensorno alcuni esser principio de nervi	106.1	Donna anche ella sparge el seme	88.1
Cuore non da origine ad alcun neruo	141.2	Donne hanno i testicoli, come gli huomini, & loro historia	91.2
Cuore è principio delle arterie	127.3	Donne grauide per doue mandon fuori el seme	90.6
D		Donne grauide non posson concipere, & perche alcune mandon fuori, hora una creatura, & hora un'altra	90.6
DENTE ò dentale, processo del secondo nodo del collo	10.6	Donne grauide come habbin situata la matrice	89.6
Denti son parte spermatica, & caduti non si rifanno	8.4	Donne pregne & donzelle per doue purghino i loro mesi, & similmente le altre donne	125.6
Denti sentono & crescono	8.4	Donne grauide non han la matrice in mezzo del corpo, ma à man ritta, o à man manca	89.6
Denti in che sieno diuersi dalle ossa	8.4	Donne grauide perche non hanno i loro mesi	92.3
Denti son 32.16 per mascella, & ciascuno ha una giunta, che cade ne fanciulli	8.4	Donne molte, essendo grauide, perche hanno i loro mesi, & che utilità ne cauino	92.4
Denti se bene non si ueggono, si nasce con essi	8.4	Donne perche hanno i loro mesi, & perche anche molti non gli hanno	92.3.4
Denti che nomi habbiano, et perche, & quante radici	8.5	Donne assai senza hauer mai i suoi mesi hanno generato figliuoli, & molto sani	92.2
Denti cordali quando naschino	8.5	Donne, che partoriscono, perche non si lascion sedere, & in che modo meglio partorischino	21.2
Denti mascellari sono diuersi in numero, & donde cio nasca	8.5	Donne di parto in quanti dì si purghino	91.4
Diaframa come sia diuersa da tutti gli altri muscoli, & sua historia	48.6. & 49.1.2.3	Duodecimo, o duodeno qual parte sia de gli intestini	85.1
Diaframa è coperta da 2 tele, & ha 2 buchi, & loro uso	49.1	Dura madre è la prima tela, che cuopre le ceruella, & sua historia	109.3
Diaframa non si muoue all'ingiu, quando si piglia l'aere	49.2		
Diarthrosi, & synarthrosi spetie della cōgiuntura, & le altre spetie sotto di esse 4.1. Li nomi di quelle 2			

T A B O L A

Dura madre per di dentro è liscia, lucida, & bagnata d'humor acquoso	109.4
Dura madre fa un processo, come una falce, el quale diuide la parte destra delle ceruella dalla sinistra	109.4
Dura madre diuide le ceruella dal celabro	109.4
Dura madre che officio habbia	109.5
Dura madre come si congiunga alla pia	109.5
Dura madre quanti buchi habbia, & quante parti inuolga	109.5
Dura madre di fuori perche sia aspra, & disuguale	109.3
Dura madre, perche ne feriti si uegga battere	130.3
Dura madre ha 4 seni, & la loro historia	130.3. 4. Il loro officio
	5.6

E

E C P H Y S I S che importi nelli intestini	85.1
Enarthrosis, sorte di congiuntura	4.2
Ensisiforme cartilagine	14.6
Epidermis è la pellicciuola, che è sopra la pelle	38.2
Epididima è la seconda tunica de testicoli	89.1
Epiglottis qual parte sia	26.1
Epiphysis e la giunta, che hanno l'ossa	3.4
Epiploon da i Greci è detta la rete, ò reticella	85.6
Epilogo dell'opera	148.4
Epilogo delle parti dell'occhio	113.2
Eritroides chiamon i Greci la prima tunica de i testicoli	88.6
Esculapio fu el primo chiamato medico appresso à i Greci	1.2
Eunuchi per che non generino	125.4

F

F A U C I & sue cartilagini	26.2
Fauci che nomi habbino, & le glandole loro	104.1
Fegato è sangue congelato, pieno di infinite sorti di vene	86.3
Fegato è principio del sangue, & sua historia	86.1
Fegato doue sia situato	86.1
Fegato come habbia la figura sua dalle membra, che gli son uicine	86.2
Fegato nell'huomo ha manco diuisioni, che nelli animali	86.2
Fegato che legature ha, & à quali parti si lega	86.3
Fegato che officio habbia	86.3
Fegato si fa maggior, ò minore, secondo che piu ò meno si mangia	86.3
Fegato come tira à se el nutrimento essendosi mangiato, quanto bisogna, & come essendosi mangiato di superfluo	88.3. 4

Femina piglia nel ventre figura humana in 40 giorni, in 30 el maschio	91.4
Femina el piu delle volte sta nel lato manco, il maschio nel destro	89.6
Femina si muoue in 4 mesi, in 3 il maschio	91.4
Ferite delle commessure del capo son piu pericolose assai di quelle dell'ossa.	5.6
Fibula, l'osso minor della gamba	22.2
Fiele che figura, che tele & fila habbia	86.5
Fiele che officio habbia	86.5
Fiele manda el suo condotto al fine dello intestino duodeneno	85.1
Fiele doue sia situato, & sua historia	86.4
Fiele ha 2 tronchi, per uno entra, per l'altro esce la collera	86.4
Fiele manda alcuna volta alcun de suoi tronchi allo stomacho, & quel che ne auuenga	86.5
Figura, che fanno l'ossa del collo del piede, tutte insieme	24.5
Figura della matrice nelle grauide, & non grauide	89.6. & 90.1
Figura prima è differente da quella del Vessalio	26.4
Figura prima del secondo libro in che sia differente da quella del Vessalio 63.4. La seconda 64.6. La quinta 68.4. La tredesima 76.6. La decimaquarta 78.2. Et 117. tauola 3. fig.1	
Fila, che sono ne i ventricoli del cuore, & loro uso	105.5
Fila delle vene in che sien differenti dalle fila de i muscoli	119.3
Fiore delle donne, vedi sangue menstruo	
Flemma del capo per doue si coli	112.1.2
Flemma non si purga per el capo, se non quando è so- perchia, come auuiene nello infreddamento	112.2
Fondamento ha 3 muscoli, & loro historia	56.5
Fontanella ò mollame ne fanciulli è parte dell'osso della fronte	6.2
Fontanella del petto qual sia	13.5
Forame, vedi Buco	
Forcella dello stomaco qual sia	13.6
Fosso della testa di sopra dell'osso della coscia	21.4
Fosselli nella matrice, di dentro, in quelle, che di poco han partorito, & loro uso	90.2
Fronte ha 2 muscoli, & la loro historia	39.6
Fronte non si debbe tagliare à trauerso	40.1
Fusello maggiore del braccio come si congiunga con l'osso dell'omero, suoi processi & seno	16.5
Dopo tal congiungimento che andar tenga	16.6
Fusello maggiore descritto fra'l suo principio & fine, con la sua figura di triangolo, & righe di quello	17.1.2
Fusello minore del braccio, sua descriptione, & uso	16.6
Fusello minore come si congiunga col maggiore, & sua	

sua historia 17.3
 Fusello minore ha vna giunta, & quella vn seno, et vn
 processo aspro, & lor vso 17.3
 Fusello minore ha vna riga secondo il lungo suo, i lati
 di quella, & il loro vso 17.4
 Fusello minore descritto dalla parte di sotto 17.4. Da
 quella di dentro & di fuori, & seni 5 della parte
 di fuori, & lor vso 5
 Fusello minore è mosso da quattro muscoli, & loro hi-
 storia 55.2
 Fuselli del braccio sò dua ossa dal gomito al bracciale,
 qual sia maggior, qual minore, et sua historia 16.5
 Fuselli del braccio in che son differenti 16.5
 Fuselli come non si congiungino di sopra, come e fan-
 no da basso 17.3

G

G ALENO perche hebbe tanto credito nelle co-
 se della Notomia 2.1
 Galeno offerrando la scimmia scrisse la notomia 2.1
 Galeno hauer fatto notomia sol di scimmie si pruoua
 con molti essempli 2.3
 Galeno esser scorretto si mostra p alcuni essempli 2.5
 Galeno quãto sia confuso nel principio del lib. dell'os-
 sa 4.3
 Galeno pensò che l'osso cuneale fusse forato, come vn
 criuello 6.4
 Galeno da à i polmoni vn quinto lobo, che ne gli huò-
 mini non si vede 104.4
 Gamba si distende & raccoglie con 10 muscoli, & la
 loro historia 56.6
 Gangole, vedi Glandole
 Gargante che sia appresso gli Spagnuoli 83.6
 Gargar, gargarcon, & gurgulio l'vgola 104.2
 Gargarozzo, sue cartilagini, & loro historia 25.4
 Gargarozzo & sua historia 103.3
 Gargarozzo è minor nelle donne, che ne gli huomini
 25.5
 Gargarozzo ha 10 muscoli proprii, & 8 communi,
 & loro historia 43.2. Altri 2 proprii ne mette el
 Vesalio 4
 Gargarozzo ha 2 glandole appresso la terza cartila-
 gine sua 44.1
 Gargarozzo non ha particular legatura, ma vna sot-
 til tela, che abbraccia le congiunture delle cartila-
 gini 44.1
 Gargarozzo come sia fatto di dentro 103.5
 Gargarozzo ha nel mezzo, quando si chiude, vna fes-
 sura, come di flauto 103.6
 Ginglimon, vna sorte di congiuntura 4.2
 Girella dell'osso dell'homero fatta di vn seno & 2 tu-
 bercoli, & in che sia differente dalle vere 16.2
 Giunte dell'ossa à che seruino 3.5
 Giunta hanno i denti, ciascun la sua, la quale cade ne
 fanciulli 8.4

Giunta del processo, che ha la spina dalla paletta delle
 spalle, la quale ne fanciulli è di piu officelli 15.2
 Giunta delle teste delle clauicole, & sue cartilagini
 15.3
 Giunta dell'osso dell'homero, grande, et sua testa 15.6
 Giunta nella parte di sotto dell'osso dell'homero, della
 quale è fatta la testa di fuori & di dentro, & come
 si congiunga 16.3
 Giunta, che ha la testa del maggior fusello del brac-
 cio, & el suo processo 17.1
 Giunta, che ha l'ultimo processo del maggior fusello
 del braccio, & tal volta 2 & come si congiunghi-
 no 16.6
 Giunta del minor fusello del braccio, & seno, & suo
 vso 17.3
 Giunta dell'ossa del pettine della mano 19.1
 Giunta della punta del gallone, sua descrizione & vso
 20.5
 Giunta di sopra del maggior fusello che forma & vso
 habbia dalla parte dinanzi 22.4
 Giunta del maggior stinco descritta dalla parte di die-
 tro, & suoi seni 22.5. quella del minore 6
 Giunta dell'ossa del pettine del piede 24.6
 Giunte de i processi de nodi del collo 11.1
 Giunte del maggior lato delle palette delle spalle 14.3
 Giunte de nodi della schiena 10.2
 Giunte di sopra & di sotto del pettine della mano co-
 me si congiungino fra loro & con le altre ossa 19.
 i. suoi seni & loro uso 2
 Giunte dell'ossa del pettine della mano presto si vniscò
 con le sue ossa 19.1
 Giunte dell'ossa del pettine della mano perche son piu
 grosse dell'ossa 19.2
 Giunte dell'osso della coscia doue & come si congiun-
 ghino all'ossa vicine 21.4
 Giunte delli stinchi della gamba dalla parre di sopra
 & di sotto, & differenza fra loro 22.2
 Giunte di sotto delli stinchi hanno, ognuna, vn proces-
 so, & fra quelli vn seno 22.5
 Glandola, che è nello intestino attaccato alla bocca di
 sotto dello stomaco, & suo vso 84.3
 Glandola delle ceruella simile à vna pina, & sua histo-
 ria 111.4
 Glandola delle ceruella, che riceue la flemma, & sua
 descrizione 112.1
 Glandole 4 che son nella canna della gola, lor sito, &
 vso 84.1
 Glandole à che seruino 104.1
 Glandole & loro historia 103.6
 Glandole di 3 sorti son nelle fauci 104.1
 Glandole seconde che officio habbino 104.1
 Glandole seconde impiegate quãto difficilmente si cu-
 rino 104.1
 Glandole terze gòfiandosi fanno el male delle scrofule
 104.1

T A V O L A

Glandole, che son nelle tele, che diuidon el petto 103.1
 Glandole di che sustanza sieno, & che differenze hab-
 bino 120.3
 Glandole che officio habbino, presso à quali vene sie-
 no, & in che parti del corpo si ritrouino 120.2
 Glondole, che seruono à riceuer le superfluità 120.3
 Glandole, che seruon à mollificare el luogo, doue sono
 120.3.4. Et altre à empirlo 4
 Glandole doue sono nel mesenterio 121.3
 Glandole molte perche son nell'anguinaia 126.3
 Glution, che vuol dir piccola natica è certa parte del-
 le ceruella 111.5
 Gola, vedi canna della gola.
 Gomito ha due muscoli, che lo piegano, & due, che lo
 distendono 51.3.4.5.6
 Gomphosis sorte di congiuntura 43
 Gorgozzule, vedi Gargarozzo.
 Grasso, che è fra la pelle & tela carnosà, & di che si
 generi 38.2
 Grasso fra la pelle & la tela carnosà in che animali si
 truoui in quantita maggiore, & grasso in altre par-
 ti del corpo, & suo uso 38.3
 Grasso è bianco ne giouani, giallo ne vecchi, & perche
 bianco 38.3
 Grasso e alle uolte nel fondo dello stomaco 84.4
 Grasso fra le cartilagini del gargarozzo & la terza
 tunica 103.5
 Grasso duro alla base del cuore 105.3
 Guàce hanno quattro muscoli & la loro historia 40.6
 Gula che significhi 83.6
 Gusto si fa per la lingua & palato 148.3.4
 Gusto de i cibi da quali non sia sentito 148.4

H

HARMONIA sorte di congiuntura 4.2
 Harmonie, vedi Righe.
 Herosilo & Erasistrato ferno la notomia di vini
 1.5
 Herbero che sia appresso gli Spagnuoli 83.6
 Hippocrate primo separò la medicina da la filosofia.
 Et suoi successori 1.4
 Homero, vedi Ossa dell'homero.
 Humore vntuoso delle congiunture, & suo uso 37.5
 Humore vntuoso dalla corda del nono musculo, che
 muoue la gamba, & suo uso 58.1
 Humor lento & lubrico sotto la tela carnosà, & à che
 serua 38.4
 Humor nitreo, & sua descrizione 112.4
 Humor cristallino & sua descrizione 112.5
 Humore albugineo è detto da alcuni l'humore acquo-
 so p'esser simile alla chiara, ò albume d'uono 113.1
 Humor acquoso, & sua historia 113.1
 Humor acquoso tal volta si conuerte in catarrata, &
 come si caui 113.1

Humor acquoso tal volta perdendosi si perde la vista
 non apparendo difetto nell'occhio 113.1
 Humor acquoso non è di tanta quantità, quanta uo-
 le el Vessalio 113.1
 Hydatoides da i Greci è detto l'humor vitreo 112.4
 Hydatoides è l'humor acquoso dell'occhio 113.1
 Hyoide osso perche si chiami così 9.6

I

IANITOR ò pyloros è la bocca di sotto dello sto-
 maco 84.2
 Ileon intestino terzo 85.2
 Imbuto delle ceruella, & sua historia 111.6. & 112.
 1.2
 Impressione della testa di dentro dell'osso della coscia
 dalla banda del ginocchio 21.6
 Impressione del maggior sinco dalla parte di sotto
 23.4
 Impressioni delle ceruella à che seruono 110.1
 Intestini, & loro historia 84.5
 Intestini tutti son vn solo 84.6
 Intestini han di lunghezza più di venti braccia 85.1
 Intestini si diuidon in grossi & sottili 84.6. Ciaschedu-
 na di tali parti si diuide in tre 85.1
 Intestini sottili hanno due tuniche, & vn'altra dal pe-
 ritoneo 84.6
 Intestini sottili, & loro historia 84.6. La lor diuisione
 85.1
 Intestini sottili pebe habbino più rami dalla vena por-
 ta, che gli altri 121.3
 Intestini grossi, & loro historia 84.6. La lor diuisione
 85.2
 Intestino duodeno & suoi nomi, al fine del quale entra
 il condotto del fiele 85.1
 Intestino grosso detto colon, & il retto, & loro tuniche
 83.5
 Intestino colon perche fussi detto così 85.3
 Intestino cieco, & diuersi pareri di esso 85.2
 Intestino digiuno, & il sottile detto Ileon 85.2
 Intestino digiuno doue finisca 85.2
 Intrecciamento, che fanno alquanti nerui del collo, dal
 quale nascon i nerui del braccio 145.1.1. & 146.1
 Intrecciamento, che fanno alquanti nerui de lombi, don-
 de deriuano i nerui della gamba 147.3
 Istmos è vn stretto, del qual nome alcuni chiamon le
 fauci 104.1

L

LABBRA hanno quattro muscoli & loro histo-
 ria 41.3
 Labbra di che si faccino 41.3
 Ladri in Venetia pel primo furto son priui d'uno oc-
 chio 142.2
 Lagrime

T A V O L A

Lagrima perche si preffo, & abbondantemente, eschi-
no 110.6
Lambdoide, sorte di commessura 4.6
Lato di fuori dell'osso del gallone, & sue righe 20.6
Lato maggiore delle palette delle spalle, sua descrittio-
ne, giunte, & cartilagini 14.3
Lato dinanzi & di sopra delle palette delle spalle, loro
differenze, & uso 14.3.4
Lato di sopra delle palette delle spalle, & suo uso 14.5
Legame, che lega lo stinco all'osso del calcagno 22.5
Legatura si puo chiamare ogni musculo 37.3
Legatur a, detta i capelli, laqual non si truoua nell'huo-
mo, & che mangiandosi dicon le donne che fa bion-
di i capelli 51.2
Legatura, con laquale si legano i processi de nodi del
collo 11.1
Legatura da l'un processo à l'altro del bracciale 18.6
Legatura grossissima del ginocchio 22.3
Legatura forte, con laquale si congiungono insieme di
sotto gli stinchi 22.4
Legatura piu forte, che alcuna altra del corpo, è quel-
la del gallone con la coscia 62.1
Legature ancora esse si chiamon nerui 37.2
Legature di che si faccino, & donde nascino 37.2
Legature hanno 6 officij 37.2.3
Legature in quanti modi sien fra loro differenti 37.3
Legature non son molto sensitiue, & perche 37.5
Legature altre assai fuor dell'ordinarie 37.3
Legature della testa, et de i due primi nodi del collo, lo-
ro descrittione & officio 46.6. & 47.1
Legature de i nodi della schiena 50.6. Altre legature
& loro officio 51.1
Legature, che legano l'osso dell'omero con la palette
della spalla, quante sieno, & loro historia 45.2.3
Legature di piu sorti de i fuselli del braccio & della
mano, & loro historia 55.5
Legature, che aiutano à far stare nel suo luogo le cor-
de, stan tutte intranersate, & sono assaissime 55.5
Legature, che abbraccion gli articoli, & loro differen-
ze 55.6. Molte altre differenze 56.1
Legature, come tele, che legano i musculi, l'un con l'al-
tro 55.6
Legature, che legan le costole à i nodi delle spalle, &
all'osso del petto, quali sieno 49.3
Legatura della congiuntura del gallone & del ginoc-
chio, & altre, che son nella gamba & piede, et loro
historia 61.6
Legature perche non son dalla parte dinanzi del ginoc-
chio 62.3
Legature del pettine del piede, & delle dita, son simili
à quelle della mano 62.6
Legature del segato, & à che parti si legbi 86.3
Legature del membro 89.3
Legature della matrice son lente, & molto piu nelle at-
tempate 89.5

Lingua che sustanza habbia, di che parti si faccia, mu-
sculi 10, che ha, et loro historia 42.5.6. & 43.1.2
Lingua è piena di uarie sorti di fila per li suoi molti mo-
uimenti 42.5. & 43.2
Lingua è diuisa per el mezzo secondo el lungo median-
te vna tela fortissima 42.5. & 43.2
Lithoides perche fu detto l'osso delle tēpie da i Greci
6.3
Lobus, vna parte de polmoni 104.4
Lombi hanno cinque nodi, & loro historia 12.1
L'una è commune madre delle humidità 92.3

M

MAMMELLE, vedi Poppe.
Mano è mossa sopra il bracciale da quattro
musculi, & loro historia 54.5
Mano tutta si muoue al mouimento del minor fusello
55.2
Manto è detta la seconda tunica, che fascia la creatu-
ra 91.6
Mascella superiore è tutta la faccia dalle ciglia alla
bocca, & 12 sue ossa 7.2
Mascella superiore ha 13 buchi 6 proprij, & 7 com-
muni, loro descrittione & uso 9.4.5
Mascella inferiore contiene el mento & le ganasce co-
i denti, & è fatta di due ossa, & sua descrittione 8.2
Mascella inferiore ne gli huomini et aiali sola si muo-
ue, nel cocodrillo quella di sopra, nel papagallo l'u-
na & l'altra 8.2
Mascella inferiore ha due buchi, et certe asprezze, &
à che seruino 8.3
Mascella inferiore vscita del suo luogo come si raccon-
ci 8.3
Mascella inferiore ha 8 musculi, & loro historia 41.5
Maschio el piu delle volte sta nel lato destro, la fem-
mina nel sinistro 89.6
Maschio si muoue in tre mesi, femmina i quattro 91.4
Maschio piglia figura d'huomo in 30 giorni in 40 la
femmina 91.4
Masteteros che musculi sieno della bocca 41.5
Maslicatore, primo musculo della mascella inferiore,
& sua historia 41.5.6
Materia gialla come fango attaccata alla creatura,
quando nasce, è superfluita della quarta digestione
92.1
Matrice doue sia situata, & sua historia 89.4
Matrice doue habbia el suo collo & corpo 89.5
Matrice ha le legature lente, massime nelle attempa-
te, nelle quali la bocca scende fin presso alla natura
89.5
Matrice non è mai d'una medesima grandezza ma nel-
le donzelle sempre è minore 89.6
Matrice che figura habbia nelle grauide & non graui-
de 89.6. & 90.1
Matrice per esser nel lato destro ò manco non mostra
piu maschio, che femmina 89.9
Matrice

T A V O L A

Matrice che sito tenga nelle grauide 89.6
 Matrice ha da alto à basso vna riga rileuata, & à che
 serua 90.1
 Matrice col suo collo descritta dalla parte di fuori &
 di dentro 90.1
 Matrice doue ha quegli angoli, assomigliati da alcuni
 alle corna, & da altri alla Luna crescente 90.2
 Matrice fa la figura d'vn pie di tazza dalla parte di
 dentro 90.2
 Matrice ha dentro certi fossetti in quelle, che hanno
 partorito di poco, & lor uso 90.2
 Matrice non ha le celle, ò camere, che alcuni si son ima-
 ginati 90.2
 Matrice che sustanza habbia, che tuniche, & le lor
 fila 90.3
 Matrice non ha vene gonfie se non nelle pregne 90.3
 Matrice, come ha riceuuto el seme, si chiude & racco-
 glie 91.3
 Matrice & mammelle per quali uene habbino commu-
 nicanza 126.1
 Mediastino vuol dir tramezo 102.4. vedi Tele, che
 diuidon il petto.
 Medicina quanto sia arte antica 1.1
 Medicina pche si dice esser stata trouata da i Greci 1.3
 Medicina pche studiosamēte furicerca da i Greci 1.3
 Medicina quando si diuise in tre parti 1.4
 Medicina theorica separata dalla pratica da Serapio-
 ne 1.5
 Membra principali son tre, donde dirina cioche biso-
 gna al nutrimento, vita, & moto 119.2
 Membra spermatiche à vn medesimo tempo si forma-
 no tutte del seme 119.2
 Membro di che sia composto, quattro suoi muscoli, &
 loro historia 56.2
 Membro che cosa sia, & sua historia 89.2
 Membro di quante parti si componga 89.2
 Membro ha qualche similitudine col corpo della ma-
 trice 89.2
 Membro come possa perdere il sentire & non el muo-
 uere, & al contrario 147.3
 Menstruo, vedi sangue menstruo.
 Meri qual parte significhi 83.6
 Mesenterion, ò Meserion 85.4
 Mesenterio, suoi nomi, & historia 85.4
 Mesenterio che officio habbia 85.4
 Mesi delle donne, vedi Sanguo Menstruo.
 Midolla spinale è piu dura delle ceruella & cosi i ner-
 ui, che nascon di essa 141.3
 Midolla spinale & sua historia 143.6
 Midolla spinale è come parte, ò processo delle ceruella
 143.6
 Midolla spinale è coperta da tre tele 143.6
 Midolla spinale in che sia simile & differente dalla cer-
 uella 143.6
 Midolla spinale perche fussi fatta 144.1

Midolla spinale in che è differente dalla midolla del-
 l'allr' ossa 144.1
 Midolla spinale che diuersità habbia i se stessa 144.1
 Midolla spinale fa 58 ò 60 nervi, & la ultima sua par-
 te non è neruo 144.1
 Milza doue sia situata, & sua historia 86.6
 Milza à quali parti si legghi, & suo officio 87.1
 Milza che colore, sustanza, & tela habbia 86.6
 Milza come sia conforme alle parti vicine 86.6
 Milza ne gli huomini in che sia differente da quella de
 gli animali 86.6
 Molares, denti mascellari 8.5
 Mollame ò fontanella ne fanciulli è parte dell'osso del-
 la fronte 6.2
 Monte di Venere da i Chiromanti da che muscolo sia
 fatto 53.3
 Monticelli chiamon i Chiromanti le polpe delle dita
 52.2
 Morene, ò morice, alcune si fanno de i rami della vena
 cana 125.5
 Morene à che giouino cauādo per esse sangue 121.4
 Mouimento perche si perda & resti el sentimento, &
 al contrario 141.4. & 147.3
 Muscolo che cosa sia, & di che si componga 38.5
 Muscolo perche si chiami così da i Latini, perche an-
 che si chiami pesce 38.5
 Muscolo, che è come vn tramezo fra le membra vita-
 li & quelle della digestione, detto Diaframa, &
 sua historia 48.6
 Muscolo, che fa la tela della palma della mano 52.1
 Vn altro, che la muoue, non scritto dal Vesalio 2
 Muscolo vñesimo terzo, che muoue le dita perche pa-
 re liuido 54.3
 Muscolo primo, & terzo, & quarto del fusel minore
 non finiscono in corda 55.4
 Muscolo del collo della vescica nell'huomo & nella
 dōna, sua descrizione, differēza, & officio 56.4.5
 Muscolo terzo del fondamento non è sì corto, come al-
 cuni pensano 56.6
 Muscolo secondo della gamba nelle donne magre pare
 vna legatura neruosa 57.2
 Muscolo nono della gamba si chiama il pesce della gam-
 ba 57.6
 Muscoli in quante cose sien differenti fra loro 38.5.6
 & 39. da 1 à 5
 Muscoli quasi tutti son di vn colore, ma scarnati bian-
 chegiano, et perche alcuni paiono di color di piom-
 bo 29.4
 Muscoli son coperti, ciascun da una tela 38.5
 Muscoli tutti han le fila secondo la lunghezza loro, ec-
 cetto quelli delle labbra & gote 39.4
 Muscoli secondo la diuersità delle fila hanno diuersi
 officij 39.4
 Muscoli della faccia quanto sien confusi 39.6
 Muscoli della fronte son dui, & l'uso loro 39.6
 Muscoli

Musculi della fronte tagliati a trauerso fanno, che non
si posson aprir gli occhi 40.1
Musculi due delle palpebre, loro historia, & officio.
Et un'altro terzo musculo 40.2
Musculi cinque dell'occhio & loro historia 40.3.4.
L'officio loro 5
Musculi quattro del naso, & loro officio ma non son
quelli, che descrive el Vessalio 40.5
Musculi quattro delle guance & loro historia 40.6
Li due primi, che hanno quattro lati 40.6. & 41.1
& l'officio loro secondo Gal. Ves. et l'Autore 41.1
Li altri due musculi 41.2
Musculi delle labbra & loro historia 41.3. L'officio
loro 4
Musculi otto della mascella inferiore & loro historia
41.5
Il primo, detto Masticatore 41.5.6
Secondo 6. & 42.1
Terzo, & loro officio 42.1
Quarto, che nel mezzo si fa neruoso 2
Musculi 12. dell'osso hyoide, 8 proprii, et quattro com-
muni, & il loro officio 42.2.3.4.5
Musculi del quarto paio dell'osso hyoide si fanno nel
mezo neruosi 42.4
Musculi 10. della lingua, et il loro officio 42.6. et 43.1
Musculi del gargarozzo 10 proprii 43.2.3.4. Et 8.
communi 5.6. L'officio loro 43.3.4.5.6.
Musculi due del gargarozzo mette il Vessalio oltre à i
10. & l'officio loro 43.4
Musculo, che si truoua in alcuni nel gargarozzo 43.3
Musculi delle fauci, del quarto paio, si ueggon bene ne
buoi, nell'huomo non gli ha potuti ancor vedere
l'autore 43.6
Musculi sette, che muouon el braccio & loro historia
44.1
Il primo, & suo officio 44.1.2
Secondo 3.4
Terzo 5
Quarto 5.6
Quinto 6. & 45.1
Sesto & settimo 45.1
Musculi quattro della paletta della spalla, & loro of-
ficio 45.3.4.5.6
Musculi della testa 14 particolari & loro officio 46
da 1 à 6
Musculi quattro altri 46.1.3
Musculi due, & otto ancora 6
Musculi del ventre & loro historia 47 da 1 à 6 l'offi-
cio loro 6
Musculi due de i testicoli dell'huomo, & loro officio
47.6 Et due anche di quei della donna 48.1
Musculi 89 del petto contando quei del ventre & lo-
ro historia da 48.1 à 49.3. L'officio del primo, se-
condo, & terzo paio 48.3. del quarto, quinto &
sesto 4

Musculi del petto detti intercostali, paia 34. & loro
historia 48.5. L'officio loro 6
Musculi otto del ventre, & loro historia 4 da 1
à 6
Musculi del ventre, & quei della schiena & braccia
come aiutino à respirare 49.2
Musculi del primo paio eella schiena non son piu di
due, come alcuni dicono 49.5
Musculi 16 della schiena & loro historia 39.5
Il primo paio & suo officio 49.5
Secondo & terzo 6
Quarto 50.1
Quinto 2
Sesto 3
Settimo 4
Ottauo 5
Musculi quattro che muouon el gomito & loro hi-
storia 51.3
Li due primi che lo piegano, de quali il primo è
detto il pesce del braccio 51.3.4.5
Li altri due, che lo distendono, de quali il primo da
alcuni si diuide in due 51.5.6
Musculi delle dita della mano 28, et loro historia 52.3
Il primo & suo officio 52.3.4
Secondo 4.5
Terzo 6. & 53.1
Tredici altri musculi, di che à ciascun primo arti-
colo ne seruon due, & tre al secondo del pol-
lice 53.1.2.3
Decimo settimo, primo de quei, che distendon le di-
ta 4
Decimo ottauo 5
Decimo nono 6
Ventesimo, ventesimoprimo, & secondo 54.1
Ventesimo terzo, che à il primo de 6 che muouon
le dita da i lati, & ventesimoquarto 3
Ventesimo quinto, sesto, settimo, & ottauo 4
Musculi, che fanno el monte di Venere de i chiroman-
ti 53.3
Musculi, che muouon le dita della mano, quattro le
distendono, sedici le raccolgono, oito le muouon
da i lati 54.4
Musculi quattro vltimi di quei, che muouon le dita,
non nascon da osso, ma da corde 54.4
Musculi quattro, che muouon la mano sopra il brac-
ciale, & loro historia 54.5. L'officio loro 55.1
Musculi quattro muouon el fusel minore, due seruon
alla parte di sopra, due à quella di sotto, & loro
historia 55.2. L'officio loro 55.3.4
Musculi quattro del membro, & loro officio 56.3
Musculi 3. del fondamento & loro historia 56.5.
L'officio 56.5.6
Musculi del fondamento non nascon da esso 56.5
Musculi 10. della gamba, & loro historia 56.6
il primo & secondo & loro officio 57.1
Terzo

Terzo	2
Quarto & quinto	3
Sesto	4
Settimo & ottauo	4
Nono	6
Decimo	58.1
Musculi, della coscia 14 al piu, almeno 10, & loro historia	58.2
Il primo	58.2
Secondo	3
Terzo & quarto	4
Quinto 5. L'officio de i detti	59.1
Sesto	59.1
Settimo & ottauo	2
Nono decimo 3. Il loro officio	3.4
Musculi due altri	59.5
Musculo quinto della coscia come si diuida in due, & come ancora in tre, & loro officio	58.6
Musculi 9 muouon el piede, & loro historia	59.6
Il primo & secondo	59.6
Terzo & quarto	60.1
Quinto	2
Sesto	3
Settimo	4
Ottauo	5
Nono 6. L'officio loro	60.6
Musculo quinto, che muoue el piede simile al coltello de Beccai	60.3
Musculi, che muouon le dita del piede, son i medesimi con quei della mano, & son 22. loro historia, & officio	61.1
Il primo	61.1
Secondo	2
Terzo & altri 10 musculi	3
Decimo quarto, quinto, & sesto	4
Decimo settimo & ottauo	5
Altri quattro musculi	6
Musculi quanti sieno in tutto el corpo	62.6

N

Naso & sue cartilagini	25.3
Naso ha quattro musculi, & loro officio	40.5
Natiche & testicoli delle cernella	111.5
Nauiculare, vedi osso nauiculare.	
Neruo cōemēte quante cose significhi	4.4. et 141.2
Neruo propriamente detto che cosa sia	141.2
Neruo, che alle volte si accompagna con l'arteria del seme	145.5
Neruo, che accompagna la vena della testa	146.2
Vn'altro la maggior vena del braccio sotto la pelle	3
Neruo, cha va con la vena del fegato & con l'arteria grande	146.5
Neruo, cha va con la vena & arteria, che passon per	

l'anguinaia	147.4
Nerui come naschino dal ceruello, l'Arterie dal cuore, le vene dal fegato	119.2
Nerui nascon dalle cernella, & non dal cuore, ne dalla dura madre	141.2
Nerui quanto sieno differenti fra loro in durezza, & per qual causa	141.3. Nel nascere & nel distribuirsi
Nerui dalla parte di dentro non sentono, ma da quella di fuori	141.3
Nerui seruon, altri al moto, altri al senso, benché tutti sentino	141.4
Nerui non son bucati, come hanno detto alcuni	141.5
Nerui che vāno alla pelle perche nō la faccin muouere, come quelli, che vāno a i musculi	141.4
Nerui sette paia escon delle cernella secōdo molti, benché si potrebbe dire che fussin	9. 141.6. & 141.1
Quelli del primo paio donde naschino, & la loro historia	142.1
Quelli del secondo	142.3
Quelli del terzo, che nascon con due radici	3
Quelli del quarto	5
Quelli del quinto, che nascon con molte radici	5.6
Vn'altro paio, che nasce presso al quinto	6
Quelli del sesto, che nascon cō molti principij	143.1
Quelli del settimo, che nascō con molti principij	6
Nerui della vista non si incrociano, come hanno pensato alcuni	142.1
Neruo della vista si inserisce nel mezzo della parte di dietro dell'occhio, & suo officio	142.2
Nerui della vista veduti dall'Autore esser diuisi, & dal Vessalio al tutto separati	142.2
Nerui reuersiui perche si chiami così	3.3
Nerui reuersiui & loro historia	143.2
Nerui reuersiui a che seruino, & per qual esperimento si conosca	142.3
Nerui, che vāno a molte parti del volto et della bocca, iquali son rami del terzo paio	142.3.4.5
Nerui, che dal sesto paio vāno allo stomaco, fegato, reticella, intestini, fiele, rognoni, mesenterio, vescica, matrice, & milza	143.4.5
Nerui, che vāno al cuore	143.3
Nerui, che vāno alla lingua, osso yoide, et gargarozzo	143.6
Nerui 58, o 60 nascon dalla spinale	144.1
Nerui, che nascon del collo, & loro historia	144.1
Quelli del primo & secondo paio, che han due principij, donde naschino el cōe si distribuischino	144.2
Quelli del terzo	3
Quelli del quarto & quinto	4.5
Quelli del sesto	6
Quelli del settimo	145.1
Nerui, che vāno a i musculi, che muouon la testa	144.2.3.6. & 145.2.3
Nerui, che vāno a i musculi del petto	144.5. 145.2.

4.5.146.1
 Nerui, che vanno alla diaframa 144.5
 Nerui, che vanno à i muscoli, che muouon la schiena 144.2.3.145.3.5.6
 Nerui, che vāno à i muscoli del collo 144.4.5.6.145.1.2
 Nerui del collo tutti eccetto el primo mandon rami al musculo largho et sottile, che muoue le guāce 145.1
 Nerui, che vāno al musculo largo & sottile, che muoue le guance, & mascella di sotto 144.3.4.145.1
 Nerui, che vanno à i muscoli, che muouon la paletta della spalla 144.2.4.5.6.145.1.2.3.4
 Nerui, che nascon de nodi delle spalle, & loro historia 145.2
 Quelli del primo paio 145.2
 Quelli del secondo 3
 Quelli delle altre paia 3.4
 Nerui, che vanno à i muscoli delle coste 145.2.3.4
 Nerui, che vanno a i muscoli del ventre 145.4.5.6
 Nerui, che vanno alle mammelle 145.4
 Nerui, che vanno à i muscoli, che muouon la coscia 145.4.5.6.146.1
 Nerui, che nascon de nodi de lombi, & loro historia 145.5
 Nerui, che nascon dell'osso grande, & loro historia 145.6
 Nerui, che vanno à i muscoli, che muouon il braccio 144.5.6.145.4.5.6.146.1
 Nerui, che si distribuiscon per il braccio 145.2.146.4
 Nerui delle braccia tutti da che altri nerui si faccino 145.1.146.1
 Nerui, che si distribuiscon per le braccia, & la loro historia 146.1
 Quelli del primo paio 146.1
 Quelli del secondo 2
 Quelli del terzo 3.4
 Quelli del quarto 5
 Quelli del quinto 147.1
 Quelli del sexto 2
 Nerui, che vanno al membro 146.1 Altri, che vanno à i muscoli, che lo muouono 147.5
 Nerui, che vanno al collo della matrice 146.1
 Nerui, che vanno al collo della uestica 146.1
 Nerui, che vanno à i muscoli del fondamento 146.1
 Nerui, che vanno à muscoli del minor fusello 146.2
 Nerui, che vanno al fusel minore, & maggiore 146.3.6.147.2
 Nerui, che vanno à i muscoli del gomito 146.2.4.5
 Nerui, che vanno alla palma della mano, & al pectine 146.3
 Nerui, che vanno al dito grosso della mano & alle altre dita, & à i muscoli, che le muouono 146.3.4.5.6.147.1.2
 Nerui, che vāno à i muscoli, che muouon el bracciale 156.6.147.1

Nerui, che vanno à i muscoli, che muouon la coscia 147.4.5.6
 Nerui, che si distribuiscon per la gamba & piede, & loro historia 147.3
 Quelli del primo paio 147.3.4
 Quelli del secondo 4
 Quelli del terzo & quarto 5
 Nerui, che vanno à i muscoli, che muouon la gamba 147.4.5.6
 Neruo piu grosso, & piu duro di tutto el corpo è il quarto, che va alla gamba 147.5
 Nerui quasi tutti, che vanno alla gamba dal ginocchio in giu, vengon dal quarto paio 147.6
 Nerui della gamba del quarto paio son fatti come di molte fila 147.6
 Nerui, che vanno à i muscoli, che muouon il piede 147.6
 Nerui, che vanno al dito grosso del piede, & alle altre dita, & à i muscoli, che le muouono 147.4.148.1.2
 Nerui, che vanno alla pianta del piede 148.2
 Nerui doi, & processi simili à nerui, che seruon al senso dell'odorare, loro historia & officio 148.3
 Nerui, che si distribuiscon p la pelle della testa 144.3
 Per quella, che cuopre el musculo, che alza el braccio 5
 Per quello della parte di fuori del braccio 6. & 146.6. Per quella dinanzi 4. Per quella di fuori 5
 Per quella delle spalle 145.4
 Per quella de lombi 5
 Per quella dell'anguinaie 6.146.1.147.6
 Per quella del minor fusello 146.2
 Per quella dell'osso dell'omero 147.2
 Per quella dinanzi della coscia 4
 Per quella di dentro della coscia, gamba, & per el ginocchio 4.5
 Per quella di dietro della coscia 6
 Per quella di fuori della gamba, tallone, & piede 148.1
 Ninfè, che i Poeti fingeano esser seguitate da i Satiri, che importino 90.4
 Noce nel gargarozzo che sia 25.4
 Noce del gargarozzo esce vgualmēte fuori nelli huomini & donne 25.5
 Noce del gargarozzo perche si mostra piu nelli huomini, che nelle donne 25.4
 Nodo della gola, vedi Noce del gargarozzo
 Nodi della schiena 30. & la loro historia 10.2
 Nodi della schiena come si cōgiungino insieme dinanzi & di dietro, & con che si leghino 10.3
 Nodi della schiena, quāto uariamente sieno bucati per far via à uerui, vene, & arterie 10.3
 Nodi della schiena come son differenti nello esser formati, & perche 10.3
 Nodi della schiena dislogati, se son piu emenor perico lo, se vno, magior, & perche 10.3
 Nodi

Nodi della schiena in che modo si congiungono	50.6.
Et 51.1.2.	
Nodi della schiena tutti eccetto il primo in che modo si commettono mediante i processi di sotto Et quei di sopra	11.6
Nodi sette del collo, Et loro historia	10.4
Nodo primo del collo in che sia differente dalli altri	10.4. Il secondo 5
Nodo primo del collo come si congiugne al secondo	10.6
Nodi dui primi del collo come si congiungono	10.4.6
Nodo secondo del collo come si congiunga al terzo, Et cosi gli altri	11.2
Nodi quattro del collo fra'l secondo Et settimo oltre à i sette processi, che hanno tutti i nodi della schiena, ne hanno di piu cinque	11.3
Nodi delle spalle sono ordinariamente 12 congiunti à quei del collo	11.3
Nodi delle spalle come son differenti infra loro	11.3
Nodi delle spalle hanno due fossi, doue s'inferiscono i capi delle coste. Et due ne ha il primo Et duodecimo, donde nascon legami. Loro forma, Et sito	11.4
Nodi delle spalle hanno sette processi. Et quei di dietro quanto sien diuersi, Et come si congiungono	11.4
Nodo primo Et duodecimo come si commettono insieme	11.6
Nodi de lombi cinque, Et loro historia	12.1
Nodi de lombi che differenze habbino dalli altri	12.1
Nodi de lombi hanno i medesimi sette processi, che gli altri, Et la description loro	12.1
Nodi alcuni de lombi in alcuni huomini hanno oltr'al li altri, due processi, non visti dal Vesalio	12.2
Nodi dell'osso sacro 6 ordinariamente, Et tal volta 5, Et come sien congiunti	12.3
Nodi dell'osso sacro son situati al contrario di quei della schiena, Et quali di essi hanno processi	12.3
Nodi del codione son quattro ordinariamente, Et tal volta 3, Et la loro historia	12.5
Nodo primo del codione quado habbia processi	12.5
Nodi del codione hanno vn seno, Et come si commettono	12.5
Nodi del codione fanno la forma d'una coda	12.5
Nodi del codione non hanno buco, ne son voti	12.6
Notomia vedi Anatomia.	
Numero de musculi perche non sia determinato	62.6
Numero de musculi raccolto insieme	92.6

O

O CCIO ha cinque musculi, Et loro historia	40.3.4
Occhi perche sien posti nel capo	109.2
Occhio è fatto di tre humori quasi di natura d'acqua	112.4
Occhio, Et sua historia	112.4
Occhio dell'huomo è perfettamente tondo	112.4

Odorato per quali instrumenti si faccia	148.3
Officio di tutte le parti del corpo	3.3
Officio delle giunte dell'ossa	3.3
Officio delle commessure Et righe ò harmonie del capo	5.6
Officio delle cartilagini delle palpebre	25.2
Officio della cartilagine dell'orecchio	25.3
Officio delle vgne	25.2
Officio della rotula del ginocchio	23.3.4
Officii sei delle legature	37.2.3
Officio delle legature, che legan l'osso dell'omero con la paletta della spalla	45.3
Officio delle legature dell'osso del gallone cò la coscia	62.1.2
Di quelle del ginocchio	2.3
Di quelle da gli stinchi dalla parte di sopra	4
Di quelle del collo del piede, Et del piede	62.4.5
Officio de i due primi musculi delle guance qual sia secondo Gal. Et Vesalio, quale secondo l'Autore	41.1
Officio della Diaframa	49.2
Officii della carne, che si troua nella parte di dentro della mano	52.3
Officio del decimo musculo, che muoue la gamba, non è tale, qual dice Galeno	58.2
Officio della tela, che fascia tutte l'ossa, detta periossion da i Greci	63.1
Officio del peritoneo	83.3
Officio delle tuniche della canna della gola	83.6
Officio di quattro glandole, che son nella canna della gola	84.1
Officio dello stomaco	84.5
Officio del mesenterio	85.4
Officio della reticella	85.6. Et 86.1
Officio del fegato	86.3
Officio della milza	87.1
Officio del fiele	86.5
Officio delle fila della vescica	87.5
Omentum chiamon i Latini la rete ò reticella	85.5
Orecchie Et sue cartilagini	25.3
Orecchia moueua Mansiglia Sinigliano	38.4
Orecchie, ò ale del cuore Et suo officio	105.3
Orina per qual via entri ne i rognoni	87.4
Orina come entri per i suoi codotti nella vescica	87.6
Orina entrata nella vescica perche non puo tornar indietro	87.6
Orina della creatura doue si raccoglie infino al parto	91.6. Per qual causa 92.1
Os ilium qual sia detto da i Latini	20.3
Os pectinis qual chiamino i Latini	20.3
Ossa sono la piu dura parte del corpo nostro, Et loro officio	3.4
Ossa come si diuidono	3.4
Ossa tutte son congiunte, l'un à l'altro, eccetto l'osso hyoide	3.6
Ossa tutte si congiungon insieme ò per congiuntura, detta	ta

T A V O L A

- ta da i Latini articulatio, ò per vnione, data da i Greci symphysis 3.6
- Ossa, che son grandi hanno vna giunta, & quali di esse l'hanno, & à che serua 3.4.5
- Ossa hanno certi processi de quali altri hanno la giunta, altri nò. Et al contrario molte giunte hanno i suoi processi 3.5
- Ossa tutte commesse insieme son dette Scheleto 3.6
- Ossa del craneo come si congiunghino 4.6
- Ossa del capo come si diuidino l'un da l'altro 5.3
- Ossa della fronte come si diuida da gli altri, & la sua forma 5.3
- Ossa della fronte, sue diuersità, & concauità 6.2
- Ossa della fronte ha 2 buchi, & à che seruino 8.6
- Ossa della coronella come si diuidono fra loro, et dall'altra 5.3. La lor forma 4
- Ossa della coronella, sue qualità et solchi ò rinoli in esse 5.6
- Ossa ottauo del capo, & li suoi termini 5.5
- Ossa ottauo del capo quali fatezze habbia & processi 6.5
- Ossa del capo come sien differenti in grossezza, durezza, fortezza, &c. 5.6
- Ossa del capo hanno 30 ò 39 buchi, & loro historia 8.6. & 9.1
- Ossa del capo hanno altri buchi oltre à i detti benchè non sono propriamente buchi 9.4
- Ossa della collottola come si diuida da gli altri, & i suoi lati. 5.4
- Ossa della collottola, sue qualità, & diuersità delle sue parti 5.6. & 6.1
- Ossa della collottola ne fanciulini è diuiso in 3 mediante 3 righe, l'andar loro, & le qualità di quello 6.2
- Ossa della collottola ha sette buchi, & la loro historia 9.3
- Ossa delle tempie come si diuidino dalle altre, & la lor forma 5.4
- Ossa delle tempie quanto sien diuerse in le sue parti, suoi processi, & buchi 6.3
- Ossa delle tempie hanno otto buchi, loro descrizione et vso 9.2
- Ossa cuneale, & li suoi termini 5.5
- Ossa cuneale, sue diuersità, qualità, &c. 6.4
- Ossa cuneale ha 17 buchi, loro descrizione & vso 8.6. & 9.1
- Ossicelli 3. che son dentro à ciascuno orecchio, lor processi, & figura 6.6. & 7.1.
- Ossa della mascella superiore 6 per banda, & la loro descrizione 7.2.3.4
- Ossa secondo della mascella superiore perche di rado si vegga nelle caluarie de cimiteri 7.2
- Ossa decimoterzo della mascella superiore, & sua descrizione 7.4
- Ossa della mascella superiore in che modo, & median-
ti quali commessure si diuidino da quelle del capo, & fra se stesse 7.5.6. & 8.1
- Ossa giogale non è osso da per se, di che si faccia, & à quel che serua 8.1
- Ossa della mascella inferiore son 2 come si congiunghino, & 2 processi loro 8.2
- Ossa della mascella inferiore si separano, l'un dall'altro, piu difficilmente negli huomini, che ne fanciulli, & crude & cotte 8.2
- Ossa yoidè ò hypsiloide perche, si chiami così, suo sito, & ossicelli, di che si compone, & loro descrizione 9.6. & 10.1
- Ossa yoidè ha 12 muscoli, & loro historia 42.3
- Ossa della schiena è ordinariamente composto di 30, chiamati nodi, & la loro descrizione 10.2.
- Ossa sacro ò grande perche fu chiamato così dagli Antichi, & sua historia 12.2.3
- Ossa sacro ha ordinariamente 6 nodi, & tal uolta 5. et come sien congiunti 12.3
- Ossa primo del petto, sua forma & seni, col loro vso 13.5
- Ossa del petto, & la description loro 12.6
- Ossa del petto è dalla parte dinanzi 12.6
- Ossa del petto che sito habbia, & sua historia 13.4
- Ossa del petto ha 6 ò 7 ossa, & tal uolta 11, et quanto si congiunghino per la età 13.4
- Ossa del petto da alcuni fu detto spada 13.4
- Ossa secondo del petto, sua figura, & suoi seni col loro vso 13.5
- Ossa terzo del petto, sua figura & sito. 13.6
- Ossa terzo del petto manca in molti, & in tali il secondo si diuide in dui 13.6
- Ossa del petto tutto insieme si puo agguagliare à vn pugnale spagnuolo, & la sua sostanza 13.6
- Ossa del petto che offitio habbia 14.1
- Ossa del cuore che origine habbia, et quel che si vegga negli huomini vecchi. 14.1
- Ossa nel cuore di alcuni animali veduto già da Gal. in vno elefante, dallo Autore in castrati vecchi 14.1
- Ossa della paletta della spalla, vedi paletta della spalla
- Ossa dell'omero è dell'omero insino al gomito, & sua historia 15.6
- Ossa dell'omero che asprezze & buchi habbia, & lor vso 16.4
- Ossa dell'omero descritto dalla parte piu alta 15.6
- 16.1. Dalla piu bassa 16.1. Nel restante 16.3
- Ossa dell'omero fuor che quel della coscia & stinco della gamba è il maggiore, che sia nel corpo 15.6
- Ossa dell'omero vscito del suo luogo come si racconci 14.5
- Ossa del braccio, vedi fuselli
- Ossa del bracciale di che son couerte loro qualità, & seni, col loro vso 17.6

Ossa 8 del bracciale, sua sostanza, buchi, & figura 17.6. Perche sono assai in numero 18.1
 Ossa del primo ordine del bracciale come si congiungino co i fuselli 18.1
 Ossa del bracciale, primo, secondo, & terzo, come si congiungino fra loro, & co i fuselli, lor descriptione, teste, & seni 18.3
 Ossa quarto del primo ordine del bracciale, & sua historia. 18.2
 Ossa quarto del primo ordine del bracciale dalli antichi si conta da per se 18.2
 Ossa quinto del bracciale, sua forma, seni, vso, & congiungimento. 18.3.4
 Il sesto 4
 Il settimo 4.5.
 L'ottauo 5
 Ossa settimo del bracciale perche facilmente si disluoghi 18.5
 Ossa del secondo ordine del bracciale, sua forma, seni, vso, & congiungimenti 18.3.4.5
 Officello simile al seme di sesame dalla banda di fuori del bracciale, & suo vso. 18.5
 Ossa 4 del pettine della mano, & sua historia 18.6
 Ossa del pettine della mano hanno vna giunta per vno, di sotto, & di sopra. 19.1
 Ossa dal pettine della mano come si congiungino al bracciale & lor forma 19.1. Loro incauature, righe, impressioni, & altre qualita 2
 Ossa del pettine della mano non si toccano nel mezzo, & perche 19.2
 Ossa delle dita della mano come si congiungino, loro descriptione, differenze, & qualita 19.3
 Ossa primo del pollice della mano come si congiunga al bracciale 19.4
 Il secondo al primo 4
 Il terzo al secondo 5
 Ossa primo del pollice della mano perche non sia incauato 19.3
 Ossa secondo del pollice della mano perche si muoue piu piegandosi & distendendosi, che da i lati 19.5
 Ossa secondo & terzo del pollice della mano non si muouon da i lati 19.5
 Officelli, come seme di sesame nella congiuntura del pollice della mano 19.5
 Officelli, come seme di sesame, detti però sesamini, in quali articoli si trouino, & loro descriptione 19.6.
 & 20.1. Venti almeno in ogni mano 1. Quanti ne piedi 1. loro vso 2
 Officelli attaccati all'ossa delle dita, a modo di teste, o processi, & loro vso. Altri 2. in ciascadun de primi articoli delle dita. Vn'altro al terzo articolo del pollice della mano de vecchi. 20.1
 Officelli, come granella de miglio ne secondi & terzi articoli della mano 20.1
 Ossa de galloni, o vero dell'anche, da ogni lato vno,

& la loro historia 20.3
 Ossa dell'anche come si congiungino all'osso grande, & la figura delle lor parti 20.3 impressioni, che hanno, & altre loro qualita 5 suoi lati 6
 Ossa dell'anche si compongon ciascuno di 3 ossa, lor nomi & vso 20.3
 Ossa dell'anche perche sien piu larghe nelle donne, che negli huomini 21.2
 Ossa dell'anche ne fanciulli come si diuida in 3 che ne gli huomini pare vn solo 21.3.
 Ossa del pettignone come si congiunga a quel dell'anche, & quanto diuersamente ne gli huomini dalle donne 21.2. Buco, seno, et altre sue parti et qualita 3
 Ossa del pettignone non si apron nel parto, come pensano alcuni, ma nella parte piu bassa stanno piu distosto, l'vn da l'altro nelle donne, che negli huomini 21.2
 Ossa della coscia e il maggior di tutte l'ossa, & sua historia 21.4
 Ossa della coscia ha 2 giunte, & doue si congiungino, & come, all'ossa vicine 21.4
 Ossa della coscia ha dalla parte di sopra 2 gran processi & loro historia 21.6. & 22.1. Vna asprezza & altre sue qualita 22.1
 Ossa della coscia dall'osso del gallone in giu che andar tenga 22.1
 Ossa delle gambe, vedi Stinchi
 Ossa del piede, & lor nomi 23.4
 Ossa del piede son vn meno di quelle della mano 25.1
 Ossa del tallone che nomi habbia & sua historia 23.4
 Quattro lati suoi dalla banda di dentro 5
 Ossa del tallone come si congiunga all'osso del calcagno 23.6
 Ossa navicolare & sua historia 24.2
 Ossa del calcagno e il maggiore osso del piede, & sua historia 24.1
 Ossa del calcagno descritto dal lato di dentro 24.1. Da quel di fuori & dinanzi 2
 Ossa del calcagno non son simili fra loro, ne a quelle del bracciale 24.3
 Ossa 4 del collo del piede, & sua historia 24.3
 Ossa del collo del piede tutte insieme fanno vna figura tonda di sopra & incauata di sotto 24.5
 Ossa quarto del collo del piede simile ad vn dado, & li suoi lati 24.3.4. Nomi diuersi che ha 4
 Ossa del collo del piede come si congiungino alle altre 24.3.4. Come fra loro 5
 Ossa del collo del piede che differenze habbino fra loro 24.4
 Ossa del pettine del piede 5 & come si congiungino a quelle del collo 24.5
 Ossa del pettine del piede hanno fra l'vn & l'altro vno spatio, & suo vso 24.6
 Ossa del pettine del piede come si congiungino alle prime delle dita 24.6
 Ossa

Ossò del collo, spalle, lombi, & ossò grande, vedi nodi del collo	
Officello simile al seme del sesame fra la congiuntura del quinto ossò del pettine del piede, & del quarto del collo	24.6
Officelli, come seme di sesame nella prima congiuntura delle dita al piede, & lor uso	25.1
Ossò che sostiene el dito picciolo del piede verso el collo, ha vn processo; & suo uso	25.1
Ossa di ciascun dito del piede son 3 eccetto che del pollice, che ne ha due	25.1
Ossò stimato da gli incantatori nel pollice del piede	20.2
Ossa quante sieno nel corpo humano	26.2

P

PADRE dell'Autore perse el vedere da vn occhio, essendogli sol uscito l'umor acquoso 50.

113.1	
Palette delle spalle, lor sito, & à che parti si congiungino	14.2
Palette delle spalle quanta diuersità di parti habbino	14.2
Paletta delle spalle ha vn collo, el quale ha vn seno, lor descriptione, & uso	14.4
Paletta delle spalle descrittta dalla parte dinanzi, & suo uso	14.6
Dalla parte di dietro con li suoi seni, & lor uso	15.1
Paletta delle spalle ha 2 processi, & la loro historia	14.5.6
Paletta delle spalle son di figura triangolare di lati non uguali, & la historia di essi	14.2
Paletta della spalla ha 4 muscoli, & la loro historia	45.3
Paletta della spalla si muoue, come el braccio, se non che non si muoue intorno	45.3
Palpebre & sue cartilagini	25.2
Palpebre de gli occhi di che si faccino	40.1
Palpebre di sopra sole dimenano gli huomini, stando ferme quelle di sotto	40.2
Pancreas è vna glandola della reticella	120.3
Parto non ha tempo determinato	90.6
Parti del corpo nostro, altre sono similianti, altre dissimilianti	3.1
Parti del nostro corpo perse quali si rifanno, ma non in tutto, & quali no	3.2
Parti del nostro corpo, che han principio dal seme, dette spermatiche, perse non si rifanno	3.2
Parti tutte del corpo nostro che officio habbino	3.3
Pasto, vedi Cibo	
Pelle che cosa sia, & sua historia	37.6
Pelle è parte spermatica	37.6
Pelle rotta perche non si rigeneri	37.6. & 38.2
Pelle quanto variamente riceua i crui	37.6. et 38.1

Pelle come variamente si attacchi alle parti, che ha sotto di se	37.6
Pelle quanto habbia gran senso	38.1
Pelle doue si muoua, & con quale istrumento, & doue sia pelosa	38.1
Pelle è per tutto piena di buchi, piccioli detti Pori, & loro uso	38.1
Altri suoi buchi manifesti	2
Pelle è differente in grossezza nelle sue parti, & tutta è piu sottile ne gli huomini, che ne gli animali	38.1
Pelle tutta è couerta d'vna pellicciuola detta da i Greci Epidermis, & come essendo rotta si rigeneri	38.2
Pelle nell'huomo perche si scortichi senza toccare la tela carnosà	38.2
Pelle della faccia doue sia congiunta con la tela carnosà	41.2
Pelle delle gote se ben non si conuerte in musculo, perche si muoua	41.2
Pelle ne caualli & asini è piena di fila di carne	38.4
Peritoneo, detto Sifach dalli Arabi, che rinnoua le membra della digestione, è corpo semplice, & sua historia	83.2
Peritoneo è la maggior tela, che sia in tutto el corpo, eccetto la carnosà	83.2
Peritoneo è com vn otre da vino	83.3
Peritoneo non è vguualmente grosso da ogni parte, & dal bellico in giù è doppio	83.3.4
Peritoneo alle volte ha attaccato del grasso, ma piu verso lo stomaco & lombi	83.3
Peritoneo in quanti luoghi sia bucatato	83.4
Et che particolarmente nelle donne è bucato, per doue passa el collo della matrice	5
Peritoneo non manca di sentimento, come han pensato alcuni	83.5
Pesce del braccio è il primo musculo, che piega il gomito	51.4
Pesce della gamba è il nono musculo	57.6
Pettine o palma della mano è dal bracciale à i primi articoli delle dita, ha 4 ossa, & la sua historia	18.6
Pettine del piede è fra'l collo & le dita del piede, ha 5 ossa, & la loro historia	24.5
Pettine del piede è simile à quel della mano	24.5
Petto qual sia & di qual figura, & sua historia	12.6
Petto ha 89 muscoli, contando quei del ventre & loro historia	48.1. infino à 49.3
Petto ha 24 costole, & tal volta 13 da vn lato & lor differenze	12.6
Phacoides è detto da i Greci l'umor cristallino per essere simile à vna lente	112.5
Pia madre è la seconda tela, che cuopre le cernella, & sua historia	109.5
Pia madre cuopre per tutto le cernella, eccetto doue è	

il corpo calloso	109.5	Processi d' vero nodi d' punte hanno alcune ossa	3.5
Pia miadre per di fuori è liscia, & coperta di humore acquoso, per di dentro aspra, & è piena di vene & arterie	109.6	Processi dell'osso cuneale, che son come ale	6.5
Pianta del piede, vedi Pettine del piede		Processi 2 della mascella inferiore, lor descrizione, & officio	8.2
Piede in quante parti si diuida, quante ossa habbia & sua historia	23.4	Processo secondo della mascella inferiore ha vnà giunta, che ne gli huomini è vnita con la mascella	8.2
Piede ne gli animali doue cominci	23.4	Processi de nodi della sehiena, & la varietà loro	10.2
Piede si muoue, come la mano, mediante 9 muscoli, & loro historia	59.6	Processi di dietro de nodi del collo, eccetto che del primo, son bifurcati	10.4
Pimeli che significhi	38.3	Processi de lati del primo nodo del collo, & lor vso	10.4
Pittori che debbino offeruare per essere eccellenti	66.4.5	Processo di dietro perche mancò al primo nodo del collo	10.5
Pleura è la tela, che fascia le coste	102.3	Processo del secondo nodo del collo, detto dente d' dentale, & sua historia	10.6
Polmoni si diuidonn in 2 parti, loro sito, & historia	104.3	Processi de 4 nodi del collo dopo el secondo	11.1
Polmoni che figura habbino	104.3	Processi di sotto & di sopra de nodi del collo come si è simili	11.2
Polmoni come son simili à vna vnghia di bue	104.3.4	Processi di dietro & de lati de nodi del collo perche si diuidono	11.2
Polmoni che sustanza habbino, & che tela gli inuolga	104.5	Processi 7 hanno i nodi delle spalle. Quei di dietro in che sien differenti, & come si congiunghino	11.4
Polmoni che officio habbino	104.5	Processi de lati, de nodi delle spalle come sien differenti, & perche, il lor seno, & le sue differenze	11.5
Polmone di fuori è liscio & coperto d' vn humor vntuoso, & doue sia aspro	104.4	Processi tutti ne gli huomini piu spesso vanno in su, che in giu, & spuntano alquanto in fuori	11.5
Polmoni non si veggon diuisi si chiaramete ne gli huomini, come ne gli animali	104.4	Processi 2 di sotto, & 2 di sopra de nodi delle spalle, & à che seruino	11.6
Polmoni non hanno quel quinto lobo, che dice Gale-no	104.4	Processi de nodi de lombi, & loro historia	12.1.2
Polmoni, quando sono attaccati alle coste, sono piu neri & scoloriti	104.4	Processi 2 oltre alli altri, in alcuni nodi de lombi in alcuni huomini	12.2
Polmoni, quando sono attaccati alle coste, essendo ferito el petto, non per questo reston di empier si di aere	104.4	Processi di dietro & da i lati de nodi dell'osso sacro, & lor descrizione	12.3
Polmoni in che modo si muouino al mouimento del petto	104.5	Processi da i lati de nodi dell'osso sacro hauno vn seno, sua descrizione & vso	12.4
Polymorphon perche si chiami l'osso cuneale	5.6	Processi della paletta delle spalle, che abbraccion la testa dell'homero	14.5
Poppe per qual causa furon fatte dalla natura, & sua historia	92.5	Processi 2 della paletta delle spalle, loro descrizione & vso	14.6
Poppe doue sien situate, loro figura, & sustanza	92.5	Processo secondo della paletta delle spalle, & sua descrizione	15.2
Poppe che diuersità habbino rispetto à diuerse età & tempi	92.6	Processi 2 del maggior fusello del braccio	16.5
Poppe & materie per quali vene habbino comunicanza	126.1	Processo vltimo del maggior fusello del braccio ha vnà giunta, & tal volta 2 & come si congiunghino	16.6
Poppe perche habbino il senso delicato	145.4	Processo della giunta, che ha la testa del maggior fusello del braccio, & suo vso	17.1
Poppe perche nelle donne, che han partorito, assai volte son vizze	92.6	Processo aspro del minor fusello appresso il gomito, & suo vso	17.3
Porro sarcoide, carne incallita	4.1	Processo del 8 osso del bracciale & del quinto	18.6
Pori sono buchi non apparenti della pelie, & à che ser-uono	38.1	Processo aguzzo dell'osso dell'anche & suo vso	21.1
Pori optici son stati chiamati da molti i nerui della vista, & perche	142.2	Vn' altro piu basso	21.2
Pori vretici son chiamati da i Greci i condotti dell'orina	87.6	Processi dell'osso della coscia nella parte piu alta, lor descrizione & vso	21.6. & 22.1
Presapiola, le concauità, doue stanno i denti	8.5	Processo di sotto del minor stinco, sua descrizione, & come	
Processus che significhi	3.5		

come si congiunga all'osso del calcagno 22.5
 Processo della giunta del minor stinco, & sua descrizione 22.6
 Processo dell'osso del tallone dal lato dinanzi, & suo uso 23.6
 Processi della prima cartilagine del gargarozzo, & doue si congiunghino, & quelli della seconda 25.5
 Processi della terza cartilagine del gargarozzo 26.1
 Processi della matrice, come ali di pipistrello 90.3
 Processo delle ceruella è la midolla spinale 109.3
 Processo della dura madre, el quale diuide le ceruella dal celabro 109.4
 Processo, come falce della dura madre, el qual diuide la parte destra delle ceruella dalla sinistra 109.4
 Processi del celabro, come vermi di legno, lor sito & officio 111.5.6
 Processo della pia madre, che ha la forma di vno imbuto, & suo officio 111.6. & 112.1
 Pterigoides osso del capo perche si chiami così 6.5
 Punta dell'omero che significhi appresso l'Autore 14.6.
 Punta del gallone & sua descrizione 20.4
 Purgation delle donne di parto quanto duri 91.4
 Pylorus ò Ianitor è la bocca di sotto dello stomaco 84.2

Q

QVATRIO osso del piede 23.5

R

RADICI de i denti hanno vn buco per doue entra vna vena, vn neruo, & vna arteria 8.5
 Radius, minor fusello del braccio 16.2.6
 Realdo notò bene che la testa di fuori & di dentro dell'osso dell'omero son fatte di vna giunta d'unaltro osso 16.3
 Rete, vedi Reticella
 Rete marauigliosa non si vede ne gli huomini, ma ne buoi, nella qual cosa merita escusatione Gal. 131.4
 Rete, che è nel primo & secondo ventricolo delle ceruella 111.2
 Reticella & sua historia 85.5
 Reticella di doppia facendosi scempia fin doue si disten da 85.5
 Reticella fa la figura d'un carniere 85.5
 Reticella che officio habbia 85.6. & 86.1
 Reticella è fatta d'una tela addoppiata, piena d'anime & grasso, di vene & arterie 85.6
 Reticella in che luogo sia attaccata alli intestini 85.6
 Retina è la seconda tunica dell'occhio 113.5
 Respiratione in quanti modi si faccia, & con quali instrumenti 49.3
 Reuersini son detti i nerui, che ritornano in su verso el gargarozzo 142.3

Rhagoides è la terza tunica dell'occhio detta vnea 112.6
 Rifiatare, vedi Respiratione
 Riga del corpo calloso, & suo officio 110.3.4
 Righe, ò harmonie 2 che nascon della commessura lamdoide, & il lor andare 5.2
 Righe 2 altre, che nascon dalle predette, & l'andar loro 5.2
 Righe ò ramuscelli delle seconde sopradette 5.3
 Righe, impressioni, asprezze, & buchi delle clauicole, & l'uso loro 15.5.6
 Righe 3 del triangolo, del maggior fusello del braccio, lor descrizione, & uso 17.1.2
 Riga secondo el lungo del minor fusello del braccio, lati di quella, & l'uso loro 17.4
 Righe del lato di fuori del gallone 20.6
 Righe, che diuidon l'osso dell'anche ne fanciulli, & l'andar loro 11.2.4
 Riga dell'osso del pettignone, & suo uso 21.3
 Riga del primo seno del maggior processo dell'osso della coscia della parte di sopra 21.6. Vn'altra dell'osso della coscia 22.1
 Righe, che son nel mezzo del minor stinco, & loro uso 23.1
 Riga della prima cartilagine del gargarozzo 25.5
 Un'altra della seconda 6
 Riga, che congiugne li 2 primi muscoli del ventre 47.2
 Riga, che ha la milza, & suo uso 86.6
 Riga nella matrice da alto à basso, & à che serua 90.1
 Rioli, che son nel tramezzo de i ventricoli del cuore, non passon da vn ventricolo à l'altro 105.5
 Rioli appresso la parte di sopra del corpo calloso, & loro officio 110.3
 Rognomi che officio habbino 87.1
 Rognoni come sien situati, lor figura & sustanza 87.2
 Rognoni han la figura d'un fagiuolo 87.2
 Rognoni non stan sempre l'un scontro à l'altro, & ordinariamente il sinistro sta piu alto, & quanto 87.2.1.2.4.6
 Rognoni che artificio habbino nella parte di dentro 87.3
 Rognoni non han quel colatoio & seni, che alcuni si son imaginati 87.2.4. & che seni habbino 3.4
 Rognoni han 2 tele, & lor descrizione 3.4
 Rognoni hanno dentro seno duro, & humore acquoso 87.4
 Rognoni stanno, tal volta el destro pin alto, tal volta el sinistro, & così le vene emulgenti 124.6
 Rotula del ginocchio, & sua historia 23.3
 Rotula del ginocchio come si congiunga all'osso della coscia & della gamba 23.3
 Rotula del ginocchio ne bambini par di cartilagine, 3
 ne

ne gli huomini è dura, & suo officio

23.3.4

S

S A C R O osso, chiamato così da i Latini 12.2
 Sangue si fa nel fegato del chilo, & si purga dalla collera, malinconia, & acquosità 88.4
 Sangue uscendo delle vene si conuerie in vno humore, come rugiada 88.4
 Sangue menstruo secondo i filosofi & Medici è fatto per mantener la creatura, l'Auttoe mostra non esser vero 92.2.3
 Sangue menstruo quanto sia cattiuo 92.2
 Sangue menstruo perche si generi & purghi nelle donne 92.3
 Sangue menstruo ritenuto causa molte & varie infermità 92.3
 Sangue come vadia dalle vene alle membra 119.4
 Sangue cauato dalle morice à che conferisca 121.4
 Sangue da qual lato sia meglio cauare nel mal di punta 122.3
 Sangue del destro ventricolo del cuore è poco differente da quel della vena grande 131.6
 Sangue del destro ventricolo del cuore per doue passi al sinistro, non ha visto ancora l'Auttoe 131.6
 Scheleto è tutte le ossa commesse insieme 3.6
 Schiena si diuide in collo, spalle, lombi, & osso grande 10.3
 Schiena di quanti nodi sia fatte, & la description loro 10.2
 Schiena ha sedeci muscoli, & la loro historia da 49.4 à 50.6
 Schiena & sue parti che mouimenti habbino 49.4
 Schirotos è la quarta tunica dell'occhio, altrimenti dura & cornea 112.6
 Scolamento perche faccia gran bruciore 89.3.4
 Scolicoides son le punte, che ha il processo del celabro, simile à vn verme di legno 111.6
 Scrofole in che parte si faccino 104.1
 Scutiforme cartilagine del gargarozzo 25.5
 Secondine hanno certe coccole, con che si attaccano alla matrice 90.3
 Secondina di che si faccia, perche si chiami così, sua figura, & sito 91.5. & 92.1
 Secondina è detto da i Latini quello, che si chiama le seconde 91.5
 Secondine che officio habbino 92.1
 Seme perche bisogna che esca dirittamente & con impeto 56.3
 Seme negli huomini doue si raccoglie, poi che è fatto 87.5
 Seme dell'huomo principalmente concorte alla generatione 88.1
 Seme è spaso dalla donna come dall'huomo 88.1
 Seme si genera della miglior parte di quello, che auan-

za alla quarta digestione 88.4
 Seme perche ne testicoli diuenta bianco 88.5
 Seme per doue entri nella matrice, non si vede, ne anche ne gli huomini, per doue esca 90.2
 Seme nelle grauide per doue esca fuori 90.6
 Seme riceuuto dalla matrice che ordine tenga à formar la creatura 91.3
 Seni due del primo nodo del collo, ne quali s'incassano le due testicciuole dell'osso della collottola, sopra li quali la testa si alza & abbassa 10.4. Altri due, sopra li quali si muoue intorno 5
 Seno del primo nodo del collo, che ricene el dentale 10.4
 Seni, che hanno i processi de lati de nodi delle spalle, & lor differenze 11.5
 Seni ò fossi due de nodi delle spalle. Et due ne ha di più el primo & 12. Loro uso, forma, & sito 11.4
 Seno de i processi da i lati, de nodi dell'osso sacro, sua descriptione & uso 12.4
 Seno, che fanno i processi de nodi del codione, et suo uso 12.5
 Seni 3 del primo osso del petto, & loro uso 13.5
 Seno del collo della paletta della spalla, sua descriptione, & uso 14.4
 Seno del collo della paletta della spalla perche nò è tanto profondo, quato richiede la testa dell'osso dell'homero 14.5
 Seni della parte di dietro della paletta della spalla & loro uso 15.1
 Seno del processo della paletta della spalla, & suo uso 15.2
 Seno di dietro, & dinanzi, della parte di sopra della girella, che ha l'osso dell'homero, & l'uso loro 16.2
 Seni della testa di dentro dell'osso dell'homero appresso la girella, & loro uso 16.3
 Seno, che ha nel mezzo l'osso dell'homero dalla parte di dietro, suo andare & uso 16.4
 Seno della testicciuola, quale ha el collo del minor fusello del braccio, & suo uso 16.6
 Seno, che è fra i processi del maggior fusello del braccio, doue egli si congiugne con la girella, sue asprezze, & uso 16.5. Vna linea & suo uso 6
 Seno, che è al lato di dentro del processo della giunta, che ha la testa del maggior fusello del braccio, vn'altro seno, che ha la giunta 17.1
 Seni cinque del minor fusello del braccio, dalla banda di fuori della parte di sotto, & loro uso 17.5
 Seni dell'ossa del bracciale & loro uso 17.6
 Seni del quinto osso del bracciale 18.3.4
 Seno del primo osso del bracciale, del quinto, del sesto, del settimo & ottauo 18.3.4.5
 Seno del primo osso del pettine della mano 19.1
 Seno del secondo osso del pollice della mano, et del terzo 19.5
 Seno dell'osso dell'anche, doue s'incassa la testa della coscia,

coscia, sua descrizione & uso 20.6. & 21.1. Altri
 2 seni 21.1
 Seno dell' ossa del pettignone 21.3
 Seno fra le teste da basso dell' ossa della coscia, & suo
 uso. Et altri 2 seni 21.5
 Seni 4 del processo maggiore dell' osso della coscia, dal
 la parte di sopra, loro descrizione & uso 21.6. &
 22.1
 seni della giunta del maggior stinco dalla parte di so-
 pra, vna costicciuola con vna impressione, & loro
 uso 22.2
 Seno del minor stinco del lato di dentro dalla parte di
 sopra 22.4
 Seno fra le giunte di sotto delli stinchi, come vna for-
 chetta, sua descrizione & uso 22.5. Vn' altro del-
 lo stinco dall' osso del tallone 6
 Seni delle teste di sotto de gli stinchi, & loro uso 22.6
 Seni 5 dell' osso del tallone & loro uso 23. 5.6. Fra el
 tallone e' l' calcagno 6
 Seno dell' osso del calcagno, & suo uso 24.2
 Seno dell' osso Nauicolare, & suo uso 24. 2. Vn' al-
 tro verso la banda di dentro 3
 Seno del quarto osso del collo del piede, et suo uso 24.4
 Seno del quinto musculo della gamba 57.4
 Seno, che ha el fegato, & suo uso 86.2
 Seni che ha dentro el rognone 87.3.4
 Seni 3 della dura madre tra le cernuella 109.4
 Seni 4 della dura madre & loro historia 130.3.4. Il
 loro officio 5.6
 Seno, che fa dentro la testa la terza vena, & suo uso
 131.1
 Senfi esteriori, & le loro utilità 112.3
 Senso del vedere perche sia el principale 112.3
 Sentimento perche si perda & resti el mouimento, &
 al contrario 141.4. & 147.3
 Sentimenti odorare gustare et toccare per quali instru-
 menti si faccino 148.3.4
 Serapione primo separò la medecina theorica dalla
 pratica 1.5
 Sesso, vedi Fondamento
 Sifach appresso gli Arabi che significhi 83.2
 Sito della matrice nelle grauide & non grauide 89.5
 Spalle ordinariamente hanno 12 nodi, & loro histo-
 ria 11.3. Vedi nodi delle spalle
 Spalle non hanno particolar musculo, che le pieghi
 verso nanzi 50.3
 Spina della paletta della spalla, & sua historia 15.1
 Spina, che importi appresso i Latini 47.2
 Spiriti della vita si generano nel cuore, & di che ma-
 teria 102.2
 Splenza, vedi Milza
 Spondilia dai Greci, Verte bræ da i Latini son chia-
 mate l' ossa della schiena 10.1
 Spongoides ò Ythmoides, osso della testa 4.5.6
 Stiloides, vno de processi dell' ossa delle tempie 6.3

Stincht della gamba son 2, loro nomi & historia 22.
 2. Vedi ossa della gamba
 Stinchi hanno le giunte dalla parte di sopra et di sotto
 22.2
 Stinco maggior della gamba come si congiugne con
 l' osso della coscia 22.2
 Stinco minore non sale tanto, che si congiunga con
 l' osso della coscia, & doue si congiunga 22.4
 Stinco minore come si congiunga dalla parte di sotto
 al maggiore 22.4
 Stinco minore che figura habbia nel mezzo, sue righe,
 canti, & lati 23. 1.2. Il maggiore similmente 2
 Stinchi della gamba come si congiungino al tallone
 22.5
 Stinchi come sien separati nel mezzo l' un da l' altro, &
 loro andare 23.1
 Stomachus è propriamente la bocca di sopra di quel,
 che diciamo stomaco 83.5.84.2
 Stomaco & la sua historia 84.1
 Stomaco doue sia situato 84. 1. Et sua figura 2
 Stomaco perche non si deue vgnere dalle spalle 84.2
 Stomaco non ha la bocca in quel luogo, doue comune-
 mente si dice 84.2
 Stomaco ha 2 bocche, suoi nomi, sito & uso 84.2
 Stomaco puo ritener il cibo senza esser di bisogno, che
 tanto strettamente si chingga la bocca di sotto 84.3
 Stomaco di dentro è liscio, & suoi diuersi colori 84.3
 Stomaco perche ha la bocca di sotto più stretta 84.3
 Stomaco si allarga & stringe secondo quello, che si
 mangia & beue 84.4
 Stomaco che grandezza habbia, et che sustanza 84.4
 Stranguglioni in che parte si faccino 104.1
 Sudore della creatura si raccoglie tra essa et la prima
 tela sua 91.6
 Sura, l' osso minor della gamba 22.2
 Sutura sorte di congiuntura 4.2
 Symphysis ò vnione, & sue spetie 4.3
 Symoides ò anchiroides, seno, che è nel gomito 14.6.
 16.5
 Synarthrosi & diarthrosi & loro spetie 4.1
 Synneurosis sorte di congiuntura 4.3
 Synchronosis sorte di congiuntura 4.3

T

TALVS, osso del piede 23.4
 Tallone di dentro qual parte sia dello stinco 22.
 5. Quel di fuori 6
 Tallone è coperto in modo, che non appare 22.6
 Tallone perche più di rado si disluoghi dalla banda di
 fuori, che da quella di dentro 22.6
 Tallone, vedi anche osso del tallone
 Tarsus dicon i Greci le cartilagini delle palpebre
 25.2
 Tela dell' occhio, vedi Tunica

Tela,

Tela, che è fra l'humor cristallino & vitreo, quel che
sia 13.2
Tela trasparente, che cuopre el bianco dell'occhio
40.2
Tela trasparente come vetro dentro l'orecchio 7.1
Tele, che nascò della riga della mascella inferiore 8.2
Tela, che empie lo spatio tra l'vno stinco & l'altro
23.2
Tela carnosà doue si attacchi, & con quali mezi, &
in che parti si muoua 38.3.4
Tela sottilissima diuide per mezo la lingua secondo el
lungo, & gli serue per spina 42.5. & 43.2
Tela che abbraccia le congiunture delle cartilagini
del gargarozzo 44.1
Tela fatta da i muscoli del secondo paio del vètre, qua
le non è semplice, come dice el Vessalio, ma si diuide
in due 47.3
Tela, come carta pecora, che cuopre gl'intestini, &
membra della digestione 47.5
Tela della palma della mano, & sua historia 52.1
Tela della palma della mano in quante modi nasca, &
à che serua 52.1
Tela del sesto musculo della gamba, et suo officio 57.4
Tela, che fascia tutte l'ossa detta Periostion da i Gre
ci, & sua historia 63.1
Tela, che rauuolge le membra della digestione, detta
Peritoneo, & sua historia 83.2
Tele, che nascon dal peritoneo 83.3
Tele delle bocche dello stomaco perche son piu grosse,
che nel resto dello stomaco 84.3
Tele dua del mesenterio piene di animelle & grasso
85.4
Tela, che fa la reticella si puo dir due, perche è doppia
ta, & donde pigli el principio 85.6
Tele, che legano el fegato 86.1. Quella, che lo fascia 3
Tela, che inuolge la milza, & sua origine 86.6
Tele de rognoni son due, & loro descrizione 87.4
Tela, che cuopre i testicoli della donna, sua descrittio
ne & officio 91.3
Tele, che riuolgon la creatura, & loro historia 91.6
Tela, che fascia le coste, & sua historia 102.3
Tela, che fascia le coste, fascia le membra della respira
tione, & delli spiriti della vita 102.4
Tela, che fascia le coste, si fa di due sottili tuniche, &
sua sustanza 102.4
Tela, che fascia le coste, à quali parti si attacchi 102.
4.5
Tela, che fascia le coste ha attaccato dalla parte di
dentro grasso, massime appresso e nodi della schiena
102.4
Tela, che fascia le coste, ha ancora officio di fortificare
la diaframa, facendola piu grossa 102.5
Tela, che fascia le coste, quanti buchi habbia, & quan
ti vasi riceua 102.5
Tele, che diuidon il petto, come si congiunghino l'vna

all'altra 102.6
Tele, che diuidon il petto son due, & loro historia 102.
6. L'officio loro 103.1
Tele, che diuidon il petto, che cosa habbino fra loro, &
quante concauità 102.6 & 103.1
Tele, che diuidon el petto, hanno dalla parte del conca
uo del petto, grasso 103.1
Tele che diuidon el petto che officio habbino 103.1
Tele del gargarozzo et canna del polmone, & loro hi
storia 103.4
Tela, che riuolge i polmoni, donde nasca, & come sia
fatta 104.5
Tele, che fascian el cuore, hanno almeno 5 buchi, & lo
ro vso 104.6
Tele, che fascian el cuore, che sito & figura habbino,
& el resto di loro historia 104.6 & 105.1
Tela, che fascia el cuore, di dentro è liscia, di fuori a
spira 105.1
Tele, che fascion el cuore, donde naschino, & che susta
za habbino 104.6 & 105.1
Tela, che fascia el cuore, che officio habbia 105.1
Tele, che fascian el cuore, à che parti si congiunghino
105.1
Tele, che son alla bocca de i buchi del cuore, & loro hi
storia 105.6. 106.1. 2.3
Tele delle cernella, & loro historia 109.3
Tele delle vene del fegato perche son piu sottili di tut
te le altre 119.4
Tempo del parto non è limitato 90.6
Testa nell'osso che significhi 4.4
Testa che cosa sia, & la sua naturale & le non natura
li figure 4.4
Testa ha 14 muscoli, che particolarmente la muouo
no, & loro historia 46 da 1. à 6
Testa è mossa verso dietro da 12 muscoli, contando il
secondo paio come due muscoli soli, verso nanzi da
due soli 46.5
Testa della giunta dell'osso dell'omero, sue parti, &
vso 15.6
Teste delle clauicole dall'osso del petto son simili à i
suoi seni, & la historia loro 15.3
Testa della clauicola, che si congiugne alla punta del
l'omero 15.4
Testa, che ha l'osso dell'omero nella parte di fuori del
la girella, & suo vso 16.2
Testa del medesimo nella parte di dentro & suoi seni
16.3
Testa del minor fusello del braccio perche non crebbe,
quanto la grossezza del bracciale richiedea 17.4
Testa del primo osso del bracciale 18.3. Del settimo 4
Testa di sopra dell'osso della coscia come si congiunga
con l'osso del gallone, & su descrizione 21.4. Quel
le di sotto con l'ossa della gamba 5
Testa, che hanno le giunte dell'ossa del pettine del pie
de 24.6
Teste,

T A V O L A

*Teste, con le quali l'ossa del pettine del piede si congiun-
gon da i lati* 24.6
Testicciuole delle costole & doue s'incassino 13.3
Testicciuola del collo de minor fusello del braccio
16.6
Testicciuole dell'ossa del pettine della mano 19.1
*Testicciuola & legature, che son al fin delle dita della
mano, & loro vso* 19.4
*Testicciuola del primo osso del pollice della mano, &
del secondo* 19.5
*Testicciuola del minor stinco nella parte di sopra, &
suo vso* 22.4
*Testicoli degli huomini hanno due muscoli, & loro hi-
storia* 47.6. Et due parimente quei della donna
48.1
Testicoli di che figura & sustanza sieno 88.5
Testicoli doue sien situati, & peche sieno pendenti 88.5
Testicoli da quante tuniche sieno innolti 88.5.6
*Testicoli ordinariamente son due, bẽche tal uolta vno,
et tal volta 3, et in questi che ingano occorra* 88.5
Testicoli della donna doua sien situati, & loro historia
91.2
*Testicoli della donna che grandezza, figura, & susta-
za hanno* 91.2
*Testicoli della donna non hanno sempre el medesimo
numero* 91.2
*Testicoli della donna hanno dentro vna humiditẽ ac-
quosa* 91.2
*Testicoli della donna hanno vna sola tela, sua descrit-
tion & officio* 91.3
Testicoli & natiche delle ceruella 111.5
Tibia il maggior osso della gamba 22.2
Tintinnabulum vuol dir l'Vgola, & perche 104.2
Tiplon buco delle tempie, detto da i Latini cecũ 9.2
Toccare ẽ senso commune de tutte le membra 148.4
Tomis i quattro denti dinanzi 8.4
Tonsille vedi Glandole.
Torcolo delle ceruella quale si possa intendere 13.1.3
Tragadero appresso gli Spagnuoli che signifiichi 83.6
*Tramezo, che ẽ fra l'vn ventricolo & l'altro del cuo-
re* 105.4
Tramezo fra le ceruella & celabro 109.4
Tramezo fra la parte destra & sinistra delle ceruella
109.4
*Tramezo della concauitã, che ẽ sotto el corpo callo-
so, & suo officio* 110.4
*Transuersales son muscoli del ventre, che vãno in tra-
uerso* 47.5
*Triangolo del maggior fusello del braccio con tre sue
righe, & loro vso* 17.1.2. Li lati del triangol det-
to & loro vso 2
Tronchantires, processi dell'osso della coscia 21.6
Tubercolo de i processi di sopra de nodi del collo 11.2
*Tuberculo & buchi de nodi dell'osso sacro, loro descrit-
tione & vso* 14.4

Tubercoli del primo osso del bracciale & del terzo
18.3
Tubercoli, che hanno l'ossa dell'anche et loro vso 20.6
*Tubercolo dell'osso del calcagno, sua descriptione &
vso* 24.1
*Tuniche della canna della gola son tre, & come habbi-
no diuersamente le fila* 83.6
Tuniche tre dello stomaco, sue fila & vso 84.4.5
*Tuniche due de gli intestini sottili, & sue fila, & la ter-
za dal peritoneo* 84.6. Tuniche delli altri intestini
85.1
Tuniche due, di che si compone la vescica, & sue fila
87.5
*Tuniche proprie, che riuolgono i testicoli, come si con-
giungino a se stesse & ad altre parti, & l'vso loro*
88.6.89.1
Tuniche due comuni che riuolgono i testicoli 88.5
Et due proprie, & loro historia 6. & 89.1
Tuniche due del membro 89.4
Tuniche, che ha la matrice & le lor fila 90.3.4
*Tunica di dentro della matrice ẽ assai piu grossa di al-
cun'altra del corpo* 90.3
*Tuniche del gargarozzo & della canna del polmone,
laro historia* 103.4
*Tunica terza della canna del polmone nõ ẽ grossa vguale
mente* 103.5
Tunica, che cuopre il cuore, ẽ sottile 105.3
*Tunica prima dell'occhio detta aranea per esser simile
a i ragnateli* 112.5
Tunica seconda detta retina, & sua historia 112.5
*Tunica seconda perche alcuni non l'hanno conta con-
l'altre tuniche* 112.5
Tunica terza dell'occhio, detta vnea, & sua historia
112.5
Tunica quarta detta dura & cornea, & sua historia
112.6
*Tunica quarta dell'occhio perche hãno pensato molti
che sia piu di vna* 112.6
*Tunica quinta dell'occhio, che non ha nome per non es-
ser stata conosciuta da gli antichi* 113.2
Tunica sesta chiamata aderente ò bianca 113.2
Tunica delle vene & sua fila 119.3
*Tunica delle vene commune a loro & ad altre parti,
& suo vso* 119.4
*Tuniche delle arterie che sorte di fila habbino, & lor
vso* 119.5.6
*Tuniche dell'arterie perche son piu gagliarde di quel-
le delle vene* 119.6
*Tunica di dentro dell'arterie che nomi habbi hauuto
per la sua durezza* 119.5
*Tunica di dentro dell'arterie ha vna pelle, come quel-
la, che ha lo stomaco & intestini* 119.6

V

VARIZZE perche facilmente si fanno nelle
gambe 126.5
 Vasa

Vasa spermatica chiamano i Latini i primi cōdotti del seme & i secondi 125.4
Vasi spermatici, vedi condotti del seme.
Vedere come tal volta si perda senza apparire difetto nell'occhio. 113.1
Vedere perche sia principal senso 112.3
Vena sola, vedi vena senza compagna.
Vene come naschin dal fegato, i nerui del ceruello, l'arterie dal cuore 119.2
Vene in che habbin le lor fila differenti da quelle de i muscoli 119.3
Vene che cosa sieno, la lor tunica, & le fila di quella 119.3
Vene doue hanno vn'altra tunica commune ad altre parti, & suo vso 119.4
Vene che officio principale habbino 119.4
Vene del fegato pche han piu sottil tela di tutte le altre 119.4
Vene ne gli huomini son tre, lor nascimento, & distributione 119.6. 120.1
Vena porta perche si chiami così 120.1. 121.4
Vena porta come nasca & si distribuisca 120.4
Vena porta come nasca dal fegato. 120.4
Vena porta da quati rami principali nasca dal fegato 120.4
Vena porta in quanti rami si diuida fuori del fegato, et doue vadino 120.5
Vena porta che officio principal habbia 121.3
Vene due, che dalla vena porta vāno al fiele 120.5
Vene, che vanno dalla vena porta alla milza, & rete 120.6
Vena, che ha comunicanza con la milza & stomaco 121.1
Vene, che van dalla vena porta allo stomaco 120.5
121.1
Vene, che fan le morice 121.2.4
Vene, che van dalla vena porta al mesenterio 121.2.3
Vena grande ò vero caua se vien dal fegato ò dal cuore, non conuengon i Medici & Filosofi 121.5
Vena caua ha principio dal fegato 121.5
Vena caua manda rami à tutto el corpo, & per quelli il sangue 121.6
Vena caua come riceua el sangue dalla vena porta 121.6
Vena caua vscendo del fegato non si sparte in due trōchi, come l'arteria grāde vscendo del cuore 121.6
Vena caua non è piu larga dal fegato infino à i lombi, che infino al cuore 121.6
Vena caua come si distribuisca dal fegato in su 121.6
Vena caua passato el cuore non va lungo la schiena, come alcuni pensano. 122.1
Vena caua come si congiunga al cuore 122.1
Vena caua come si diuida, dalla gola in rami 122.3
Vena caua come si distribuisca dal fegato in giu 124.6
Vena caua dall'osso grande entra sotto l'arterria gran-

de, come si diuida, & si distribuischino i suoi rami 125.4.5
Vena caua come si distribuisca per la gamba 126.2
Vene come si sparghin per el fegato 121.5
Vene, che vāno dalla vena caua alla diaframa 121.6
Vene, che nutriscon el cuore 122.1
Vene senza cōpagna doue nasca dalla vena caua, che andar tenga, & che rami faccia 122.1.2
Vene, che da i rami della vena caua scēdon infino alla terza costa 122.4
Vene, che van sotto l'osso del petto infino presso al bellico 122.4. Il loro nascimento diuerso 5
Vene, che vanno verso i nodi del collo. Et altre, che vāno dentro al craneo 122.5
Vene nate dalla vena caua appresso la gola, & loro diuisione 122.5
Vena giugulare interiore, & la distributione delli suoi rami 122.6
Vena giugulare esteriore donde nasca, come si diuida, & à che parti mandi i rami 123.1.2.3
Vena, che si distribuisce per li muscoli piu bassi del collo, & piu alti del petto, li suoi rami 122.5
Vena, che si distribuisce per la faccia & tutta la testa, come si distribuisca 123.3
Vena detta della testa di doue nasca, & come si distribuisca 123.5
Vena detta saluatella, ò della milza di doue nasca 123.6
Vena saluatella non si taglia con ragione ne mali della milza 123.6
Vena della commune doue si faccia della vena della testa & di quella del fegato 123.6
Vena del fegato che andar tenga, & come si distribuisca 124.1
Vena del fegato alcuna volta si perde appressandosi à quella della testa, alcuna volta apparisce sola 124.5
Vena, che è ramo di quella del fegato, el quale va per el braccio tra pelle & carne 124.2
Vena cōmune che via tenga, & come si diuida 124.4
Vena cōmune alle volte si fa piu giu, alle volte piu su 124.5
Vena, che è tra'l pollice & indice, perche non bene si punga per quella della testa 124.5
Vene del braccio come non tenghino vn medesimo ordine 124.5
Vena, che è tra'l dito picciolo & anulare, ò tra l'anulare et quel di mezzo, perche nō bene si tagli per quella del fegato 124.5
Vene della mano hanno diuersità grande nel diuidersi 124.5
Vena, che va al testicol sinistro, & quella del destro, donde naschino, & che andar tenghino 125.1
Vena, che va alla tela, che inuolge il rognon sinistro, & quella dal destro di doue naschino 124.6
Vene emulgenti, cioè succiatrici, doue naschino della vena

Vena caua, & come sien diuerse nel lor sito 124.6
Vene emulgenti come si congiungbino alle arterie nel li huomini 125.2 *nelle donne* 3
Vene emulgenti se ben nel nascere son differeti, nel processo poi tengono vn medesimo ordine. 125.2
Vene, che vanno alla midolla spinale & à i musculi de lombi 125.4
Vene, che vanno al collo della vescica, & di piu nelle done al fondo della matrice et collo di quella 125.6
Vena, che salendo al peritoneo & ventre congiugne i suoi rami coi rami di quella che scende sotto l'osso del petto 126.1
Vene, che si distribuiscon per la coscia 126.3
Vena maggiore, che va alla gamba, doue cominci, & come si diuida 126.2
Vena, che va al tallone & picde, che diuersità habbia 126.3
Vene, che si distribuiscon per la gamba, & arriuan al piede 126.6. 127.1
Vene del piede quanto diuersamente si distribuischino 127.1
Vene del piede come si possin considerare 127.2
Vene 4 differenti nel pettine de piede per trar sangue secondo i medici 127.2
Vena appresso el ginocchio, della quale molti Greci solo voleuon che si caua il sangue 127.2
Vena ombilicale 127.2
Vena ombilicale entrando nel fegato non si sparte in rami, come dice el Vessalio 127.3
Vena ombilicale ne gli huomini si secca, & si fa come legatura, ò corda 86.3
Vene & arterie del bellico che andar tenghino 91.4
Vene della matrice non son gonfiate, se non nelle pregne 90.3
Vene vanno alla testa 6 paia 130.2
Vena prima secoda & quarta, & prima & secoda arteria, che uāno alla testa, pche buchi entrino 130.3.4
Vene & arterie quanto variamente si congiungbino & separino dentro la testa 130.3
Vene, che escono da i 4 seni, che ha la dura madre, & si distribuiscon dentro la testa 130.5.6
Vena terza quita & sesta, che vāno alla māmella, pche buchi entrino, & come si distribuischino 131.1.2
Vena arteriale donde nasca, & come si diuida 131.4
Vena arteriale che tunica habbia, & perche su detta cosi 131.4
Vena arteriale & arteria venale che officio habbino
Ventre ha 8 musculi & loro historia 47 da 1 à 6
Ventricoli del cuore & lor historia 105.4
Ventricolo destro del cuore è assai maggior del sinistro 105.4
Ventricolo sinistro sta quasi nel mezzo del cuore 105.4
Ventricoli del cuore che officio habbino 105.5
Ventricoli del cuore hanno ciascun di loro 2 buchi, & à che seruino 105.5.6

Ventricoli delle ceruella son 3 & loro historia 110.5
Ventricolo primo & secodo delle ceruella 110.5.6
Ventricolo primo & secodo delle ceruella hanno dell'acqua dentro 110.6
Ventricolo primo & secodo delle ceruella di sopra & da i lati son lisci, di sotto aspri. 110.6
Ventricolo primo secodo & terzo che cosa contenghino in loro 111.2
Ventricolo terzo delle ceruella, & li suoi riuoli 111.1
Ventricolo 4 delle ceruella qual sia chiamato da alcuni, el quale non contiene altro, che acqua. 111.2
Ventricoli 3 primi delle ceruella son coperti di dentro da vna sottil tela, il quarto nò. 111.2
Ventricoli delle ceruella hanno l'officio di generare gli spiriti della vita 111.2
Vertebre da i Latini Spondilia, da i Greci son chiamate l'ossa della schiena 10.1
Vessalio comincio ad aprir gli occhi à molti nelle cose della notomia 2.2
Vessalio non fa particolar mentione dell'osso decimoterczo della mascella superiore per parergli di poco momento 7.4
Vessalio non ha veduto mai 2 processi, che in alcuni huomini si veggon in alcuni nodi de lombi, & son nelle scimmie. 12.2
Vessalio è d'altro parere, che l'Autore, nel congiugnimento del secondo osso del pollice della mano col primo 19.4
Vessalio dice che l'articolo primo delle quattro dita della mano è simile al secondo del pollice essendo simile al primo 19.6
Vessalio dice che la testa dell'osso del calcagno, che risponde al dito piccolo, s'incassa in vn seno, & ella s'incassa in vna testa 24.2
Vessalio dice che l'osso del pettine, che sostiene il dito grosso, ha di dietro vn processo, & egli ha vn picciol fossetto 24.6
Vessalio non vuole che tutti i musculi habbin le medesime parti 38.6
Vessalio non ha auuertito el congiugnimento de i musculi della fronte 39.6
Vessalio dice che el neruo della uista nò si cōgiugne nel mezzo della parte di dietro dell'orecchio, & che uia è vn musculo che lo cuopre; el quale negli huomini non si vede, ma ne gli animali bruti 40.3
Vessalio mette vn musculo nel numero di quelli, che muouon l'occhio, el qual serue ad alzar la palpebra 40.3
Vessalio non vide i 2 primi musculi del naso benchè manifesti 40.5
Vessalio oltre alli 10 musculi cōmuni d'l gargarozzone mette 2 nò visti mai dall'autore, ne dal Realdo 43.4
Vessalio dice che l'quinto musculo dell'occhio lo volta in su, il che non puo fare inserendosi nella sua parte di sotto 40.4
 Vessalio

Vesalio mette altri 2 muscoli dentro el naso, non vi si trouando altro, che la pelle & tela carnosia 40.5
 Vesalio dice che i 2 primi muscoli delle guace cominciano da i pcessi delle tēpie simili alle poppe, cominciando loro d'appresso la pūta delle ganasce 40.6
 Vesalio doue dica che li 2 primi muscoli delle guace si vniscō si, che paion vn solo essēdo loro distinti 41.1
 Vesalio con Gal. danno à i 2 primi muscoli delle guance l'officio d'aprire el labbro inferiore & tirarlo da i lati col superiore, ò di aiutar muouer la faccia l'Autore di aiutar à aprir la mascella inferiore 41.1
 Vesalio mette 9 muscoli della lingua, con tutto che e sien 10. 42.6
 Vesalio pone el 4 paio de muscoli nelle fauci, che non ui si veggono, et l'officio loro lo fāno certe fila 43.6
 Vesalio dice che la tela, che fāno i muscoli del secōdo paio del vētre, quando arriuanò al mezo di esso vētre, è semplice, diuidendosi quelle in due 47.3
 Vesalio mette il primo & secōdo musculo intercostale di fuori per vn solo, l'Autore gli fa due 48.5
 Vesalio nō fa mentione del musculo quadro, che muoue la tela della palma della mano 52.2
 Vesalio dice che i 4 muscoli della mano principalmente distēdon & piegano il bracciale, piegādo li 2 primi principalmente la mano, & gli altri 2 distendendola 55.1. & che non seruon à voltar la mano in su & in giu 2
 Vesalio dice che il secondo musculo della coscia si mette tutto sotto'l primo, con tutto che si vegga quasi la metà scoperta 58.3
 Vesalio dice che'l seſto musculo del piede s'inferisce in vn processo inferendosi quello in vn seno 60.4
 Vesalio non auuertì che il peritoneo di sotto al bellico è doppio, et che fra l'vna tela et l'altra passano l'arterie del bellico, & il condotto della orina 83.4
 Vesalio pensa che rotto il peritoneo i muscoli attraversati del ventre ritenghino le budella, altrimenti l'Autore 83.5
 Vesalio non vuole che i 3 primi ventricoli delle ceruella sien coperti di dentro da vna sottil tela, come notò Galeno 111.2
 Vesalio fa che i rami, che dalla vena caua vanno verso el braccio, si diuidono, nāzi che arriuinò alla ascel

la, diuidendosi loro dalla ascella 122.5
 Vesalio, come la vena giugulare interiore arriua alla testa, fa andare il maggior suo ramo accompagnato da vno dell'arteria del sonno, andando quello solo 123.1
 Vesalio dice che la vena ombilicale nello entrare nel fegato si diuide in piu rami, il che non è vero 127.3
 Vesalio dice che vna arteria insieme con vna vena montando insino alla collottola entrano anche per vn buco di quella, il che non è così 127.5. 130.3.4
 Vesalio dice che il neruo della uista nel inserirsi di dietro nell'occhio inclina ad vn lato, inferendosi quello nel mezo appunto. 142.2
 Vescica, che fascia el cuore, vedi Tele, che fasciano el cuore
 Vescica del fiele, vedi fiele
 Vescica nell'huomo & nella donna ha al suo collo vn musculo, & sua historia 56.4
 Vescica si compone di 2 tuniche & sue fila 87.5
 Vescica doue sia situata & sua historia 87.5
 Vescica è di figura ouata 87.5
 Vescica che operationi faccia con le sue fila 87.5
 Vescica de gli huomini in che sia differente da quella delle donne 87.5.6
 Vescica come riceua per li suoi condotti l'orina, & loro historia 87.6
 Vescica nelle donne doue sia situata 89.5
 Vgne di che si faccino & doue si attacchino 25.2
 Vgne non han vena, che le nutrisca, & loro vso 25.2
 Vgne non han senso, & crescon dalla radice come i capelli 25.2
 Vgola in quanti modi si chiami, & sua historia 104.2
 Vgola che figura & officio habbia 104.2
 Vlna ò cubitus, maggior fusello del braccio 16.5
 Voce in che modo si faccia 103.6
 Vreteres chiamon i Greci i condotti dell'orina 87.6
 Vnea è la terza tunica dell'occhio 112.6
 Vula è detta da i latini l'vgola & perche 104.2
 Y
 YOIDE commessura 5.1
 Ypsiloide osso perche sia detto così 9.6
 Yhmoides ò spongoides osso della testa 4.5
 Z
 ZYGOMA ponticello dell'ossa delle tempie 8.2

PROLOGO.



VOLENDO io scriuere l'historia dell' Anatomia, nella quale è gran controuerſa tra coloro, che ne parlano, parmi neceſſario dir primieramēte la ſua origine, inſieme con le cagioni, per le quali fu prima trouata, & dapoī tralaſciata; accioche quelli che non hanno cōmodità di poterla vedere eſercitare ne corpi humani, ſappino di coloro, che ne hanno ſcritto, a chi maggior fede preſtar ſi debba. Et perche queſta hīſtoria è piu neceſſaria alla Medicina, che ad alcun' altra ſcienza & i primi inuentori d'eſſa ſono ſtati medici, comincia rō dalla ſua origine. E' adunque la Medicina coſa tanto antica, che non è gente al mōdo ſi barbara, o ſi ſeluaggia, appreſſo lequale non ſi ſiano trouati alcuni rimedy; coſi per ferite, come per altre infermità. Nondimeno ſolo a Greci ſ' attribuiſce l'inuentione di queſta arte, ſi per hauerla eſi eſercitata piu ch' alcun' altra natione, coſtretti forſe dalla neceſſità, per le guerre, che con ſtraniere genti ogn' hor facuano, nelle quali era neceſſario ricener diuerſe ſorti di ferite; ſi perche anchora ceſſate le guerre & rimasi eſi ſignori, quelli che naturalmente erano al male inclinati, viuendo in otio & laſciua, incominciorno a darſi in preda a i diletti & a i piaceri; gli altri. ch' erano di miglior intelletto ſi diedero totalmente alle virtu, ſpendendo il ſuo tempo ne gli ſtudy, & nella contemplatione delle coſe naturali. Talmente che queſti per lo ſouerchio fatigare, & quegli per lo diſordinato viuere indebolirono tanto la compleſſione de i corpi loro, che gli fecero ſoggetti a molte ſorted' infermità, per le quali fu neceſſario anchora ritrouare nuoue ſorti di rimedy. Il primo adunque che tra Greci hebbe nome di medico fu Eſculapio figliuol d' Apollo, nipote di Mercurio per ſopra nome detto Trimegisto. Queſto Eſculapio fu alquāto innāzi la guerra di Troia, & hebbe tato credito tra Greci, che l' collocorno nel numero de gli Dei loro. Ad Eſculapio ſucceſſero due ſuoi figlioli, detti l' uno Podalirio, & l' altro Machaone, huomini ſimilmēte molto eccellēti in quell' arte: de quali fa mentione Homero nella guerra di Troia, non ſenza grā de ammiratione, anchor che egli nō dica che curaffero altro che ferite, ne che tenessero cōto alcuno di quello, che all' ordine del viuere ſ' appartiene, ne delle purghe & ſiruppi che hoggidi tutti ſiamo. La qual coſa manifeſtamēte dimoſtra la Ghirurgia eſſer la piu antica parte della medicina, & quella della quale eſi piu ſtima facuano. Perche attribuēdo eſi la cagione dell' altre infermità tutte a lor peccati (come il medesimo Homero afferma) nō cercauano per ſanar quelle altro rimedio che quello di Dio. Et è da credere, che coſi come gli huomini di que tempi uiucano piu regolatamēte, cō manco viuande, & cō maggior fatica, coſi anchora douessero ſtar piu ſani. Ma (come habbiā detto) cominciādo dapoī gli vni a darſi all' otio, & a guſtare i piaceri, & diletti dōde ordinariamēte naſce la maggior parte delle iſfermità; & gli altri a darſi cō ogni diligēza alle lettere, & a gli ſtudy della Phtloſophia (coſa nō mē dannosa al corpo, che ſalutifero allo ſpirito) l' intēperāte vita di quelli e la troppo ſollecita di queſti, furono cagione che la medicina, della quale niuno o poco biſogno hauea alcū di loro, fuſſe dapoī da tutti cō poco profitto ſtudioſamēte ricercata. Percioche, ſi come da prima viuēdo ordinatamente, ſenza medico, o medicina diuentauano la piu parte vecchiſſimi, mātēnēdoſi ſempre ſani & gagliardi, coſi hora cō queſta ſorte di viuere diſordinata, & otioſa, cō grā fatica alcuni de piu regolati, pūtellādoſi ſempre, come muro mal fondato, poſſono arriuare a parere, nō che ad eſſere. Per queſta ragione dopo la guerra di Troia furono molti eccellēti huomini, che eſercitarono la medicina, ſin che alcuni filoſofi iſfermādoſi p lo cōtinuo vegghiare, & p la cōtēplatione delle coſe naturali, cominciarono a meſcolare la medicina cō la filoſofia, parēdo loro l' vna, & l' altra eſſere quaſi vn me
A deſimo

Prologo

de ſimo ſtudio. In queſta età furò di molti grã ſoſoſi, i quali ſimilmẽte hebbero nome di grãdiſſimi medici. Tra i quali i piu famoſi furono Pi thagora, Empedocle, & Demo crito, del quale ſecòdo alcuni fu diſcepolo Hippocrate Coò, huomo nõ mẽ prudẽte in curare, che diligente in ſcriuere, la onde fra tanti & coſi eccellenti huomini è ſtato ſolo degno di eterna memoria. Queſto Hippocrate fu il primo, che ſeparò la medicina dalla ſoſoſia. Ad Hippocrate ſucceſſe Diocle Cariſtio; A Diocle Praſſagora, & Criſippo, & dapoì Heroſilo, & Eraſiſtrato, i quali tutti comiciarono diuerſe ſorti di curare. Al tempo di q̃ſti fu diuiſa la Medicina i tre parti, delle quali l'vna curaua cò la dieta, l'altra con vnguenti, & purgationi, la terza ſolamente coſerri. La prima chiamarono Dietetica; la ſecòda Pharmaceutica; la terza Chirurgia, nominãdo ciaſcuna dall'operatione ſua. I primi di coloro che ſolo cò la dieta curauano, nõ laſciarono pciò d'attendere alla cognitione della natura delle coſe, giudicãdo ſenza q̃lla la medicina molto Zoppa. Dopo queſti fu il primo Serapione, che cominciò a ſeparare la Theorica dalla Pratica, dicendo nõ eſſere neceſſario alla medicina altro che la eſperienza, & la memoria de caſi, che ogni di occorrono. Dopo coſtui ſeguitò Apollonio Glaucio & molti altri, i quali tutti furono dalla pfeſione chiamati Empirici. Eſſendoli adunq̃ queſti Medici, che curauano ſol cò la dieta diuiſi in due parti, delle quali l'vna medicaua cò la ragione, & l'altra cò l'eſperienza, quelli che la ragiò ſeguiuano parendo loro eſſer neceſſario, prima p poter ben curare, intender le cagioni delle infermità, ſi delle occulte, come delle manifeſte, & inſieme anchora la cõpleſione, l'oſſitio, il ſito, la figura, la grãdezza, il colore, la durezza, l'aſprezza, la morbidezza, l'ordine, la cõpoſitione, & la corriſpondẽza delle parti interiori del noſtro corpo, cominciarono ad aprire alcuni huomini morti, ne quali notauano il ſito, la figura, l'ordine, la corriſpondẽza del ventre dell'interiori, & dell'altre parti del noſtro corpo. In queſti tempi fiorirono Lico, Marino, & altri grandi Anatomisti. Dopo i quali volendo Heroſilo & Eraſiſtrato (che fuſſe coſi piaciuto a Dio, ch'eſi mai non l'haueſſero fatto) hauere piu particolar notitia della cõpoſitione dell'huomo, procurarono hauere alcuni condannati, & faccendogli aprir viui, notauano alcune particolarità di quelle, che ſono nel corpo. Queſta coſa quantunque fuſſe veramente fatta con buon zelo, non reſtaua perciò di dare occaſion di mormorare al popolo, per la crudeltà che in quelli infelici vſauaſi. A che ſ'aggiunſe, che i medici, che ſeguiuano l'eſperienza ſola, ſenza curarſi di trouare altri rimedi, che quelli, de i quali haueſſero gia prima fatto proua in guarire alcuno, diceuano che tutta l'importãza ſtaua non in conoſcere la cagion del male, ma in trouare il rimedio da ſanarlo; & che molte volte era accaduto vna vil femminella con vn ſempliciſſimo rimedio ſenza tante anatomie, hauer liberato ſubito quaſi miracoloſamente molti huomini da grauiffima infermità, la cura de quali molti eccellenti medici dopo molte diſpute, conſidatiſi ſolo ne ſuoi diſcorſi haueano per impoſſibile abbãdonata. Talmente che l'odio che l'popolo tutto portaua a queſta coſa, & le ragioni, che gli allegauano contro i medici empirici, inſieme con la crudeltà, che ſenza eſſer neceſſario ſ'vſaua in alcuni, furono di tal forza, che non ſolo fu prohibita l'Anatomia ne gli huomini viui, (come ragioneuolmente eſſer douea) ma etiandio fu ordinato, che ne anchora ne morti ſi poteſſe eſercitare. Et coſi cercãdo que medici di vſare piu diligẽza, che nõ biſognaua, furono cagione, che lor fuſſe poi vietato di vſare anche quella, chera neceſſaria. Per la qual coſa quei che vennero dopo loro non potendo vedere l'Anatomia dell'huomo nelle lor patrie, furono coſtretti andare in Aleſſandria, doue tal volte faceuaſi, ouero farla eglino in altri animali, benche ſ'ingegnauano di pigliare ſempre quelli, che fuſſero piu ſimili alla figura dell'huomo, giudicando che ſi come in quello che di fuori appariaua nõ erano molto differẽti, coſi anchora doueſſero eſſere nella cõpoſitione interiore. In queſto tempo fu Galeno di Pergamo Città dell'Asia, il piu ſauo & eloquente

quēte huomo che fusse stato mai nell'arte sua insino al presente. Ilquale desideroso d'insegnare a tutti, & parendogli, che tra la fattura dell'huomo, e quella della simia fusse pochissima differenza, scrisse l'historia della compositione del nostro corpo, tenēdo davanti (come per gli suoi scritti si vede) la simia. Et perche in quella età erano pochi huomini, che di ciò haueſſero scritto, & quelli di poco credito, & egli nell'altre parti della medicina era eccellentiſſimo, fu facilmente data da tutti piena fede alla sua historia, non potendosi prouare il contrario da alcuno, per eſſer vietata l'Anatomia negli huomini. In questo credito è durato Galeno insino a nostri tempi senza hauer mai hauuto ardire veruna persona di contradirgli in cosa alcuna, fin che Andrea Vesalio cominciò ad aprir gli occhi a molti, dimostrando come non è da prestar fede a tutto quel, che si troua scritto, come molti desiderosi piu di parere ſauu, che d'eſſere fanno. I quali (parendo loro troppo faticoso l'eſaminare ben ogni cosa, & conoſcendo che in questo modo non potēdo eſi aſſicurarsi d'affermare molte cose ſarebbono reputati mē ſauu dal volgo) diedero tanta autorità ad alcuni scrittori, che in niun modo vogliono confeſſare che habbiano potuto errare. Non conſiderando che quelli, a i quali preſtano tanta fede, furono huomini, come ſiamo noi, & poterono facilmente traſcurarſi, o ingannarſi in alcuna cosa, come ogni di veggiamo accadere a piu dotti in molte. Et tanto piu, che eſſendo antichamēte tutti i libri ſcritti a mano, oltre che ſi faceuano di molti errori in riſcriuergli, accadeua molte volte, che alcuno leggendo vn libro, notaua in margine qualche cosa, & dapoī quelli che l'riſcriueuano, nō ſapendo, che quelle fuſſero annotationi le ſtendeano come parole dell'autore. In questo & in molti altri modi, come da per ſè può ciaſcuno conſiderare, è da credere, che i libri de gli antiqui ſiano di tal ſorte ſcorretti, che non può ne deue huomo alcuno di giudicio dar loro tanta fede, ſenza eſaminar prima la verità, quanta queſti pigri gli danno. I quali ſe pur nō vogliono pigliar tanta fatica, almeno non douerebbono cercar di difendere l'ignorāza loro con l'autorità di queſto autore, & di quello, & maſſime in quelle cose, nelle quali ſi può toccar con mano il contrario. Percioche ſe noi conſideriamo bene l'Anatomia, della quale parliamo hora, trouaremo facilmente molte cose in eſſa, che ne dimoſtrano chiaramente, che quelli, che vogliono difendere Galeno, dicendo, che egli ſcriſſe l'Anatomia dell'huomo, oltre cha fanno grande ingiuria all'autore, facendolo bugiardo ad ogni paſſo, moſtrano anchora di nō hauere eſi mai veduto tagliare alcun huomo. Et accioche ogn'uno poſſa chiaramente cōprendere, che ſolo la verità & nō altro mi muoue a dir queſto, noterò qui alcune cose di quelle, che Galeno afferma. Lequali tutte ſi trouano nella ſimia, & ne gli altri animali bruti, & niuna nell'huomo. Et prima parlerò dell'oſſa, nelle quali non può cadere errore, per eſſer tanto dure, che nō poſſono coſi ageuolmēte perdere la forma, ne meno è da credere, che dal tēpo di Galeno in qua l'habbiano perduta. Dice adunque Galeno, che nella maſcella ſuperiore ſono due commiſſure, che diſcendono appreſſo i denti canini. Queſte ſi trouano nelle ſimie tutte, ne gli huomini di cento non ſi trouano in vno. Dice piu, che i proceſſi poſteriori de i nodi del collo ſono acuti in punta, come quei de proceſſi de i nodi delle ſpalle; nella ſimia è coſi, ne gli huomini ſono bifurcati. Dice che l'decimo nodo delle ſpalle ſ'articola col piu alto, & col piu baſſo, che gli ſtanno a cāto; in la ſimia è veriſſimo, nell'huomo è il duodecimo. Dice, che l'oſſo ſacro ſi fa di tre oſſa, & il codione d'altre tre, queſto è coſi in la ſimia, ma nell'huomo, l'oſſo ſacro ſi fa ordinariamente di cinque nodi, & alcuni di ſei & il codione di quattro. Dice anchora, che l'oſſo dell'homero ſi ſtorce in fuori, il che ſi troua nella ſimia, ma nell'huomo egli è diritto. Dice, che il maggior fuſello del braccio ha vn picciol proceſſo, come puntaruolo, che ſi articola con la raſeta della mano, & pur nell'huomo non ſi troua ſegno alcuno d'articulo. Dice che il polmone ſta diuiſo in cinque pezzī, ilche non potrebbe egli affermare, ſ' almeno vna ſol volta haueſſe veduto

Prologo

aprire vn huomo. Ma a che perdo io tempo in allegare tante ragioni? poi che non è dubbio alcuno, che se Galeno hauesse veduto tante volte l'Anatomia dell'huomo, non haurebbe lasciato di dirlo, come non lasciò di far mentione di due volte, che vide l'ossa, l'una in un corpo, che disforerò vna gran piena d'un fiume, l'altra in vno impiccato già quasi del tutto mangiato da corui. E se pur quando egli era giouane alcuna volta andò in Alessandria per vederla, forse che quando vi giunse era finita, come accade, o che (ricercando questa historia più presto memoria, che giudicio) si la scordò da poi, come appare per quello, che ne scrisse. Come ho addutti questi essempli, per li quali si uede Galeno hauer più tosto scritto l'history della Simia, che dell'huomo, ne potrei similmente addurre alcun altri, ne i quali si dimostra la sua trascuraggine, come è il mouimento della testa, sopra il primo & il secondo nodo del collo, quel della mano in fuori, il nascimento della vena sola, & altri, ne quali si conosce essere scorretto il testo, come in quel che dice, che scoprendo il cernello, o ammaccando i ventricoli suoi, si perde subito il moto, & il sentimento, doue dice o ammaccando, dee necessariamente dire & ammaccando. Ma l'animo mio per adesso non è di riprende alcuno, anzi auuertire quelli, che no'l fanno, che queste, et molti altre cose, che io lascio di dire per breuità, mi fanno creder fermamente, che Galeno rare volte, o non mai vide l'Anatomia dell'huomo, o che i suoi scritti sono molto scorretti, et che quelli, che vogliono difenderlo sono così pigri, & desiderosi di parer sanj, che vogliono più tosto coprire la sua ignoranza con l'autorità di Galeno, che prender fatica di tronar la verità. Si che io consigliarei ciascuno, o a venire qui in Italia, doue la potrà facilmente vedere, o se pur ha da stare al detto di coloro, che ne scrivono, che voglia più tosto credere a coloro, che hanno speso tutta la lor vita in questo studio con maggior copia d'huomini, che non potè mai Galeno hauer di Simie, che a coloro, che come trombette dicono dalle catrede, non quello, che essi hanno veduto, anzi quello, che pur ogni picciolo fanciullo potrà per se stesso leggere hauendo il libro innanzi.



LIBRO PRIMO

dell'Historia dell'Anatomia

COMPOSTA PER GIOVANNI

V ALVERDE MEDICO,

NEL QUALE SI TRATTA
DELL' OSSA.



LE PARTI del nostro corpo, ò sono di tal modo semplici, ch'ogni lor particella serba il proprio nome, che tutta la parte hauea di prima, & perciò furono chiamate simiglianti, come son la carne, il grasso, l'ossa, il sangue, la flemma, & la collera; ò tanto composte, che diuidendole, ogni lor particella ha il nome proprio da per se, per la qual cosa furono chiamate dissimiglianti, come sono i nerui, le vene, i muscoli, le dita, la mano, la faccia, le braccia, il petto, & tutte l'altre membra del nostro corpo. Le parti che fra se stesse sono simili, o sono tenere, & humide; o dure & secche. E di quelle alcune sono tali sempre, come la carne, il seme, il latte, la collera, la flemma, la malenconia, lo sterco, & l'vrina; o solamente sono tali stando nel suo natural luogo, come fanno il sangue, il grasso, il seuo, la midolla. Le secche & dure sono la pelle, i nerui, le vene, l'arterie, le cartilagini & l'ossa. Et così le dure & secche, come le tenere & humide, o in tal modo sono parte del corpo, che s'alcuna cosa di loro si perde, per niuna via si puo ricourare, come sono la pelle, i nerui, le vene, l'ossa, l'arterie; o in tale, che quantunque si perda vna parte di loro, (se del tutto non manca) facilmente si ricouera, come è la carne, il grasso, tutti i quattro humori, & gli spiriti, così quei, che dan la vita, come que', che danno il senso. Le parti che non si possono ricourare pigliarono principio dal seme dell'huomo, & perciò si chiamarono spermatice; quelle che si ricourano pigliarono principio nel ventre, dal sangue della donna, fuori del nutrimento quotidiano. Nondimeno tutte queste parti, così le spermatice, come quelle, che non sono, & così le simili, come le dissimili hanno diuersi officij nel corpo. Perche seruono alcune di copertura, o vestimento, come fa la pelle, il grasso, la tela carnosa, & la carne. Alcune mantengono l'ossa insieme, come le legature. Altre seruono a cuocere il cibo, come lo stomaco, l'intestini sottili, & alcune vene del mesenterio. Altre fanno il sangue, come il fegato; alcune altre lo portano a tutte le membra, come le vene. Alcune altre fanno gli spiriti della vita, come il cuore; altre portano questi spiriti per tutto il corpo, come l'arterie. Altre fanno gli spiriti del sentire, come le ceruella; alcune altre compartono questa virtù per tutto il corpo, come i nerui. Alcune altre seruono al mouimento che dipende dalla nostra volontà, come i muscoli. Alcune riceuono le superfluità del corpo, come la milza, il fiele, gl'arnioni, la vessica, l'intestini, le glandole. Passa per alcune l'aere, che recrea le ceruella, & il cuore, come il naso, il gorgocciuolo, i polmoni, l'arteria venale. Alcune altre seruono a i sensi esteriori cioè all'vdir l'orecchie, al veder gli occhi, al gustar la lingua il palato, a fauellar i polmoni, il gargarozzo, & sopra tutto i due nerui, che ritornano, chiamati perciò reuerfui, come in suo luogo diremo. Altre seruono per fondamento od armatura, sopra laquale tutte l'altre parti s'armano & stabiliscono, come l'ossa & le cartilagini. Delle quali incomincerò prima à trattare si per tal ragione, come perche dal conoscimento loro dipende la maggior parte di questa historia.

*La diuisione del
le parti del cor-
po.*

*Le parti simi-
lari.*

*Diuisione delle
simili in dure
& secche.*

*La diuisione di
tutte due queste
parti.*

*L'Officio di tut-
te le parti del
corpo.*

Dell'Ossa

Dell' Anatomia del Valuerde

Dell' Ossa.

Cap. I.

La divisione
dell' Ossa.

Giunta.

Processi.

Il modo nelqual
si congiungono
l'ossa.

Scheleto.

Congiuntura.

QUANTO sia necessario saper la natura, il sito, & la figura dell' ossa del nostro corpo, niuno meglio il pruoua, che quelli, i quali ogni di n' indirizzano, quando si disluogano ò rompono. Perche s'è tutta l'intention del Medico ritornarle al suo natural luogo, o consolidarle, non u'è dubbio, che sia bisogno, ch' egli prima intèda il vero sito, & figura, & natura loro. Or sono l' ossa la parte più dura del nostro corpo, e dapoì loro le cartilagini. Queste insieme con l' ossa sostengono tutto il corpo, dalle quali tutte l'altre parti nascono, & si stabiliscono. Di quest' ossa alcune son grandi, lequali son vote & piene di midolla di dentro. Altre sono picciole & spugnose di dentro, & piene parimente di midolla, anchor che in alcune non si ve da facilmente la midolla ne'l voto. Le grandi per la maggior parte hanno da amendue i capi, ò almeno dall' vno, vna giunta d' vn' altro osso, la quale i latini chiamarono Appendix (benche alquanto impropriamente) che vuol dir cosa, che penda da un' altra. i Greci più propriamente la chiamarono Epiphysis, che vuol dir cosa aggiunta naturalmente ad un' altra. Hanno questa giunta l' osso dell' homero ^a nella parte di sopra, & ne fanciulli anchora in quella ^b di sotto; il maggior ^c fusello del braccio nella parte di sotto, appresso il bracciale; & ne fanciulli anchora in quella di sopra appresso il gomito; il minor fusello ^d del medesimo braccio; la ^e coscia, & gli stinchi della gamba da amèdue i capi. Seruono queste giunte si a ciò che di loro nascano le legature, che congiungono l' ossa insieme, si anchora a dar principio alle corde d' alcuni muscoli. Hanno anchora l' ossa certi nodi, ò punte ò processi (come gli vogliam dire) quali i Latini chiamano Pro cessus, i Greci Apophysis, si come ha l' osso della spalla, & quello della coscia, & tutti i nodi della schiena. Di questi processi alcuni hanno la sua giunta d' un' altro osso, si come i due ^f processi dell' osso della coscia, il processo della parte di dentro dell' osso della spalla, simile ad vna Anchora. Alcuni non l' hanno, come que della mascella da basso (anchor che in questa in alcuni bambini nati nouamète se ne veggiano certi vestiggi) quello dell' osso del calcagno, quello del tallone, quello dell' osso dell' homero appresso il gomito, & tutte l'altre ossa spugnose. Hanno parimente al contrario molte giunte i suoi processi, si come quel che ha la giunta del maggior fusello del braccio, ^g appresso il bracciale, che pare un puntaruolo. Quel del maggior fusello della gamba che fa la gauola di dentro del piede. Quel dell' osso del piede, che sostiene il dito picciolo (di cui nasce, come diremo, l' ottauo musculo che muoue il piede) & i due che ha l' osso della coscia, & parimente quello dell' homero, quel nella parte di sotto, questo in quella di sopra, così grandi amendue, che più tosto si possono dir teste, che processi. Queste, & altre simili (che per breuità lascierò in fin' al suo luogo) sono tutte le giunte, & processi dell' ossa, parlando propriamente, benche nel processo del libro chiameremo ogni parte, come communemente si nomina, non curandoci di tanto rigore. Perche se la giunta hà un processo, basterà chiamarlo processo, come si fa in quelle dell' osso della coscia. Ne anche chiameremo tutti i processi di questo nome, perche quelle dell' homero, & della coscia più tosto s' hanno da chiamar teste, come ho detto. Così quelli anchora, che s' incassano in altr' ossa, tutti gli chiameremo teste. Tutte queste ossa così grandi, come picciole, (eccetto che l' osso, ch' è nella radice della lingua chiamato ^h yoide) si congiungono l' vne con l'altre in diuerse forme, & a ciascuna sorte di congiuntura diedero particolar nome i passati Anatomisti, quali faremo forzati vsare nel processo del libro, si per non hauer nostra lingua altri che gli dichiarì, si per hauerli vsati tutti gli altri Anatomisti, che da poi hanno scritto di loro. Et più presto sarebbe confonder la dottrina, che dichiararla, uoler ritrouare nuoui vocaboli. Si che essendo costretto per queste ragioni vsar quelli, parmi cosa conueneuol prima dichiarargli, per non hauere poi ad intrattenermi, ouero interrompere l' historia nel dichiarargli. Dunque è da sapere in prima, che tutta l' armatura dell' ossa si chiama in Greco scheleto, che vuol dire secco ò disseccato. Quest' ossa si legano ò congiungono in due modi, ò per congiuntura, & questa chiamano i Latini articulatio, ò per vnione, detta da Greci symphysis. Articulatione è una

a tab. i. ij.
ij. x
b tab. ii. y.
c tab. ii. z.
d tab. ii. i.
e t. ii. iij. 1. 2.
φ x

f ta. i. ii. iij. T

g tab. i. 4.

h ta ii. H. r.
v. fig. vij.

vna natural congiuntura di due ossa mediante una legatura che l'abbraccia sempre amendue, & tal volta entra nel mezzo dell'uno & l'altr'osso. Symphysis è una natural vnione di due ossa; dico naturale, per quelle, che, dopo l'esser state rotte, si risaldano artificiosamente mediante vna parte di carne dura bianca & neruosa, che nasce fra l'uno & l'altr'osso, simile a quella, che si vede ne segni delle ferite, chiamata perciò da Chirurgici Poro sarcoide, che vuol dir carne incallita. La congiuntione si fa in un de tre modi, o in modo che manifestamente si muouono l'ossa di lei, per non legarsi molto strettamente, & questa chiamano li Greci Diarthrosis, i Latini Articulatio, noi altri Congiuntura. O in modo, che anchor che si muouino, il mouimento è molto oscuro, incassandosi elleno molto strettamente; & questa sorte di congiuntura chiamarono i Greci Synarthrosis, i Latini Coarriutato, noi altri non ci hauemo proprio nome. O in modo, che per niuna via si muouono, per esser tanto giustamente incassare; & à questa sorte di congiuntura non diedero gli antichi nome alcuno, ch'io sappia, perciò la chiameremo noi quella, che non ha nome. La diarthrosis, & synarthrosis si fanno in un de tre modi, O incassandosi vna tonda testa in un profondo seno; essemplio della quale è, nella Diarthrosis, la congiuntura dell'osso della coscia con quel del gallone, quella dell'omero cò la palette della spalla; quella delle prim'ossa delle dita cò quelle del pettine; nella Synarthrosis, la congiuntura del tallone cò'l nauicolare, & quella del settimo osso del bracciale, col primo & secondo del medesimo. O falsi incassandosi una piana testa in vn picciol seno, come fanno nella Diarthrosis, il primo nodo del collo, col secondo; & tutti i processi di sotto & di sopra dell'ossa della schiena; il minor stinco del braccio col maggiore; nella Synarthrosis, quella del minor stinco della gamba col maggiore; quella delle coste co' nodi delle spalle, & con l'osso del petto; & quella dell'osso del collo del piede fra se stesse. O s'incassano faccèdo l'uno vna testa al quanto rileuata da i lati, & incauata nel mezzo, & l'altro un seno al contrario, rileuato nel mezzo, & incauato da lati, come si congiungono, nella Diarthrosis il maggior stinco della gamba cò la coscia, & il maggior del braccio cò l'omero, nella Synarthrosis, il tallone col calcagno, & alcun'ossa del bracciale fra se stesse. La prima sorte di congiuntura, (così nella Diarthrosis come nella Synarthrosis) chiamarono gli antichi Artrodia; la seconda Enarthrosis; la terza Ginglimon, senza far altra differenza, eccetto che nel muouerli, o chiaramente, ouero oscuramente. Quella che detto habbiamo non hauer nome, si fa anch'ella in vn de tre modi, o congiungendosi l'ossa, mediante certi denticciuoli simili a quei della sega, come si vede nell'ossa della testa, & questa congiuntura chiamarono eglino Sutura, noi altri Cómiffura. O congiungendosi mediante vna semplice riga, come si fa nell'ossa del naso, & della mascella superiore, & molte giunte; & questa chiamarono i Greci Harmonia, noi non le diamo particolar nome. O entrando l'un'osso nell'altro, come chiodo, o cuneo, come fanno tutti i denti nelle mascelle, & l'osso cuneale ne gli altri della testa & della mascella superiore; & questa chiamano i Greci Gomphosis, noi altri fin' adesso non le habbiamo dato nome alcuno. La Symphysis od vnione si fa in due modi, ò mediante neruo, ò legatura; come fan molte giunte; & i nodi della schiena; & chiamasi Syneurosis. O mediante alcuna cartilagine, come fanno alcune parti dell'osso del petto; & quelle dell'osso della col lottola; & quelle di quelle de galloni, & chiamasi Synchondrosis. Queste son tutte le forti delle congiunture dell'ossa, insieme col nome che ad ogni una di loro diedero gli Antiqui. Nel che mi pare essere piu conforme all'intention di Galeno, che quanti di questa historia insin' adesso han parlato. Anchor che egli vada tanto confuso nel principio del libro dell'ossa, che è necessario dire, o che il testo è corrotto, o che egli non si ricordò di quel, che poco innanzi hauea detto. Perche hauendo prima affermato, che nella Synarthrosis è alcuno mouimento, dappoi da essempli di congiunture, nelle quali niun moto si ritroua. Si che o egli vuole intèder, che nella Synarthrosis nò è moto alcuno, & sotto la Diarthrosis intese ogni sorte di mouimento, o dimenticòfi il terzo membro, il quale io adesso ho aggiunto, le cui specie sonò quelle, che egli attribuisce alla Synarthrosis, o mouimento oscuro. Dice anchora, che la Symphysis, od vnione si fa alle volte col mezzo di carne, il che se in ossa si può verificare, è ne denti, i quali il medesimo dice non congiungersi per vnione, & perciò non l'aggiungo io a quella

Vnione.

In tre modi si fa la congiuntura.

Seconda sorte di congiuntura.

Terza.

Divisione della prima, & seconda sorte di congiuntura.

Nomi di queste congiunture.

Divisione della terza sorte di congiuntura.

Dell' Anatomia del Valuerde

quella diuisione, che io fo, come ne anche aggiungo l'vnione, che fa l'un'osso con l'altro, senza esserci cosa nel mezzo, per non l'hauer veduto infin' adesso. Ma sia, come si voglia, basti intendere, come chiamauano gli antiqui queste congiunture, accioche leggendo i libri loro non ci causino oscuritate. Et percio aggiungerò anchora, che Collo chiamauano eglino vn processo aguzzo, al cui fine si fa vna coccola, & la coccola chiamauano Testa; & se'l processo non hauea testa, nol chiamauano collo, se non Coronon, che vuol dir processo aguzzo. Et Neruo diceano cosi i capi de muscoli, & le legature dell'ossa, come quei che nascono delle ceruella, & spinal midolla. Presupposto questo cosi in commune, serà bene incominciare a trattare di ciascun'osso da per se, faccendo principio dalla testa come da membro piu principale.

Il Collo.
Testa.
Coronon.
Neruo.

Dell' ossa della Testa.

Cap. 2.

La Natural figura della testa.

Altre quattro figure, che non son naturali.

Il Craneo, & le sue parti.

In due modi si congiungono l'ossa del craneo, Le commissure del craneo naturale.

Commissura Coronale.

La Lambdoide.

La Sagittale.

TESTA & capo chiamano i medici tutta quella parte che cuoprono i capelli, la cui natural figura è ^a come vna palla ouata, & compressa vn poco con le mani da i lati; piu larga di dietro, che dinanzi, ma da amendue le parti rileuata, (anchor che alquanto piu di dietro) & piana nel mezzo. Ha anchora la testa altre quattro figure, senza questa, piu mostruose, che naturali. La prima delle quali è ^b bassa dinanzi, & alta di dietro. La seconda è ^c al contrario, alta dinanzi, & bassa di dietro. La terza ^d bassa da amendue le parti, & alta nel mezzo, come quella, che fanno le donne Genouesi a lor teneri bambini, & come quella, che hauea Thersite, secondo che descriue Homero. La quarta è ^e piu larga che lunga, quasi come son quelle de gli Indi del Perù, laqual rade volte si vede nelle nostre parti. Sonui anche oltre a queste, diuerse altre forme di teste, lequali non curo di raccontare, per vederse rare volte. La testa che serba la sua piu propria figura ha vn'osso, che la cuopre tutta, ilquale i Greci chiamarono Cranium, i Latini Caluaria, noi altri il chiamiamo a similitudine de Greci il Craneo. Questo Craneo si compone d'otto ossa, delle quali il primo occupa ^f comunemente la fronte, fin passato il mollame, & chiamasi l'osso della fronte, per lo luogo che tiene. Il secondo & terzo ^g fanno tutta la Coronella, & si chiamano l'ossa della coronella. Il quarto & quinto ^h occupano amendue le tempie, (in quest'ossa sono i buchi dell'orecchie.) Il sesto ⁱ piglia tutta la collottola, & la metà del fondo del craneo, & chiamasi l'osso della collottola. Il settimo s'incassa ^k nel mezzo del fondo del craneo, come vn cuneo (dal che fu detto Cuneale) & fa il centro o radice del concauo de gli occhi, & vna parte del lato di fuori dell'istesso concauo. Quest'osso alcuni il contano fra le ossa del capo; alcun'altri fra quelle della mascella superiore, per esser mezzano fra l'vne & l'altre; ma piu ragioneuolmente si può contare fra quelle del capo, attento che occupa vna bona parte del fondo di lui. L'ottauo ^l empie tutto il buco del fondo dell'osso della fronte, che risponde a i forami del naso. Fu quest'osso chiamato da Greci, os Ythmoides, che vuol dir osso colatore, per esser forato come un criuello. Altri il chiamarono Spongoides, Per esser bufo, come vna spugna. Quest'ossa si congiungono sempre in tutti gli huomini, o mediante certe commissure, come fan quelle del craneo; o col mezzo di certe righe & harmonie, come fa tutto'l resto, non ostante che in alcuni vecchi non si veggiano le congiunture. Le commissure del craneo, che ha la sua natural figura, comunemente sono tre, due che lo partono al trauerso, & vna che l'fende per mezzo. Delle due prime l'vna ^m passa d'appresso il molame, & arriva da tempia, a tempia la quale i Latini chiamarono Sutura coronale, o inarcata, perche pare vn'arco. Questa commissura in alcuni è piu alta che in alcun'altri, nondimeno in tutti sta appunto tant'alta, quanto possono aggiungere col dito di mezo, ponendo la polpa della sua mano nel uoto del naso tra ciglio & ciglio. L'altra passa ⁿ per la collottola, & fa una figura, simile alla lettera maiuscula de Greci, chiamata labda ^o per laqual cosa fu chiamata Lambdoide. La terza passa ^o dal mezzo di questa seconda, per mezzo del craneo fin'al congiungerfi co la coronale; & rade uolte, (& molto meno nelle donne che ne gli huomini) passa per mezzo della fronte, fin'al principio del naso fra le ciglia. Questa commissura è molto simile ad una saetta, & per tal ragione fu chiamata Sagittale. Tutte queste tre commissure insieme rappresentano la figura d'vna H grande:

a t.iii. fig.i.

b t.iii. fi.ii.

c t.iii. fi.iii.

d t.iii. fi.iiii.

e ta.iii. fi.v.

f t.i.B.t.iii. fi.i.L.

g t.ii.a.t.iii. fi.i.j.R.

h ta.ii. D.r. iii. fi.i.d.

i t.iii.B.t.iii. fi.i.E.

k t.iii. fi. vi. OOO.

t.v. fi.iii.

l t.v. fi.vi. M

m ta.ii.A.ta.iii A I. A.B.

n ta.ii.iii. B.

o ta.iii.c.ta.iii. fi.i.m.

Lib. primo dell'ossa.

5

grande, come molto bene notò Hippocrate nel libro delle ferite del capo. L'altre teste che non seruano questa natural figura, se ben son coperte dal craneo come la sopradetta, nondimeno non hanno l'istesse commessure. Perche quella, a cui manca la parte alta dinanzi, non ha se non la commessura sagittale, & la lambdoide, lequali fanno vna figura simile al T maiusculo P. Quella a cui manca la parte alta di dietro, ha la sagittale & coronale sole, che fanno l'istessa figura del I maiusculo, ma volto al riuerso. Quella che è alta solo nella coronella, non ha la commessura coronale, ne la lambdoide; ma in luogo di queste ne ha vn'altra che attrauerfa il capo per mezo, & fa vna croce †, con la commessura sagittale. Hanno anchora tutte le caluarie (senza le tre commessure dette) altre due nelle tempie di sopra l'orecchie, che vanno in arco dal fine della commessura lambdoide, infino al fine della coronale. Lequali si fanno mediante la congiuntura dell'ossa, non come le sopradette, anzi l'osso della coronella da ogni parte finisce, assottigliandosi come vna scaglia, & entra di sotto l'ossa delle tempie dal suo lato, che montano in su. Per laqual cosa alcuni non han voluto chiamarle commessure semplicemente, ma commessure scagliose. Hanno anchora tutte le caluarie vn'altra picciola riga, o commessura, (parlando piu licentiosamente) commune all'ottauo osso, & a quel della fronte, laqual circonda per dentro del craneo la parte dinanzi, & quella da i lati del buco dell'osso della fronte, che risponde al naso. A questa commessura non diedero nome alcuno gli antiqui. Io sempre la chiamerò commessura hyoide; si per esser ella molto simile alla v de Greci; si per schifare la circunlocutione nel nominarla. Ha similmente la caluaria senza queste sei commessure proprie, altre due righe, o od harmonie; & ogn'vna di loro nasce dal fine della commessura lambdoide, & si distende per di sotto della collottola, (benche alquanto oscuramente,) & passa fra'l nodo della collottola, che si giunge col prim'osso del collo, & la parte dell'osso dell'orecchia simigliante ad vna rupe, & va innanzi giungendosi a poco a poco con la sua compagna, finche arriua al fine dell'osso della collottola, doue finiscono di congiungersi col mezzo d'vna picciola riga, attrauerfata fra lui, & l'osso cuneale, appresso i pertugi del naso, che rispondono al palato. Da ciascuna di queste righe ne monta vn'altra verso a dietro per le concavità delle tempie, con certi circoli intorti, verso la parte dinanzi delle commessure scagliose, & da indi cala vn poco auanti, & si congiunge col fine della commessura coronale; & dapoi cala nel medesimo modo vn'altro poco, fin presso al canto di fuori dell'occhio, doue getta vn ramo, ch'entrando nell'occhio passa per la parte di sopra de lati di tutto il suo spatio, fin che viene a congiungersi con quella dell'altro lato, fra le ciglia. Gettato questo ramo segue la riga il suo cammino innanzi, & calando nel medesimo modo, che montò per le tempie, arriua infino al fine de gli vltimi denti mascellari; & da indi torna a montare alquanto in obliquo per tutta quella concavità, che risponde al voto del naso, fin che arriua a congiungersi fra l'ottauo osso, & il cuneale con quella, che nella istessa guisa viene per tutto l'altro lato. Questa commessura appare chiaramente per la parte di dentro del craneo, che risponde alle ceruella. Nella qual parte si vede similmente da ogni suo lato vn'altro ramuscello, che nasce di lei, & è commune all'osso della fronte, & al cuneale. Questi ramuscelli si dimostrano anchora dentro del voto de gli occhi, poco piu in su del centro o radice loro; nondimeno la riga od harmonia per la parte di sotto appresso i buchi del naso, che rispondono alla gola, quasi non si dimostra. Queste son tutte le commessure, & righe o harmonie dell'ossa della testa. Delle quali alcune piu manifestamente si palesano, alcune no; come facilmente in qual si voglia caluaria si puo vedere; & molto meno si veggono negli huomini che ne fanciulli. Et si come ne gli vni, & negli altri s'appartano senza molto trauaglio cocédogli; cosi in alcuni vecchi non s'appartano per niuna via, anzi pare che si siano vnite l'ossa. Mediante queste commessure o righe o harmonie si diuidono tutte l'ossa del capo in questa forma. Quel della fronte, per la parte piu alta, si diuide da quelle della coronella, col mezzo della commessura coronale; per la piu bassa, da quelle della mascella superiore, mediante quella che attrauerfa il nato vicino alle ciglia, incominciando dal canto di fuori de gli occhi, per li lati; dall'ossa delle tempie, mediante vna parte delle commessure scagliose; per di sotto, (dentro lo spatio della caluaria) dall'osso cuneale, mediante la riga, che è fra le radici dell'occhio. Di modo che quest'osso della fronte viene ad essere quasi tondo. Quelle della coronella si diuidono l'vno dall'altro, col

Le commessure delle teste, che non son naturali.

Le commessure scagliose.

La commessura hyoide.

Due righe o harmonie.

Altre due righe o harmonie.

Diuisione dell'ossa del capo.

B mezzo

Libro Primo

mezzo della commessura sagittale; dalla parte dauanti si sparte ogn'un di loro da quel della fronte; mediante la coronale; per la parte di dietro dall'osso della collottola, col mezzo della lambdoide; per la parte di sotto, dall'ossa delle tempie, mediante le scaglioie; dal cuneale, mediante la parte della riga commune all'ossa del capo; & a quelle della mascella superiore, che dicemmo camminare innanzi, dalla parte dinanzi delle scaglioie, infino al fine della coronale. Di modo che quest'ossa uengono ad essere quadrate, eccetto in quelle parti, che assottigliandosi come scaglie, entrano di sotto quelle delle tempie; nella qual parte son massicce, & nel resto tutto ò uote ò cauernose; & tutt' elle sono alquanto piu lunghe che larghe. Quelle delle Tempie si diuidono, dalla parte di sopra, oue si congiungono con quelle della coronella, mediante le commissure scaglioie; dalla parte di dietro, & da quella di sotto, dall'osso della collottola, mediante la riga, che nasce del fin della lambdoide; per la parte dauanti dall'osso cuneale, col mezzo della riga ò harmonia che montando per lo concauo delle tempie, si rigiunge alla parte dinanzi delle commissure scaglioie; dal prim'osso della mascella superiore, mediante quella commessura simile ad una s. Dimodo ch'elleno vengono ad esser tonde, tollone uia (come dappoi diremo) quei processi, che hanno. L'osso della Collottola si diuide da quello della coronella, mediante la commessura lambdoide; da quelle delle tempie, mediante le righe, che nascono della lamboide; & dal cuneale, col mezzo della riga attrauerata, che congiunge le due, che nascono della lamboide. Di modo che ha cinque lati; fin'al fine della lamboide due; altri due infino al fine dell'harmonie; & vno che fa la riga, ch'el congiunge col cuneale. Questo Cuneale si diuide dall'osso della collottola, mediante la sopradetta riga; da quelle delle tempie, col mezzo dell'altra, che da ogni lato nasce di lei, & monta (si come dicemmo) per mezzo delle tempie, fin'alle commissure scaglioie; si diuide appresso dall'osso della fronte, & da quelle della coronella, mediante quella riga, che nasce del fine della sopradetta, & il ramo, che nascendo di lei, & entrando nell'occhio per lo canto di fuori attrauerfa (come habbiamo detto) fin'al congiungerfi con quel dell'altro lato; & dall'ottauo osso col mezzo de fini di quelle, che passando per lo estremo de gli ultimi denti mascellari, si uengono a congiungere nella forma detta fra le radici dell'occhio; si diuide anche dalla mascella superiore, mediante tutto il retto di quelle righe dette. L'Ottau'osso si separa dall'osso della fronte, col mezzo della commessura hyoide, che lo circonda tutto per sopra; eccetto in quella parte, che habbiamo detto separarsi dal cuneale medianti i fini di quelle, che attrauerfano ò abbracciano quello spatio del naso, che risponde al palato; & dalle due ossa della mascella superiore, che contengono i denti, mediante la riga, che da un lato all'altro cala tra le finestre del naso; & dall'osso cuneale, col mezzo della detta riga, che per la parte da basso sta uicina a i buchi, che rispondono dal naso al palato, appresso gli ultimi denti mascellari. Tutte queste commessure ò harmonie o righe, che diuidono l'ossa del capo nel modo detto, seruono non a fare, che la testa resistesse meglio a i colpi, come alcuni pensano (perche ragioneuolmente assai piu resiste essendo d'un osso solo, oltre che i colpi, che tocano le commessure, sono senza comparatione piu pericolosi anzi) seruono tutte principalmente, che la dura madre s'attachi meglio al craneo, entrando fra osso, & osso; & non caggia sopra le ceruella; & insieme perche la tela chiamata Pericraneo, che nasce della dura madre (come al suo luogo diremo) possa uscir per loro. Aiutano anchora che per loro si risoluano le humidità del capo. Et per tal ragione i fanciulli, (che hanno i ceruelli piu humidi) hanno queste commessure assai piu aperte, & rallentate; principalmente nel mollame, doue ui hanno ordinariamente di molta crasima. Or ritornando al proposito nostro, Di tutte queste ossa quelle della coronella sono le piu sottili, & fiacche, & di dietro cauernose; (eccetto in quella parte che si congiunge con quelle delle tempie) & lisce cosi di fuori, come di dentro. Benche per la parte di dentro fanno certi piccioli riuioli^f come solchi, ne quali le uene, & arterie della dura madre piu sicuramete si pongono. Quel della collottola è assai piu forte, & duro, benché non ugualmente d'ogni parte; perche in quella doue è scarnato, della qual nõ nasce

L'officio delle
commessure, &
righe del capo.

Comparatione
dell'ossa del ca-
po fra se stesse.
Quelle della co-
ronella.
Quel della col-
lottola.

f. r. v. fi. ii.

niuno

niuno musculo è tanto più duro, che quel della fronte, quanto quello della fronte è più duro che quel della coronella. Nondimeno ne anche in tutta questa parte è vgualeme-
 g ta.v. fi.i.ii. grosso; pche nel suo principio è di molto maggior grossezza. Tutta questa parte grossa
 ki. con tutto il suo resto, ch'è scarnato, ha dentro certe picciole concauità, separate con vna
 h la medefi- molto forte scaglia dell'istesso osso, h come quelle, che hanno quelle della coronella,
 ma. d quel della fronte, nelle parti oue similmente sono scarnate. Il resto di quest'osso, che
 i la medefi- concauità; & ha nel lato di dentro vna i riga rileuata come costicciuola, che attrauerlan-
 ma. dolo per mezzo, dal principio della parte scarnata, fin'al buco della schiena, lo aiuta ad
 k lib.v. ta.ii. essere più forte. Da i lati di questa costicciuola si fanno nella parte di dentro due seni,
 fi.ix.R. o angoli, k ne quali sta il cerebro. La parte vltima passato il buco della schiena si va in-
 grossando, a poco a poco, fin che s'appressa all'osso cuneale; doue manifestamente e più
 grosso. Ha similmente quest'osso, nella parte di fuori, da lati dell'istesso buco, alquan-
 to innanzi, l due picciole teste, o nodi, più lunghi, che larghi; i quali si congiungono col
 primo nodo del collo; & sopra loro, come sopra gangheri, alziamo & abbassiamo il ca-
 po. Questi nodi son due giunte, come manifestamente si vede ne fanciulli; ancor che
 ne vecchi siano tanto vniti, che paiono parte dell'istesso osso. Et e da notare, che tut-
 to quest'osso ne piccioli fanciullini è diuiso in tre, mediante tre righe piene di cartilagi-
 ne; delle quali vna ne va dal fin della commessura sagittale, fin'al buco dell'osso della
 schiena; & diuide in due pezzi quella parte di quest'osso, che chiamiamo la collottola.
 L'altre due vanno, vna per lato, dal mezzo del detto buco, vicino al fine delle due teste,
 che si congiungono al primo nodo dell'osso della schiena, fin'alle righe, che si congiun-
 gono con la lambdoide, incontro de i processi simili alle mammelle. Nondimeno tut-
 to l'osso per la parte di dentro è vgualemente liscio; per la parte di fuori, la parte scarnata
 è liscia, il resto, che fa vna parte del fondo del capo, è manifestamente aspro, & disugua-
 le, m accioche meglio potessero inserirsi i muscoli. L'osso della n fronte e mezzano tra
 m t.iii. fi.vi.s. duro, & tenero; & se bene appresso le ciglia e alquanto voto, nondimeno vn poco più
 n t.iii. fi.i.1. in su ritorna massiccio, & duro, per tutta la fronte, fin'a i capelli, doue comincia a inte-
 nerirsi, & assottigliarsi, quanto più s'auuicina all'osso della coronella. Questa è quel-
 la parte, che per elser ne fanciulli tenera, come molletta, fu chiamata il mollame.
 o t.v. fi.i.t. Quest'osso in niuna parte è più sottile, o che in quella, che risponde al voto de gli oc-
 p la med. fi.1. chi; & in quella che si congiunge con l'ottau'osso p del capo; perche in questo luogo è
 fatto di due molto sottil scaglie vote, & piene dentro d'aere, ne più ne meno, che le con-
 canità vicine alle ciglia. Et è da notare, che queste concauità, che dicemmo essere ap-
 presso le ciglia, si comunicano a quelle, che diremo essere nell'osso cuneale, mediante
 alcuni spiragli, che attrauerfano l'ottauo osso. In queste cauerne, o concauità, si dispo-
 ne l'aere, che va alle ceruella, si come ne polmoni, quello, che va al cuore. Quelle del-
 le tempie son molto differenti, ogn'vno fra se; perche la parte lor di sopra che si con-
 giunge con la coronella, e sottile, & massiccia, di fuori liscia, di dentro alquanto disu-
 guale, & corrispondente alla figura delle ceruella; le quali (come al suo luogo diremo)
 fanno nella parte di fuori appresso il cranio certe volte, & giri, simili a quei delle bu-
 della. Quella da basso, che si congiunge con l'osso cuneale, & quello della collottola,
 è aspra, dura, & disuguale; principalmente nella parte di fuori, che risponde alla i riga,
 che congiunge quelle, che nascono del fine della lambdoide, & diuide l'osso della col-
 lottola, dal cuneale; nella qual son aspre come pietra pomice, & perciò furono da Greci
 chiamate Lithoydes, che vuol dir petrosi, o di pietra. Ogn'vno di quest'ossa ha tre pro-
 cessi, vno nella parte di dietro passato il buco dell'orecchia, i simile ad vna mammella,
 r t.iii. fi.i.vi. per la qual cosa fu chiamato processo mammillare; vn'altro vn poco più a basso ver-
 k. so a dentro, al fin del luogo, doue la mascella inferiore si lega con la superiore, il quale
 s t.iii. fi.vi.i. è simile ad vn puntaruolo o sprone di gallo, & perciò il chiamarono i Greci Stiloi-
 des. Questo processo e tanto sottile, che benché massiccio facilmente si rompe; &
 perciò rade volte si troua nelle caluarie, che sono ne cimiteri. Il terzo che sta nella
 parte dinanzi, si va a congiungere con vn u processo dell'osso della mascella superiore,
 che fa l'angolo di fuori dell'occhio; & amendue fanno vna punticella, che si chiama
 L'osso della col-
 lottola si compo-
 ne di tre.
 L'osso della fron-
 te.
 L'ossa delle temp-
 pie.
 I processi dell'os-
 sa delle tempie.
 t.iii. fi. ix x
 u t.iii. fi. i. z

Libro Primo

L'osso cuneale. l'osso giogale, per esser simile ad vn giogo, come diremo. Nel mezzo di questo processo, & del mammillare * vi sta il buco dell'orecchia. Tolti via questi processi restano l'osso fa tonde. y Il cuneale medesimo è così differente; & perciò gli Antiqui il chiamano Polymorphon; che vale tanto, quanto di molte figure. Quest'osso da lati, & nelle concauità delle tempie è sottile & massiccio; nella parte di mezzo, che è come fondamento del capo, è più grosso, che niuna altra di lei, & voto di dentro; & nel voto vi sono due z fosse, separate mediante vna sottil scaglia a dell'istesso osso; & di sotto loro ven'è vn'altra più picciola, circondata della medesima forma; & niuna di loro risponde a parte alcuna, eccetto al voto della fronte; b & al naso; non ostante, che Galeno pensò, che questa parte di quest'osso fusse forata, come criuello, ad effetto che per lei la flemma del capo si purgasse. Ma per questo effetto fu ordinata vna c come ghiandola, che sta in vn picciol seno, che si fa nella parte più grossa di quest'osso, che corrisponde alle ceruella, simile ad vna sella; & di lei escono due picciol riuoli, quasi niente concaui, per li quali la detta flemma si purga, come si dirà, quando tratteremo di tutti i buchi del capo in comune. Ha anchora quest'osso sei processi, come ali, d due appresso la grossa parte di lui, che risponde alle ceruella, le quali fanno il centro d radice d'amendue gli occhi, & rappresentano l'ali d'vna farfalla; e altri due da i lati, che empiono il voto delle tempie, di sotto l'osso giogale, & paiono ali di pipistrello; & i due vltimi f nella parte più bassa, che scendono, ogn'vno dal suo lato, fin'a gli vltimi denti mascellari; & fanno come vna porta inarcata al principio del voto del naso, che risponde al palato; & rappresentano quasi la medesima figura, che le grandi; per la qual cosa fu l'osso chiamato Pterigoides, che vuol dir cosa con ali. Nel mezzo d'ogn'vna di queste due ali vi è vna concauità, di cui nasce sicuramente (come diremo) quel muscolo s che è nascosto nella bocca, & aiuta a dimenare la mascella da basso. L'ottau'osso, (che occupa il buco dell'osso della fronte, che risponde al naso, & è minor di tutte l'ossa del capo) è ouato, & piano, & forato come vn criuello. Et ha due processi, l'vno nella parte h da basso, il quale fende le finestre del naso per mezzo, & si congiunge col secondo osso della mascella superiore (come diremo;) l'altro nella parte di sopra, che risponde alle ceruella, mediante il quale si diuidono in luoghi d seggi, in che sono gl'instrumenti dell'odorare.

L'osso cuneale.

Il cuneale non è perungiato.

I processi dell'osso cuneale.

L'ottau'osso della testa.

x la med. o
y t.iii. fi. vi.
uoo. t.v. fi.
iii.

z t.v. fi.iii. c.D
a t.v. fi. iii. E

b la med. F

c lib.v. t.ii. fi.
xiii. S. fi. xv.
F. fi. xix. A

d t.v. fi. i. y

e t.iii. fi. vi.
oo6. t.v. fig.
iii. II
f t.iii. fi. vi.
p p y. ta. v. fi.
iii. H

g li.ii. t.vi. D

h ta. i. p.
i t.v. fi. i. u

De gli ossicelli dell'orecchie.

Cap. 3.

ANchor che Galeno, & il Vesalio trattino subito dopo l'ossa del capo, dell'osso chiamato giogale, per farsi in parte d'vn processo dell'ossa delle tempie; Nondimeno perche anchora si fa d'vn'altro processo del prim'osso della mascella superiore, non mi par conueniente parlar di lui, fin che io habbia trattato dell'ossa di detta mascella; il che farò subito, che haurò finito di trattar dell'ossicelle, che sono dentro dell'orecchie. Già dicemmo, come in ciascun'osso della tempia vi era vna concauità, chiamata l'orecchio. Questa concauità ha quattro buchi; de quali faremo particolar mentione nel suo luogo. Hora parlerò solo del primo, per esser necessario alla dichiarazione di quello, che io ho da dire. Questo buco comincia dal principio della concauità dell'ossa delle tempie; & va torcendosi, come lumacha, fin'al voto del capo, che risponde alle ceruella. Dentro di lui vi sono alcuni a seni d concauità, le quali tutte non meno, che lui, son coperte d'vna sottil tela, che si fa dell'vno de nerui b del quinto paio, che nasce delle ceruella. Fra queste concauità, che sono molto differenti fra se stesse, ven'è vna c tonda, & piana, circondata d'vn'arco d'osso alquanto rileuato. In questa concauità son tre ossicelli. Il primo d vicino la parte di fuori, appresso l'orecchia, il quale ha due piccioli processi, come gambucci all'ingiu, con i quai s'appoggia alle mura dell'arco. De quale quel di fuori e verso l'orecchia e corto, & grossetto, & largo, & finisce in vna punta aguzza. Quel di dentro (che è più verso la tela che cuopre le sponde di tutta la concauità, anzi s'inferisce più in lei, che in quella di fuori) è più lungo f & più sottile; & finisce in vna punta intorta, come vncino, a cui la detta tela s'attacca. Il corpo di quest'osso e quadro, & piano; di sopra la sua maggior parte e piana, il resto

Il primo buco dell'osso, delle tempie.

Il primo ossicello dell'orecchie.

a t.v. fi. iii. A
b ta. v. fi. iii.

c t.v. fi. iii. H

d ta. v. fi. iii.
IO

e t.v. fi. iii. r

f t.v. fig. iii. c

Dell'ossa.

7

Questo è tondo. Di modo che è simile ad vna incude, ò dente mascellare; a cui similmente si può comparare, per non hauer piu di due processi, simili alle radici sue. Questo officello si vede chiaramente, fendendo per mezzo il detto buco dell'orecchia. E anchora in questo medesimo buco, appresso la detta concauità, vna molto sottil tela, che è trasparente, come vetro; laqual cuopre, & tura come coperchio il principio della concauità verso l'orecchia. In questa tela (per la parte di dentro) è attraversato il secondo officello (si come stanno le corde nel ciembalo di sotto la carta pecora,) il quale è lungo, sottil, & vn poco ritorto, comel'osso della coscia. Et nella parte di sopra ha due piccioli processi, simili a quei, che dicemmo hauere l'istesso osso della coscia; mediante i quali s'attacca piu sicuramente alla detta tela. Passati questi processi fa vna testicciuola tonda, & liscia. Di sorte che tolte via le due teste, che ha l'osso della coscia appresso il ginocchio, gli faria questo tanto simile in figura, quanto disuguale in grandezza. Questa testicciuola scostandosi alquanto dalla detta tela verso in dentro, si lega con la parte dell'alt'osso, simile all'incude, mediante alcune molto sottil tele; come chi legasse vn martello sopra vn'incude. Il terzo officello è triangolare, & simile ad vna staffa; & è situato nell'istessa concauità, appresso il buco cieco; & in lui s'appoggia il maggior processo del prim'officello.

Il secondo officello.

Il terzo officello dell'orecchie.

Dell'ossa della mascella superiore.

Cap. 4.

Chiamasi mascella superiore tutta la faccia dalle ciglia alla bocca; & ha dodici ossa, sei da ogni lato; differenti non meno in grandezza, che in figura; benche quasi tutte sottili, & dure, perche pesino manco, & resistano piu. Di quest'ossa il primo fa il canto di fuori dell'occhio, dal fin delle ciglia, fin circa il naso, & la maggior parte della mascella, & vna parte dell'osso giogale, come subito diremo. Il secondo (che è sottil, come scaglia, & quasi tondo) fa il canto di dentro dell'occhio, appresso il lagrimale; & è il piu picciolo di tutti quei della mascella. Et per esser tanto sottil, & stare in luogo cosi humido, come è il lagrimale, doue facilmente si corrompe, di rado si troua nelle caluarie de cimiteri. Quest'osso vetissimamente pare parte dell'ottauo, di quelle del capo; come ogn'vno potrà prouare, spartendo per mezzo vna caluaria, & procurando di scauar intero il detto ottau'osso, perche le vederà vnite, mediante alcune scaglie. Il terzo sta subito dietro il secondo, & è quadro, & vn poco maggior di lui; & empie tutto quello spazio tra il fin del secondo osso, & il centro dell'occhio; & è tanto sottil, che traluce come vna scaglia. Rompendolo si vede dentro pieno d'alcune cauerne, circondate tutte d'altre scaglie. Il quarto & il suo compagno, a cui si congiunge, (& sono le maggior ossa di tutte quelle della mascella, & in loro s'incassano tutti i denti) fanno quasi tutto il palato, & la maggior parte de lati del naso, & quasi tutto il suo fondo. Nondimeno in queste due vltime parti non son massiccie anzi son piene di certi pertugi simili alle bresche, cioè fiali di mele. Quest'ossa fra gli altri buchi che hanno, sol'vno, (che è quel, che si vede nella punta delle gote, & comincia nel concauo dell'occhio) anchor che al principio sia circondato d'vna sottil scaglia, nondimeno vn poco innanzi che finisca, è circondato da vn forte osso. Et sopra lui si vede vna picciola riga, che non penetra piu, che fin'al buco; come ne anchora penetra l'altra, che si ritroua in alcuni fanciulli al principio del palato, appresso gli denti canini, laquale in niuna forma, (che habbia veduto io) passa innanzi, come fa ne gli animali bruti. Il quinto, & quel, che gli risponde dall'altro lato, fanno tutta la parte dinanzi del naso, fin'alle sue cartilagini, & la metà de lati. Et son quest'ossa dure, & massiccie, sottili, & larghe, ma ben assai piu lunghe; & hanno quattro lati; & sono vn pochetto piu larghe di sotto, che di sopra. Il sesto col suo compagno fanno l'ultima parte del palato, & del largo del naso, che risponde alla bocca; & sono tal'ossa larghe, & sottili, & forti. Et i lati dell'ultima parte d'ognun di loro s'appoggiano alle punte de processi di sotto dell'osso cuneale. L'altra metà sta in aere, & fa vna C. Senza queste dodici ossa ve n'è vn'altro & scella.

Il primo osso della mascella superiore.

Il secondo.

Il terzo.

Il quarto.

Il quinto.

Il sesto.

Vn'altro officello, di questa mascella.

B 3 che

Libro primo

che sta fra l'osso cuneale, & quelle del palato, il qual diuide il voto del naso, che risponde al palato, & pare che sostenga il capo. Quest'osso è simile all'aratro; di cui non fa partecolar mentione il Vesalio, per parergli di poco momento. Quest'ossa tutte si diuidono col mezzo d'alcune righe, le quali chiamerò sempre commessure, ò colture, si per schifare confusione, si per hauerle Galeno chiamate di questo nome. Et perche trattando delle commessure dell'ossa del capo, contāmo quelle anchora, che erano comuni alla mascella superiore, hora tratteremo delle sue proprie; le quali sō noue, quattro da vn lato, alle quali corrispondono altre quattro simili, nell'altro lato; & vna in mezzo. Di queste commessure, la prima,^h che è quella di mezzo, fende tutta la mascella d'alto, a basso, incominciando fra le ciglia, infino al fin del palato. La secondaⁱ nasce di sotto l'osso giogale, di quella, che dicemmo scendere per lo concauo delle tempie; & da indi scende facendo vna gobba innanzi, infino alla punta dell'osso della gota; dappoi monta in obliquo verso innanzi, hor diritta, hor storta per mezzo della detta gota, fin'all'entrare nell'occhio per sopra il buco,^k che si vede nel quarto osso; & dappoi ritorna in arco, per dentro del medesimo occhio, verso l'angolo esteriore, fin che giunge al luogo, doue incominciò, che è appresso la fessura, che si vede nella parte piu bassa del concauo dell'occhio. La terza è simile alla seconda; & fa l'istessa strada dall'altro lato.^l La quarta comincia appresso il lagrimale; & scende per di fuori dell'occhio, fin presso doue la seconda entrò; & iui entra in lui; & va alquanto in obliquo all'insù, fin quasi al mezzo del voto dell'occhio, doue getta vn ramuscello, che montando similmente in sù, (vn poco verso la parte dinanzi) si congiunge con quella, che dicemmo separar l'osso della fronte dalla mascella superiore. Gettato questo ramo passa fin'al centro de gli occhi, doue montando vn poco in arco, si ricongiunge con quella, con laquale ho detto congiungersi il ramuscello. La quinta fa il medesimo cammino dall'altro lato. La sesta, & settima^m nascono dal principio delle ciglia, & calano diritte per gli lati del naso fin'alle sue cartilagini. L'ottaua attrauersaⁿ il palato, appresso il suo fine, incominciando da gli vltimi mascellari della commessura, che dicemmo spartire la mascella superiore dall'osso cuneale; & cammina in arco verso la parte anteriore, fin che arriua a congiungersi nel mezzo della prima commessura con la nona, che fa l'istessa strada da l'altro lato; & d'amendue si fa vn'arco. Mediante queste commessure proprie, & le comuni, che habbiamo dette, si diuidono l'ossa della mascella superiore, fra se stesse, & dall'ossa del capo, in questa forma. Il primo si diuide dal quarto, mediante la seconda commessura; & dall'osso cuneale, col mezzo d'vna parte di quella, che ritornaua a scendere per l'ossa delle tempie; (che è quella, che si vede dentro del voto dell'occhio) & dall'osso delle tempie, mediante quella, che è simile ad vna^o f, & congiunge i due processi di queste due ossa, che fanno l'osso giogale; dall'osso della fronte, col mezzo di quello, che habbiamo detto entrar nell'occhio per lo canton di fuori, appresso il fine delle ciglia. Il secondo osso si diuide dal quarto, mediante la parte della terza riga, che va dall'angolo di dentro dell'occhio, fin doue getta un ramuscello nel mezzo pur dell'occhio (come dicemmo) mediante ilquale si diuide dal terzo; & dall'osso della fronte, mediante vna parte di quella, che habbiamo detto separar l'osso della fronte dalla mascella superiore. Il terzo si diuide dal quarto, mediante la maggior parte della riga, che segue fin'al centro dell'occhio; dal cuneale, mediante il fine di questa riga; & da quel della fronte, con vna parte dell'istessa riga, con laqual il secondo si diuidea dalla fronte. Il quarto osso si separa da quei del naso dal suo lato, col mezzo della quarta commessura; & dal suo compagno, mediante la parte della riga commune; (che torna dal fondo del naso, fin presso al palato) & dal primo, secondo, & terzo, mediante le sopradette righe; & dall'osso della fronte appresso il lagrimale, col mezzo d'vna assai picciola riga, che piglia dal principio del ciglio, fin presso al lagrimale, la quale è parte di quella, che tante volte habbiamo detto separar la mascella superiore, dall'osso della fronte. Il quarto osso si diuide dal suo compagno, col mezzo del principio della commessura commune; & da quel della fronte, mediante il fine di quella, che lo diuide da tutta la mascella; & dal quarto, mediante la quarta commessura, come dicemmo. Il testo osso si diuide dal suo compagno, col mezzo del fine della commessura commune; dal quarto, mediante la quinta; dall'osso cuneale, col mezzo della parte della commessura, o riga, che scendendo per le tempie, & per gli vltimi mascellari, rimonta in obliquo uerso innanzi.

Queste

La prima delle
commessure, del
la mascella su-
periore.
La seconda.

La terza.
La quarta.

La quinta.
La sesta, & set-
tima.
L'ottaua.

Diuisione dell'
ossa di questa
mascella.

h t. i. p.
i l. iiii. fi. i. y.
fi. vi. d.

k t. i. n.

l t. iiii. fi. i. m

m t. iiii. fi. i. q
n t. iiii. fi. vi.
u u.

o t. iiii. fi. i. a

Queste son tutte l'ossa, & commessure della mascella superiore.

Dell'osso Giogale.

Cap. 5.

IN Ciascuna tempra si fa un ponticello di due ^a processi, che escono, vno dal primo osso della mascella superiore. l'altro dall'osso delle tempie; de quali quello dell'ossa delle tempie è assai piu lungo, ma piu sottile; l'altro è al contrario. Questi processi si congiungono nel mezzo delle tempie, mediante vna riga, o harmonia simile ad vna ^b f; & fanno (come si è detto) vna punticella, laquale i Greci chiamarono Zygomia, i Latini Giogale, che vuol dire giogo; per esser simile al giogo de buoi. Questa punticella, benchè habbia nome d'osso da per se, pur in vero non è. Et fu fatta, perche di sotto lei passasse piu sicuro ^c il musculo delle tempie, che chiude la mascella di sotto, come nel suo luogo diremo. Et perciò fu fatta d'un osso duro, cupo di fuori, & di dentro incauato, perche meno l'incomodasse.

Della Mascella inferiore.

Cap. 6.

CHIAMASI mascella inferiore tutta la barba, i denti, i mascellari, insieme con le ganasse; ^a laqual si fa di due ossa, che si congiungono nella punta della barba. ne bambini, mediante vna riga, o harmonia, piena d'vna cartilagine; come fa l'osso della collottola, ne gli huomini, mediante la congiuntura, chiamata Symphysis od vnione. Di questa riga nascono le tele d'alcuni muscoli, che muouono il labro inferiore. Questa mascella è larga nella punta della barba, (nella qual parte, ne gli huomini, assai piu difficilmente si rope, cosi cruda, come cotta) & di qui si va ristringendo fin' alle pùte delle ganasse, doue si ritorna a far ^b larga, ma piu sottile; & cosi monta verso l'orecchie assottigliandosi sempre piu, fin che finisce in due processi, come corna. De quali quel dinanzi, che è piu largo, ^c si assottiglia in la punta, & finisce sotto l'osso giogale; & in lui s'infersce (come diremo) fortissimamente il musculo delle tempie. L'altro (che è piu tondo, & ha dal capo vna giunta, che ne gli huomini è vnita con la mascella, & perciò non appare) s'incassa in vn angoletto ^d, che si fa fra l'orecchia, & il principio dell'osso giogale; & distendendosi da ambedue i lati, fa vna testicciuola, che aiuta, che questa mascella più facilmente si muoua; la qual sola dimenano tutti gli huomini, & il resto de gli animali, eccetto il Crocodillo, che muoue solamente quella di sopra, & il Pappagallo, che le dimenano ambedue. In questo angolo, o concauità (oltre alla cartilagine, che hanno tutte l'altre congiunture) se ne vede vn'altra, che è fra la testicciuola della mascella, & lei; laquale è liscia, sottile, & tenera, & in certo modo simile ad vna corda, o legatura. Questa cartilagine mai non nasce dell'ossa, se non delle legature, che abbracciano tutto intorno la congiuntura. Et mediante lei si congiungono l'ossa dure, per la maggior parte, si perche piu facilmente si muouano, si perche meno si offendano nel muouerli. Suole tal volta disluogarsi questa mascella, aprendo troppo la bocca; nondimeno facilmente torna al suo luogo; mettendosi il dito pollice sotto la punta dell'orecchia, alquanto innanzi, & premendo forte in dentro, prima da vn lato, dapoi da vn'altro. Ha anchora questa mascella due forami, da ciascun lato; ^e vno, che comincia dalla parte di dentro, vicino i processi gia detti, & risponde nella parte di fuori, al fin del labbro, fra la ^f radice dell'vn dente canino, & il dente mascellaro, che gli è appresso. Questi buchi al principio son maggiori, & men tondi; & per ogn'un di loro entra vn ramo del terzo par de nerui, che, come diremo, va alla radice de denti, accompagnato da vna vena & vna arteria; & esce per lo fine di quello, che si dimostra nella parte di fuori, & è molto minore, diuidendosi in molti ramuscelli, che si spargono per lo labbro da basso. Sol questi buchi ha la mascella inferiore. Perche i luoghi, ne quali s'incassano i denti, non sono veramente buchi. Ha anchora questa mascella nella ^h parte, doue è piu larga, & sottile, & di sotto la punta della barba, certe asprezze; nelle quali i muscoli, che la muouono, piu fortemente si legano.

La mascella inferiore non è d'un osso solo.

Il primo processo di questa mascella.
Il secondo.

Tutti gli animali, & gl'huomini dimenano la mascella inferiore, eccetto il pappagallo, & il crocodillo.

Come s'incassa la mascella.

Due buchi di questa mascella.

Libro Primo

De denti.

Cap. 7.

I denti sentono,
& crescono.

I denti son tren-
ta due.

Tutti nascono
con denti.

Ogni dente ha
vna vena, & vn
nervo, & vna
arteria.

A Nchor che i denti fian diuerfi dall'altre ossa, cosi in sentire, & star scoperti (ciò che non fa niun'altro osso) come anchora, che crescono tutto'l tempo della vita nostra; (come si vede in quelli, che hanno alcun dente meno; perche quello che gli sta-ua in scontro, come non si stregola col suo compagno, non si consuma, & così resta maggior de gli altri, i quali crescono tanto, quanto ogni di si consumano masticando) nondimeno ne perciò si han da lasciare di non mettergli nel numero dell'osso; poi che niun'altro nome piu ragioneuolmente lor si puo dare. Hora sono i denti ^a tutti trenta-
due, sedici per mascella; ogn'vno de quali ha vna giunta, che cade ne fanciulli, fra cin-
que, & noue anni. Et benché volgarmente si dica, che gli mutano non è se non che lor
cade questa giunta. Perche i denti; si come sono parti spermatiche del nostro corpo, non
rinascano, poi che caduti sono. Et se alcun mi dicesse, come son parti spermatiche poi
che non nascono fin passato l'anno? Rispondo, che se ben non si veggono (per star co-
perti dalle gengiue) niuno nasce senza loro. Di questi denti, i quattro dinanzi furo-
no chiamati da Greci Tomis, che vuol dir tagliatori; perche con loro tagliamo ciò, che
mangiamo; & ogn'vn di essi ha vna radice sola. Dopo di loro seguono i canini, vno per
lato; detti canini per esser simili, a quei del cane. Piu a dietro sono i mascellari, cinque
per ogni lato; detti da Latini Molares, perche con loro maciniamo il pasto. Nondime-
no que da basso hanno due radici, & tal volta tre; que di sopra ne hanno tre, & tal vol-
ta quattro, principalmente i due vltimi; & i primi l'hanno piu lunghe, che gli vltimi.
Ma le radici de gli vni, & de gli altri, hanno dal capo (non meno, che quelle de denti di-
nanzi, & de i canini) vn picciolo buco, per lo qual entra vna vena, vn neruo, & vna arte-
ria. Et è da notare circa il numero de mascellari, che vi sono di quelli, che non hanno se
non quattro per lato; alcun'altri ne hanno cinque da vn lato, & quattro da vn'altro, o
cinque di sotto, & quattro di sopra, o al contrario. Queste varietà causano i denti, detti
cordali (che nascono dapoi, che comincia la barba) perche tal volta non nascono (tutti i
lati. Tutti questi denti s'incassano in certe concauità, che sono nelle mascelle, (in ogni
concauità vno) lequali i Latini chiamarono Presepiola, (che vuol dir piccioli presepi)
per esser simiglianti a loro,

a t.v.f.

De buchi del capo, & della mascella superiore. Cap. 8.

I buchi del capo
sono trent'otto.

I buchi dell'osso
della fronte.

I buchi dell'osso
cuneale.

Il terzo, &
quarto.

P Erche trattando de nerui, & vene, & arterie, potrei causare gran difficulta, s'io
non ragionassi de buchi del capo, & della mascella superiore; perciò farà ben fare
vn particolar capitolo di tutti loro, incominciando da que del capo; i quali sono tut-
ti trent'otto, o trentanoue, senza quei dell'ottauo osso, & quei, che non trapassano
l'osso, oue sono. Di questi buchi due ne ha l'osso della fronte; diciasette il cuneale,
& tal volta diciotto; otto que delle tempie; sette quel della collottola; due son commu-
ni all'osso delle tempie, & a quel della collottola; altri due al cuneale, & a quel delle tem-
pie, & a quel della collottola. Quei dell'osso della fronte sono, ogn'vno dal suo lato nel
mezzo delle ciglia, alquanto verso il naso; & rispondono appresso il voto dell'occhio.
Questi buchi ordinariamente son tondi; nondimeno tal volta non se ne vede piu d'vno
di loro; alle volte se ne vede vn tondo, l'altro come mezzo arco. Et per ogn'vn di loro
passa il primo ^b ramuscello del piu sottil principio del terzo paio de nerui della testa. Di
quei dell'osso cuneale, il primo, & secondo sono ^c nelle due ali di sopra, che fanno la ra-
dice, o centro de gli occhi; & per la parte, oue rispondono al voto dell'occhio, son ton-
di; per quella, oue rispondono alle ceruella, fanno ogn'vno vn angolo aguzzo verso il
lato di fuori. ^d Et per loro passano i nerui della vista. ^e Il terzo, & quarto stanno di sot-
to de sopradetti buchi, fra l'ali di sopra di questo osso, & quelle de lati, che paiono ali
di pipistrello; anzi questi buchi non sono altro, che lo spatio, che è tra l'ali fra l'vna, &
l'altra; & son lunghi, & larghi di sotto, & quasi tondi, & si vanno ristrignendo infino al
fine; & amendue insieme rappresentano questa figura. Per la parte piu bassa di questi bu-
chi passano, ^f il secodo par de nerui della testa, & il piu sottil ramo del terzo, & vn buo
ramo

a t.iii. f. i. r.

b lib. vii. t. i.
f. ii. N
t. v. f. i. F

d li. vii. t. i. f.
i. H. f. ii. G
e t. v. f. i. G
f li. vi. t. ii. fig.
xiii. G. lib.
vii. t. i. f. ii. m
g li. v. t. ii. f.
xiii. H

h lib.v.ta.ii.
fi.i.F

i t.v.fi.i.S
k lib.vii.t.i.
fi.ii.d

l t.v.fi.v.Q
m lib.v.t.ii.
fi.xiii.IK

lib.vii.t.i.fi.
ii.MZ

n t.v.fi.i.R
o li.vi.t.i.F

ramo dell'arteria^h del sonno, & parte della flemma, che va a gli occhi; & dapoì al palato, & al naso, per lo primo buco commune della mascella superiore. Per la parte piu alta, & stretta passano alcuni ramuscelli di vene, di quelle, che diremo gire al musculo delle tempie. Il quinto, & sesto stanno piu a basso de sopra detti, verso dietro;ⁱ & vanno piu a dentro dell'osso di loro; ma son piccioli, & tondi; & per lor passa la radice^k piu sottile del quinto paio de nerui delle ceruella. Il settimo, & ottauo^l sono assai piu in dietro, appresso la riga, che monta alle tempie, incominciando da quella, che dicemmo spartir l'osso cuneale da quel della collottola; & sono amēdue ouati; & per loro esce^m il principio piu grosso del terzo paio de nerui del capo. Il nono, & decimo sono alla fin de sopra detti, alquanto in fuori;ⁿ & sono assai minori, & tondi, & per lor entra la vena^o giugulare interiore. Vedesi anchora tal volta vn picciol pertugio (quanto v'entrarebbe dentro vt spilleto) dalla parte di dentro dell'vno di questi buchi; & pochissime volte a quella d'a mendue. L'vndecimo, & duodecimo sono nella parte di fuori di questo osso, al principio delle ali da basso lui; & escono dall'altra parte della medesima ala, che risponde al voto del naso; & son tondi, & tanto piccioli, che tal volta nō può passar per loro vna fetola. Ha anchora questo osso nel suo fondo verso in fuori, tra le due ali da basso, altri cinque pertugietti, da ogni lato due, & vno in mezzo de lati. Entrano i due per mezzo dell'osso, camminando inanzi, & rispondono al voto del naso; gli altri due vanno a rispondere vicino al centro dell'occhio. Di modo che ha questo osso dieci & sette buchi, otto per lato, & vno in mezzo. De buchi dell'ossa delle tempie il primo è quello, che communemente chiamiamo p l'orecchia, ilquale cominciando di fuori si va torcendo come lumacha, fin'al rispondere alle ceruella, dentro del craneo; & è largo di dentro, ma rade volte traluce da vn capo all'altro; si per esser molto intorto, si per esser molto stretto al principio, & al fine. A questo buco, & a tutti gli altri, che ho detto esser in questo osso, corrispondono altri simili, nell'osso delle tempie, dall'altro lato; & per questo buco passa il quinto paio^q de nerui del capo. Il secondo nasce^r di mezzo il primo, & va all'indietro fin'al montare alla parte di fuori di questo medesimo osso. Questo buco è stretto, & ritorto, & fu chiamato da Greci tiphon; & da Latini Cæcum, che vuol dire cieco, perche non appare il suo principio; & per lui passa, vn ramuscello del quinto paio de nerui delle ceruella. Il terzo si^s vede (anchor che con difficoltà) da di fuori del craneo, & cammina in obliquo verso al buco dell'orecchia, fin'al corrispondere dentro di lui; & potrebbe si anche chiamar cieco, come il secondo, se bene è molto maggior di lui, & meno ritorto. Questo buco è quello, per ilquale sentiamo passare vn strepito, dalla bocca all'orecchia, quando tenendola piena d'acqua, od aere procuriamo gettarla via per esse. Passa anchora per lui il secōdo ramuscello del quinto^u paio de nerui del capo, & vn ramuscello dell'arteria^x del sonno. Il quarto è nel mezzo di quella parte di questo osso, simile alla pietra pomice, & va dalla parte di dietro verso quella dinanzi, passando per mezzo del lungo dell'osso, fin che aggiūge alla riga, che separa l'osso cuneale, da quel della collottola appresso l'vndecimo buco dell'osso cuneale, che risponde al voto del naso; & per lui^y passa l'arteria del sonno. Di que dell'osso della collottola il primo è^z ouato, & è il maggior di tutti quei della testa; & per lui habbiam detto passare la midolla dell'osso della schiena. Il secondo, & terzo sono, ogn'vno dal suo lato sopra le due^a testicciuole, che dicemmo hauer questo osso; & cominciando di dietro^b vanno verso innanzi; & son piccioli, & tondi; & per lor passa^c il settimo paio de nerui del capo. Il quarto si vede nella parte di dietro^d dell'vn nodo di questo osso; ilqual cominciando d'appresso, doue s'incassa il detto nodo col primo osso del collo, entra pel mezzo del largo dell'osso alquanto, & cammina verso innanzi, fin che finisce nel piu alto dell'vno di questi sopra detti buchi dal suo lato. A questo buco corrisponde il quinto dall'altro lato; & per ogn'vn di loro passano^e la vena, & arteria, che montano per gli buchi de processi de lati de nodi del collo. Il sesto, & settimo^f si veggono dirimpetto la commesura, che nasce del fine della lambdoide, vn poco auanti che arriue al processo dell'osso delle tempie, simile alle poppe. Anzi per la parte di fuori stāno nel mezzo della commesura detta; & per quella di dentro di questo osso. Per ogn'vn di questi buchi entra vn ramo della vena angulare esteriore. De buchi comuni il primo, & secondo^g sono fra l'ossa delle tempie, & quello della collottola, da ogni lato vno, nel mezzo della commesura, che comincia del fin della

Il quinto, & sesto.

Il settimo, & ottauo.

Il nono, & decimo.

L'vndecimo, & duodecimo.

Altri cinque pertugietti.

I buchi dell'ossa delle tempie.

Il secondo.

Il terzo.

Il quarto.

I buchi dell'osso della collottola.

Il primo.

Il secondo, & terzo.

Il quarto buco.

Il quinto buco.

Il sesto, & settimo.

I buchi comuni.

Libro primo

della lambdoide, tra la parte dell'osso delle tempie simile alla pomice, & le testicciuole dell'osso della collottola. Questi buchi sono mezzanamente grandi, ma non perciò molto tondi, ne uguali; & per loro entra la vena ⁱ giugulare interiore; & si purga vna parte della flemma del capo. Il terzo, & quarto sono comuni all'osso cuneale, & a quel della collottola, & a quel delle tempie; ^k & sono ogn'vno dal suo lato al fin della riga, che nasce del fine della commessura lambdoide; & per lor entra ^l l'arteria del sonno. Hanno anchora l'ossa del capo molt'altri pertugi senza i detti, ^m come son quei, che sono nell'ottauo osso, (che sono molti, & ben piccioli) tra i quali se ne vede vno alquanto maggior degli altri; che è al principio di questo osso, iui doue si congiunge con quel della fronte; per il qual passa vn ramuscello della vena giugulare esteriore; & come son que che si veggono dentro del craneo, a i lati della commessura saggittale, principalmente verso la lambdoide; per li quali entrano alle ceruella alcuni ramuscelli della vena giugulare esteriore; & ne escono alcun'altri dalla dura madre alla pelle della testa; & come son quelli, che si veggono nell'osso della fronte, appresso le ciglia. Nondimeno non son questi propriamente buchi, perche non trapassano l'osso; & perciò non farò mention di loro. La mascella superiore ha tredici buchi, sei propij, & sette comuni. De propij, il primo, & secondo sono nel quarto paio dell'ossa di questa mascella; & cominciano ogn'vno dal suo lato di mezzo della parte piu bassa della conca dell'occhio; & scendono fin'alle gote; & sono quelli, che si ⁿ veggono in loro. Questi buchi al principio son circondati da vna scaglia d'osso sottile; ma al fine sono circondati dal medesimo osso; & per ogn'vn di loro passa il secondo ^o ramuscello del piu sottil principio del terzo paio de nerui, che nascono delle ceruella. Il terzo, & quarto sono nel sesto ^p paio dell'ossa, ogn'vno nel suo; appresso le radici de gli vltimi mascellari, & caminano verso il centro de gli occhi, rispondendo ogn'vno al buco del suo lato, per doue va la flemma al naso. Appresso questi due da ogni lato, vn poco piu a dietro all'ingiu' v'è vn'altro ^q spiraglio picciolo, che il piu delle volte risponde a loro, nondimeno tal volta finisce fra le commessure, che congiungono il quarto di questa mascella col cuneale. Per questi buchi esce vn ramuscello del quarto ^r paio de nerui del capo, & si distribuisce per lo palato. De comuni il primo è appresso il lagrimale dell'occhio, ^s fra il secondo, & quarto osso di questa mascella; & scende fin che risponde al voto del naso; & è alquanto maggiore, che il primo de propij, ma non perciò appare nelle caluarie, per esser alquanto nascosto; & perciò non è marauiglia, se alcuni non han fatto mention di lui. Per questo buco passa il terzo ramo del piu sottil principio ^t del terzo par de nerui delle ceruella; & similmente scende per lui vna parte della flemma al naso, & al palato. Il secondo stà nella medesima forma dell'altro lato. ^u Il terzo stà nel mezzo della prima commessura della mascella, fra i primi denti dinanzi, dentro della bocca, tra il quarto osso, & suo compagno. Questo buco se bene in alcuni huomini si diuide nel principio in due, che subito si raggiungono, nondimeno ordinariamente è vn solo. Il quarto, & quinto sono i maggiori di tutti quei della mascella; & stàno in ciascun'occhio vno, nella parte da basso del voto suo; & son comuni all'osso cuneale, & al primo della medesima mascella; & per lor passa al muscolo delle tempie il primo ramuscello ^x del terzo paio de nerui delle ceruella. Il sesto, & settimo son le finestre del naso, le quali son diuise (come dicemmo) mediante il processo da basso dell'ottauo osso; & seruono oltre le molt'altre cose, principalmete al rifiatare, & al parlare. Sèza i detti buchi ve ne son di molti altri piccioli, per liquali passano alcuni rami di vene, & arterie; come quelli, che sono nel canto di dentro dell'occhio, appresso le commessure comuni al secondo & terzo osso di questa mascella; & come quelli, che si veggono nell'ossa del naso, & nel primo osso della mascella superiore (nella parte di quello, che chiamiamo la gota) nella qual parte se ne vede quando vno, & quando due. Se ne vede anche vn'altro nel quarto osso della medesima mascella, piu in giù del lagrimale. Questi sono i buchi della testa, & della mascella superiore, cosi propij come comuni; i quali sono tutti quaranta noue; & se d'alcuno ci siamo scordati, nel suo luogo il contaremo.

Dell'osso Y oide.

Cap. 9.

TRouasi nella radice della lingua ^a vn'osso, attaccato alla parte piu alta del gargarozzo, chiamato Ypsiloide, ouero Hyoide, per la similitudine grande, che ha con la Y

i lib.vi. t.iii.
fi.i. DE. t.ii.S
k t.iii. fi.vi.f
l lib.vi. t.iii.
L. t.iii. d
m t.v. fi.iii. A

n t.i.n. t.iii.
fi.i. tra'l Q
e'l S
o lib.vij. t.j.
fi.ii. O
p ta. iiii. fig.
vi. II

q t.iii. fi. vi. a
r li. vii. t. i. fi.
ii. Z
s t.iii. fi. i. f

t lib.vii. ta. i.
fi. ii P
u t.iii. fi. vi. n

x lib.vii. fig.
ii. Q

a li.ii. t.v. L

b ta. v. fi. vii. **AB** la u de de Greci, il quale ordinariamente si compone di vndici ofsicelli. **b** Il primo de quali (che facilmente si può toccare con le dita sopra la noce) è il piu largo di tutti, & gobbo per di fuora, nella qual parte ha un grommo; per di dentro è concauo; per di sopra fa un seno lungo & alquanto ouato, secondo che richieggono i muscoli, che diremo inferirsi in lui. **c** A questo ofsicello se ne giungono da ogni lato altri due, che fanno i lati di questo osso; vno piu a basso, che è il piu corto, ma ben piu largo, il cui fine si cògiunge al processo piu alto della prima cartilagine del gargarozzo; l'altro piu alto, che è piu stretto, & lungo; il qual si fa (cosi come il suo compagno dall'altro lato) ordinariamente di tre o quattro ofsicelli, che si congiungono, & legano l'vno all'altro, sin'all'arriuare al processo dell'osso delle tem pie simile ad vn puntaruolo, a cui si legano. Et in alcune donne accade che mancano questi ofsicelli, & in luogo loro si ritroua vna legatura tonda, & forte, che si va ad inserire nel processo detto.

Della Schiena. Cap. 10.

a ta. vi. fi. 1. **L**'OSSO della Schiena è simile ad vn acquedutto fatto di molti canali; per il qual passa la midolla, che esce delle ceruella, & scende fin'al codione; ^a & si compone ordinariamente di trent'ossa, lequali i Greci chiamarono Spondilia, i Latini Vertebrae, noi gli chiamiamo Nodi od ossa della schiena. Ogn'uno di questi nodi è largo dalla parte dinanzi (eccetto che il primo) che si chiama il corpo del nodo, & è quasi tondo; & ha il corpo si nella parte di sopra, come in quella di sotto vna ^b giunta; & tra la giunta dell'vno, & quella dell'altro vi è vna legatura di natura di cartilagine; & per lo corpo si veggono seminati alcuni pertugiotti, senza ordine alcuno; tra quali niuno se ne vede maggior di quello, che è nella parte di dentro del corpo, che risponde alla midolla spinale; il quale è mezzanamente grande secondo la grandezza dell'osso, & finisce in molti piccioli spirargli. Nondimeno cosi per questo, come per lo resto entrano alcuni ramuscelli di vene, & arterie, che nutriscono, & viuificano queste ossa. Nell'altre parti ha ogni nodo tutto intorno molti processi, come spine; per laqual cosa furono tutti chiamati Schiena. ^c Di questi processi, alcuni vanno in su, alcuni in giù, altri da i canti, & altri a dietro. Fra ogn'uno di que di dietro (di quei, che hano la giunta, che sono molti) & quel, che segue all'ingiu, v'è vna cartilagine, accioche l'ossa nō si facciano male, nel muouerfi. Hanno medesimamente tutti questi nodi, fra l'vno & l'altro vn buco ^d da ogni lato (per doue esce vn neruo, & entrano vna vena, & vna arteria, come al suo luogo diremo) che si fa, scauando ogni nodo vn poco, benchè non vguilmente; perche ne nodi del collo, quanto piu si scende, tanto quel di sopra è piu scauato, che quel di sotto; in quelli de lombi è al contrario, & nelle spalle vguilmente. Tutti questi nodi fin'all'osso grande (eccetto i due primi, de quali l'uno non ha corpo, & l'altro non ha giunta nella parte di sopra) si legano dalla parte dinanzi l'vn corpo dell'vn nodo, con quel dell'altro, non col mezzo delle due tele, o camiscie, che coprono la midolla spinale, se non mediante le legature, che nascono fra ogni corpo, & la sua giunta, cosi nella parte di sotto, come in quella di sopra; & mediante ^e la legatura di natura di cartilagine, che è fra l'un corpo, & l'altro. Dalla parte di dietro si giungono i processi di sotto del nodo superiore, co processi di sopra di quel, che segue, mediante la congiuntura, chiamata Artrodia, specie della Diartrosi. I nodi si legano medianti certe corde, che nascono di loro tanto strettamente, che possono facilmente muouerfi tutti, senza correr pericolo di disluogarsi. Ma è da notare, che se tal volta si disluogano, (come accade) corre maggior pericolo, se si disluoga vn solo, che molti insieme, pche in questo modo si offende meno la midolla spinale. Questi nodi son forati come si è detto, ma non vguilmente, perche si va restringendo il buco, vn poco dal principio al fine; di modo, che se ben non son differenti nell'esser forati, sono però nella grandezza de buchi. Et si come il nodo superiore ha maggior buco, che l'inferiore, cosi l'inferiore è piu grosso, che il superiore; accioche pesi meno il superiore, & resista meglio al peso l'inferiore. Si diuide tutta la Schiena in quattro parti, in Collo & Spalle, Lombi & Osso grande.

Quanti nodi ha la Schiena.

I processi de' nodi della schiena.

Il buco, pel quale escono i nerui.

La forma, nella quale si cògiungono i nodi della schiena.

Discaffatura della schiena.

Diuisione della schiena.

Libro Primo

De Nodi del collo.

Cap. I I.

Il collo ha sette nodi.

I processi di dietro. Differenza fra il primo osso, e il resto.

Due seni del primo nodo.

L'asprezza del primo osso.

Il secondo nodo del collo.

Il processo di questo nodo.

La legatura, che abbraccia il corpo di questo nodo.

COLLO si chiama dal fin della collottola, fin'a gli homeri; ^a & ha sette ossa, o nodi, de quali i due primi si congiungono da ogni partel'vno all'altro, medianti certe legature, che nascono dell'osso della collottola, & gli circondano per di fuora; il resto s'attacano sol per la parte dinanzi, che chiamiamo il corpo del nodo, nella forma detta nel capitolo passato. Et tutti essi hanno i processi di dietro bifurcati, ^b eccetto il primo, il quale è piu duro, & massiccio, & ha piu largo buco, che niuno de gli altri, ma è piu sottil di loro, & assai differente in figura. Perche oltre a l'hauere il buco molto maggiore, che il resto, ha il corpo anchora incauato di dietro; & in quello si fa vn seno, circondato da vna cartilagine, ^c nel qual entra vn processo, come dente, che diremo hauere il secondo ^d nodo; & in luogo del corpo, che gli manca, ha vn nodetto verso innanzi. Ha anchora questo osso, da amendue i lati del buco della midolla, (nelle quai parti è piu forte, che in niun'altra) vn ^e seno ouato, rileuato alquanto di fuori; & incauato di dentro in tal modo, che congiungendoli amendue, si farebbe vn perfetto seno. In questi due seni s'incafsano le due testicciuole ^f dell'osso della collottola chiamate da Greci (assai impropriamente) Coronides, che vuol dir processi aguzzi; & sopra loro si muoue la testa, quando l'alziamo, o abbassiamo. Ad ogni lato di questi seni di questo nodo, si vede vn processo & assai piu largo, che niuno de gli altri processi de lati dell'osso del collo; & in loro s'inseriscono il quinto, & sesto paio ^h de muscoli, che muouono la testa. Questi processi non son diuisi, come il resto de nodi piu bassi, per cagione de grommi, che si fanno in loro; ma ben son forati, come tutti gli altri piu bassi; & i buchi rispondono al secondo, & terzo buco dell'osso della collottola. Mancogli a questo nodo il processo di dietro, perche non facesse male ad alcuni muscoli, che passano sopra lui; ma in suo luogo ha i vna asprezza lunga, alquanto rileuata, di cui nasce il quarto paio de muscoli di quei, che muouono il capo. Ha parimente questo nodo di sotto a i sopra detti seni, altri due simili nella parte piu bassa, benchè alquanto minori, & disuguali, & molto meno incauati, che que di sopra, chiamati da Greci Glenes, che vuol dir occhi, p assimigliar al seno, che fa l'occhio. In questi seni s'incafsano due grommocchi, che sono ne processi de lati del secondo nodo mediante vna cartilagine, che sopplisce la loro disugualità. Et sopra questi seni si muoue la testa da lati, come quando diciam di no. Questi grommocchi, o tubercoli, son cagione, che i buchi, che si fanno ne processi di questo secondo nodo, siano alquanto intrauerati, & non diritti, come quelli de processi de lati del primo, & di tutto il resto. Nel mezzo di questi grommi, che si fanno nella parte di sopra di questo secondo nodo, nasce del corpo suo vn ^k processo grande, alto, massiccio, & molto duro, alquanto piu basso & liscio dauanti, che di dietro, ilqual per esser simile ad vn dente, principalmente al canino d'un huomo, fu chiamato Dente, o Dentale. Questo processo entra nel seno, che ho detto farsi nel corpo del primo nodo, ilqual seno è circondato da vna cartilagine, & abbraccia la parte dinanzi di questo dente, che è piu bassa, & sdrusciolosà; la parte di dietro è piu larga, & fa come vna testicciuola da lati; di sotto della quale ha da ogni lato vn picciol seno, & nella parte di dietro vn'altro. Que de lati, insieme co i seni del primo nodo, che lor rispondono, fanno da ogni lato vn buco, per donde passano certi nerui, che tal volta vanno a i muscoli, che piegano il collo. Il seno di dietro fu fatto, perche la legatura, che passa da vn lato a l'altro del nodo, piu sicuramente si legasse, & stesse piu forte. Al che parimente aiuta, che il primo nodo ha nelle parti, doue ella nasce, vn'asprezza, & vn picciol buco, che non entra piu a dentro per l'osso. La parte piu alta di questo processo è aguzza, come vn pignuolo, & monta vn poco piu su del primo nodo; & del suo mezzo nasce vna legatura tonda ^l & forte, che l'lega all'osso della collottola. Di modo che il primo nodo si congiunge col secondo, medianti due larghi grommi del secondo, & altri due seni, che sono nel primo, & vn seno, che è nel medesimo primo, nel quale entra il dente del secondo. E anche il secondo nodo nell'ultima parte de tubercoli alquanto scauato, ne piu ne meno, che l'primo. E tra amendue si fa vn buco, per ilqual passa il secondo paio de nerui della schiena; benchè molto più (scauato il primo nodo che l'secondo. Tutto'l resto, che si ha da dire del secondo nodo) parimente commune a gli altri cinque. Perche ha il

a t. v. fi. v.

b t. v. fig. vi. AB

c t. v. fi. vi. a
d t. v. fi. vi. D

e t. v. fi. vi. CC
f ta. iiii. fig. vi. l. l.

g t. v. fi. vi. B
h li. ii. t. xliii. HI

i t. v. fi. vi. F

k t. v. fi. vi. D
li. ii. f. xv. fi. xxvii. H

l li. ii. ta. xv. fi. xxvii. I

m t.v.fi.vi.B
n la med. G

ha il processo di ^m dietro diuiso, come il resto; ne quali tutti, questi processi finiscono in due punte, principalmente quei de cinque primi, perche quel del settimo quasi ⁿ niente diuide. Nondimeno essi tutti hanno dal capo vna giunta, principalmente il settimo, che l'ha assai piu lunga, che niuno de gli altri; per laqual cosa e alquanto simile à i processi di dietro de nodi delle spalle, benchè quei delle spalle sono vn poco piu aguzzi. Et così questi, come quelli, sono di sotto incauati, di sopra rileuati, per cagion d'vna riga rileuata, che hanno nel mezzo della parte di sopra, laqual risponde ad vn'altra riga incauata, che e della medesima forma nella parte di sotto. Di sorte, che i processi paiono triangolari. Et della riga di sopra dell'vno nasce vna legatura, che s'interisce nella riga di sotto del processo del nodo piu alto; mediante laquale questi processi si legano, separando (come diremo) i muscoli del lato destro, da quei del lato manco. I processi de lati de quattro nodi, che seguono dietro al secondo, sono piu larghi, che gli altri; & ognun di loro ha due punte, ne piu ne meno, che i processi di dietro. Benchè non sono tanto aspri, ne disuguali, come quelli; & la punta dinanzi in questi e piu larga, che quella di dietro; & monta piu in sù, principalmente nel sesto, nel qual la punta di dentro di questo processo e notabilmente piu larga. Ma nel settimo quasi non si dimostrano le due punte; perche e vn processo largo, & i muscoli, che nascono di lui, non s'attacano iui tanto forte, come que che nascono de piu alti. Ne anche si muoue tanto forte questo nodo, come gli altri del collo.

Le giunte de processi di dietro.

I processi de lati de quattro ultimi.

o la med. B

La cagione di questa diuisione, così in questi processi de lati, come in quelli di dietro, e perche meglio si potessero inserire i muscoli, che nascono della patte di dietro del collo. Et per questa medesima cagione il ^o processo di dietro del secondo nodo e piu largo & lungo, che quei, che seguono; perche nascono di lui il secondo, terzo, & quarto paio de muscoli, che muouono il capo. I processi di sopra, & quei di sotto, in tutti questi nodi son simili, dal secondo in giù, & anche il secondo ha i processi, che calano come gli altri, cioe che fanno vn molto picciol, & alquanto tondo seno, ilqual scende d'alto a basso, p & dinanzi a dietro; & que di sopra hanno vn tubercolo, o grommo tondo, così poco rileuato, che con difficoltà si conosce, se e seno o tubercolo. Questo tubercolo s'incassa nel seno de processi di sotto del nodo di sopra; & e coperto d'vna cartilagine, ne piu ne meno, che'l seno. Et incomincia parimente dalla parte dinanzi storcendosi alquanto, & cammina verso quella di dietro. Questa torcitura e maggiore, quanto i nodi vāno piu a basso verso le spalle. Di modo che'l secondo nodo si congiunge al terzo, medianti le due

La cagione delle diuisione, de processi di dietro, & di que de lati.

I processi di sotto, & di sopra.

p t.v.fi.vi.H

congiunture; così anchora il terzo, al quarto; & tutto il resto. Restaci a dire de corpi q di questi nodi, & del modo, nel quale si congiungono. Hor e da sapere, che tutti essi, eccetto il primo (che non l'hà) hanno il corpo ouato, & tanto pieno, quanto piu vanno a basso. Et si congiungono l'vno a l'altro, non come que delle spalle, o de lombi, che son piani: anzi la parte di sopra del corpo di quest'ossa e concaua nel mezzo, & ouata secondo la figura del corpo: quella di sotto e ouata, & l'ouato monta tanto in sù, che empie il seno del nodo nel qual s'incassa. Il che fu fatto, perche piu facilmente potessimo muouer il collo. Questa congiuntura si vede chiaramente nel secondo, & terzo nodo, & in alcuni de piu in giù. Perche nel settimo, che s'incassa col primo delle spalle, già quasi non appare. Il che fu fatto, perche non era dibisogno che si mouesse tanto, come il resto. Et e da notare, che i quattro nodi del collo, che sono fra'l secondo, & settimo, oltre a i sette processi, comuni ad ogni nodo della schiena, ne hanno di piu ^s altri cinque. De quali il primo, & secondo sono nella parte di sopra del corpo d'ognuno di questi nodi. Il terzo, & quarto sono, ognuno dal suo lato: perche, come si e detto, i processi de lati sono diuisi, il quinto e vn ramo del processo di dietro, ilquale e parimente diuiso.

I corpi de i nodi del Collo.

f la med. kk

g la med. LL

Cinque processi straordinarij di questi nodi.

De Nodi delle Spalle.

Cap. 12.

u t.vi.fi.i.LL

A Nodi del Collo, si congiungono que delle Spalle, che sono ordinariamente a dodici. Non ostante, che tal volta, come per miracolo, accada macarne, od auāzarne vno; & piu di rado manca, che auanzi. Di quest'ossa, quelle di sopra son minori: quelle di sotto son maggiori, per la ragione detta. Et i corpi loro ne primi non son molto tondi, anzi sono ouati, come in que del collo, ne gli vltimi son del tutto tondi, & tanto piu spugnosi, che quei di sopra, quanto son piu grossi: & quāto son piu grossi, tanto piu son

I nodi delle spalle son dodici.

Differenza tra questi nodi.

C sparsi

Libro primo

sparsi per loro que pertugiatti, che nō trapassano; che dicemmo esser posti senza ordine alcuno. Hāno anchora tutte queste ossa, da amēdue i lati vn fasso, nel qual s'inferiscono i capi delle coste, tanto coperto d'vna cartilagine, che quasi nō si vede. Questo fasso, dal primo nodo infī al nono si fa tra'l corpo dell'vn nodo, & quel dell'altro, vicino a i buchi p doue escono i nerui, bēche la sua maggior parte si vede nel nodo piu basso; & nel decimo, vndecimo, & duodecimo s'imprime tutto nel corpo. Nōdimeno nel primo, & duodecimo nodo, (oltre à i seni, che si veggono nella parte piu alta de lati del corpo loro) se ne ritrouano parimente altri due nella parte piu bassa de medesimi lati, piu profondi, & aspri, che quei di sopra, (benchē quel del duodecimo non è così profondo, come quel del primo) & pieni di certi spiragli; de quali nascono alcuni legami, che aiutano a legar qste due coste co nodi, a quali si cōgiugono. Tutti questi nodi delle spalle hanno i suoi sette processi ordinarij; cioè, due alti, due bassi, due da lati, & vn di dietro. Quelli di dietro fin al nono ^b son tutti grandi, & quasi vguali, & triangolari; & vanno all'ingiu al quanto in fuori, faccendosi sempre piu stretti, fin che finiscono in vna pūta, come di triāgolo, sopra il medesimo processo del nodo piu basso; & tutti si legano l'vno all'altro mediante vna legatura, che nasce della riga rileuata, che dicemmo farsi nel mezzo della parte di sopra, del processo piu basso, secondo il lungo suo. Il decimo nodo non ha questo processo, che esca tanto in fuori, ne così triāgolare; anzi i due lati di fuori son molto larghi, & quel di sotto stretto, aspro, & disuguale; & nō finisce in punta, come gli altri di sopra, ma faccendosi alquanto largo. Il processo dell'vndecimo nodo esce assai manco in fuori, & è assai piu largo in punta; & molto piu quel del duodecimo, che gia comincia a dimostrarfi a quelli de nodi de lombi. Si come son differenti questi processi in figura, così sono nel scendere. Perche quelli de noue piu alti vanno all'ingiu (come habbiamo detto) alquanto in fuori; quelli de tre vltimi scendono tanto oscuramente, che quasi non si fanno vedere. I processi de lati ne ^c noue primi son quasi vguali; nel decimo cominciano gia chiaramente à farsi minori, & di mano in mano piu, fin' al duodecimo. La cagione di questa differēza è l'incassarsi le noue prime coste in vn seno, coperto d'vna cartilagine, che si vede ^d nelle punte di questi processi alquanto in dentro; quel, che nō fanno le tre piu basse; & perciò non fu dibisogno, che i processi fussero tanto grandi; ne che hauessero i seni, che hāno i piu alti; bēche nel decimo si veda tal volta, come vn segno d'incassatura. Questi seni, quantunque siano tutti situati nella parte dināzi di questi processi, nondimeno alcuni ne stāno piu alti, alcuni piu bassi, & altri in mezzo. Perche ne processi del primo nodo stan piu bassi; in quei del nono piu alto, in quei del sesto in mezzo. Ma i processi tutti ne gli huomini piu spesso vāno in sù, che in giù, & spūtano alquāto in fuori. E bē vero, che l'esser questi processi rileuati di sopra, & incauati di sotto, & hauere vna testiciuola al fine, gli fa parere, che scēdano, ma cō tutto questo ne tre vltimi manifestamente montano. Questo è quel, che tocca i processi de lati. Restaci da dire di quei ^e di sotto, & di sopra; liquali son quattro, due di sotto, & due di sopra; mediati i quali dicemmo incassarsi tutti i nodi della schiena (eccetto il primo in questa forma) O entrando il processo di sopra del nodo inferiore, di sotto a i processi piu bassi del nodo piu alto; come fāno tutti i nodi della schiena, dal secōdo del collo, fin all'vndecimo delle spalle; O al contrario, entrādo i processi di sotto del nodo piu alto, di sotto à i piu alti di quel, che segue; come fāno tutti gli altri, dal primo nodo de lombi in giù. Di modo, che tutte l'ossa della schiena, dall'vna parte riceuono le punte di questi processi del nodo vicino, dall'altra son riceute le sue. Eccetto che il primo del collo, ilqual riceue da amēdue le parti ne seni, che dicemmo hauere; & il duodecimo delle spalle, che incassa tutti i suoi quattro processi in quelli de nodi vicini, i piu alti in quelli di sotto dell'vndecimo delle spalle, i piu bassi nel primo de lombi. Et perciò tutti essi processi, in questo nodo sono alquāto rileuati nella parte di fuori; & quegli, che riceuono l'incauati, in quella di dentro. Il che si ha da intendere; ne piu, ne meno, ne gli altri processi, alti, & bassi; perche quelli, che s'incassano, fanno vn grōmo; o tubercolletto; & quelli, ne quali s'incassano, vn fossetto; benchē in alcuni difficilmente si conosce & l'vno, & l'altro.

Sette processi di questi nodi.

I processi de lati.

Vn seno di questi processi.

I processi di sotto, & di sopra. Come s'incassano i processi di sopra, con quei di sotto.

Come s'incassano il primo nodo del Collo, & il duodecimo delle spalle.

b le med. PP

c la med. M.

d la med. S

e la med. N.

De

De Nodi de Lombi.

Cap. 13.

a t.j.ij.ij.tra
la L & la
M.t.vj.fj.j.
L L.

b t.j.ij.ij. q

c ta.ij.ij. r

d t.ij. s

e t.ij. t

I NODI de Lombi son ^a cinque, piu grossi, che i sopradetti, & tanto meno pertu-
giati, quanto la Midolla Spinale, che passa per loro, è piu sottile. Et hanno semmi-
nati pel corpo certi pertugi, tanto maggiori, che quelli de corpi de nodi delle spalle, &
del collo, quanto questi corpi son piu grossi, & hebbero bisogno di riceuere piu nutri-
mento. Et il buco, che detto habbiamo farsi fra l'vn'osso, & l'altro, di doue escono i ner-
ui, s'imprime tutto nel nodo piu alto; & quel di sotto fa solamente il suo fondo. Tutti
questi nodi hanno i medesimi sette processi, che gli altri; de quali, quelli de ^b lati son al-
fai piu sottili, & lunghi, che quelli de nodi delle spalle; & pare, che volessero seruir per
coste; se ben son piu corti quelli del primo, & vltimo nodo, che quelli de gli altri. Et
niun di loro monta manifestamente in su, eccetto quelli dell'vltimo, che furono forzati
a farlo, per fuggir l'ossa de galloni, che lor erano molto appresso. I processi di ^c dietro
di quest'ossa son forti, grossi, & corti; & guardandoli da lati son larghi & sottili; guar-
dandoli pel longo, d'alto a basso, stretti, & aguzzi in cima; & finiscono in vna riga al-
quanto aspra. Per la parte di sotto son larghi; & hanno due picciole impressioni, nel
mezzo delle quali si fa vna picciola collina, di cui nasce (come diremo) la legatura, che
s'inferisce nella riga, che si fa nella parte di sopra del medesimo processo, del nodo vici-
no verso in giù. Et la giunta, che hanno questi processi di dietro, è piu sorda, che quella
de medesimi processi de nodi delle spalle. I processi ^d di sopra, per la parte, oue si mira-
no l'vn l'altro, hanno vna lunga, & cupa impressione. Que di sotto ^e scendono manife-
stamente, & finiscono faccendo nella parte di fuori, alquanto verso innanzi, vn grom-
moncello alquanto largo, che s'inferisce ne processi piu alti del nodo, che segue all'in-
giu, come habbiamo detto. Oltre a questi processi, hanno parimente alcuni di questi no-
di, in alcuni huomini, altri due piccioli processi, che scendono all'ingiu, & si veggono
appresso i buchi de nerui. I quali si trouano tanto poche volte ne gli huomini, & cosi
ordinariamente nelle simie, che marauiglia non debbe essere, che Galeno facesse tanto
conto di loro, & che il Vesalio non mai gli vedesse.

Quanti sono
nodi de lombi.

I processi de no-
di de lombi.
Quelli de lati.

Quelli di die-
tro.

I processi di so-
pra.
Quelli di sotto.

Dell'Osso Grande.

Cap. 14.

a t.j.ij.ij.M.
t.vj.fj.ij.L.

b t.vj.fj.ij.dd

c t.vj.fj.j.LL
MR.

d t.vj.fj.ij.N.
NPQ.

F V Quest'osso chiamato da gli Antiqui Sacro, ò Grande, ^a per esser il maggiore, &
de maggiori processi, di quanti ne siano nella schiena. Il chiamarono anchora
alcuni de Latini Sacro, perche pensauano, che s'aprisse nel parto, & si riserrasse poi. Il
che esser non può naturalmente, senza morir la creatura; perche è tanto gagliardo l'os-
so, & cosi tenera la creatura, che si distruggerebbe tutta al tempo dell'uscire. Quest'osso
è gobbo di dietro, & concauo dinanzi; & ha ordinariamente sei nodi, & tal volta cin-
que, talmente ben congiunti, che ne gli huomini di età (per la parte di dentro) con dif-
ficultà si vede vn picciol segno di congiuntura. Per quella di fuori, in niuna guisa si co-
nosce, eccetto fra l'primo, & il secondo, che tal volta si vede; perche si congiungono
molte volte, ne piu, ne meno, che i nodi de lombi. Ma ne fanciulli si veggono chiara-
mente le congiunture di tutti sei, cosi nella parte di dietro, come in quella dinanzi. I no-
di di quest'osso son situati al contrario de gli altri della schiena; perche ne gli altri era-
no maggiori que di sotto; & in questi son maggiori que di sopra. Di sorte che tutto l'os-
so rappresenta la figura d'vna Cocolla di scapulario da frate. Il primo de nodi di questo
osso è tanto simile a quelli de lombi, che se non fusse pel gran processo, che ha da i lati,
con difficultà si distinguerebbe da loro. Et cosi questo, come gli altri nodi di quest'osso,
hanno i ^b processi di dietro simili a quelli de nodi de lombi; benché assai piu sono pic-
cioli, quanto piu vanno all'ingiu. Il sesto, & vltimo non hanno processo, se non vn tu-
bercolo ò grommo tondo, & largo, mediante il quale si congiunge al primo nodo del
codione, come fanno i corpi de nodi fra se stessi, ò come si congiungono i nodi della co-
da in qual si voglia animale. I processi ^c de lati son piu lunghi, & larghi; & son tutti at-
taccati l'vno all'altro, in tal modo, che paiono tutt'vno; & si fanno piu corti, come piu
son bassi. Et ha ogn'vn di loro dal capo, alquanto verso dietro vn ^d seno, nel qual
C 2 s'incassa

Perche è così
chiamato l'Os-
so Grande.

Quanti nodi ha
quest'osso.

I processi di die-
tro di quest'os-
so.

I processi de la-
ti.

Libro Primo

s'incassa da ogni lato l'osso de galloni. Questo seno è aspro, & disuguale, & ha nel mezzo vna riga alquanto rileuata, come vn grōmo o e tubercolo o spina, che'l diuide in due; de quali quel dinanzi è meno fondo, che quel di dietro, & ha nel mezzo attrauerato vn processo, che'l diuide in altri due seni, vn'alto, & vn'altro basso. A questi seni risponde giustamente la figura de lati dell'ossa de galloni, & s'incassano in loro, mediante vna legatura, come cartilagine. Ma i seni piu chiaramente si veggono ne tre nodi primi, per esser piu grossi, che ne gli altri, che son piu stretti; non ostante, che tal volta son larghi, & attaccati. Et di lor nasce il quarto muscolo di quelli, che muouono la coscia. Vedeli oltre di ciò, nel processo del lato del quinto osso, iui doue si congiunge col processo del sesto, vn tubercolo alquanto rileuato, & grosso, a cui diremo legarsi due corde o legature. Ha medesimamente quest'osso, tra nodo, & nodo, da ogni lato vn buco, come quel, che hanno tutti gli altri nodi, per doue escono i nerui. Questi buchi sono ordinariamente cinque, & tal volta quattro, secōdo il numero de nodi. Et si dimostrano, cosi per la parte di dietro dell'osso, come per quella dinanzi, per esserui attaccati i processi. Ma i buchi di dietro son molto minori, che que dinanzi; & per ogn'vn di loro diremo vscire vn neruo. Senza questi buchi se ne veggono parimente de gli altri fra i processi di dietro; i quali ne fanciulli son pieni di certe legature neruose, (ne piu, ne meno, che dicemmo esser gli spatij, o buchi che si fanno fra i processi di dietro de nodi delle spalle, & de lombi) & ne gli huomini non appaiono, per esser gia le legature conuertite in osso.

I buchi dell'osso grande.

Altri spiragli di quest'osso.

e t.vi. fig. ij. OO.

f la med. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

g la med. e f g h i k.

Della Coda, o Codione.

Cap. 15.

Di quanti ossi fu il codione.

L'OSSO, che comunalmente chiamiamo il Codione è simile alla coda de gli altri animali; eccetto, che ne gli huomini non appare. Et si fa ordinariamente di quattro nodi, & tal volta di tre. Il primo di loro ha nella parte di sopra vn fossetto, o seno, nel qual s'incassa sempre l'ultimo nodo dell'osso grande, mediante vna sola legatura, come cartilagine, simile a quella, cō la quale si legano gli altri nodi della schiena. Nel medesimo modo si congiunge il secondo al primo, & il terzo al secondo. Ma quando l'osso grande non ha piu di cinque nodi, il primo di quei del codione ha parimente da i lati certi piccioli processi aguzzi, liquali vanno all'in su, & s'incassano fortemente, con quel del quinto nodo dell'osso grande; & fanno nel mezzo vn buco, pel quale esce sicuramente il sesto par de nerui, che nascono dell'osso grande. Nel resto tutti questi nodi son piu larghi di sopra, che di sotto; & quel di sopra è sempre maggior, che quel, che segue; tanto che vengono a finire in vna punta alquanto ritorta in dietro, quasi come becco di Pappagallo. Et tutti insieme fanno la figura d'vna coda; laquale insieme con l'osso grande fa vna figura simile alla Cocolla del scapulario de frati Scapuccini nouitij. Questi quattro nodi, ne hanno buco alcuno, ne manco son voti dentro, ne anche hanno midolla, ma son spugnosi, & rossi; come diremo anchora essere que del petto. Et ne fanciulli paiono piu tosto cartilagini che ossa; anzi l'ultimo piu tosto è di cartilagine che d'osso; ilche fu fatto, perche non facesse male all'intestino retto, che gli stà appresso.

a ta. j. ij. iij. N t. vj. fi. ij. G

b t. vj. fi. ij. e

Dell'Osso del Petto.

Cap. 16.

PETTO chiamano gli Anatomisti tutto quel voto, che è abbracciato con le coste, che fa vna figura ouata. Chiamiamo anche noi altri petto, sol quella parte dinanzi, che è dalle clauicole, fin' alla bocca dello stomaco. Nel mezzo di questo petto dinanzi è vn osso largo, che piglia dalla fontanella della gola, fra le due clauicole, fin' alla forcella del stomaco, e ilquale chiamiamo comunalmente l'Osso del petto. Ha parimente il petto ventiquattro coste, da ogni lato dodici, & alcune volte (ma bẽ rade, ilche ho io veduto solo in vna donna, in Pisa, l'anno del 1544, faccẽdo l'Anatomia Realdo Colombo) sono da vn lato tredici; & molto meno accade ritrouarsene da vn lato vndici. Di queste coste le sette piu alte sono intere, & si congiungono all'osso del petto, l'altre sono mezze, & non vi artiuano; per la qual cosa furono chiamate da Latini Mendose o Spurie, che vuol dir Bastarde, & illegitime. Ma cosi queste, come l'intere, son fatte parte d'osso, parte di cartilagine. La parte della banda di dietro è osso. Quella della

Le coste tutte son ventiquattro.

Le coste intere son sette.

a ta. j. ij. iij.

b ta. j. ij. o

c t. j. ij. p

d t. j. ij. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

banda

banda dinanzi è cartilagine. Et mediantî queste cartilagini si congiungono l'intere all'osso del petto; & le bastarde tagliano all'obliquo in sù, attaccandosi ogn'vna di loro a quella di sopra, che gliè piu vicina, & alla diaframa, mediante l'istessa diaframa; eccetto l'ultima, la quale in guisa niuna si cōgiunge con l'vndecima; & l'vndecima, che anche molte volte lascia di cōgiungersi alla decima. Et tutte quate per la parte di dētro del voto del petto, son liscie, & hāno nella parte di sotto vn canaletto, come incastro per tutto il lungo d'ogn'vna; il quale piu chiaramente appare, da doue si congiungono con l'ossa delle spalle, fin alla metà, che da indi innāzi; & piu in quelle, che sono fra la terza, & la nona, che nell'altre. Perche essendo fatta tale incauatura, perche piu sicuramente passassero per lei i rami della vena, che nutrice le coste, insieme con vn neruo, & vna arteria, i tre rami di sopra, che son piu sottili, nō hebbero di bisogno di cosi grande incastro; & i tre di sotto, anchor che sian grossi, pur perche le coste son sottili, & curue di dētro, ne anche n'hebbero di bisogno. Et è da notare, che la parte dell'osso d'ognuna di queste coste non è dell'istessa sustāza; perche con piu s'auicina alla cartilagine, tanto piu è l'osso tenero. Ne sono anchora tutte d'vna medesima lunghezza; perche essendo il petto ouato, quelle di sopra, & di sotto son minori, & quelle di mezzo maggiori. Ne si somigliano anchora in larghezza; perche la superiore sempre è piu larga, che quella, che segue appresso; principalmete la prima, che è molto piu larga, che niuna delle altre. Ma l'vne, & l'altre son fatte d'vn sottil osso, come tela o scaglia, che le cuopre tutte dalla banda di fuori, & da quella di dētro son spugnose. Ne piu, ne meno, che habbiamo detto esser differēti le coste, sono anche le lor cartilagini; perche le cartilagini delle medese sono assai piu tenere (dal che chiamarono alcuni queste coste Chōdron, che vuol dir Cartilagine); quelle dell'intere sono assai piu dure, principalmente ne vecchi, ne quali diuidendole paiono d'osso, come quelle che si veggono in alcuni Buoi, & Castrati vecchi. Son parimēte differēti le cartilagini, nel largo & lungo, secondo che sono le coste, anchorche quelle della sesta, settima, & ottaua, sempre si vadano perdēdo, cō piu s'appressano all'osso del petto; et cōgiungēdosi cō la cartilagine di sopra, finiscono cosi elleno, come l'altre fin all'ultima, in vna pūta aguzza, al cōtrario delle ntere. La prima delle quali è assai piu larga al fine, che quādo si partì dalla costa; l'altre fin alla sesta (come s'appartano dalle coste) si vanno ristrignendo fin all'arriuare all'osso del petto; & iui fanno vna testicciuola, mediante la quale si congiungono a lui, come dappoi diremo. Ma cosi le coste, come le cartilagini dalla banda di fuori son curue, & liscie; benchè non vgualmete da ogni parte; perche doue si cōgiungono con la schiena, oltre a l'hauerui vn grommoncello, sono anchora alquāto aspre, perche meglio si potessero intaccare le legature, che le congiungono co corpi, & processi, de lati de nodi delle spalle. Et hanno parimēte, ogn'vna di loro, vn poco piu innanzi di doue si cōgiungono co processi de lati, vn picciolo tubercolo o grommo, a cui si legano in parte le corde dell'vndecimo musculo, che moue la schiena; & vn poco piu innāzi certe asprezze, & disugualità come grommi, ne quali si lega il quarto musculo di quei, che muouono il petto; & nascono quelli, che empiono lo spatio tra le coste, per la parte di fuori, come in suo luogo diremo. Si veggono similmente alcune asprezze picciole nella parte di dētro, doue nascono, & finiscono i muscoli, che empiono la parte di dentro del medesimo voto, & la prima costa nella parte di fuori, senza l'asprezze dette, ne ha d'altre assai maggiori, delle quali nasce il quarto musculo, che muoue la schiena. Et è da notare che le coste tutte nel separarsi da nodi della schiena scendono in obliquo verso dietro; da indi vanno di sotto delle ascelle scendēdo sempre in obliquo verso la parte dinanzi, fin che cominciano le cartilagini. Le quali montano in arco all'in sù, in guisa che ogni cartilagine fa vn cantoncello, o come di triangolo sodo, con la costa, di cui nasce: eccetto la duodecima, che alcune volte non monta niente in sù. Et è da notare, che di tutte queste coste, le prime noue s'incassano co i nodi delle spalle, in due luoghi: le due vltime in vn solo: la decima si congiunge ordinariamente in vna parte, & tal volta in due. Quelle, che si congiungono in due parti, hanno anchora due testicciuole, vna maggiore, che s'incassa nel corpo del nodo, l'altra minore, che s'incassa nelle pūte de processi de lati dell'istesso nodo, in que seni, che dicemmo hauer questi processi. Et di queste due testicciuole la maggiore è tanto piu alta che la minore, quanto è piu alto il seno del corpo del nodo, che quel del processo. V'è parimente vn'altra differenza

Come si cōgiunge l'vna cartilagine all'altra.

L'incastro delle coste.

Differenza tra le coste in sustanza.
In lunghezza.
In larghezza.

In che si concordano le coste.

Differenza tra le cartilagini.

Nella larghezza, et lunghezza.

Il modo nel quale le s'incassano le coste.

La differenza fra le coste, nel congiungersi.

Libro Primo

fra queste coste nel congiungersi. Perche la prima si congiunge al primo nodo delle spalle, senza toccare il secondo, mediante vna testicciuola tonda, & vn seno che le risponde in figura, & grandezza; l'altre fin'all'ottaua s'incassano, ogn'vna fra due nodi, con vna testicciuola aguzza in punta; le tre vltime, che s'incassano solamente ne corpi de nodi, non hanno testa molto sospesa, ne molto profondo seno, in cui s'incassano. Abbiamo detto come si congiungono le coste a nodi delle spalle. Restaci a dire, come si congiungano all'osso del petto; il che farò trattando insieme di quest'osso per non hauer tante volte a replicar vna cosa. Hor sta quest'osso p nel mezzo del petto, & piglia (come dicemo) dalla fontanella della gola, fra le due clauicole, fin'à quel luogo, che comunalmente chiamiamo la bocca dello stomacho, benché falsamente, come in suo luogo diremo. Quest'osso è sottile, & largo di sopra, & finisce in vna punta, come di spada; per la qual cosa alcuni il chiamarono Spada; & si compone ordinariamente di sei o sett'ossa, le quali ne gli huomini di età si congiungono in tal modo, che par sia quest'osso fatto di due o tre sole, & alcune volte, benché rade, si compone d'vndici; come vidi io in Roma, l'anno del 1554, in vna fanciulla, d'età di circa sette anni, che hauea diuiso quest'osso in sei; de quali i cinque piu bassi erano fessi d'alto a basso, secondo il lungo dell'osso. Tutte le parti di quest'osso si congiungono, mediante vna cartilagine; ma perche ne gli huomini (come è detto) non si veggono ordinariamente se non due congiunture, tratterò di lui, come se non hauesse, che tre ossa. Il primo 9 de quali è notabilmente piu largo, che gli altri, & vn poco piu grosso, ma assai sottile secondo il largo; & per la parte di dietro, che risponde al voto del petto, è alquanto piu concauo nel mezzo; per la parte dinanzi è alquanto rileuato; misurandolo pel lungo è alquanto piu grosso nel mezzo che da lati (ne quali s'incassano le cartilagini del primo paio delle coste); & per la parte di sopra è piu grosso, & largo, che da quella di sotto. Et ha due seni, vno da ogni lato, lunghi, & scauati dalla banda di dietro, & coperti d'vna cartilagine. In questi due seni s'incassano le testicciuole delle clauicole; & nel mezzo loro dalla parte di sopra se ne fa vn'altro, come vna mezza luna, che è quello, che comunalmente chiamiamo la Fontanella. La parte di sotto è alquanto aspra; & così leggeri si lega col secondo osso, che non mai si lascia di dimostrare la congiuntura; anzi tal volta si veggono dimenare amendue in coloro, che hanno grand'Alima. Questo secondo osso è piu stretto, & sottile, che'l primo, & piu largo di sotto (vn poco innanzi, che finisca) che di sopra, oue si congiunge col primo; nella qual parte ha da ogni lato vn seno commune ad amendue, che è coperto d'vna cartilagine, & in lui s'incassa la cartilagine della seconda costa, con vna punta (come di triangolo sodo) alquanto rileuata. Oltre di questi seni ne ha quest'osso di molti altri simili a ogni lato, ma non vguualmente separati l'vno dall'altro. Perche il primo del primo lato (nel qual s'incassa la cartilagine della terza costa) è piu lontano da quel, nel qual s'incassa la seconda, che non è il terzo dal seno, nel quale s'incassa quella della quarta. Et così consequentemente fin'al testò, che si viene a congiungere col settimo. Di modo, che nel primo osso si viene ad incassare la prima cartilagine; tra'l primo, & secondo, la seconda; & nel secondo la terza, quarta, quinta, sesta, & settima, con certe testicciuole rileuate (come quelle della cartilagine della seconda) mediante quella sorte di congiuntura, chiamata Artrodia, che detto habbiamo esser spetie della synartrosis. Il terzo osso è assai piu picciolo, & si congiunge alla parte di dentro del fin del secondo, inui doue la cartilagine della settima costa s'incassa. Quest'osso è stretto, & sottile, & dalla parte sua piu bassa si conuerte tal volta in vna cartilagine aguzza in punta, che chiamiamo la Forcella dello stomaco. Ma è da notare che in molti manca quest'osso, & in questi tali il secondo si diuide in due, incontro della cartilagine del terzo paio di coste. La cartilagine detta nasce del luogo, doue le cartilagini della settima costa, da ogni lato si congiungono al fin del second'osso. Questa cartilagine serue a guardare la parte dinanzi del fegato, & dello stomaco, & è simile ad vna spada; dalla qual cosa fu da Latini detta Ensisiforme; non ostate che tutto l'osso insieme si possa molto meglio agguagliare ad vn pugnale Spagnuolo; perche il prim'osso fa il pomo, il secondo il manico, & il terzo la lama. Tutto quest'osso è spugnoso, sottile, & massiccio piu dinanzi, che di dietro; perche in questa parte ha di molti spiragli disuguali, che non penetrano, per i quali si nutrice. Questi spiragli tanto piu si veggono nel prim'osso, che ne gli altri, quanto egli è piu grosso di loro. Hor

Dell'osso del petto.

Di quante parti si fa quest'osso.

Il prim'osso.

Il secondo.

Le coste, che s'incassano nel primo, & secondo osso del petto.

Il terzo.

L'Officio della forcella dello stomaco.

p l. j. ij. o

q t. iij. o.

r t. j. ij. x.

t. j. ij. y.

u. j. ij. p.

Hor ritornando alle coste, dico che l'osso del petto fu fatto, così ad effetto, che le coste s'incassassero in lui, come anchora, che'l cuore, & i polmoni stessero piu riguardati. Et le coste furono fatte per difesa del petto. Et la parte lor di dietro, che meno era sicura, fu fatta d'osso; quella dinanzi, perche è piu guardata dalle mani & occhi, di cartilagine, accioche piu facilmente potessimo respirare.

Dell'Osso, o cartilagine del Cuore.

Cap. 17.

QUANTUNQUE nel Cuor dell'huomo giamai si ritroui osso alcuno, nondime no perche in alcuni animali si vede vn'osso, o almeno vna cartilagine dura, come lui, (ilche ho veduto io in alcuni castrati vecchi, & Galeno dice hauerlo veduto in vno Elefante) perciò dirò quello, che ne gli huomini, & principalmente ne vecchi, in luogo di quest'osso si ritroua. Si congiungono (come piu lungamente al suo luogo diremo) nel mezzo del cuore, nella parte piu alta^a del tramezzo, che si fa fra i due suoi ventricoli, le radici della vena arteriale, & quelle dell'arteria grande, come si congiungerebbono due CC per le spalle, & amendue insieme fanno vn corpo poco men duro, che cartilagine; la cui figura è come vna X, perche la radice dell'arteria grande è alquanto maggiore. Queste radici, o si chiamino ossa, come Galeno dice; o cartilagini, come veramente sono, importa poco; pur che si sappia, che si fanno delle sopradette radici, lequali col tempo s'induriscono.

Di che si fa l'osso del cuore.

Delle Pallette delle Spalle.

Cap. 18.

LE Pallette dele Spalle son^a quell'ossa, nelle quali s'incassano le braccia, che sono situate (stando il corpo diritto) fra la prima, & quinta costa, & in alcuni arriuanò alla sesta. Et si legano ognuno di queste ossa dal suo lato con l'osso della collottola, & con nodi della schiena, & con le coste, mediante certi muscoli; cioè, coll'osso della collottola, mediante il secondo^b paio de muscoli che l'mouono (ilqual anchora li congiunge con molte punte de processi di dietro, de nodi della schiena); con le punte di dietro d'alcuni nodi del collo, mediante il terzo paio di muscoli, che muoue^c le medesime palette; con processi di dietro d'alcuni nodi delle spalle, & del collo, mediante il quarto paio^d de muscoli, che le muouono; con le coste, mediante il primo, che le muoue, & il secondo, f che muoue il petto. Ognuna di queste palette da per se è molto disuguale & differente in ogni parte. Perche, oltre a l'hauere molti processi, còcavità, tubercoli, o grommi, & giunte, è parimente d'vna figura triangolare; i cui lati non son vguale, anzi il lato di dietro (che è il fondamento del triangolo di quest'osso, & si distende secondo il lungo delle spalle, da canto i processi di dietro de nodi loro) è maggior, che niuno de gli altri. Questo lato è alquanto rileuato da capi, doue si congiunge con gli altri lati, & è nel mezzo alquanto incauato; benché molte volte manca questa incauatura, & allhora questo lato fa questa figura C. E parimente tutto questo lato assai sottile; benché alquanto meno da capi, che nel mezzo, & il capo di sotto è alquanto piu grosso, che quel di sopra. In questo lato quasi sempre vi son due giunte, vna maggiore, & piu grossa, che si vede sempre nella parte piu bassa di questo lato, & fa vn canto come di triangolo sodo, alquanto tondo, l'altra minore, che è nella piu alta, hui doue comincia il processo, che è nella parte di fuori di quest'osso, chiamato la Spina, come da poi diremo. Senza queste giunte si vede parimente in tutto questo lato vna cartilagine, simile a quella, che nasce al fin di tutte l'altre ossa, che non si congiungono a niun altro, laquale è assai minore negli huomini, che in niuno altro animale. Gli altri due lati di quest'ossa son parimente differenti fra se stessi; perche quelⁱ dinanzi monta al fin del maggiore, camminando in obliquo verso la banda dinanzi; quel^k di sopra (che è tanto piu picciolo, che quel dinanzi, quanto quel dinanzi è minor, che quel di dietro) cala alquanto verso innanzi, fin che finisce in vn picciol seno appresso il collo della palette, accostandosi a quel dinanzi. Questi lati non solo son differenti in lunghezza, & figura, ma parimente in grossezza. Perche quel dinanziⁱ quanto piu monta in su (diuidendosi da quel di dietro, & maggiore, quale dicemmo essere il fondamento o basi di quest'osso) tanto piu si fa grosso, & massiccio, conuertendosi in vn grosso

A che parti si congiungono le palette delle spalle.

La figura delle palette delle spalle.

Il maggior lato di questa palette.

Le giunte di questo lato.

Il lato dinanzi di sopra.

Differenza tra questi lati.

a lib. iij. ta. j.
fig. iij. sotto
la BCD

a t. i. ii. iii. R
t. vi. fi. iiii.

b lib. ii. t. ix.
Δ Γ

c lib. ii. tab.
xii. G

d li. ii. t. x. r

e li. ii. t. v. r

f li. ii. t. vii. L

g ta. vi. fi. iiii.
YYY

h la med. X.

i la med. da
la B al Z

k la med. dal
Z al F

l la med. PP
ST

Libro primo

grosso orlo, il quale (oltre che fa quest'ossa piu forte, & incauate nel mezzo, per dar luogo a i muscoli, che diremo nascer di loro) ha nella parte piu bassa ^m vna impressione, di cui nasce il muscolo, che muoue ⁿ il braccio in dietro; & nella piu alta, appresso il collo di quest'osso, vna asprezza, della qual nasce il muscolo, che distende il gomito. Il piu alto lato di questa paletta è sottile, & aguzzo, & finisce (come dicemmo) in vn seno, come mezzo ^o cerchio, pel qual passa vn ramo del quinto paio de nerui della midolla spinale; insieme con vna vena, & vna arteria, che vanno a nutrire la parte di dietro di quest'osso. Al fin di questo lato, tra lui, & quello della bada dinanzi, ha ognuna di queste palette, come è detto, vn ^q collo, nel quale par si sia raccolto tutto il largo loro, per farlo grosso, & come comincia a vscir in fuora si fa alquanto piu largo. Et nel mezzo della parte sua dinanzi si vede vn ^r seno, alquato longo, secondo la lunghezza del collo, nel qual diremo incassarsi la testa dell'osso dell'omero. Questo seno è tondo di sotto, & aguzzo di sopra; ilche fu fatto per cagione della impressione, che si fa nella parte di dentro del collo, per laqual passa piu sicuramete la corda del muscolo, che raggiua il braccio dalla bada di dentro, & da quella di fuori. In questa parte, cosi il seno, come la parte di sopra di questo collo, son piu rileuati, che di sotto; perche d'amendue nascano le ^s legature di questa cõgiuntura, & la parte di fuori del principio del primo ^t muscolo, che diremo muouere il gomito. Questo seno è coperto d'vna cartilagine, come gli altri, & non è tanto profondo, quato la ^u testa dell'osso dell'omero richiederebbe; ilche in niun'altra cõgiuntura accade, eccetto in questa, & in certa guisa, in quella della coscia cõ l'osso del gallone (come al suo luogo diremo) per cagione di diuersi mouimenti, di queste parti. Ma per rimediare a tal difetto, oltre a le molte legature, che ha, furonò fatti in quest'osso certi ^x processi, che abbracciano la testa dell'omero, in tal guisa, che nol lassano disluogare. Fu parimente ordinato, che la cartilagine, che cuopre questo seno, vscisse tanto in fuora, che faccendolo maggiore, sopplisse alla piccolezza dell'osso, & non disturbasse il moto. Questa cartilagine non nasce d'osso, ne manco è attaccata a lui, ma alle legature, che l'circodano, & è per la parte di fuori grossa, & si va assottigliando, quanto piu s'appressa al centro del seno, & finisce assai innanzi, che arriui a lui, faccendo la figura d'vn anello, la cui parte, che tocca il dito, è agguzza in triangolo, & quella di fuori tonda. Questa cartilagine, se bene aiuta, che non si possa cosi facilmente disluogar l'osso dell'omero; nondimeno quando si disluoga all'ingiu, non lo lascia cosi facilmente ritornare a suo luogo, perche si doppia nel mezzo, & non lascia acconciar l'osso. Et perciò è di bisogno assicurarsi bene, insin'al ritornarlo al suo luogo, & dapoì dimenare alquanto l'osso dell'omero, perche la cartilagine si spieghi. I processi di quest'osso son due; il primo ^y & piu alto nasce della spina, che tosto dirò hauer quest'osso, & fa la punta dell'omero, & perciò la chiamerò sempre la Punta dell'omero. Il secondo, che ^z è piu basso & minore, comincia dalla parte piu alta del collo ^a di quest'osso, & camminando innanzi si fa alquanto largo, & finisce scontro alla parte dinanzi di questa congiuntura. Questo processo, per la parte piu bassa è molto liscio, & incauato come vna ^c Greca, antiqua; & perciò fu chiamato da loro Sygmoides; alcun'altri il chiamaronò Anchiroides, che vuol dir simile ad vna Anchora; per hauer alcuna similitudine con la parte dell'Anchora, che si ficca in terra. Per la parte piu alta è aspro, & disuguale, & la piu alta parte del suo principio è alquanto piu grossa, & ha vn picciolo, & aspro ^b grommo, a cui s'appoggia la clauicola, & si lega fortemente. E parimente aspro questo processo nella punta, & di questa asprezza nasce il principio ^c di dentro del primo muscolo, che muoue il gomito, & la legatura particolare di questa congiuntura. Vedesi anchora tra la punta di questo processo, & il grommo, o tubercolo, a cui s'appoggia la clauicola, vna ^d asprezza, di cui nasce sicuramente la ^e legatura, che s'inserisce nel processo piu alto di quest'osso. All'asprezza di questo processo rispondono alcuni buchi, che sono tutto intorno al collo della paletta, & nõ penetrano; de quali nascono le legature della cõgiuntura dell'omero. La parte ^f dinazi di quest'osso è incauata, quanto il grosso dell'orlo, del lato dinanzi, esce in fuora, (questo vacuo empie ^g il sesto muscolo, che muoue il braccio) & è tutta liscia; & ha alcune ^h impressioni (come se le coste si fussero stampate in lei) lequali si conoscono assai piu chiaramente ne vecchi, che ne giouani. Vedesi parimente in questa parte al fin del maggior canto ⁱ vn picciol tubercolo, nel qual s'inserisce il secondo muscolo, che muoue il detto osso.

Il lato piu alto.

Il collo della paletta.

Il seno del collo.

La cartilagine, che fa maggior questo seno.

L'offitio di questa cartilagine.

Il primo de i processi della paletta della spalla. Il secondo.

La parte dinanzi di questa paletta.

m la med. T.
n li. i. ta. viij.
k t. xvij. S

o t. v. fi. iij. a
p li. vij. t. ij. i

q ta. vj. fi. iij.
C D.

r la med. AB

f lib. ij. t. xij.

V

t li. ij. t. vj. m

u t. j. ii. iij. x.

ta. v. fig. vj.

A. B. C

x t. vj. fig. iij.

F F K K K

y la med. K.

K K

z la med. FF

a la med. C

b la med. F

c lib. ij. t. vj. n

d t. vj. fi. iij. F

e li. ij. ta. vj. c

f ta. vj. fi. iij.

M M M

g lib. ij. t. vj.

r. t. viij. H

h t. vj. fi. iij.

M M M

i la med. o

k la med.
NO

osso. Et è da notare, che questa parte è piu tonda, o scauata iui, ^k doue rispõde alla spina, o scaglia, di cui nasce il processo chiamato la Punta dell'homero, che in niun'altra; come se hauesse voluto la natura, faccendo questa spina in quest'osso, cauarlo piu in dietro, & farlo piu profondo dinanzi. Et la parte di questa impressione, che risponde a fini di questa spina, è piu profonda, che quella, che risponde al suo mezzo; perche la spina è piu grossa nel mezzo, che da capi, come tosto dimostrerò. De gli altri fossi, che ha quest'osso, quel che è vicino al collo è il piu cupo; si perche nascendo della spina si distende verso dietro; si perche in questo luogo il collo è piu grosso; & vscendo vn poco innanzi il fa

l la med.

te di ^l dietro di quest'osso, nella quale è il processo, simile ad vna spina, la cui punta si chiama la Punta dell'homero, è alquanto inarcata per poter meglio resistere. Et ha due

m la mede.

piccioli seni, l'vno ^m di sotto al processo detto, tra il suo fine, & la parte piu grossa & rile

n la med. bc

uata del lato dinanzi; l'altro ⁿ tra la parte di sopra della medesima spina, & il lato di so-

o li. ij. t. vj. K

pra della paletta. Di questo seno nasce il terzo ^o muscolo, che muoue il braccio; dell'al-

p li. ij. t. xj. r

tro il secõdo. Questa spina è assai piu in su della metà ^p della parte di dietro di quest'os-

q t. vj. fig. vj.

so; & cominciando dal lato di dietro & maggior di quest'osso, iui doue comincia ^q la

r t. vj. fig. iij.

giunta piu alta, cammina, ristignendosi al principio; & subito poi si rilarga ^r di sopra,

s la med. I

restando di sotto piu ^s sottile. Et dapoì si torna a ristignere appresso il collo dell'istesso

t la med. C

osso, doue si separa da lui; & vscendo vn poco innanzi si fa fra triangolare & tonda al

u la med. F

principio, & dapoì s'allarga, & fa vn processo, che finisce in vna ^u giunta; laqual ne fan-

x la mede. E

ciulli e fatta di molti officelli, che si congiungono mediante vna cartilagine. Questo pro-

z lib. ij. t. x.

cesso si chiama Acromion, che vuol dir la Punta dell'homero; & è tutto liscio, eccetto

a li. ij. t. x. Δ

che in la parte di sopra, che è aspro; & ha certi spiragli, che non penetrano, principalme-

b la med. fi. v.

te nella piu alta parte della ^a giunta di questo processo; & al principio della scaglia, ^y o

c la med. Q

spina; ne quali s'inferisce il secondo muscolo che alza ^z quest'osso; & nasce ^a il primo,

che muoue il braccio. Ha parimente questo processo vn ^b seno nella parte dinanzi, che

è tanto picciolo, che non si vede, se è o seno, o testa; nel qual s'incassa la testicciuola, che

diremo hauer la clauicola, medianti alcune fortissime corde, & vna cartilagine, simile a

quella, che habbiamo detto concorrere nella congiuntura della mascella inferiore, con

la superiore, liscia, & sdrusciolosa da amendue le parti verso l'ossa, & laquale non s'ap-

poggia se non alle legature di questa congiuntura.

La parte di dietro.

La spina di questa paletta.

Il secondo processo dell'osso della spalla.

Delle Clauicole.

Cap. 19.

CI A habbiamo detto, come le Clauicole s'incassauano nel seno del processo piu alto della paletta, chiamato la Punta dell'Homero dal suo lato, & in que due seni, che si fanno nella parte piu alta delati, del prim'osso del Petto. Et parimente dicemmo, come questi seni erano inarcati, & camminauano dalla banda dinanzi verso quella di dietro; & che erano assai piu larghi da quella parte, che da questa. ma piu profondi di dentro, che di fuori. Hor è da sapere, che le teste di queste due clauicole, che si cõgiungono, ognuna dal suo lato, con l'osso del petto, son simili in figura a i suoi seni. Perche son alquanto lunghe & compresse, & in certa ^a guisa di forma di triangolo, i cui lati son disuguali; si come anche sono i canti, che fanno questi lati. Perche il ^b primo, che è nella parte piu bassa del lato dinanzi, è in certo modo fodo; & parimente il secondo, ^c che è nella parte di sopra di questa testa, alquanto verso dietro; ma il ^d terzo, che è nella parte di dietro alquanto all'ingiu, è piu aguzzo, & lungo. Et secondo, che sono i canti maggiori, o minori, cosi anche sono i lati di questo triangolo. Perche quel che va dal primo al secondo, è piu corto; quel che va dal terzo, infini al primo, è piu lungo, & alquanto torto; quel che va dal secõdo al terzo, è mezzano. Questa è la figura della testa della clauicola, che si cõgiunge all'osso del petto. Laquale ha vna picciola giurta couerta d'vna grossa; & tenera cartilagine, che fa tutta la testa liscia; ma tolta via la cartilagine, & la giunta, resta l'osso aspro. Oltre di questa cartilagine (che è simile a quella, che si vede ne seni, ne quali queste testicciuole s'incassano) se ne vede anchora in questa congiuntura particolarmente vn'altra, ^e come quella, che dicemo esser nella congiuntura della mascella inferiore con la superiore, laquale è tato grande, quato tutto il seno dell'osso del petto, & la testa delle clauicole;

Come si cõgiungono le clauicole all'osso del petto.

Vna cartilagine di questa congiuntura.

a t. vj. fi. v. A

b la med. B

c la med. C

d la med. D

e li. vii. fi. xx.

S.

Libro primo

Historia del re-
sto di quest'osso.

La figura delle
clauicole.

La testa della
clauicola, che si
congiunge alla
punta dell'home-
ro.

La sustanza di
quest'osso.

Alcune righe,
impressioni, bu-
chi, & asprez-
ze di quest'os-
so.

clauicole; & è sottile, & vguale da ogni parte; & per quella, che risponde al seno, è molto liscia, & bagnata d'un humor vntuoso; & nasce delle legature, che abbracciano tutto intorno a questa cōgiuntura; & perciò è anche di figura triangolare. Fatta questa testic-
ciuola se ne va vna delle clauicole verso la punta dell'homero, benché alquanto in obli-
quo. Perche tosto, che si separa dall'osso del petto, si storce verso dietro, & dapoi verso
innanzi, facendo fine in vna testa, che s'incassa ne due processi della paletta della spalla.
Di modo che la testa di queste clauicole, che si congiunge all'osso del petto, è torta all'in-
dietro; & quella che si congiunge alla punta dell'homero, verso dinanzi. Ogn'vno di
quest'ossa ha due ^f gobbe, & due scauature, che si corrispondono. La prima gobba, che è
piu lunga, è ^s appresso l'osso del petto nella parte dinanzi; a questa risponde vna scauatu-
ra nella parte ^h di dietro, che risponde al voto del petto. La seconda, & piu corta gobba è
verso la punta dell'homero, nella parte di ⁱ dietro, che risponde al voto del petto. Di mo-
do che l'fine di questa paletta, che si congiunge all'osso del petto, è storto verso dentro;
& quel che si congiunge alla paletta della spalla, verso fuori; & tutto quest'osso fa la figu-
ra d'vna ^f. La testa, che si congiunge alla paletta nella parte sua piu alta (che s'incassa nel
la punta dell'homero) ha vn tanto picciolo grommo, o tubercolo, che cō difficoltà si co-
nosce, se è o grommo, o seno; & la parte piu bassa, che si congiunge al piu basso processo
della paletta (simile ad vn' Anchora) è piu larga, come anchora è lo processo. Ma così que-
sta testa, come quella, che si congiunge coll'osso del petto, son piu spugnose, che la parte
di ^k mezzo; perche son anche piu grosse, che l'altre; & (come al principio di questo libro
dicemmo) quanto piu è l'osso grosso, tato è piu voto. La parte di mezzo, che è piu sottile,
& massiccia, & quasi tonda, ha nella parte di sotto vna ^l riga, alquanto rileuata; la qual
comincia poco dapoi la testa di quest'osso, che si cōgiunge a quel del petto, quasi di mez-
zo del suo primo, & vltimo canto, & arriua vn poco piu innanzi della metà della clauic-
ola. Di questa riga nasce il primo ^m musculo, che muoue il petto. Vicino al principio di
questa riga, appresso alla testa di questa clauicola è vna ⁿ impressione aspra, della qual na-
sce vna legatura, che congiunge questa parte coll'osso del petto; & appresso al fine, vn'al-
tra, di cui nasce vna legatura, che lega fortemēte la clauicola col tubercolo, che è nel fine
del processo dinanzi della paletta, a cui la detta asprezza si congiunge. Della medesima
forma si vede nella parte di dietro, che risponde a questa asprezza (iui doue la clauicola
si fa piu larga) vn'altra ^o asprezza, assai piu profonda; principalmēte appresso la gobba,
che è appò il processo, chiamato la Punta dell'homero; nella qual parte queste legature so-
no assai piu forti, che in quella di sopra. Ma la parte alta di questa clauicola è tutta liscia,
eccetto appresso i capi, doue si fa alquanto aspra; perche meglio possino nascere alcune
legature, & ^p muscoli, che (come nel suo luogo diremo) nascono di queste parti. Ha così
anchora ognuna di queste clauicole nella parte dinanzi, appresso il fine del primo canto
(di quei, che dicemmo hauer la testa, che s'incassa coll'osso del petto) vna ^q riga rileua-
ta, che finisce nanzì al mezzo della clauicola; della qual nasce vna gran parte del primo
musculo, che muoue il braccio. Vedesi oltre di ciò in questa parte (iui doue si storce a
dietro, & si fa la scauatura, che sta appresso la testa, che si cōgiunge col processo, chiama-
to la Punta dell'homero) vna grande ^s asprezza; della qual nasce la maggior parte del se-
condo ^t musculo, che muoue il braccio. Nella parte di dietro di questa clauicola, niuna
asprezza si vede, di cui non habbiamo fatta mentione. Eccetto vn ^u grommo, o tubercolo,
che è nel mezzo della gobba di questa parte; di cui nasce vna legatura, che si appoggia
al processo di dentro della paletta della spalla. Niun'altra cosa v'è da notare nelle clauico-
le, eccetto che nella lor parte piu massiccia, che è quella di mezzo, & principalmēte ver-
so dietro, vi sono quando due, quando tre spiragli, che non penetrano, per liquali passa
no alcuni ramuscelli di vene, & arterie a nuttarle.

f t.vj. fi. iij.

g la med. F

h t.vj. fi. v. I

i la med. E

k la med. H

l la med. FG

m li. ij. t. iij.

d

n t.vj. fi. v. G

o la med. N

p lib. ij. t. iij.

q 6 t. ix. TA

q t.vj. fi. v. E

r lib. ij. ta. j. ij.

Δ. t. iij. L

s t.vj. fi. v. K

t lib. ij. t. iij.

dal e al f

u t.vj. fi. v. O

a t. j. ij. x.

ta. vj. fig. vj.

A B C

b la med. B

ch'io

Dell'Osso dell'Homero.

Cap. 20.

L'osso dell'Ho-
mero è il mag-
gior osso del cor-
po, eccetto l'osso
della coscia, &
amēdue gli stin-
chi della gamba.

C Hiamasi Osso dell'Homero, l'osso del braccio dall'homero fin'al gomito; il qua-
le è maggior di tutte l'ossa, eccetto l'osso della coscia, & amēdue gli stinchi della
gamba. La parte piu alta di quest'osso (che si congiunge con la paletta della spalla) ha
vna gran ^a giunta, che fa vna gran testa, diuisa mediante vna così leggiera ^b impressione,

ch'io non so perche habbia alcuno detto, che son due teste. La parte di dentro (che è maggiore, & tonda, come mezza palla, liscia, & vguale, & couerta d'vna cartilagine, & s'incassa nel seno della paletta della spalla) fa tutto il lato di dentro della giunta, & piu della metà del lato di fuori. Quella di fuori (che è alquanto aspra, & disuguale, & fa il resto del lato di fuori) non s'incassa in niun osso; anzi esce come vn gromino ò tubercolo, nel quale s'inferiscono molte, & fortissime legature, che legano quest'osso con la paletta della spalla. Et si comel'altre parti (di doue nasce ò s'inferisce alcuna cosa) sono aspre, così anchora è questa impressione, che diuide questa testa. La parte di fuori oltre che è disuguale, & aspra, si diuide in due picciole teste ò grommi ò processi, vno di fuori, & maggiore; l'altro di dentro, & assai minore. I quali si diuidono mediante vna incauatura, che si fa nella parte dinanzi di questa giunta alquanto in fuori; & è assai lunga, & incauata, & tonda, come vn canale & simile al principio di fuori del musculo primo, che muoue il gomito, che diremo nascere di lei. Questo seno nò solo si fa nella giunta, ma parimente nel collo dell'osso, a cui ella si congiunge, che è assai piu corto, & grosso. La parte di sotto di quest'osso, che si congiunge a gli due fuselli del braccio, è assai piu differete, così in l'abbondanza di seni, & teste, come in la figura loro. In prima nel mezzo di questa parte di sotto c'è vn seno, & due grómi ò tubercoli, che fanno la figura d'vna Girella, eccetto che la girella è incauata vguabilmente tutt'intorno. Et in quest'osso la testa di dentro è piu rileuata, che quella di fuori. Perche per la parte di fuori non era pericolo, che'l maggior fusello, (che si congiunge a questa girella) si disluogasse, congiungendosi a lei (come diremo) il minore, detto da Latini Radiū; ilqual serue in questa parte per appoggio al maggiore perche non escà del suo luogo. C'è parimente vn'altra differenza tra le vere girelle, & questa; perche in quelle la fune cāmina tutt'intorno dell'incauatura; in questa il maggior fusello del braccio nò puo andare tutto intorno a lei, per esserui nel mezzo della parte sua di sopra vna scaglia d'osso, che traluze, nella quale il maggior fusello s'appoggia (quando distendemo ò pieghiamo il braccio) per poter far maggior forza. Di questi due seni, che sono nella parte di sopra di questa girella quel di dietro è assai maggior che quel dinanzi, & sopra d'amendue giuocano i processi del maggior fusello del braccio, chiamati in Greco Coronas; perche son fine del seno, che si fa fra loro. Il seno dinanzi riceue il processo dinanzi, quando ritiriamo il braccio; il seno di dietro riceue il processo di dietro (che chiamiamo il gomito,) quādo lo distendiamo. Et son fatti tanto giustamēte questi fossi, che e lasciano piegare, & distendere il braccio, quanto è di bisogno, & non piu. Ha parimente quest'osso nella parte di fuori della girella, alquanto innanzi, vna testa tonda, lunga & liscia, & couerta d'vna cartilagine, simile a quella che cuopre la girella; laqual s'incassa in vn grande, tondo, & poco cupo seno, che diremo farsi nella parte di sopra del minor fusello del braccio. Dal lato di fuori di questa testa, l'osso dell'omero esce molto in fuori & fa certe asprezze, delle quali, & d'vna riga (che nascendo di loro, monta alquanto in sù per lo lato di fuori) nascono sei muscoli, (come nel suo luogo diremo); & all'hora chiamerò io sempre questa parte la Testa di fuori dell'osso dell'omero. Et si come è rileuato il lato di fuori di quest'osso, così anchora il lato di dentro ha vn processo tondo; il quale io chiamerò la Testa di dentro dell'omero. Questa testa, se ben non si congiunge a niun'osso; pur della punta sua, che è alquanto larga, nascono, il musculo, che dirò far la tela, che cuopre la palma della mano; & due di que, che piegano il bracciale. Et della parte piu bassa, nasce vna parte del musculo primo, che volta all'ingù il minor fusello; & anche in parte alcuni muscoli di que, che piegano alcune dita. Ha così anchora questa testa nella parte dinanzi, (appresso l'incauatura ò girella) vn picciol seno per lo qual diremo passare il terzo neruo di que, che vanno al braccio; & nella parte di dietro vn'altro per lo qual passa il quinto neruo del braccio. Questa testa è maggior, che quella di fuori, se bene al toccare paia el contrario; per rispetto di congiungersi a quella di fuori il minor fusello del braccio. Non dimeno amendue son fatte della giunta d'vn'altro osso; laquale ne fanciulli si congiunge, mediante vna riga ò harmonia; ne gli huomini di tempo mediante la vnione ò symphysis; & perciò molti hanno pensato, che fusse parte dell'istesso osso. Ma veramēte è parte d'vn'altro, come ha molto bene notato Realdò Colombo. Nel resto, quest'osso è diritto, & quasi tondo, se ben nella parte piu bassa è alquanto incauato, largo di dietro, dinanzi

La parte d'sopra di quest'osso.

Historia della parte di sotto dell'osso dell'omero
La Girella.

Due seni, che sono sopra a questa girella.

La testa di fuori di quest'osso.

Quella di dentro.

La giunta della parte di sotto.

Libro Primo

Vn seno dell'osso dell'homero.

I buchi di quest'osso.

Differenza fra i due fuselli del braccio.

Due processi del maggior fusello.

Il seno, che si fa fra questi due processi.

Come si congiunge il minor fusello all'osso dell'homero.

Historia del resto del maggior fusello.

nanzi rileuato; nella piu alta al contrario; & nel mezzo quasi triangolare; ilche fu fatto per cagione de muscoli, che nascono di lui, come nel suo luogo diremo. Ha parimente quest'osso nel mezzo della parte di dietro, secôdo il lungo suo vn^a seno, per ilqual passa il quarto neruo ^b di que, che vanno alla mano. Questo seno comincia dalla parte di dentro, & caminando per quella di dietro, va alla parte di fuori, torcendosi a basso, quanto il cammin richiede. Ha di piu vn'asprezza nella parte dinâzi verso fuora, innâzi a la metà sua, secôdo il lungo; nella qual s'inserisce il piu forte ^d musculo di que, che muouono il braccio; & nasce l'ultimo di quelli, che piegano^e il gomito. Et vn'altra appresso il seno, per il qual passa la testa di fuori del primo musculo, che piega il gomito; della qual nasce la parte carnosa di dentro di questo primo musculo. In quest'osso non è buco alcuno, che sia da notare, eccetto alcuni piccioli, che sono appresso i seni, & tutt'intorno delle teste; i quali furono fatti, perche meglio, & piu forte s'inserissero, o nascessero le legature di questa congiuntura. Et altri, per i quali passano le vene, che si veggono per lo lungo dell'osso; principalmente nella parte di dentro; nella qual si vede il piu delle vene; che seruono a nutrirlo.

De Fuselli del Braccio.

Cap. 21.

DAL Gomito al Bracciale son due ^a ossa, lequali io chiamerò sempre i Fuselli del braccio; & quel, che fa il giuoco del gomito, dirò maggiore, & l'alto minore. Questi due fuselli son amendue lunghi; ma ben differenti, così nel modo d'incassarsi, come in figura. Perche il maggior, che è quel di sotto, chiamato da Latini, Vlna, o Cubitus, s'incassa nella Girella, che habbiamo detto hauere l'osso dell'homero nella parte ^b piu bassa medianti certi seni, & processi, a questo effetto necessarij. Perche nella parte di sopra (che è assai piu grossa, & massiccia, che niun'altra) ha due processi, l'uno innâzi dell'altro. Il primo ^c è quel, che entra nel fosso dinâzi, che è sopra la girella, quâdo ritira mo il braccio, alquale è alquâto simile i figura, pche è alquâto largo, sodo, & duro. Il ^d secôdo è quel che comunalméte chiamiamo il gomito, & si mette nel fosso di dietro, che è sopra la e girella, quâdo distédemo il braccio. Fra q^{ti} due processi si fa vn seno simile ad vna C, lûgo, quâto è lo spatio fra l'vno, & l'altro, ilquale i Greci chiamarono Sygmoides, che vuol dir Cupo, o icauato, pche è nel mezzo icauato. Questo seno è tutto liscio, & coperto d'una cartilagine, mediante laquale abbraccia tâto giustaméte la girella dell'osso dell'homero; che qual si voglia picciola cosa, che si aggiúgesse, o togliesse via, impedirebbe il mouimento. Et sopra lei giuoca, come sopra vna corda, quando distédemo, o ritira mo il braccio. Alla parte di fuori d'ognun di questi due processi è vna asprezza, della qual nascono certe forte legature, che abbracciano queste cōgiunture, & alcuni muscoli, così di quelli, che distendono ^f il gomito, & di que, che l' ^g piegano, come di quelli che chiudono i ^h secondi & i terzi articoli delle dita; alche aiutano anchora certi grōmoncel li, che sono alla radice del primo processo. Ha così anchora questo fusello alla radice del processo dinanzi certe asprezze, che seruono parimente al nascimento de muscoli detti. Si vede pariméte nella parte piu bassa del detto seno, iui doue finisce la sua tōdezza, vna picciola linea, o impressione, della qual nascono certe legature, che legano fortemente questo fusello maggiore, coll'osso dell'homero. Et è da notare, che nel processo vltimo di quest'osso è ordinariamente vna giunta, & tal volta due; lequali ne vecchi si congiu gono mediante la Vnione, o Symphysi. Il minor fusello, (che sta sopra il maggiore, & habbiamo detto esser chiamato da Latini Radius) per la parte che si congiunge all'osso dell'homero, è alquâto sottile; & ha dal capo vn collo lûgo, & sottile, che finisce in vna ^k testicciuola grande, & tonda. Nel mezzo di questa testicciuola si fa vn tondo, & poco cupo seno, nel qual s'incassa la testa ^l di fuori dell'osso dell'homero; & sopra lui si storce in su, & in giù; & senza disturbar pcio che l' braccio nō si pieghi, o stēda. Anzi il seno di q^{sto} minor fusello si piega, & distēde sopra la testa istessa dell'osso dell'homero, senza che vi sia pericolo di disluogarsi, anchor che sia poco incauato, per esser la testa, che s'incassa, così lunga; & larga. Ma il maggior fusello dopo l'esser si congiunto coll'osso dell'homero, camminando verso l' bracciale si fa a poco, a poco piu sottile, infin'all'arriuare a lui, Et iui si cōuerte in forte, & sottil collo, di cui nasce ^m vna testa, al cui fine si vede sempre vna giunta

a ta. iii. c.
b li. vii. t. ii.
iii. o
c ta. i. ii. iii.
appresso la S
d li. ii. t. i. ii.
iii. ΔΔ L
e li. ii. t. ii. N

a t. i. ii. iii. X
Y. t. vi. fi. vii.

b t. vi. fig. vi.
L M
c t. i. ii. 3. t.
vi. fig. vii. c.
d la med. o D

e t. vi. f. vi. O

f li. ii. t. xiii.
b c d
g li. ii. t. viii.
r
h li. ii. t. v. o
i li. ii. t. vi. g

k t. vi. fi. vii.
L M
l la med P

m la me. PQ

n la med. R giunta tonda. La parte di fuori di questa giunta è disuguale, & ha vn processo aguzzo, ⁿ come vn puntaruolo, che risponde all'osso, che sostiene il dito picciolo, & aiuta (come diremo) a sostenere il bracciale, quando si storce in fuori. Al lato di dentro del processo detto si fa vn seno disuguale, nel qual è vna ^o cartilagine, che nascendo di questo minor fusello, si mette quasi tutta tra'l bracciale, & il maggior fusello, senza attaccarsi a niun di loro. Et fa il medesimo effetto, che quella, che dicemmo esser tra la mascella inferiore, & il seno dell'osso delle tempie; & tra le clauicole, & l'osso del petto. Tolto via questo seno, tutto il resto di questa giunta, che si congiunge al bracciale, è coperto d'vna cartilagine, ne piu, ne meno, che sono gli altri seni, & teste delle giunte. Ha similmente questa giunta vn'altro seno ^p lungo, & tondo, come vn canale, che arriua fin'al collo di quest'osso, et per lui passa la corda ^q del terzo musculo, che distende la palma della mano. Il resto di quest'osso è di diuerse figure. Perche la parte bassa, (appresso il fine dell'ultimo processo, che si congiunge coll'osso dell'omero) è vn poco gobba, & di figura triangolare, & tolta via la pelle, si vede subito scarnata, ^r & couerta da alcune corde de muscoli, che distendono il gomito. La prima riga di questo triangolo, è nella parte di sotto di quest'osso, & va secondo il lungo del fusello assai scoperta. Perche cosi il ^s musculo, che si distende sopra il lato di fuori di questo fusello, & s'inferisce nell'osso della palma, che sostiene il dito picciolo, come l'altro, che si distende pel lato di dentro, ^t & finisce nel bracciale, innanzi a l'osso dell'istesso bracciale, che sostiene il dito picciolo, stringono di tal modo i lati di quest'osso, che fanno vscir in fuori questa riga. La quale va in questo modo camminando per lo fusello fin piu della metà sua. La ^u seconda riga comincia dal lato di dentro della radice del primo processo, & fa vn lato comune a lei, & alla prima, per cui diremo passar quel ^x musculo, che piega il bracciale. La terza comincia ^y dal lato di fuori della radice del primo processo, di doue nasce vna forte ^z legatura, simile ad vna tela, che congiunge gli due stinchi pel lugo. Fra questa riga, & la prima si fa vn lato, il quale spianano que muscoli, che empiono la parte di dentro del maggior fusello, a quali tutti, amendue i fuselli danno luogo, & principalmente a quello, che piega ^a il terzo articolo delle prime quattro dita. Et è da notare, che questo lato secondo il lungo suo è piu aspro, che'l primo, o secondo, & di questa asprezza nascono in parte i muscoli, che diremo nascer del maggior fusello. Il lato, che è fra la prima riga, & la terza, è meno incauato, che gli altri due, & ha particolarmente vna riga, alquanto foda, lunga, & non molto rileuata, (che è piu vicina alla terza riga, che alla prima) della qual nascono tre muscoli; ^b il piu picciolo di quegli, che riuoltano il minor fusello in su, & i due, che (come diremo) seruono l'vno al mouimento del pollice, l'altro a quel dell'indice, & a quel di mezzo. In questo modo va questo fusello fin a piu della metà; da indi in giu sarebbe tondo, se non si rileuasse la seconda riga d'auantaggio; la quale camminando in obliquo all'ingiu, dà luogo al musculo quadro, ^c che nasce in questa parte, come diremo. Restaci hora a dire del minor fusello, il qual si congiunge ^d col maggiore, di sotto, & di sopra, nondimeno nel mezzo si storce tanto, che no'l tocca ^e in niuna parte. Il che fu fatto principalmete, perche seruisse per appoggio al maggiore, nel storcersi in su, & in giu, & in parte, perche meglio potessero nascer gli muscoli, ch'occupano, cosi il lato di dentro, come quello di fuori del braccio. Questi fuselli si congiungono assai in altra forma, da basso che di sopra; perche di sopra il maggiore riceue il minore, da basso è al contrario. Fassi adunque dal lato di fuori del processo davanti del maggior fusello, vn picciol ^f seno intrauerato, simile alla quarta parte d'vn cerchio, liscio, & coperto d'vna cartilagine, nel qual s'incassa il lato di dentro della testa del minor fusello, che dicemmo hauer vn seno, nel qual s'incassaua la testa di fuori dell'osso dell'omero. Nondimeno, di sotto appresso il bracciale, s'ingrossa il minor fusello, & si allarga, & finisce in vna ^g giunta, nel lato di dentro della quale è vn molto picciol seno, coperto d'vna cartilagine, simile a quella, che hora dicemmo esser nel maggior fusello. In questo seno s'incassa la parte piu alta del lato di fuori della giunta del minor fusello, mediante vn picciol tubercolo, coperto anche lui d'vna cartilagine. Et sopra queste due congiunture si storce il minor fusello, in su, & in giu. Ha similmente il minor fusello appresso il gomito innanzi al collo suo vn ^h processo aspro (che guarda al maggior fusello) nel qual s'inferisce il primo musculo di que, che piegano il gomito. Il resto di quest'osso verso il bracciale non è anche molto tondo; anzi ha dal lato di dietro, secondo il lungo suo

Historia di questo Fusello secondo il lungo.

Historia del minor fusello.

Il processo aspro del minor fusello.

Libro primo

Historia della
parte di sotto di
questo fusello.

vna rigaⁱ aguzza, & molto erta, che sta scontro alla terza riga del maggior fusello. Et di lei nasce quella ^k legatura, come tela, che habbiam detto legare l'vn fusello coll'altro, iui doue son piu separate. I lati, che fa questa riga, sono alquanto abbassati, per dar luogo a muscoli, che passano per amendue. Ma il lato di dentro è assai piu aspro, & cupo, che quel di fuori; perche nasce di lui il ^l musculo, che piega il terz'osso del pollice. Il lato di fuori di questo minor fusello, che sta scontro alla detta riga, è quasi tondo, & circa il suo mezzo, (secondo il lungo) è alquanto aspro, & di questa asprezza nasce il piu picciol ^m musculo di quei, che storcono il minor fusello in su, & il piu alto ⁿ di quelli, che l' storcono in giu. La parte di sotto del ^o minor fusello se ben dicemo farsi piu grossa, & larga, perche se le hauea da cōgiungere tutto l' bracciale, (perche si potesse la mano storcere in su, & in giu, come fa, stando fermo quasi il maggior fusello) pure perche correrebbe perico- lo che vn cosi sottil osso non si rompesse con tanto grossa testa, non crebbe la testa, quanto la grossezza del bracciale richiederebbe. A questo difetto supplisce il maggior fusello, aiutando anche egli a sostenere il bracciale, mediante solo il processo ^p simile al puntaruolo, che dicemo essere nella sua giunta. Perche il resto di questa giunta, verso il bracciale è coperto d' vna cartilagine, che nasce della parte di sotto del seno (nel qual s' in- cassa il bracciale) che è nella giunta del minor fusello, & va per sopra la giunta del mag- giore, fin' alla punta del processo detto; diuidendolo in tal modo dal bracciale, che, ancho- ra che questo maggior fusello lo sostenga, non percio s' incassa il processo in lui. Ne anche nel processo simile al puntaruolo si vede segno d' incassatura, per esserui la cartilagine in mezzo, & la congiuntura piu tosto lenta, che stretta; anzi tutto il bracciale s' incassa nel minor fusello, come volea la ragione. Ha parimente questo minor fusello la parte di den- tro, che si congiunge colla giunta, & anche la medesima giunta, alquanto scauate, ^q per dar luogo all' ultimo ^r musculo di que, che storceno questo minor fusello in giu, et simil- mente perche le corde, che vanno ^s a piegar le dita, passino senza impedimento alcuno. La parte di fuori è alquanto tonda, & gobba, perche sia piu forte. Nondimeno, perche essendo tonda & gobba, le corde, che passano per sopra lei a distender le dita, potrebbero facilmente sdruciolare, furono fatti quattro seni in questa parte, per li quali le ^t corde passassero, come per buchi od anella. Oltre di questi quattro seni se ne vede parimente vn' altro ^u nella parte di fuori, la doue la giunta del minor fusello si cōgiunge cō la giun- ta del maggiore, & per lui passa la corda del ^x musculo, che distende il dito picciolo.

i t.vj. fi. vii. ff
k lib. ii. t. vii.
vv. t. xiii. K

l lib. ii. t. vi. x

m li. ii. t. vii.

n lib. ii. t. xii.

o t. i. v. ta. vi.
fi. vii. γ d

p t. vj. fi. vij.
R

q la med. n.

r li. ii. t. vii. x

f li. ii. t. v. e c

t lib. ii. t. i. ii.

iii. 345. 6.

u t. vj. fi. vij.

g

x li. ii. t. ix. e

Dell' Ossa del Bracciale.

Cap. 22.

Quant' ossa ha
il bracciale.

La figura del
bracciale.

BRACCIALE chiamiamo quell' ossa, sopra le quali giuoca ^a la mano, alle quali, come habbiamo detto, si congiungono i fuselli del braccio. Et si fa d' otto picciole ossa, composte di quattro in quattro; le quali tutte ne gli huomini d' età non dure di fuori, & spugnose di dentro, & piene di midolla (principalmente le piu grandi, nelle quali manifestamete si vede) & seminate d' alcuni piccioli spiragli, che nō penetrano, per gli quali entrano alcuni ramuscelli di vene, & arterie. Tutte quest' ossa son differenti fra se stesse, non meno in grandezza, che in figura, & sito; perche non è l' uno tanto simile all' altro, che facilmete non si conosca, ognuno da per se. Ma cō tutto che sian differenti, sono cosi bene incassate, & attaccate, che par che tutto il bracciale sia fatto d' vn osso, & con difficultà si possono contare, se non si toglie via la ^b tela, che le tiene abbracciate. Et tutte insieme per la parte di dentro fanno vna figura ^c cōcaua come C, per quella di fuo- ri vn' altra, incuruata, come quella, che dicemo fare la testa del minor fusello. Et sol per queste due parti son couerte di legature; perche per quella di sopra, oue si cōgiungono al minor fusello, son liscie, & couerte d' vna cartilagine, & parimete per la parte di sotto, che si congiunge all' ossa della palma, & al primo del pollice. La parte di questi ossicelli, col cui mezzo si cōgiungono, l' uno all' altro, nō è disuguale ne alpra, ne manco piena di legature, come l' altre parti. Anzi alcuni di loro hāno i suoi seni coperti d' vna cartilagine liscia, ne quali s' incassano le testicciuole o tubercoli degli altri, eccetto che nella cōgiun- tura dell' ossa, dell' ordine di sotto; doue s' intrapone vn poco di legatura, come cartilagi- ne, che quasi non si vede, in quel luogo, doue quest' ossa son meno congiunte, che quelle di sopra. Perche (congiungendosi l' ordine dell' ossa di sopra al minor fusello, come se fusse

a t. vj. fi. viij.

b lib. ii. t. viii.

Δ t. xii. l

c t. vj. fi. viij.

fusse vn osso solo, & cōgiungendosi quello di sotto al prim'osso del pollice, & agli quattro della palma, come a molt'ossa separate) fu di bisogno che l'ossa di sopra si cōgiungessero, l'vne a l'altre, piu giustamente, & con manco tramezzo, che quelle di sotto. Ma cosi quelle dell'vn ordine, come quelle dell'altro, furono molte per cagion de varij mouimenti del bracciale & della mano. Abbiamo dimostrato la figura di tutto il bracciale. Diciamo hora particolarmente il nome, sito, & in parte la figura, i seni, & tubercoli d'ognuno di quest'ossa da per se, & la forma, nella quale si congiungono l'vne, all'altre, cominciando dall'ordine di sopra, che si congiunge al minor fusello. Hora sono in quest'ordine quattro ossa, le quali io contarò, secondo che procedono; ^d chiamando il primo quel, che fa il lato di dentro di quest'ordine; il secondo, terzo, & quarto, quelle, che seguono di mano in mano, fin fuora. Nell'istessa guisa contarò l'altre quattro ^e dell'ordine piu basso, che fanno il quinto, sesto, settimo, & ottauo. Il primo, & secondo osso dell'ordine di sopra si congiungono molto forte nella forma detta, al seno, che è nella giunta del minor fusello, mediante vna cartilagine, che li cuopre per questa parte. Il terzo s'appoggia nella cartilagine, che uscendo del minor fusello il separa dal maggiore (come dicemo); benche, quando piegamo la mano in fuora, il lato di fuori di questo terzo osso tocca similmente vn poco quel processo del fusello maggiore, simile al puntaruolo. Questo terzo osso, ne gli huomini, il piu delle volte non ha seno alcuno couerto di cartilagine, che si possa conoscere, nel quale questo processo detto s'incassi. Il quarto ^f osso di quest'ordine non tocca in niuna forma il maggior fusello; anchor che nella parte di sopra di lui s'inferisca vna parte della legatura, che nasce del processo suo aguzzo. S'inferita parimente in questa parte di tal'osso, la corda del piu basso musculo di que, che piegano ^g il bracciale. Er dalla parte bassa di questo medesimo osso, nasce vn musculo, che separa il dito picciolo dall'altre dita; & parimente vna parte del ^h musculo di fuori, de due, che piegano ⁱ il prim'osso del dito picciolo. Di modo, che questo quart'osso da niun lato non tocca i suoi compagni, eccetto che da quel di dentro alquanto verso la palma; doue si congiunge con vna testicciuola piana, al lato di fuori del terzo osso del bracciale, mediante quella congiuntura, detta Artrodia, che si riduce alla Synartrosis. Quest'osso è il piu picciolo del bracciale, & quello che ha manco fossi, & tubercoli; anzi è quasi tondo, benche piu lungo, che largo. Perche nascendo di sotto alcuni muscoli, & inserendosi nella parte di sopra vna fortissima corda, fu di bisogno, che fusse piu rileuato di sopra, & di sotto, che da lati. Quest'osso si conta nell'ordine di que di sopra, per congiungersi al terzo di quelli; se ben gli antiqui lo contano da per se. Eccetto quest'osso, tutti gli altri si congiungono in diuerse parti l'vno all'altro; perche il primo (che è gobbo di fuori, & ammacato di dentro, & alquanto piu lungo, che largo) oltre al congiungersi al minor fusello, si congiunge anchora al secondo osso del bracciale, con vna testicciuola larga, che s'incassa in vn seno, che per questo effetto si fa nel secondo osso. Si congiunge anchora per la parte di sotto, al quinto, & sesto osso dell'istesso bracciale, mediante vn tubercolo, che esce di lui, & s'incassa in vn seno commune alle due sopra dette ossa. Fra tanti tubercoli ha quest'osso vn solo seno grande, nel qual s'incassa vna testa del settimo, & piu grande osso del bracciale. Di modo che'l primo osso si congiunge al minor fusello; & al secondo, quinto, sesto, & settimo osso, del bracciale. Il secondo (che è tanto piu picciol del primo, quanto è egli maggior del terzo) è alquanto tondo da ogni parte, eccetto che da quella di sotto, oue è ammacato, & si congiunge al primo, & al settimo, nella forma detta, & al terzo mediante quella congiuntura, chiamata Artrodia, membro della Synartrosis. Di modo, che questo secondo osso si congiunge al minor fusello, & al primo, terzo, & settimo, & quasi tocca l'ottauo. Il terzo si congiunge da lati, al secondo, & quarto, & è tanto incauato che è impossibile, che possa toccare il maggior fusello, & dalla parte di sotto s'incassa in vn seno dell'ottauo, con vn tubercolo grande, ma poco rileuato. Quest'osso è alquanto tondo, eccetto che nella parte di sopra. Del quarto habbiamo gia detto, che sol si congiunge al terzo. Il quinto osso (che è il primo dell'ordine di que di sotto) è in certo modo quadro; & ha nel lato di sopra vn seno, nel qual s'incassa vna testicciuola del primo, & in quel di fuori vn'altro, nel qual riceue vna testa del sesto, & nella parte di sotto vn'altro grande, & alquanto lungo (piu

Perche l'ossa del
Bracciale son
molte.

Come si cōgiun-
gono l'ossa del
bracciale co' fu-
selli.

Historia del
quarto osso del
bracciale.

Historia del pri-
m'osso del brac-
ciale.

Del secondo.

Del terzo.

Del quinto.

d la med. 1.
2. 3. 4.

e la mede. 5.
6. 7. 8.

f per questo,
& que, che
seguono, va
alla tau. vj.
alla fi. viij.
g lib. ij. t. i. ix.
xj. A
h lib. ii. t. iij. q
i li. ii. t. iij. 5

Libro primo

incauato di dentro & di fuori, che da lato o nel mezzo,) nel qual s'incassa vn'altra testicciuola del primo osso del pollice, col mezzo della congiuntura, chiamata Ginglimon spetie della Diartrosi; assai differentemente da quello, che si congiungono l'osfa del bracciale fra se stesse. Ha di piu questo quinto osso, nella parte di sotto, vn'altro seno, commune a lui, & al sesto, nel qual in parte s'incassa il primo osso della palma, che sostiene il dito Indice. Di modo, che si congiunge questo quinto osso al primo, & al sesto del bracciale, & sostiene tutto'l primo osso del pollice, & parte del primo osso della palma. Il sesto osso (che è il secondo & minor di questo ordine) è in certa spetie triangolare, & dal lato di dentro si congiunge al quinto, nella forma detta; da quel di fuori, al settimo, mediante la congiuntura detta Ginglimon, spetie della Synartrosi o mouimento oscuro; per la parte di sopra tocca il primo. Nella parte di sotto, oltre al seno commune al quinto, ne ha vn'altro commune al settimo; nel qual s'incassa parte dell'osso della palma, che sostiene il dito di mezzo. Di modo che questo sesto osso si congiunge al primo, quinto, & settimo osso del bracciale, & al primo, & secondo della palma. Il settimo & maggior del bracciale è in certa forma quadro, & piu lungo, che largo, & per la parte di sotto s'incassa in vn seno, commune al primo & al secondo osso del bracciale, mediante vna testa grande, larga, molto erta; per quella di dentro si congiunge al sesto osso, & per quella di fuori a tutto il lato di dentro dell'ottauo, mediante vna testa poco compressa, & vn seno poco incauato. Questa giunta è couerta in parte con la cartilagine, che lega fortissimamente il settimo osso coll'ottauo. Ma non perciò lascia questo settimo osso di disluogarsi più facilmente dalla banda di fuori, che niuno degli altri del bracciale cosi per l'esser maggiore & non poter cosi facilmente schifare i colpi, come perche la legatura, che lo giunge coll'altre ossa, è alquanto piu sottile in questa parte, che nell'altre del bracciale. Di modo, che questo osso si congiunge al primo, secondo, sesto, & ottauo osso del bracciale, & all'osso della palma, che sostiene il dito di mezzo. L'ottauo osso è quasi triangolare, & entra come cuneo, tra'l settimo, & terzo, a quali si congiunge; al settimo, nella forma detta; al terzo, mediante vn seno che si fa in questo ottauo. Si congiunge anchora alle due ossa della palma, che sostengono le dita Annu'are, & picciolo. Di sorte, che questo osso si congiunge a quattro ossa, & ad vn'altro officello simile al seme del sesame, (per la qual cosa, cosi egli, come i suoi compagni furono chiamati Sesamini, che vuol dir simile al sesame) ilquale è dalla banda di fuori del bracciale; iui doue il quarto osso della palma, che sostiene il dito picciolo, si congiunge coll'ottauo osso del bracciale. Questo officello par che faccia questa congiuntura piu forte, & insieme aiuta a sostenere od appoggiare il detto quarto osso della palma. Ha questo ottauo osso particolarmente nella parte di dentro, verso la palma della mano, vn notabil ^kprocesso incauato come vn C. & del medesimo modo ne ha vn'altro simile ^lil quinto osso del bracciale, anchor che alquanto minore. Dalla punta dell'vn processo a quello dell'altro, si distende vna molto forte & neruosa ^mlegatura, sotto della quale passano sicuramente le corde, che vanno a piegar le dita, senza che possano esser offese, ne poter elleno trasuiare in parte alcuna. Tutta questa parte di mezzo dall'vn processo, all'altro è in certa guisa liscia; perche non si facciano male queste corde, & il resto del bracciale è aspro, perche meglio si attachino le legature, che congiungono le dette ossa.

Del sesto.

Del settimo.

Del ottauo.

k t.vj. fi. viij.
M
l la mede. h
m lib.ij. tab.
iiij. 6.

Del Pettine o Palma della mano.

Cap. 23.

Quante ossa ha la Palma.

PETTINE o Palma della mano si chiama ^atutto quello spatio, che è dal bracciale infino a primi articoli delle dita; il quale anchor che (contando anchora il primo osso ^bdel pollice, si perche in certo modo è parte della palma; si perche noi altri chiamiamo Palma, non meno quella parte, che occupa quell'osso, che'l resto,) potessimo dire che si cõpone di cinque ossa; pure perche il primo articolo del pollice è molto simile al primo dell'altre dita, & per contare, come tutti gli altri contano, io dirò sempre che son ^cquattro; lequali son piu lunghe, che l'altre ossa delle dita, & quasi tonde, & vote, & piene dentro di midolla. Il piu lungo di loro è quel, che sostiene il dito di mezzo, & do-
po

a t.j. ff. t.vj.
fi. viij. i.
b t.vi. fi. viij.
A.
c la med. j. ij.
iiij. iij.

a la med. Q.
R.
e per questo
& quelli che
seguono va
a la tau. vj.
a la si. viij.

po lui quel, che sostiene l'indice, & così di mano in mano son minori. Et tutte queste ossa hanno vna giunta così nella parte di sotto, come in quella di sopra; col cui mezzo ognun di loro si congiunge all'ossa del bracciale in questa forma. Il primo si congiunge mediante due piccole teste, & vn seno, quasi tutto al sesto, & tocca vn poco del quinto, incassandosi nel seno, che dicemo essere commune al quinto, & sesto osso del bracciale. Il secondo s'incassa con vna testicciuola ammaccata, & storta, in vna poco cupa, & alquanto torta impressione, che habbiamo detto hauere il settimo osso nella parte di sotto, & s'incassa anchora in parte nel sesto. Il terzo, & quarto s'incassano amendue nell'ottauo, mediante due assai piccole testicciuole, quasi niente rileuate. Le giunte di queste ossa della palma si vniscono tanto presto cò le sue ossa, che quelle di sopra non appaiono, ne anche ne fanciulli. In questa parte queste ossa son'alquanto piu larghe dalla banda di fuori, che da quella di dentro, & tutte insieme sono gobbe dalla banda di fuori, & ammaccate da quella di dentro, assai piu sensibilmente, che quelle del bracciale. Le giunte di sopra di queste ossa si congiungono l'vna con l'altra, da lati, mediante vna cartilagine, che le lega. Quelle di sotto son parimente grandi, & finiscono in vna testa tonda, & alquanto lunga, (misurandole dalla banda di fuori a quella di dentro) laquale è couerta d'vna cartilagine, & s'incassa nel seno di ciascuno delle prime ossa delle dita, mediante la congiuntura detta Artrodia (spetie della Diartrosi). Si congiungono anchora da lati queste giunte l'vna con l'altra, come dicemmo congiungerfi quelle di sopra, benché non tanto fortemente. Non ostante che per la parte, oue si guardano, hanno così anchora i suoi seni; de quali nascono certe legature di natura di cartilagine, mediante le quali si congiungono molto fortemente. Nel resto, queste ossa non si toccano nel mezzo, secondo il lungo della palma; perche le giunte son piu grosse, che non son l'ossa. Il che fu fatto perche negli tre spatij, che si fanno fra le quattro ossa della palma, potessero star sei muscoli, (de gli otto, che diremo piegare il primo osso delle quattro dita) due in ogni spatij. Sono anchora queste ossa per la parte di dentro, che risponde alla palma, alquanto incauate per dar piu luogo a detti muscoli. Et hanno per lungo alcune righe, & impressioni, secondo che gli stringono i muscoli, che di lor nascono. Et per la parte di fuori, che risponde al pettine della mano, sono alquanto aspre; perche si potessero interire tre muscoli, di que, che muouono il bracciale.

Le giunte di queste ossa.

Come si congiungono l'ossa della Palma al bracciale.

Le giunte di sotto.

Perche le giunte dell'ossa della palma son piu grosse, che non son l'ossa.

f lib. ij. t. viij.
A t. xij. m.

g lib. ii. t. iij.
A t. ix. xi. A

Dell'Ossa delle Dita.

Cap. 24.

a ti. AA t. vi.
fi. viii AB
CDEF.

C IASCUNO Dito della mano si compone di tre ossa, (che si congiungono, mediante tre articoli) molto dure; ma non lasciano perciò d'hauer midolla; anzi oltre a l'esser spugnose da capi (come le giunte), sono parimente nel mezzo vote. Et in ogni dito, il primo è maggiore, & piu grosso, & dopo lui il secondo, & il terzo è il piu picciolo. Et ognun di loro è piu largo al principio, che al fine, & finisce in vna assai picciola testa. Et tutte son piu grosse da capi, che nel mezzo; come anchora sono quasi tutte l'ossa lunghe. Il che fu fatto, perche fossero piu leggieri, & le giunte piu gagliarde. Ma sono le dita vguualmente tonde, & lisce, perche patissero meno non hauendo tubercoli. Sono anchora queste ossa dalla banda di dentro aspre, & incauate, perche possano meglio strigner le cose; da quella di fuori gobbe, perche meglio sopportino; nel mezzo incauate, perche non ci diano disturbo. Il che si dimostra chiaramente nel dito picciolo, il qual dalla banda di fuori, & da quella di sopra è tondo; da quella di dentro, & di sotto incauato. Et parimente il dimostra il dito pollice, che è tondo dal lato di dentro, perche non è guardato con l'altre dita. Tutte l'altre ossa delle dita son tonde per la parte di fuori, tanto, che ne anche ne gli articoli non sono di niente rileuate; eccetto il primo osso del dito pollice, che è alquanto largo, & incauato, & ogni terzo osso delle dita, che se bene per la parte di fuori son gobbe, nondimeno d'appresso l'articolo, oue si congiungono col secondo, infino al fine non escono tanto in fuori, come l'altre, per dar luogo all'vgne. Sono anchora queste ossa per la parte di fuori alquanto incauate (& fanno come vn canaleto, per lo qual passano sicure le corde, che piegano le dita) eccetto il primo osso del pollice, che risponde con la parte di dentro all'ossa della palma. Il quale, anchora che habbia il lato, che mira la palma della mano, piano da amendue i capi, appresso gli

Ogni Dito ha tre ossa.

La grande di queste ossa.

La figura.

D 3 articoli,

Libro primo

articoli, & nel mezzo incauato; non perciò è tanto largo, incauato, & piano, come l'altre ossa delle dita; anzi è gobbo più aguzzo dalla banda di dentro, che da quella di fuori. Il che non fu fatto senza gran ragione; perche non essendoui pericolo, che le corde, che passano a piegare il secondo & terzo articolo di questo dito, potessero trasuiare a parte alcuna (per esser molto ben abbracciati co i muscoli, che diremo esser propinqui a questo osso,) non fu bisogno, che hauesse canale; ne meno bisognò la legatura, che nel secondo libro diremo hauere l'altre ossa delle dita. Nondimeno è da notare che'l terzo osso di tutte le dita, al fine doue non si congiunge cō niun' altro osso, è alquanto rileuato, & ha vna testicciuola aspra con due legature, alle quali si congiunge la corda, che passa per la parte di dentro del dito, & va fin' alla punta, oue finisce. Ma serà ben contare particolarmente la forma, nella quale queste ossa si congiungono. In prima è da sapere, che'l primo osso del pollice si congiunge al quinto osso del bracciale, in tal guisa, che si puo mouer da ogni canto, in su, & in giù; ma assai più facilmente da lati, che in niun'altra parte. Perche il seno dell'osso del bracciale, doue s'incassa, è più fondo dinanzi, & di dietro, che da lati, & la testa di questo osso gli risponde giustamente in figura. Di sorte che la congiuntura si puo riferire al Ginglimon, & alla Artrodia, membra della Diartrosi. Il secondo osso del medesimo dito si congiunge al primo, mediante la congiuntura detta Ginglimon, specie della Diartrosi, anchor che al Vesalio paia vn'altra cosa. Perche il fine del primo osso finisce in vna testicciuola, che entra in vn seno del secondo. Ma perche questa testicciuola è alquanto rileuata dal lato di dentro del pollice verso la bāda di fuori, & alquanto lunga per trauerso, & bassa più da lati, che nel mezzo, & la testa fa la medesima figura al contrario; perciò questo osso si muoue più piegandosi, & distendendosi, che da lati. Ma non si puo distendere più in su, di quanto s'indirizza, per rispetto della testa del primo osso. E parimente da sapere che in questa congiuntura per la parte di dentro si veggono ^b due piccioli officelli, come seme di sesame, iquali disturbano, che'l dito non si pieghi più del douere, come farebbe se questi officelli mancassero, per esser la testa per la parte di dentro alquanto compressa. Il terzo osso s'incassa nel secondo al contrario; perche la parte di sotto del secondo ha due testicciuole, alquanto tonde, diuise mediante vn seno coperto d'vna cartilagine, ne più, ne meno, che le testicciuole. La parte di sopra del terzo osso ha due seni, separati mediante vna collina, che vi sta in mezzo. Et in questi due seni s'incassano le due testicciuole della parte più bassa del secondo. Et nel seno, che habbiamo detto hauere il secondo osso nel mezzo delle due testicciuole, s'incassa la costicciuola, che è nel mezzo de due seni. Di sorte, che'l terzo s'incassa nel secondo, & il secondo nel terzo in tal modo, che si possono distendere, & piegare; ma in niun modo muouere da lati. Et non si possono distendere più, di quanto s'indirizzano per la ragion detta. Con questa tal congiunzione si congiungono il secondo, & terzo articolo di tutte le dita; perche il primo delle quattro dita è simile al primo del dito pollice, et non al secondo, come il Vesalio non guardandoui bene disse. Et perciò a tutte le dita è più facile il distendersi, & piegarli, che muouersi da lati. Anchor che il pollice, l'indice, & il picciolo si muouano alquanto più da lati, che l'annulare o quel di mezzo. Il che intrauiene, per esser le teste dell'ossa della palma (nelle quali s'incassano queste dita) alquanto più compresse da lati. Et i primi articoli delle dita non si piegano tanto, quanto i secondi, & terzi, per cagion di certi officelli, c'grandi come seme di sesame, che sono in questa congiuntura, & non gli lasciano piegare. Si distendono parimente o si riuersano questi primi articoli più in su, che gli altri, per esser le teste dell'ossa della palma meno rileuate, che quelle dell'ossa delle dita. Le quali anchora in alcune persone son tanto compresse, che lasciano piegare le dita manifestamente in su.

Delli Officelli simili al seme del Sesame, chiamati perciò Sesamini. Cap. 25.

*In qual parti si
ritrouano questi
officelli.*

PERCHÉ habbiamo nominati certi officelli, che si trouano nella parte di dentro degli articoli delle dita; è ben sapere particolarmente, in quali articoli o parte del corpo tali officelli si ritrouino. In prima se ne troua vno tra l' ^a quarto osso della palma, & l'ottauo del bracciale. Et due nella parte di dentro ^b del secondo articolo del pollice;

^a t. vi. fi. viii.
N.
^b la med. T

*Il prim'osso del
pollice si congiun-
ge al bracciale.*

*Il secondo di que-
sto dito come si
congiunge al pri-
mo.*

*Il terzo come si
congiunge col se-
condo.*

*Il primo artic-
olo delle quattro
dita è simile al
primo del polli-
ce.*

^b t. vi. fi. viii.
T.

^c la med. V V

pollice, che sono alquanto tōdi, & massicci, & in certo modo simili alle grana del Riso; benché sono alquanto piu corti, perche hāno l'vna parte piu incauata, & coperta d'vna cartilagine, mediante laquale si congiungono al primo osso del pollice; l'vno appresso il lato di dentro della testa di questo osso; l'altro appresso quel di fuori. Et fra l'vno, & l'altro passa vna corda, che diremo piegare e il terzo osso di questo dito. Ce ne sono anchora degli attaccati all'ossa delle dita, che par che siano processi, o testicciuole loro, de quali nascano le legature, & che in loro s'interiscano le corde de muscoli. Ne piu, ne meno si ritrouano due altri ^d ossicelli in ognuno de primi articoli delle dita, tanto piu piccioli l'vno dell'altro, quanto piu s'auuicinano al dito picciolo; nel qual sono piu piccioli, & quasi come cartilagini. Alcuni vecchi hanno anchora nella parte di dentro del terzo articolo del pollice vn'ossicello. Et anche si ritroua vn'altro simil osso in ognuno de secōdi, & terzi articoli delle quattro dita, ma tātō piccioli, che paiono grana di miglio. Et di questi ossicelli in ogni mano ne sono almeno venti. Et nel piede se ne ritroua dell'istesso modo vno, e che risponde al primo di que della mano, iui doue il quarto osso del pettine del piede, che sostiene il dito picciolo, si congiunge coll'osso del collo dell'istesso piede, che diremo esser simile ad vn dado. Ma nelle prime cōgiunture delle dita del piede con difficultà si ritrouano, eccetto che nel dito pollice; benché ne vecchi, (per esser alquanto maggiori) si ritrouino con manco fatica. Nelli secondi, & terzi articoli quasi non si veggon mai, fuor che nel dito pollice. Nel qual si ritrouano due ^s ossicelli assai grandi (benché non tanto, quanto quelli, che sono nella congiuntura del medesimo dito) de quali quel di dentro è assai maggiore. Et ha ognun di loro (in quella parte, che si congiunge alla testa dell'osso del pettine del piede, che sostiene questo dito) vn seno coperto d'vna cartilagine. Per la parte di sotto verso il suolo son tondi, & simili alla parte cupa del fagiuolo. Questi ossicelli sono assai forti, & oltre al giouare a non lasciar piegare gli articoli (come gli altri) seruono anchora a guardar le corde, che passano a piegare il secōdo, & terzo osso del pollice. Perche essendo lor rileuati, passa come fra due coste la corda; in modo che nel posare il piede in terra non la potemo ammaccare. L'vno di queste ossa, è quello, del quale tanta mentione fecero molti Incantatori, Dicendo, che era vn'ossicello nell'huomo, ilquale era incorruttibile, & che di lui si hauea da fare l'huomo il di del giuditio, come di seme. Ma quanto questo sia la verità, lo lasciamo determinare à Theologi, insieme col risolvere, quanta ragione habbiano le Fatucchiare o Streghe di cercar questo osso per suoi incanti, & ribalderie, come cosa di virtù grandissima.

Quanti ossicelli sono ne piedi, simili al seme del fagiolo.

L'osso de gli incantatori.

Dell'Ossa dell'Anche, o de Galloni.

Cap. 26.

A Gli processi de lati dell'Ossa grande, si congiungono due grand'ossa, da ogni lato vno, che chiamiamo l'Anche, o Galloni, ognuno de quali si compone di tre ossa; che si congiungono negli huomini, mediante la sorte di congiuntura chiamata Vnione. Il primo di loro fa la parte piu alta, che risponde al fianco, chiamata da Latini Os Ilium; da noi altri la punta dell'Anca, o del Gallone. Il secondo fa quella di sotto, doue s'incassa la testa dell'osso della coscia, chiamata da Latini Coxendix; da noi altri l'Anca, o il Gallone. La parte dinanzi chiamano essi Os Pectinis; noi altri l'osso del Pettignone. Queste ossa furono fatte, perche in loro s'incassassero le gambe, & perche aiutati ero a sostenere gli intestini, & la vesica, & nelle donne la matrice. Et furono fatte molto grandi, & con molti processi & tubercoli, perche haueano a nescer di loro quasi tutti i muscoli, che muouono la coscia, & alcuni di que, che muouono la gāba, & il petto, & la schiena. Et per la parte, oue si congiungono coll'osso grande, hanno molto differenti figure; come anchora dicemmo hauere le punte de processi, de lati ^b dell'osso grande. Perche ad ogni seno di questi processi risponde vn tubercolo, & ad ogni tubercolo vn seno. A tale, che s'incassa l'osso grande cō ognuno di queste in varij luoghi; hora entrādo l'uno nell'altro, hor al contario. Nondimeno è tanto giusta questa congiuntura, che non si possono l'ossa muouere. Perche ne fanciulli si congiungono, mediante vna riga, o harmonia; ne gli huomini di età, mediante la vnione. La figura delle parti di queste ossa facilmente si potrà vedere, per la figura delle punte de processi dell'osso grande. I quali (come dicemmo) hanno in prima vn lungo seno, a cui risponde in queste ossa vn lungo tubercolo,

L'osso dell'Anche che si compone di tre.

L'officio di queste ossa.

La figura de lati dell'ossa dell'Anche, che si congiungono all'osso grande.

Libro Primo

bercolo, conueniente a lui. Et alla parte dinanzi, o labbra de seni de processi (che dicemo essere manifestamente rileuati) rispondono i seni, che sono nella parte di dentro di questo tubercolo, ne quali queste labbra s'incassano. Et a quella di dietro de medesimi seni, che è alquanto piu bassa, rispondono certe labbra, o processi di queste ossa, che assottigliandosi (come scaglia) fanno vna incastratura piana, col quarto processo de lati dell'osso grande. Et al tubercolo d'lungo, che si vede nel mezzo de seni de processi, de lati dell'osso grãde, risponde vn lungo seno, che hãno queste ossa, nel quale i detti processi s'incassano. E ben vero, che queste ossa non rispondono tanto particolarmente a gli due seni, che habbiamo detto farsi nella parte di dietro de processi, de lati dell'osso grãde, passato quel tubercolo lungo, che habbiamo detto; ne meno al tubercolo, che gli diuide in due seni, vn'alto, vn'altro basso: si perche queste ossa non sono tanto rileuate, quanto i seni incauati, come perche il tubercolo, che diuide questi seni, non fu fatto per incassarsi in questa parte de galloni. Anzi è tra l'vna parte, e l'altra vna grossa cartilagine, di natura di legatura, laquale empiendo tutto quello spatio non gli lascia, che si tocchino. Ma è da notare, che tutta la parte di queste ossa, che si cõgiunge all'osso grãde, è aspra, & disuguale, & molto grossa, (come anchora sono tutte l'ossa nelle parti, oue si cõgiungono a l'altre, perche sieno piu forte) & esce assai piu a dietro, che i processi de lati dell'osso grande; si perche fu bisogno, che fussero queste ossa piu grandi, per amor de muscoli, che nascono di loro; come perche sostengono tutta la persona. Il resto d'ognuno di queste ossa, che chiamiamo la punta del gallone, è come mezzo cerchio, o come vn vètaglio. Et ha tutto intorno dalla parte piu alta vna ^f giunta, che fa come vn orlo tondo, che esce alquanto in fuori. Et per la parte di fuori è aspra, & disuguale, & ha certe impressioni, così dalla banda di dentro, come da quella di fuori; dalla banda di dentro, perche sia piu larga, & riceua la parte carnosà ^g del musculo, che attrauersa il ventre; da quella di fuori, perche nasca la maggior parte ^h del musculo del ventre, che monta in obliquo, & s'interisca i il primo, che scende similmente in obliquo; perche questi tre muscoli occupano tutta questa parte; laquale è piu grossa dalla banda dinanzi, & nella parte di sopra, che verso i lombi. La parte dinanzi di questa giunta è particolarmente piu grossa; perche nascono di lei il ^k primo, & sesto musculo, che muouono la gamba. Ha parimente ognuno di queste ossa nel mezzo, dalla parte di dentro, vna picciola, & larga impressione, che si vede in scõtro de processi, de lati del quinto osso de lombi, della qual nasce il nono ^l musculo, che muoue la schiena. Oltre a questa impressione tutta questa parte è incauata, & aspra; & di lei nasce il settimo, che muoue la coscia, come al suo luogo diremo. Et l'altra nel lato di fuori, appresso la parte piu alta del fosso, nel qual s'incassa la coscia (ad ogni lato del qual è vn notabil tubercolo, che lo fa parer piu cupo,) che guarda, che le corde del setto, & settimo ^m musculo della coscia, che passano per lui, non ribalzino. Di questi tubercoli quel dalla banda di fuori serue al nascimento del nono ⁿ musculo, che muoue la gamba; pel cui rispetto, questa parte di fuori è alquãto aspra, & disuguale, & ha vn picciol seno, del qual nasce la ^o corda di questo nono musculo. Quello, che è dalla banda di dentro, fa questo osso piu grosso, & forte; come fu di bisogno, douendo incassarsi in lui la testa dell'osso della coscia, & douendo essere il fosso, che si fa in questo osso, (nel qual s'incassa il detto osso) assai piu incauato, che quello di niun'altro. Et per questo la parte di questo osso chiamata la Pũta dell'Anca, o del Gallone, è anchora piu grossa nella parte piu alta, che si congiunge con l'osso grande, & fa vna costa, che si distende quasi fin'al lato di dietro del secondo tubercolo, facendo questo osso piu forte, & dando anche luogo al nascimento del decimo ^p musculo, che muoue la coscia verso la banda di fuori. Il lato di fuori dell'osso del gallone, è piu aspro, che quel di dentro, & di lui nascono tre muscoli, che (come diremo) occupano tutta questa parte, & si diuidono secon do la diuision delle due righe, che caminano in arco per lei, & la diuidono alquanto oscuramente in tre parti. E parimente da notare, che la parte di mezzo del fosso, o seno di questo osso (nel qual dicemo incassarsi la testa della coscia) è alquanto piu rileuata che'l suo resto, & alquanto aspra, & questa parte sola non è couerta di cartilagine; anzi è piena di certi pertugietti, de quali nasce la ^q legatura tonda, che habbiamo detto inserirsi nel mezzo della testa dell'osso della coscia. Oltre di questo le labbra di questo seno non sono tanto rileuate dalla parte dinãzi, come in quella di dietro; il che aiuta, che sedendosi, possiamo ben piegare

La figura della punta del gallone.

La giunta di questa parte.

Certe impressioni, & tubercoli di quest'osso.

Il lato di fuori dell'osso dell'anca, o del gallone.

Il fosso di questa parte.

d la me. O O

e t.iii. o
f ta. i. ii. iii.
ii. 12. 13.

g li. ii. t. vi. Δ
h lib. ii. t. iii.
i li. ii. t. i. Θ

k lib. ii. ta. i.
Σ x
l li. ii. ta. viii.
Σ

m li. ii. t. vii.
x
n lib. ii. t. iii.
o. t. xv. fig. i.
F G. t. xiii. r
o t. ii. 11.

p lib. ii. t. xv.
fi. xvi. E E

q li. ii. ta. xv.
fi. xvii. o

gare la coscia, secondo che era di bisogno. Ma è da notare, che per la parte piu bassa di questo seno, le labbra non vanno tutto intorno continuamente; anzi s'interrompono, per dar luogo ad vna picciola ^a vena, che diremo passar per questa parte, & camminare verso quella parte aspra, che non è coperta di cartilagine; dando a questa cōgiuntura nutrimento, di cui fassi quello humor viscoso, che si vede in lei, & la mātiene humida, & fa, che piu facilmente si muoua. Ha cosi anchora questo seno tutto, intorno all'orlo vna cartilagine, che esce alquanto in fuora, & cuopre quella incauatura per doue passa la detta vena, & abbraccia la testa dell'osso della coscia in tal forma, che non la lascia cosi facilmente disfluogarsi; anchor che cō tutto questo si disluoghi piu facilmete per quella parte oue passa la detta vena, che per niun'altra. Ha di piu questo osso fra la parte di sopra, chiamata la punta del gallone, (che si congiunge coll'osso grande, & la parte dell'istesso osso, doue s'in cassa la coscia) vn seno, come canale; per il qual diremo passare il quarto ^s neruo, che va alla gāba. E anche da notare in questo osso vn processo ^a aguzzo, del qual nasce vna ^a legatura, che finisce nel processo de lati, del quinto nodo dell'osso grāde, & anche il principio del decimo, o secondo vn'altro cōto, dell'vndecimo ^x musculo, che muouē la coscia. Ne manco è da scordarsi vn seno, che è nella parte di dietro ^y del lato di dentro di questo osso, di sotto al processo, a cui si lega con marauiglioso artificio, come ad vna Carrucola, il decimo ^z musculo, che muoue la coscia. Ha di piu questo osso nella parte piu bassa, sopra laqual sedemo, vn ^a processo, fatto d'vna giunta larga, & gōssa, quanto l'osso istesso, cosi perche sia piu forte, come per gli quattro ^b muscoli, che (come diremo) nascono di lui. In tal guisa è fatta la parte di queste ossa, chiamata Anca, o Gallone, laqual nelle donne è assai piu larga, che ne gli huomini, come anche sono i processi de lati, dell'osso grande; perche vi capeffe meglio dentro la creatura. La parte dinanzi di ^c questo osso, che communalmente chiamiamo l'osso del Pettignone, è alquanto piu sottile, che la sopra detta, & si congiunge con la sua cōpagna, mediante vna ^d cartilagine, che le lega tanto giustamente, che paiono vna, & quanto piu cresce l'huomo, tanto manco appare questa cartilagine, che vi sta in mezzo, cosi ne gli huomini, come nelle donne. Ma nelle donne non si congiungono queste ossa per tanto lungo spatio, come ne gli huomini, ne mai s'aprono nel parto, come alcuni pensano. E ben vero, che nella parte piu bassa vicino doue si cōgiungono, sono piu separati, l'vno dall'altro, nelle donne, che ne gli huomini, come anche sono l'altre parti piu basse d'ognun di loro; accioche con manco tra naglio potessero partorire. Al che aiuta molto il ^e Codione, torcendosi nel tempo del parto, (come dicemmo) all'indietro, come facilmente si puo vedere ne gli animali bruti. Et le donne il conoscono chiaramente in se stesse, perche non le lascia sedere tutto quel tempo del parto, & sedendo partoriscono con piu trauaglio; ma, se stanno inginocchione, & piegate alquanto innanzi, partoriscono con manco trauaglio. Ha ognuno di queste ossa del pettignone vn gran buco, che lo fa assai piu leggiero, & è turato cō due ^f muscoli, & vna ^g tela, che è nel lor mezzo, come al suo luogo diremo, & per questo buco passa solamente vn ^h neruo, & vna vena & arteria, non pel suo mezzo, anzi per vn seno, che si fa nella parte sua di sopra. La parte piu alta di queste ossa è aspra, & di lei nascono i due muscoli ^k diritti del ventre. La parte della banda dinanzi è parimete aspra, & delle asprezze nasce il principio neruoso del secondo ^l musculo, che muoue la gamba. Si vede parimete in questa parte vna testicciuola, che piglia dal lato di dentro del seno grande, dell'osso del gallone, fin'alla congiuntura delle due ossa del pettignone, & di lei nasce l'ottauo ^m musculo, che muoue la coscia. A questa costicciuola corrisponde nella parte di dietro vna riga aguzza, dalla qual nasce vna parte del decimo ⁿ musculo, che muoue la coscia. Resta a dire, che queste ossa sono alquanto grosse, appresso la parte piu bassa, oue si congiungono, & appresso i buchi, che habbiamo detto hauere, nella qual parte son grosse, & quasi tōde; perche fussero piu forti, & perche d'ognuna di queste parti nascessero alcuni muscoli del membro, & vna parte di quel corpo, del quale egli è fatto. Tutto questo osso, se bene ne gli huomini di età pare vn solo, & non ha piu d'vn nome; nōdimeno ne fanciulli si diuide in tre (come habbiamo detto, secondo i tre nomi, che dicemo lui hauere) mediante due righe piene d'vna cartilagine. La prima delle quali comincia dalla parte di dietro di questo osso, poco piu innanzi, a doue si congiunge coll'osso grande, & cammina dirittamente, attrauerando per mezzo del seno, nel qual s'inserisce l'osso della

Vna cartilagine, che raggrira tutto questo osso.

Vna giunta di questa parte.

L'ossa dell'anche sono piu larghe nelle donne. L'osso del pettignone.

L'ossa del pettignone non s'aprono nelle donne.

L'osso dell'anche, o de galloni si diuide in tre.

Libro Primo

della coscia, & per mezzo del buco dell'osso del pettignone, vn poco piu in su del mezzo. L'altra scende dalla parte piu alta di fuori dell'osso del pettignone, & finisce nel mezzo del seno, nel qual s'incassa la coscia congiungendosi con la prima. Ma perche queste righe non meno si ritrouano ne gli agnelli, & capretti, che ne gli huomini, facilmente le potrà ognuno in lor vedere.

Dell'Osso della Coscia.

Cap. 27.

L'osso della coscia è il maggior di tutte l'altre ossa. Come si congiunge questo osso al l'osso del gallone.

Come si congiunge con la gamba.

Il seno, che si fa fra le due teste da basso di questo osso.

I processi dell'osso della coscia. Il minore.

Il maggiore.

L'OSSEO della Coscia, ne gli huomini è il piu lungo di quante ossa siano nel corpo, & ha da amendue i capi vna giunta. Di queste due giunte ^a quella dalla banda di sopra si congiunge all'osso del gallone, quella di sotto ^b si congiunge, (come habbiamo detto) al maggiore stinco della gamba, benche in varia forma. Perche la parte di sopra si congiunge, mediante vna gran testa tonda, che esce d'vn ^c collo, alquanto torto in dentro, che ha questo osso, & s'incassa in quel fosso grande, che dicemo hauer l'osso del gallone; al quale giustamente risponde cosi in grandezza, come in figura. Questa testa è tutta coperta d'vna cartilagine; ma nel mezzo della coronella, o centro suo, alquato verso in giù, è vn picciol fosso stretto, & profondo, & alquanto disuguale, nel qual s'inferisce la ^dlegatura tonda, che dicemo nascere del centro di quel seno, che (come habbia detto) è nell'osso del gallone. Quella di sotto, si congiunge, mediante le due ^eteste (in le quali si diuide,) maggiori, che quelle di niun altro osso. Lequali montando piu dalla banda di dietro, che da quella dinanzi, non solo son cagione, che la gamba si distenda, o pieghi, quato fa bisogno, ma seruono anche, che di lor nascano alcuni muscoli di que, che muouono ^fil piede, & s'inferiscono alcun'altri, che muouono ^gla gamba, & la coscia, come al suo luogo diremo. Questa congiuntura per niun modo si muoue da lati; perche sono le teste molto rileuate da amendue i canti, & nel lor mezzo è vn seno comune ad amendue, nel qual s'incassa la ^hrotula del ginocchio, come ⁱal suo luogo diremo. Fassi anchora fra queste teste nella parte di dietro, vn altro piu gran seno, ^k& alquanto aspro, il qual non è couerto di cartilagine; perche s'incassa in lui vn tubercolo aspro, & disuguale, che ha il maggior stinco; il qual sta rileuato nel mezzo de seni di detto stinco, dando principio ad vna fortissima legatura, che s'inferisce in questo seno; insieme con vn'altra, che parimente è molto forte, & nasce della parte di dietro del medesimo stinco. Serue oltre di ciò questo seno a dar luogo al maggior ^lneruo della gamba, che passa piu sicuro per lui, accompagnato da vna vena, & arteria. I lati di queste ossa hanno di molti pertugi, che non appaiono; de quali nascono certi fortissimi legami, che legano questa congiuntura. Nò dimeno nel lato di fuori della testa esteriore, alquato a dietro, si vede vn particolar seno, posto alquato in obliquo; per lo qual diremo passare sicuramete la corda del quarto ^mmusculo, che muoue la gamba, senza poter piegare a parte alcuna. La testa di dentro ha dalla parte di dietro vna picciola impressione; per la qual passano le corde de tre primi muscoli, & del quinto, che muouono la gamba. Ha questo osso nella parte piu alta, vicino alla radice del collo, due processi, vno ⁿ nella parte di fuori, che è il maggior di quanti ne habbiano l'ossa, & fatti d'vna molto notabil giuta; vn altro in ^o quella di dietro alquato a dietro, & piu a basso, che quella di fuori, il quale è piu picciolo, & si fa anch'egli d'vna giunta. Questi processi chiamano i Greci Trochantiras, per esser simili a i piccioli, aggiungendoui grande, o picciola; ma, quando semplicemente la nominano, intendono la maggiore. Del processo di dentro nascono le corde del sesto, & ^psettimo musculo, che muouono la coscia; & in vna riga aspra, che ha questo processo, appresso la radice, che scede alquato storta verso dietro fin circa la terza parte dell'osso, s'inferisce l'ottauo ^qmusculo, che muoue la coscia. Il processo maggiore dal lato di fuori è gobbo, & ne gli huomini osuti, et di età mostra quattro fossetti, o seni. Il primo de quali è il maggiore, & piu largo, & è nella parte di dietro di questa gobba. Del fin di questo seno nasce vna riga aspra, che cala dalla bada di dietro dell'osso alquato intorta, nella qual diremo inferirsi vna parte del primo ^rmusculo, che muoue la coscia. Il secondo seno è nel lato dinanzi, & è piu aspro che'l primo, & alquanto incauato. Il terzo è tra'l primo, & secondo, vn poco piu alto, & è alquanto gobbo. Il quarto è nella punta di questo processo, & è assai piu stretto, che niuno de gli altri. In questi seni, s'inferiscono i quattro primi muscoli, che muouono

a ta. ij. iij. 17
b la med. 16.

c t. ij. iij. 18

d lib. ii. t. xv.
fig. xvij. O
e t. ij. iij. 16.

f lib. ij. cap. xxxvij.
g li. ij. t. xij.
r. t. xij. E
h ta. i. ij. E
i cap. xxvij.
k ta. iij. tra't 16. & 17.

l li. ii. t. ix. A
t. x. 49

m li. ij. t. x. P

n t. i. ii. iii. T
o t. j. ij. iij. 4

p li. ij. t. viii. @ A
q li. ii. t. vii. @

r lib. ij. ta. ix. II. t. x. A

s lib. ii. t. ix. ^{π. t. x. x} muouono la coscia, nel primo * il primo, nel secondo * il secondo, & così di mano in mano. Ha di piu questo processo appresso la radice sua (nella parte dinanzi, verso la banda di fuori) vna asprezza, nella qual s'inferisce il ^u settimo musculo, che muoue la coscia. Il resto di questo osso è quasi tutto tondo, & liscio in ogni parte, eccetto che in quella parte dinanzi, appresso il collo, nella quale è aspro. Et di questa asprezza nasce * l'ottauo musculo, che muoue la gamba, & circonda questo osso da ogni parte, eccetto che da quella di dietro, che ha vna riga alquanto rileuata, aguzza, & ineguale, che comincia dal fin de processi, & scende fin quasi piu della metà dell'osso, nella qual s'inferisce fortemente il ^y quinto musculo, che muoue la coscia. Nondimeno nella parte piu bassa di questa riga appresso le radici delle teste di sotto, questo osso è largo, & piano, & per questa pianura passa alla gamba vna gran vena, accompagnata da vn neruo, & vna arteria. Oltre di cio questo osso non scende diritto da doue s'incassa col gallone; anzi il suo collo scende in obliquo in fuora, come dicemmo, & anche quasi al trauerso. Il che fu fatto per dar luogo a i muscoli, vene, & arterie, che passano per la parte di dentro della coscia. Il resto di questo osso scende fin'al ginocchio storcendosi alquanto in fuora.

De gli Stinchi della Gamba.

(ap. 28.

a ta. i. ii. ii. e ^{π. t. vi. fi. ix.} **D**AL Ginocchio al Collo del piede ci sono ^a due ossa, che rispondono a que del braccio, dal gomito alla mano. Delle quali quel che sta nel lato di dentro della gamba, è il piu grosso; Il quale i Latini chiamano comunalmente Tibia; noi altri lo Stinco, ouero il maggior Fusello della gamba, per esser assai piu grosso, che l'altro, che è verso il lato di fuora; Il quale i Latini chiamarono Sura, o Fibula; noi altri per schifare confusione lo chiameremo sempre lo Stinco minore della gamba. Amendue questi stinchi hanno le sue giunte, così nella parte di sopra, come in quella di sotto. Ma quella parte di sopra del maggior stinco è assai piu grossa, & larga, che quella del minore, & la medesima giunta è anche piu larga dinanzi, che di dietro, nella qual parte scende piu in giù. Questa giunta ha nella parte piu alta due ^b seni, come due mezze Lune, separati mediante vna ^c costicciuola aspra, & disuguale, & couerra d'vna cartilagine sdruciolosa; ne quali s'incassano le due teste dell'osso della coscia, & la costicciuola s'incassa nel seno, che dicemo separar le dette due teste dell'osso della coscia per la parte di dietro. Et nel mezzo della parte piu alta di questa costicciuola, che non è couerta di cartilagine, è vn'aspra impressione, della qual nasce vna molto forte ^d legatura, che s'inferisce nel seno, che habbian detto di uider le due teste dell'osso della coscia. La parte dinanzi non è molto rileuata, anzi è compressa, & aspra; pur di lei non nascono altre legature, che quelle, che congiungono ^e certe cartilagini alla parte dinanzi di questa costicciuola, le quali (come subito dirò) fanno piu grandi i seni del maggior stinco. Perche essendo eglino poco cupi, & non corrispondendo alla grãdezza delle teste dell'osso della coscia, che s'incassano in loro; rimediò la natura al difetto, creando in ognuna vna cartilagine oltre alle ordinarie, le quali non sono attaccate all'osso della coscia, ne al maggior stinco, se non mediante certe legature, che abbracciano tutt'intorno la congiuntura del ginocchio, delle quai nascono queste cartilagini. Et mediante queste cartilagini si congiungono alla parte dinanzi, & a quella di dietro della costicciuola, che separa i seni del maggior stinco, ne quali dicemo incassarsi le teste dell'osso della coscia. Queste ^f cartilagini sono assai piu tenere di quello, che sogliono essere ordinariamente le cartilagini, & quasi di natura di legatura, & per la parte, oue si congiungono all'ossa, sono assai vguale, sdruciolose, & lisce, & couerte d'vn humor vntuoso. Tutto intorno all'articolo son ^g grosse, & finiscono assottigliandosi assai innanzi al centro ^h de seni, in modo, che ognuna di loro rappresenta l'istessa figura d'vna mezza luna, che fanno i seni, ne quali s'incassano. Et perciò nel mezzo de lati sono assai piu grosse, & da capi appresso la costa, dinanzi, & di dietro, che separano i detti seni, sono assai piu ⁱ sottili, & finiscono in certe pùte aguzze, col mezzo delle quali si congiungono, l'vna all'altra. Benche le punte di queste cartilagini, che toccano la parte di dietro di questa costa, sono alquanto piu separate, & pel lor mezzo passa vna grossissima legatura, che nascendo di questa costa s'inferisce nell'osso della coscia. Presopposto questo, facilmente si vede, come mediati queste cartilagini i seni dello stinco maggiore della gamba si fanno piu

Il maggior stinco della gamba.

Il minore.

Le giunte de gli stinchi della gamba.

Le cartilagini del ginocchio.

La sostanza, et figura di queste cartilagini.

Libro Primo

*Come si cōgiun-
gono questi stin-
chi, dalla parte
di sopra.*

*Come si cōgiun-
gono da quella
di basso.*

*Come si cōgiun-
gono gli stinchi
della gamba al
tallone.*

*Il seno, che fan-
no q̄sti due stin-
chi in questa par-
te.*

*Il Tallone di de-
tro.*

*Il Tallone di
fuori.*

*Il Tallone non
appare.*

piu cupi non meno negli huomini, che negli altri animali. In questa forma si congiun-
ge lo stinco maggiore all'osso della coscia. Il minore non monta tanto in su, che si possa
incassare nell'osso della coscia, & perciò si congiunge ^k ad vn tubercolo, che è nella parte
di fuori della giunta del stinco, couerto alquanto (verso la banda di dietro) d'vna cartila-
gine, co' l mezzo d'vn seno, che ha nel lato di dentro, della parte di sopra, alquanto cupo,
largo, & couerto nella medesima forma d'vn'altra cartilagine. Di sotto ^l si congiunge
anchora al maggior stinco, benché in differente modo. Perche il lato di fuori di questo
stinco ha vna lunga impressione, nella qual s'incassa il lato di dentro del minor stinco,
che è vn poco rileuato, & alquanto aspro, come è anche la impressione. Ma non è couer-
to di cartilagine alcuna, anzi si congiungono amendue gli stinchi in questa parte, mediā
te vna molto forte legatura, che gli abbraccia non solamente tutto intorno, ma doue
anche si congiungono, entrando fra l'vno, & l'altro. Siche si congiunge la parte di sopra
della giūta del maggior stinco all'osso della coscia, & quella di fuori al minor stinco del-
la medesima gamba, nella forma detta. La parte dinanzi ^m di questa giunta è alquanto
ammaccata, & aspra, & in questa asprezza s'inferiscono le corde de ⁿ muscoli, che muo-
uono la gamba, per cagion de quali la parte piu alta della bāda di fuori di questa giunta
del maggior fustello si vede vn poco rileuata, & in lei s'inferisce (come diremo) la corda
del ^o quarto muscolo, che muoue la gamba. Fa parimente il minor stinco in questa parte
vna testicciuola, della qual nasce il settimo ^p muscolo, che muoue il piede. Et le giunte
di sotto di questi due stinchi hanno ognuna vn processo; il maggior nella banda ^q di den-
tro, il minore in quella di ^r fuori, che scende all'ingui. Et fra l'vno, & l'altro si fa vn seno,
come vna forchetta, nel qual s'incassa l'osso del tallone, mediāte la cōgiuntura, chiamata
Ginglimon, specie della Diartrosi. Ma del tallone al suo luogo diremo. Hora mia inten-
tione è di trattar solo del seno, che in questa parte bassa fanno amēdue gli stinchi. Il qua-
le è piu largo, & par che sia diuiso in due; perche ha nel mezzo vna ^s costicciuola, lūga, &
alquanto rileuata, & da lati è manifestamente piu cupo. Il processo del minor stinco per
la parte di fuori, che risponde al seno, è concauo, & liscio, come il medesimo seno, & co-
uerto di cartilagine; ma per la parte di dentro, che mira l'altra gamba, è gobbo, & facil-
mente si sente al tocco, per non esser couerto di carne, & è quella parte di dentro ^t della
gamba, che communalmente, chiamiamo il Tallone. Nella parte piu bassa di questo pro-
cesso si fa vna impressione, della qual nasce vn ^u legame di natura di cartilagine, che lo le-
ga coll'osso del calcagno. Ha anchora questa giunta nella parte piu bassa dalla banda di
dinanzi vn ^x seno, alquanto lungo, aspro, & difugale, del qual nasce vn'altra legatura, che
giunge a questo stinco il ^y collo dell'osso del tallone. Et la parte di dietro di questa giun-
ta, vicino a doue fa il tallone, è alquāto incauato di dētro, & sono in lei alcuni seni circō
dati di certe legature intrauerfate; di sotto le quali passano sicuramente (come diremo)
le corde d'alcuni ^z muscoli, senza poter disuiare da lato alcuno. La giūta del minor ^a stin-
co si fa anche ella piu grossa, & facendo il tallone di fuori, scende tanto piu, che la giun-
ta del maggiore; quanto piu appresso il ginocchio monta piu quella del maggiore, (&
per tal ragione piu rade volte si disluoga il tallone della banda di fuori, che da quella di
dentro,) di modo che vengono ad esser lunghi, tātō l'vn comel'altro. Il processo di que-
sta giunta, che fa il lato di dentro, è tanto gobbo, & tanto couerto di cartilagine, che fa
parere, che piu tosto s'incassi egli nel tallone, che al contrario. Nondimeno con tutto
questo cuopre giustamente tutto il lato di fuori dell'osso del tallone. Questa giunta, &
quella dell'altro stinco abbracciano l'osso del tallone da ogni parte, eccetto, che da quel-
la ^b dinanzi, doue anchor che elle nol cuoprano, è molto bē couerto cō le corde, che pas-
sano per lo collo del piede alle dita; & da la parte di ^c dietro, doue anchora è couerto di
certe corde, che s'inferiscono nell'osso del calcagno, & da altre, che passano per questa
parte al piede. Di modo, che da niuna via può esser tocco l'osso del tallone; perche que-
che noi chiamiamo Talloni, nō sono, che queste due teste, o giūte di questi stinchi, come
habbiām detto. Delle quali quella della banda di fuori ha nel lato di dietro vn gran seno,
couerto d'vna legatura, intrauerfata, sotto della quale passano le corde del sesto, & setti-
mo muscolo, che muouono il piede. Et nella parte piu bassa del lato di dentro alquanto
a dietro, piu in giu di questo, ha vn ^d altro seno fondo, & aspro, di cui nasce vn ^e legame di
natura di cartilagine, che lega q̄sto minor stinco all'osso, chiamato veramēte il tallone.

Nel

k t.vj. fi. ix. v

l la med. x

m la med. AB

n lib. ij. ta. vj.

56. t. vij. ag

h i c

o li. ij. t. x. v

t. ij. a

p lib. ij. t. ij. x

t. vj. φ

q t. ij. iij. x

t. vj. fi. ix. D

r la med. φ. E

f la med. q

t lib. ij. t. ij. x

u li. ij. t. vij. a

x t. vj. fig. ix.

presso l'el

y la med. fig.

x. N

z lib. ij. t. xv.

fi. i. DEOP

a ta. j. i. iij. φ

t. vi. fi. ix. E

b t. ij. iij. o. t.

vj. fi. x. O

c ta. j. iij. o.

t. vj. fi. x. E

d lib. ii. ta. xv.

fig. xvij. g

e t. vj. fi. ix. Y

f la med. **r** Nel resto questi stinchi sono separati, l'vno ^f dall'altro, per tutto il lungo loro; perche essendo le teste del maggiore, a cui si congiunge il minore, tanto grosse, & il lor resto tanto sottile, non possono in modo alcuno toccarsi sendo amendue diritte. Ben è vero
g la me. **op** che l'menor stinco si storce alquato in dentro nel ^s mezzo, & in questa parte tanto piu, o meno si congiunge al maggiore, quanto piu, o meno si storce. Et il minor stinco tutto
h la med. **ff** (eccetto il lato di fuori dal ^h mezzo in giu, & la giunta di questa parte, che si veggono scarnate) è couerto di certi muscoli, che l'abbracciano in tal modo, che l'fanno consentire, & diuentar quasi di figura triangolare, principalmente nel suo mezzo, secondo il lungo; nella qual parte è aguzzo di nanzi, & fa vna riga ⁱ molto rileuata, che è il primo canto del triangolo. Di dietro è alquanto piano, & ha da ogni lato vna riga manifestamente rileuata; delle quali quella di dentro ^k fa il secondo canto; quella di fuori ^l il terzo. Questi
k la med. **pp** tre canti abbracciano tre lati. Il primo è fra'l primo ^m canto, & il secondo; & insieme col
l med. **x** lato di fuori del maggior stinco da luogo a certi ⁿ muscoli, che cominciando dalla parte
m lib. ii. t. iii. di nanzi della gamba, vāno alla parte di sopra del piede; de quali al suo luogo diremo. Ci
n lib. ii. t. v. **o** è anchora in questo primo lato vna riga picciola, della qual nasce il muscolo, ^o che disten
o lib. ii. t. v. **p** de il pollice. Il secondo lato è fra'l primo canto, & il terzo; & è largo, & alquanto incaua
p li. ii. t. vi. **q** to, & aspro; & per lui passano il ^p settimo, & ottauo ^q muscolo, che muouono il piede, &
q la med. **r** l'ottauo nasce tutto d'vna asprezza, che si fa per tutto questo lato. Il terzo lato è fra'l se
r li. ii. t. xiii. **A** condo canto, & il terzo; & per lui passano i muscoli, che fanno la polpa della gamba, &
s lib. ii. t. xv. **fi. xvii. a** principalmente quello, che piega il secodo ^r osso del pollice, che nasce di questo lato. Ma
 è da notare, che nasce della secoda riga vna ^s tela, laquale empie tutto lo spatio fra l'vno
 stinco, & l'altro; & gli lega amendue inferendosi nella seconda riga del maggior stinco, che è anche nel mezzo in certa forma triangolare. Et la prima riga, o suo cantone è nella parte dinanzi, & è quella, che comunalmente chiamiamo lo Stinco; la seconda è in quella di fuori; la terza è in quella di dentro. Questa terza è alquato soda, & quasi tonda; la seconda è piu aguzza, & sottile. Queste tre righe fanno anchora tre lati. Il primo è tra la prima, & secoda; il quale è piano, & alquato incauato; & per lui passano gli medesimi muscoli, che dicemo passar pel primo lato de minor stinco. Il secondo è fra la prima riga, & la terza; & è manifestamente incuruato, pur non è couerto di muscolo alcuno. Il terzo è fra la seconda riga, & la terza; & non è molto incauato; & per lui passano gli muscoli, che fanno la polpa della gamba, & principalmente ^t quello, che piega il terzo osso delle quattro dita; & ^u il quinto, che diremo muouere il piede. Ha similmente, oltre di ciò, questo terzo lato nella parte piu alta, vna riga aspra, & intrauersata, nella qual s'inserisce quel ^u muscolo, che si chiama il muscolo nascosto nel chino de ginocchio.

Figura del minor Stinco secondo il lungo.

Figura del maggior Stinco.

Della Rotula del Ginocchio.

Cap. 29.

a t. iii. t. iii. **S** I vede nella parte di nanzi della congiuntura del Ginocchio vn' ^a osso, tondo, come vn scudo, alquato piano di dietro, & dinanzi, il qual per la parte di dietro, che rispode alla congiuntura, è liscio; & è couerto d'vna sdruciolosa cartilagine; & nel mezzo (d'alto a basso) ha vna costicciuola, che s'incassa nel seno, che diremo farsi nel mezzo delle due teste dell'osso della coscia. Da lati di questa costicciuola si veggono due impressioni, nelle quali s'incassano le dette teste. Et, si come dicemo esser maggioi la testa di fuori, che quella di dentro, cosi anche si debbe intendere, che il seno della rotula, che risponde alla maggior testa, è assai piu profondo, & grande. Questa rotula per la parte di nanzi, & da lati, è aspra, & piena di certi pertugieti, che quasi non si dimostrano. Et ha nella parte piu bassa vna pūta, come vn picciol pcesso, che rispode alla parte piu alta del maggior stinco; & è ne piu, ne meno aspra, & piena di buchi, perche meglio s'attacchi al le corde de ^b muscoli, che distendono la gamba; a quali ella è attaccata da ogni parte, eccetto che per quella, che detto habbiamo esser couerta d'vna ^c cartilagine. Et è da notare, che questa rotula nō si lega, o incassa all'osso della coscia, ne all'ossa della gamba, anzi queste corde, o tele, delle quali nasce, la tengono abbracciata strettamente con le sopradette ossa. Questo osso ne gli huomini di tempo è molto massiccio, & duro, come manifestamente si vede, nettandolo bene dalle corde, & cartilagini, nelle quali è inuolto; ma ne bambini è tanto tenero, che pare di natura di cartilagine. Et è suo officio non la-

Il sito, & figura della Rotula del ginocchio.

Come si congiunge questo osso all'osso della coscia.

L'officio di questo osso.

E sciar

Libro Primo

sciar disluogare verso innanzi le teste della coscia; ilche intrauerebbe molte volte, se mancasse, principalmente quando c'inginocchiemo, o caliamo alcuna costa, o scala; o quando facciamo alcuna forza col corpo innanzi, appoggiandoci su le gambe.

Dell'Osso del piede.

Cap. 30.

Quante ossa ha il piede.

Il tallone.

Come si congiunge questo osso a gli due stinchi.

Quattro lati di questo osso.

Vn seno.

Vn'asprezza.

Come si congiunge questo osso al l'osso del calcagno.

IL piede^a si diuide in tallone, calcagno, osso naucolare, collo, pettine o pianta, & dita, non meno ne gli animali bruti, che l'hanno diuiso in dita, che ne gli huomini. Il che io intendo misurando in loro il piede dalla terza congiuntura della gamba in giu; & non facendo, come han fatto alcuni, che veggendo, che molti animali bruti non posano in terra, che le dita, chiamano quella parte sola piede; & non risguardano, che contàdo in questo modo, fanno tre congiunture in ogni gamba, non essendo, che due. Hor è da sapere che'l primo^b osso del piede chiamarono i Greci Astragalus; i Latini Talus, che vuol dire il tallone; alcuni il chiamarono la noce della Balestra, per esser alquanto simile a quella. Nella parte piu alta di questo osso s'incassano, (come habbiamo detto) gli due stinchi della gamba; & perciò questa parte di questo osso è alquanto tonda, & couerta d'vna sdruciolosa cartilagine. Et è elquanto piu rileuata da lati, che di dietro, o dinanzi. Perche si vede nel suo mezzo alquanto verso la banda di dentro, per tutto'l lungo di questa parte, da dietro innanzi, vn assai poco fundo riuolo, che lo fa in certo modo simile alla quarta parte d'vna carrucola. Questa parte ha quattro lati, il primo, & il secondo sono da suoi canti, & l'abbracciano secondo il lungo. Il terzo è nella parte dinanzi; il quarto in quella di dietro. Di sorte, che viene ad esser quadro; per laqual cosa, alcuni Latini chiamarono tutto l'osso Quattro. Di questi quattro lati, quel di dentro, & quel di fuori sono couerti d'vna cartilagine liscia, & sono alquanto cupi, anchor che non vgualmente da amendue i lati. Perche il lato di dentro è meno cupo, & il fosso è assai minore; come anche è minore il processo della giunta inferiore del maggior stinco, che similmente è couerta di cartilagine. Quel di fuori è piu cupo; & la cartilagine è piu larga tanto, che fa vn luogo conueneuole, accioche il lato di dentro del processo del minor stinco s'incassi in lui; il quale, come dicemo, scende piu a basso, che quel del maggiore. Ha cosi anchora questo osso dalla banda di dentro vn seno aspro, nel qual s'inferisce la^c legatura, che dicemo nascer dal lato di dentro del processo del maggior stinco, & legarlo coll'osso. Et parimente ne ha vn'altro nella banda di fuori, nel qual s'inferisce vn'altra^d legatura, che nasce dal lato di fuori del processo del minor stinco, chiamato comunamente il tallone; & lega questo stinco coll'osso, di cui parliamo. Mediante questa congiuntura distendiamo, & ritiriamo il piede. Ha similmente questo osso nella parte piu bassa del lato di dietro vna asprezza, nella qual s'inferiscono certe legature, che nascono del maggior stinco, & ne nascono altre, che s'inferiscono nel calcagno. Ha oltre di ciò questo lato due seni; vno verso la banda di dentro, & maggiore; l'altro verso quella di fuori, & minore, per gli quai passano le^e corde de^f muscoli, che passano di sotto al piede. Et dal lato dinanzi nasce vn^g processo, come collo, alquanto lungo, il qual finisce in vna testa tonda, couerta d'vna sdruciolosa cartilagine, & s'incassa in vn profondo seno, ^h che ha l'osso chiamato naucolare. Mediante questa congiuntura penso che dimeniamo il piede da lati, & d'intorno. Et il collo ha nella parte di sopra vna asprezza, nella qual si veggono certi spiragli, de quali nascono in parte le legature, ⁱ che abbracciano le corde de muscoli, che vanno alle dita del piede. La parte di sotto di questo osso s'incassa in due parti coll'osso del calcagno, sopra ilquale solo si posa. cioè, nella parte ^k di dietro, doue diremo hauere il calcagno vn gran tubercolo che s'incassa in vn seno grande, che ha questo osso nella parte di sotto; Et nella parte dinanzi, verso il lato di dentro del piede; nella qual parte fa il calcagno vn lungo fosso, couerto d'vna cartilagine, & questo osso fa vn tubercolo, che è nella parte piu bassa della testa di questo osso, che dicemo incassarsi nel seno del naucolare. Nel mezzo di queste due congiunture, così il calcagno, come il tallone son'aspri; & hanno certi seni profondi, de quali nascono certe legature, di natura di cartilagine, che gli legano fortissimamente insieme.

a t. vi. fig. 2.

b ti. ii. iii. a
c. vj. fi. x. r

c lib. ii. t. xv.
fi. xvii. f

d la med. g

e lib. ii. t. xv.

f la med. E

OP

g t. vi. fi. x. N

h la md. tra l

o c l' N

i lib. ii. t. x. ii.

iii. o

k t. vi. fi. x. o

l la med. A

Dell'osso

Dell'Osso del Calcagno, & del Naucolare.

Cap. 31

a t.ii.iii.a.t.
vi.ii.x.Δ
b t.vi. fi. xx.
c la med. Y
d lib. ii. ta.
xiii. o
e la med. x
ta. xv. fi. i. N

f li. ii. t. xiii.
la corda che
si fa del no
p q
g li. ii. t. xiii.
ta. xv. fi. i. N

h lib. ii. ta.
xvi. x
i lib. ii. ta. ii.
n. t. xiii. V
k lib. iii. ta.
vi. o r

l ta. vi fig. x.
A. 4.
m la med. o
n la med.
tra l o el N
o la med.
1. 2. 3.

p li. ii. t. iii. v

Il secondo osso del piede fa il ^a Calcagno, & è il maggior di tutte, & tanto duro, come il primo Et per la parte di sotto, sopra la quale ^b possiamo il piede, è tondo, & alquanto largo, aspro, & disuguale, per cagione de muscoli, che iui nascono. Al fin di questa parte verso la banda di dietro, si fa vn grosso tubercolo; dalla cui parte ^c dinanzi nasce il ^d musculo, che diremo piegare il secondo osso delle quattro dita; & quel pezzo ^e di carne muscolosa, che diremo diuiderli i quattro parti, & storcere le quattro dita verso il pollice. Questo tubercolo serue, che fermadosi sopra il calcagno, non ammacchiamo i sopra detti muscoli. La parte di sopra di questo osso dalla banda di dietro dell'osso chiamato il Tallone, fin'a quella di dietro del calcagno, e alquanto tonda, & incauata nel mezzo; & ha vna picciola asprezza, nella qual s'inferiscono le legature del maggior stinco, & del tallone. L'ultima parte di questo osso esce piu notabilmente in dietro, che gli stinchi della gamba, ilche serue, che piu sicuramente ci teniamo in piede. Et nel suo fine verso dietro si veggono certe asprezze, & rioli, ne quali s'isferisce la piu forte corda ^f del corpo, come al suo luogo diremo. Il lato di dentro di questo osso, e manifestamente cupo nel mezzo, & rileuato da capi, per cagione de processi, che si fanno ne suoi fini. Per questo seno passano piu sicure le corde de ^g muscoli, che vanno alla parte di sotto del piede, accompagnate da vna vena, vn neruo, & vna arteria, storcedosi vicino alla parte di dietro, del processo dinanzi di questo lato: il cui lato di dietro dicemo fare vn seno, nel quale s'incassaua vn tubercolo dell'osso del tallone; & del processo di dietro di questo lato diremo nascer il ^h musculo, che diuisa il pollice dall'altre dita. Il lato di fuori del calcagno non ha seno alcuno, anzi e aspro, disuguale, & scarnato, eccetto, nella parte di sotto, della qual nasce il ⁱ musculo, che separa il dito picciolo dall'altre dita; & nella parte dinanzi, che eliscio, & alquanto incauato, & da luogo, che passino per lui le corde del ^k settimo, & ottauo musculo, che muouono il piede. Dalle parti dinanzi di questo osso, quella, che e scontro al dito pollice, & fa quella punta, come processo, che dicemo far piu fondo il lato di dentro di questo osso, si congiunge solamente (come habbiamo detto) al tallone. Ma quella di fuori, che risponde in sito al dito picciolo, per la parte dinanzi e liscia, & couerta d'vna sdruciolosa cartilagine, & ha vna testa ammaccata, alquanto sospesa da lati, & incauata nel mezzo, che s'incassa non in vn seno, (come disse il Vesalio) anzi in vna ^l testa del quarto osso del pettine del piede, simile al dado (che e anchora couerta d'vna cartilagine) mediante quella sorte di congiuntura, detto Artrodia, specie della Diartrosi. Il terzo osso del piede si chiama ^m Naucolare, per esser simile ad vna naucella, & ha nella parte di dietro vn cupo, & lungo ⁿ seno, nel qual s'incassa (come habbia detto) la testa dell'osso del tallone. La parte dinanzi, che e couerta d'vna sdruciolosa cartilagine, mostra tre faccie, o lati, ne quali s'incassano le tre ^o ossa del collo del piede, i ogni lato vno. Questi lati son tanto piani, che non si può vedere alcun fosso, o tubercolo in loro: ma il resto verso la banda di dentro del piede e il maggiore, & piu rileuato, perche l'osso, nel qual s'incassa, e anche piu largo, & cupo, che l'altre due ossa del detto collo. La parte di sopra di questo osso e gobba, & alquanto simile ad vna Rotula, ma e in certa forma aspra, & di questa asprezza nascono i legami, che legano questo osso co quel del tallone, & co quelle del detto collo. La parte di sotto e alquanto scauata, & aiuta a fare il voto del piede, & e questa parte piu aspra, che quella di sopra, perche le legature, che nascono di lei siano piu forti. Ha anchora oltre di ciò questa parte verso la banda di dentro vn seno, per il qual ritorcendosi passa la corda del sesto ^p musculo, che muoue il piede. Queste tre ossa del calcagno non hanno simiglianza fra se stesse, ne con quelle del bracciale.

La parte bassa del Calcagno.

Vn tubercolo di questa parte.

L'officio di questo tubercolo.

Il lato di dentro dell'osso del calcagno.

Quel di fuori.

La parte dinanzi di questo osso.

Il Naucolare.

La parte dinanzi di questo osso.

Quella di sopra

Che l'ossa del piede non hanno simiglianza con quelle della mano.

Del Collo del Piede.

Cap. 32.

a t. vi. fi. x. i.
2. 3. 4.

Il Collo ^a del piede e alquanto simile al bracciale, se ben non ha piu, che quattro ossa. Delle quali tre, che non hanno proprio nome, si congiungono (come habbiamo detto) al naucolare. Il quarto, che e alquanto simile ad vn dado ha sei lati, il primo di loro verso innanzi, il qual dicemmo congiungerli alle due ossa del pettine del piede; il terzo

Quante ossa ha il collo del piede.

Libro Primo

verso dentro, che si congiunge all'osso dell'istesso collo, che gli e vicino, il quarto rispon-
de al lato di fuori del piede, & è si poco piano, che quasi nō merita di esser chiamato lato,
il quinto mira all'insù, & nō si cōgiunge ad altro osso, il sesto mira all'ingiu, ne anche si
congiunge ad osso alcuno, & è piu disuguale, che niuno de gli altri. In questo lato è vn
seno ^b lūgo, per il qual passa la corda del settimo ^c musculo, che muoue il piede, & vn tu-
bercolo, mediante il quale si posà in terra. Ma perche alcuni lati di questo osso son di tal
modo stretti, & disuguali, che non son molto simili a que del dado, anzi paiono grandi-
nosi, lo chiamarono gli Arabi osso grādinoso, altri il chiamarono Polimorpho, come il
Cuneale, per quelle, che ha diuerse forme. Questo osso si cōgiunge (come habbiam det-
to) al calcagno, & si ferma in terra. Le altre tre ossa, & il naucolare non toccano terra,
anzi fanno di questa parte vn profondo seno. Queste ossa del collo son differente fra se
stesse, in figura, grandezza, & sito, non meno, che quelle del bracciale. Perche quello, che
è simile al dado, & il primo (che e quello, che occupa la banda di dentro del piede,) son
piu grandi, che quei di mezzo, & quel, che e simile al dado, è maggior del primo. Et si co-
me quello si distende molto verso il calcagno, cosi il primo esce innanzi, piu che quei di
mezzo. Il terzo osso (che è quel che sta appresso a quello, che pare vn dado) e maggior, &
esce piu inanzi che'l secondo, ma amendue insieme fanno la figura di vn cuneo, perche
son larghi di sopra, & stretti di sotto. Il terzo si ristrigne particolarmente piu di sotto,
& esce piu innanzi, & scende piu che'l secōdo, che resta nascosto fra'l primo, e'l terzo: &
nella pūta piu bassa di questo terzo s'inferisce vna corda del quinto ^d musculo, che muo-
ue il piede. Nondimeno queste ossa tutte insieme fanno vna figura, alquanto tonda di so-
pra, & incauata di sotto, come si vede nel piede. Tutte queste tre ossa, sono attaccate l'u-
ne all'altre, iui vicino la parte di dietro, che si congiunge col naucolare, col mezzo d'vna
sdruciolosa cartilagine; per l'altre parti sono alquanto separate, & si congiungono me-
dianti cerre legature di natura di cartilagine.

Le altre tre ossa.

*Differenza fra
le tre ossa del
collo del piede.*

Del Pettine, o Pianta del Piede.

Cap. 33.

Pettine del Piede, si chiama, parlando propriamente, la parte ^a di sopra del piede,
fra'l collo, & le dita, & pianta la parte di sotto, che risponde al pettine. Pure io chia-
mero queste due parti indifferente, hor Pianta, hor Pettine, per esser tutta vna
cosa, & perche gli altri Anatomisti fanno cosi. Questo Pettine del piede e simile a quel
della mano, ecceto, che ha cinque ossa, lequali tutte si congiungono per suo ordine a
que del collo, con certe testicciuole lisce, & cosi poco rileuate, che cō ragione si potreb-
be dire, che si congiungono di piano. Di queste ossa, quel, che sostiene il pollice, s'incas-
sa nel primo del collo; il secondo, che sostiene l'indice, s'incassa nel secondo. Il terzo, che
sostiene quel di mezzo, s'incassa nel terzo, gli due vltimi s'incassano nell'osso simile al da-
do, ne piu, ne meno, che habbiam detto cōgiungerli all'ottauo osso de bracciale gli due
della palma, che sostengono il dito picciolo, & quel di mezzo. Et si come dicemmo essere
vn osficello simile al seme del sesame fra la cōgiuntura dello'osso, che sostiene il dito pic-
ciolo, & quel del bracciale, cosi ne piu ne meno, se ne vede ^b vn'altro nel piede, fra la con-
giuntura del quinto osso del pettine, & il quarto del collo. Et si come dicemo, che l'ossa
del collo del piede vsciuano piu l'vne, che l'altre, innāzi, cosi anche q̃lle del pettine esco-
no piu l'vne, che l'altre a dietro. Ma tutte son grosse in questa parte, & hanno certe teste
quasi triangolari, col mezzo delle quali si congiungono l'vn'osso all'altro da lati (che so-
no in certo modo lisci, & piani) mediante quella sorte di cōgiuntura detta Artrodia, spe-
cie della Synartrosi. Nel resto, fin che si congiungono alle dita, si vāno facendo piu sottili,
& aguzze di sotto, & tōde di sopra, & fra l'vn'osso, & l'altro si fa vn' ^c spacio, nel quale
sta vna parte di quella carne ^d muscolosa, che diremo piegare i primi articoli delle dita.
Ma per la parte, oue si cōgiungono alle dita, son del tutto simili a quelle della palma del-
la mano, & hanno la sua giunta, che finisce in vna testa tonda, alquāto piu lunga, di su in
giu, che da dentro in fuori, laqual s'incassa in vn seno, che fanno le prime ossa delle dita,
ognuno nel suo. Ma quel, che sostiene il pollice, ha nella parte piu bassa di dietro, che si
congiunge al collo, non vn processo (come dice il Vesalio) anzi vn picciol ^e fossetto, nel
qual s'inferisce il settimo ^f musculo, che muoue il piede. Et l'osso che sostiene il dito pic-
ciolo,

*Quante ossa ha
il Pettine.*

*Come si congiu-
gono queste ossa
al collo del pie-
de.*

*Il vacuo tra l'os-
sa del pettine.
Come si congiu-
gono all'ossa del
le dita.*

*L'osso che sostie-
ne il pollice non
ha processo nel
la parte piu bas-
sa di dietro.*

b la med. x
c lib. ii. t. xv.
fi. i. v x

d la me. DE

a ta. vi. fi. x. i.
ii. iii. iii. v.

b t. vi. fig. x.
x μ

c la med. v v
d lib. ii. t. xv.
fi. i. L

e t. vi. fi. x. x
f lib. ii. t. xv.
fi. i. v x

g t. vi. fi. x. p
h lib. ii. t. xv.
fi. i. a

ciolo, nella parte, oue si congiunge all'istesso collo, ha vn s processo, ch' esce verso la parte di fuori del piede; nel qual s'interisce la corda^b dell'ottauo musculo, che muoue il piede.

Dell'ossa delle dita del piede.

Cap. 34.

a ta. vi. fi. x.
AE
b la med. ex

AL pettine ò pianta del piede seguono le dita, ^a le quali si fanno, ogn'vno di tre ossa, come quelle della mano, eccetto il pollice, che nò ne ha piu de^b due. Delle quali il primo fa il primo osso del pettine; & aiuta, che piu facilmente posiamo il piede; al che aiutano anche molto gl'ossicelli, ^c come seme di sesame, che sono nella prima congiuntura del dito, come dissi parlando particolarmente di questi ossicelli. Nel resto queste ossa sono del tutto simili in figura alle dita della mano; & per tanto non farò piu mention di loro, che dire, che in ogni piede si ritroua vn'osso manco, che nella mano. Perche nella mano sono ventisette ossa, senza quelle, che sono simili al seme del sesame; otto nel bracciale; quattro nella palma; quindici nelle dita. Nel piede ne sono ventisei, cioè il calcagno, il tallone; il naucolare, quattro nel collo, cinque nel pettine ò pianta, & quattordici nelle dita. Et questo basti all'historia dell'ossa. Restaci hora a trattare delle vgne, & cartilagini.

Quante ossa ha ogni dito.

Delle vgne.

Cap. 35.

a t. vii. fi. xiii.

L'Vgne ^a son tanto conosciute, che non bisogna mi distenda molto in scriuere di loro. Basti sapere, che son fatte d'ossa, legature, corde, carne, & pelle tutte ammassate insieme; & che sono attaccate alla radice di sopra del terzo osso delle dita, mediante vna forte legatura; & che per di fuori son circondate di cuoio, & di dentro si attaccano tutte alla carne; & non hanno niuno senso; & crescono sempre dalla radice, come i capelli. La qual cosa è chiaro argomento, che non hanno particolar vena, che le nutrisca, come alcuni han pensato. Seruono l'vgne per appoggio alle dita, perche possano meglio stringere qual si voglia cosa.

Di che si fanno l'vgne.

L'offitio dell'vgne.

Delle cartilagini delle palpebre de gl'occhi.

Cap. 36.

a t. vii. fi. xvi.

Hanno le palpebre d'ogni occhio, cosi quella di sopra, come quella di sotto, vna ^a cartilagine lunga, sottile, & tenera, che le circonda amendue per le sponde. Et di lei nascono que peli, detti penne dell'occhio, come fu necessario, perche stessero diritte, & per suo ordine, come fanno i remi nella Galea; per la qual cosa furono queste cartilagini dette da Greci Tarsus.

L'offitio della cartilagine dell'occhio.

Della cartilagine dell'orecchie.

Cap. 37.

a li. ii. t. i. r.
b t. iiii. fi. i. o

LA cartilagine^a dell'orecchia è tenera, & sottile; pur sempre piu s'indura, quanto piu s'appressa al craneo, da cui nasce pigliando principio del cerchio del buco^b dell'orecchia, che si vede nell'osso delle tempie; & percio il cerchio di questo osso e alquanto aspro tutto intorno. Et l'offitio dell'orecchia e raccogliere l'aere; & far, che faccia piu strepito nell'intrare; come chiaramente si vede, quando alcun gran vento ci percuote in faccia; perche fa vn grandissimo romore nell'orecchie, entrando per loro, come per lumaca, o chiocciola.

L'offitio dell'orecchia.

Delle cartilagini del naso.

Cap. 38.

a li. ii. t. iiii. k

HA il naso cinque cartilagini, delle quali^a le due prime nascono del fine dell'ossa del naso, & scendendo in giu, si fanno à poco à poco piu tenere; & finiscono, come in vna legatura di natura di cartilagine, facendo tutta la parte dinanzi del naso, dal fin dell'ossa, fin'à la sua pùta. Nasce anche vn'altra cartilagine dal processo dell'ottauo osso del capo, che dicemmo diuidere il naso per mezzo, tenera come legatura, laqual scendendo innanzi, si congiunge per la parte di dentro alla parte dinanzi delle due dette cartilagini,

La prima, & seconda cartilagine del naso.

La terza.

E 3 secondo

Libro primo

La quarta, e
quinta.

secondo il lungo loro. Questa cartilagine fende per mezzo il naso, dall'osso in giù; & fa le due sue finestre; & si distende tanto in dentro, che si congiunge coll'osso, che diuide il concauo del naso, che risponde al palato. Oltre a queste cartilagini ne sono anche nel naso, altre ^b due, assai piu tenere & neruose delle prime; ognuna delle quali fa il principio della finestra del naso dal suo lato. Queste cartilagini, per la parte di dentro, si congiungono alle su dette; & elle sole si muouono; & per virtu loro l'altre. Le parti di queste cartilagini piu larghe, & tenere, sono da lati del naso; & le chiamano gli Anatomisti le ali del naso, perche s'aprono, & serrano, quando rinfatamo, come due ali.

b la med. L

Delle cartilagini del gargarozzo.

Cap. 39.

La prima cartilagine del gargarozzo.

Il gargarozzo ^a è il primo buco dinanzi a que due, che si veggono nelle fauci; per lo qual ^b passa l'aere à polmoni, composto di tre cartilagini. Delle quali la prima ^b è nella parte sua dinanzi, & fa quel nodo della gola, che comunalmente chiamiamo la noce; & è molto maggiore, che niuna delle altre; & dalla bāda di fuori ^c è gobba, da quella di dentro ^d è cupa, come rotella, o scudo antiquo; per la qual cosa fu da latini detta scutiforme, che vuol dire simile ad vn scudo; & è assai piu larga di sopra, che di sotto. Et anchor che paia, che esca piu in fuori negli huomini, che nelle donne, per cagion di certe glandole, che hanno elle da lati di questa cartilagine, che fanno tondeggiare il collo, & coprir la noce; nondimeno, & in esse, & in essi esce fuora vguualmente. Ben è vero, che tutto il gargarozzo delle donne è minore, che quel de gli huomini. Et in amendue si diuide queste cartilagine in due parti, come chiaramente il dimostra vna ^e riga, che la diuide per mezzo d'alto a basso; & si vede senza tagliar la cartilagine, netando bene le legature, che le son di sopra. Si che assai piu giustamente si douerebbero chiamare due cartilagini, ch'vna; pur per che gli altri l'han chiamata vna, veggendo forse, che ne gli huomini era gia vnita, io parimente la chiamerò vna. La quale cosi nella parte di sopra, come in quella di sotto, ha due processi, da ogni lato vno; & que di ^f sopra son piu lunghi, & si congiungono à lati di sotto ^g dell'osso chiamato hyoide medianti certe legature ^h neruose. Quelli di sotto ⁱ si legano alla parte di dietro de ^k lati della seconda cartilagine. Questa seconda cartilagine è minor che la prima; & maggior, che la terza; & è quasi tutta situata ^l nella parte di dietro del gargarozzo, appresso la canna della gola. Et sopplisce per la parte di sopra, & di dietro tutto quello, che alla prima manca per far veramente la figura d'vn scudo antiquo; faccendo da ogni lato vn grosso processo, ^m nella fine di ognuno de i quali è vn seno, nel qual s'incassano i processi di sotto della prima. Et dalla parte di sotto fa vn cerchio intero, la cui parte di nanzi si vede nella gola, di sotto al fine della prima cartilagine. Questa seconda cartilagine ⁿ è piu liscia dalla banda di dentro; & nella parte di dietro, che risponde alla canna della gola, ha vna lunga ^o riga, rileuata, come schiena, secondo il lungo suo, col mezzo della quale si diuideno i due ^p seni, che si fanno in questa cartilagine; de quai diremo nascer due ^q muscoli, che s'inseriscono nella terza. La parte piu alta del lato di dietro di questa cartilagine finisce in due lunghi ^r tubercoli, da ogni lato vno, medianti i quali sicongiunge, come diremo, alla terza cartilagine. La parte piu ^s bassa della seconda e alquanto sottile, iui doue fa il lato di dietro del gargarozzo, & scende piu in giù, che niun'altra; il che fu fatto, perche d'indi nascessero i muscoli, ^t che diremo scendere distendendosi per tutto il lungo della seconda cartilagine, & inserirsi nella terza. A questa cartilagine non diedero nome gli antiqui; perciò la chiamarono alcuni quella, che non ha nome. Il Vesalio la chiama annulare, per esser alquanto simile all'anello, che portano gli arcieri turchi nel dito pollice della mano diritta. La terza ^u cartilagine del gargarozzo chiamata da Greci aritena, che vuol dir boccale o inghiastara, per esser lei (quando è intera, & couerta dalla tela, che abbraccia la fauce per la bāda di dentro) assai simile alla bocca d'vn baccal da lauar mani; anchor che veramente si componga di due ^x cartilagini, legate l'etlissimamente insieme, medianti le dette legature, & la tela, che abbraccia il gargarozzo; pur perche stando couerta con le dette tele pare vna; & perche il piu de gli Anatomisti non la diuide, io la chiamerò sempre vna; Ma aduertendo, che si diuide in due; & che in ogn'vna parte di loro si vede vn ^y fondo seno, nel qual s'incassano i tubercoli, che dicemo hauere la ^z seconda cartilagine; in modo che tutta questa cartilagine si puo mouere, non meno verso

a t.vii. fi. i. ii.
b t. vii. fi. iii.
iii. v
c t. vii. fi. v
d t. vii. fi. iii.

Perche piu si dimostra la noce ne gli huomini, che nelle donne.

e t. vii. fi. ii.
iii. GH

La seconda cartilagine del gargarozzo.

f t. vii. fig. iii.
iii. v. AB
g t. v. fig. vii.
EF
h li. ii. t. xvi.
fi. ii. iii.
i t. vii. fig. iii.
iii. v. cd
k t. vii. fi. viii.
EF
l t. vi. fig. vii.
viii.
m t. vii. fi. vi.
vii. K
n t. vii. fi. vi. I
o t. vii. fi. vii.
viii. L M
p lame. NO
q li. ii. t. xvi.
fi. vi p
r t. vii. fig. vi.
vii. P Q
s t. vii. fig. vi.
vii. viii. L
t lib. ii. t. xvi.
fi. vi. P
u t. vii. fi. ix.
x. xi.
x la med. RS



La terza cartilagine si compone di due.

y t. vii. fig. x.
xi. v x
z t. vii. fig. vi.
vii. viii. P Q

verso la banda di dentro del gargarozzo, che verso quella di fuori, assai piu facilmente, che niuna dell'altre. Et parimente ogni parte di questa cartilagine assai piu largha di sotto, che di sopra; & la parte sua dinanzi finisce in vn lungo ^a processo, che entra verso la banda di dietro del gargarozzo. Di sopra ^b si diuidono, l'vna punta dall'altra, a poco, a poco secondo che piu si diuidono dal principio; & dapoi caminando verso dietro, & faccèdo si piu sottili, & tenere, & couerte di grasso, si rigiungono (faccendo nel mezzo ^c vn vacuo) la parte piu alta dell'vna con la parte piu alta dell'altra, & fanno naturalmente vna bocca ^d di boccale da lauar le mani. Questa cartilagine è tanto tenera, & si addoppia così facilmente in questa parte, che quando vomitamo, si riuolta innanzi; & cuopre così giustamente il gargarozzo, che per niun modo puo entrar niente à polmoni. Senza queste tre cartilagini, ve ne è vn'altra ^e tenera, & molto simile in sustanza alla parte piu alta, della terza cartilagine, a cui si congiunge faccèdo vno assai giusto coperchio. Questa cartilagine nasce d'appresso la parte piu alta di dentro della prima cartilagine con vn principio ^f largo, & torto verso innanzi; & camminando a dentro finisce in vna punta ^g come di triangolo, che si distende verso la canna della gola; & per la parte di sopra, che risponde al palato, è alquanto rileuata, & tenera; da quella da basso, che cuopre il gargarozzo, è cupa, & piu dura, che di sopra. La punta di essa, che risponde alla canna della gola, è molto tenera, & couerta d'vna tanto grossa tela, che la fa parer legatura. La parte, che si congiunge alla prima cartilagine, ha parimente molto grasso, & è assai piu tenera, che nel mezzo. Questa cartilagine da Greci fu chiamata Epiglottis, che vuol dir sopra la lingua, per esser la punta sua non sopra la lingua, se non sopra la ^h fessura, che si fa fra i due processi della terza cartilagine, simile alla lingua de flauti. L'altre cartilagini delle fauci son tutte fin'a i polmoni di figura d'vna ^k C. Ilche fu fatto, perche la parte di dietro della canna del polmone, a cui è attaccata la canna della gola, non impedisse con sua durezza l'inghiottire. Et tutte elle son tanto piu tenere, quanto piu vanno verso il polmone. Questo è tutto quello, che tocca all'historia delle cartilagini, & ossa. Le quali, poste da parte le giunte, & cartilagini, per schifar prolissitate; & gl'osficelli, simili al seme del sesame, che sono nelle mani al piu quarant'otto, & ne piedi in alcuni altrettanti; & contandogli secondo che ne gli huomini comunamente si veggono, sono tutti secondo vn conto, dugento ventiquattro; secondo vn'altro dugentoquindici. Delle quali, otto ne ha la testa; sei l'orecchie; dodici la mascella superiore; due l'inferiore; vndici l'osso hyoide; ventiquattro la schiena; sei l'osso grande, & tal volta cinque; quattro il codi-one. Ventiquattro son le coste; tre ne ha l'osso del petto, & secondo vn'altro conto sette. Due son l'ossa delle spalle; due quelle delle clauicole; sei sono nelle braccia; otto in ogni bracciale; quattro in ogni palma della mano; tre in ogni dito. Due son l'ossa de galloni, & secondo vn'altro conto sei; due son quelle delle coscie; quattro quelle delle gambe; vno ne in ogni ginocchio; in ogni piede vn tallone, & vn nauicolare; quattro che fanno el collo; cinque, che fanno il pettine, o pianta; tre ne ha ogni dito, eccetto il pollice, che ne ha due sole.

La couerta delle fauci.

Le cartilagini della canna della gola.

Il numero dell'ossa.



Dichiar. delle Fig. del Lib. I.



Dichiaratione delle lettere delle tauole del primo libro; & prima delle tre prime: le quali tutte hanno quasi le medesime lettere; & se alcuna ven'è particolare, facilmente si possono conoscere per lo numero. Solo voglio auvertire il lettore, che la prima Figura è tutta differente da quella del Vesalio, perche la sua non era ben fatta, come potrà veder ciascuno conferendo le parti, nelle quali siamo differenti, col naturale.

- A** 2. 3. La commessura coronale, laquale altri chiamano arcuata, altri quella della poppa, altri la inarcata, altri stephanica.
- B** 2. 3. La commessura lambdoide, laqual altri chiamano l'hypsiloide, altri la commessura della proda.
- C** 3. La commessura sagittale.
- D** 2. 3. Le commessure squagliese, o quelle delle tempie, o le mendo-se.
- a** 2. 3. L'osso della coronella.
- β** 1. 2. 3. L'osso della fronte, l'impudico, & quel della poppa.
- γ** 2. 3. L'osso della collottola, della proda, quello della memoria, ouero il basilare.
- *δ** 2. Gli officelli dell'orecchie.
- δ** 2. 3. L'osso delle tempie, & il petroso.
- ε** 2. Il processo di quest'osso simile al puntaruolo.
- ζ** 2. 3. Il processo simile alla tetta o sia mammella.
- E** 1. 2. 3. I processi de lati dell'osso cuneale.
- η** 2. La parte dell'osso delle tempie, chiamata petrosa.
- θ** 2. I processi dell'osso cuneale simili all'ali del pipistrello.
- F** 1. 2. 3. Questo processo, & quello che insieme è attaccato con lui, si chiamano l'osso giogale, & l'osso delle ascella, e l'incarnato.

- G** L'undici ossa della mascella di sopra non hanno nome alcuno, & perche faremo particolar mentione di loro nella quarta tauola, non dirò altro, eccetto che così in quella di sotto, che notamo col G, come in quella di sopra vi è in ciascuna quattro denti scisori, & i due canini, e dieci mascellari.
- H** 2. L'osso hyoide, quello della lingua, quello del gargarozzo, & quello dell'osso del boccone di Adamo.
- I K** LMN Queste lettere mostrano quasi tutta la schiena in tutte tre le figure. Dalla I alla K chiamasi collo; dalla K alla L, spalle; dalla L alla M, lombi; dalla M alla N, osso grande, o venerabile; & dalla N in giù codione.
- O** 1. 2. 3. L'osso del petto, il sternon, il scudo del core.
- P** 1. 2. 3. La paletta dello stomaco, la spada, la granata, & la forcilla dello stomaco.
- I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3.** le coste.
- Q** 1. 2. 3. La clauicola.
- R** 1. 2. 3. La paletta delle spalle.
- λ** 1. 2. 3. Il processo più alto della paletta delle spalle chiamata la punta dell'omero, o grugno di porco.
- μ** 1. 2. 3. Il processo simile all'Anchora chiamata da questo anchiroide.
- S** 1. 2. 3. L'osso dell'omero.
- TVX** 1. 2. 3. Il maggior fusello del braccio, il cubito, la vlna.
- Υ** Il minore, o il raggio.
- ν** 2. Il processo di dietro del maggior fusello chiamato la punta del gomito.
- ξ** 1. 2. 3. Il processo di quest'osso simile ad vn puntaruolo.
- ZZ** 1. 2. 3. Il braeciale, la raffeta.
- Γ** 1. 2. 3. La palma, o pettine della mano, il postbracciale.
- ΔΔ** 1. 2. 3. Le dita.
- Θ** 1. 2. 3. L'osso dell'anche.
- π** 1. 2. 3. L'osso del gallone.
- ρ** 1. 2. 3. L'osso del pettignone.
- ς** 1. 2. 3. La cartilagine, che giunge l'os-sa del pettignone.

TABVLA I

LIBRI I




Dichiar. delle Fig. del Lib. I.

Λ	1. 2. 3. L'osso della coscia.	qq	2. 3. I processi de lati, de nodi, de lombi.
τ	1. 2. 3. Il processo di fuori dell'osso della coscia, chiamato il Rotatore.	rr	2. 3. Quei di dietro.
υ	1. 2. 3. Il processo minor del medesimo osso.	ss	3. Gli alti.
Ξ	1. 2. 3. La rotula del ginocchio, la patella, la girella.	tt	3. I bassi.
ΠΣ	1. 2. 3. La gamba dal ginocchio in giù, che ha due ossa.	uu	1. 2. L'angolo che fanno le cartilagini con le coste one si giungono.
Φ	1. 2. 3. Il maggior stinco della gamba, o la tibia.	x	1. 2. 3. La giunta di sopra dell'osso dell'omero.
Ψ	1. 2. 3. Il minor stinco della medesima, la fibula.	y	2. Quella di sotto, & particolarmente la testa di fuori.
Φχ	1. 2. 3. Le giunte de i stinchi, che communemente chiamiamo i talloni; delle quali la Φ mostra quella di fuori, & la χ quella di dentro.	z	2. 3. La giunta del maggior stinco del braccio.
Ω	1. 2. 3. L'osso de tallone, il tallone l'osso della balestra.	1	1. 2. 3. La giunta del minore, presso al braccio.
a	1. 2. 3. L'osso del calcagno.	2	1. 2. La giunta del medesimo, presso al gomito.
b	1. 2. 3. Il navicolare.	3	1. 2. Il processo davanti del maggior stinco del braccio.
c c	1. 2. 3. Il collo del piede, il tarso, il qual fassi di quattro ossa; de quali i tre, che son notati con queste lettere d, e, f, chiamaron i Greci Calcoides; il quarto, che nota la g, chiamano il quadrato, & l'ottilatero, il simile al dado, & il grandinoso.	4	1. 2. La parte di dietro chiamata la punta del gomito.
d e f		5	2. 3. La girella.
g		6	2. 3. La impressione che si fa nella testa dell'osso dell'omero.
h h	1. 2. 3. La pianta, o pettine, o suola del piede, che ha cinque ossa.	7	1. 2. 3. La giunta di sotto dell'osso della coscia.
ii	1. 2. 3. Le dita del piede.	8	1. 2. 3. La giunta del minor stinco della gamba, presso al ginocchio.
k	1. 2. 3. L'ossa come seme di sesame.	9	1. 2. 3. Quello del minore, presso al sopra detto.
ll	2. 3. Le punte, o processi della mascella inferiore.	10	1. 2. 3. Il processo come puntaruolo del minor fusello del braccio.
m	Il terzo osicello dell'orecchio.	11	1. 2. 3. La parte dell'osso dell'anca, che chiamiamo la punta del gallone.
n	1. 2. Il primo buco del quarto osso della mascella superioee.	14	2. Il processo piu basso dell'osso del gallone.
o	1. 2. 3. La spina dell'osso de galloni.	15	2. 3. Il seno piu basso di quest'osso.
p	2. La prima commessura della mascella superiore.	16	16. 3. La testa piu bassa dell'osso della coscia.
		17	1. 2. 3. Il collo dell'osso della coscia.
		18	1. 2. 3. La testa piu alta dell'osso della coscia.

TABVLA II.

LIBRI I.



Dichiar. delle Fig. del Lib. I.

Tauola. IIII. Fig. I. II. III.

IIII. & V.

LA prima figura mostra la naturale forma della testa da vn lato. L'altre mostrano diuerse figure straordinarie, che tal volta accade haure; & la prima particolarmente mostra certe ossa, cōmessure, & buchi della testa, & delle mascelle; & perciò la notamo con le lettere.

AB	La commessura coronale.
CD	La lambdoide.
E	La sagittale.
GC	Lo spatio fra la scagliosa, & la lambdoide.
AFG	H. La scagliosa.
I	L'osso della coronale.
K	Il medesimo dall'altro lato.
L	Quello della fronte.
M	Quello della collottola.
N	L'osso delle tempie.
O	Il maggior processo dell'osso cuneale.
Q	Q. Il prim'osso della mascella di sopra.
* R	Vn processo di quest'osso, che fa maggior il fosso delle tempie.
RR	R. L'asprezza da cui nasce il muscolo delle tempie, che chiude la mascella inferiore.
SS	Il quarto osso della mascella superiore.
V	Il processo del prim'osso della mascella superiore, di cui fassi vna parte dell'osso giogale.
X	Il processo dell'osso delle tempie, di cui fassi l'altra parte dell'osso già detto.
Z	La commessura di quest'osso.
aa	La commessura, che giunge l'osso cuneale a quello delle tempie.
b	La Riga commune all'osso cuneale, & a quello della fronte.
c	La commessura commune all'osso cuneale, et quarto della mascella di sopra.
g	La commessura commune all'osso della fronte, & al primo delle mascelle di sopra, et al cuneale.
h	Il processo largo della mascella inferiore, & il luogo doue s'incassa.
K	Il processo simile alla mammella,
l	La mascella inferiore.
m	Il luogo doue si giungono i rami delle commesure, che separano la mascella di sopra dall'osso della fronte.


n	Il secondo osso della mascella di sopra.
o	Il buco dell'orecchio.
p	Il terzo osso della mascella di sopra.
q	Il quinto osso dell'istessa.
r r	La seconda commessura della medesima.
s	Il primo buco commune di questa mascella.
J	Il suo processo aguzzo.
t t	Il primo buco dell'osso della fronte.

Figura Sesta.

Questa Figura rappresenta il fondo della Caluaria per la parte piu bassa; & accioche meglio si potesse vedere, leuammo via la mascella di sotto.

CC	I termini della commessura lambdoide.
F	Parte della commessura scagliosa.
MMM	Vna gran parte dell'osso della collottola.
NN	Parte dell'ossa delle tempie.
PP	2. 3. 4. 5. I processi di sotto dell'osso cuneale che son quattro, notati con questi numeri. 2. 3. 4. 5.
OOO	L'osso cuneale.
QΓ	Il prim'osso della mascella di sopra.
SΔ	Il quart'osso dell'istessa.
VX	L'osso giogale.
Y	La commessura del medesimo.
d	Qui di sotto è la commessura commune all'osso cuneale, & al primo della mascella di sopra.
e	La commessura commune al cuneale, & al quarto osso della mascella detta.
f	La commessura commune al quarto & secondo osso di questa mascella.
g	La commessura commune all'osso della fronte, & alla mascella di sopra.
h	Il seno nequal s'incassa la mascella di sotto.
i	Il processo simile al puntaruolo.
k	Il processo simile alla poppa.
l	Le testicciole dell'osso della collottola.
m	n n. Tutte queste lettere mostrano i capi della commessura lambdoide, & preso alla m, à il quinto buco dell'osso della collottola.
nn	La riga che congiunge la lambdoide.
op	La riga che comincia dalla sopradetta, & monta per le tempie, la quale a principio è piu tosto diuisione che riga.

La parte



Dichiar. delle Fig. del Lib. I.

qq	La parte della commissura, che circonda l'osso cuneale commune a lui, & alle sei ossa della mascella di sopra.
III	Il sexto paro d'ossa della mascella superiore.
r	Vna riga, che va dall'ossa delle tempie ad intrare nell'orecchio, & pare che diuisa l'orecchio dall'osso.
f	L'asprezza dell'osso delle tempie, & il processo, che guarda verso la riga commune all'osso della collottola, & il cuneale, & presso a lei è il terzo buco commune.
M	Il settimo osso della mascella superiore.
t	Il secondo buco commune della medesima.
u	La parte aspra dell'osso della collottola.
x	Il buco dell'orecchia.
y	Il secondo buco dell'osso delle tempie.
u	Il terzo buco di quest'osso, che è sopra questa lettera; & il quarto, che è maggior, è di sotto.
z	Il primo buco de i comuni.
a	Il quarto osso della mascella di sopra.
2	Il forame della midolla spinale.

Figura. VII. & VIII.

Q Veste due Figure mostrano la mascella inferiore; la settima per la parte di fuori; l'ottava per la parte di dentro.

A	1. 2. Il processo o testa di questa mascella, col qual si giunge alla mascella superiore.
B	1. 2. Il collo di questo processo.
C	1. 2. Il processo di questa mascella, nel qual s'inferisce il muscolo delle tempie.
D	2. Vna asprezza, nella qual s'inferisce il muscolo, che è nascosto nella bocca.
E	1. 2. Un'asprezza nella qual s'inferisce il masticatore.
F	2. Vn forame, per il quale entra vn ramo del terzo par de nervi delle cernella.
G	1. Il buco, di doue esce il detto neruo.
H	2. Certi tubercoli, ne quali s'inferiscono i muscoli, che muouono questa mascella, & di doue nascono alcuni muscoli della lingua.

Tauola. V. Figura. I. & II.

Q Veste due Figure mostrano la parte di dentro della Caluaria; & debbesi notare che'l 2. importa la seconda figura, & l'1. la prima.


TT	2. La commessura coronale.
ΔΔ	1. 2. La lambdoide.
ΘΘ	1. 2. La sagittale.
ΛΛ	1. 2. La scagliosa.
ΞΞ	1. Parte della commessura lambdoide.
Π	1. La riga, che giunge i capi della lambdoide.
ΣΣ	1. 2. Le commessure, che circondano la parte dell'osso cuneale, commune a lui, & all'osso della fronte, & all'ottauo osso della testa.
E	1. Il primo buco dell'osso cuneale.
F	1. In questi seni s'incassa la congiuntione de nervi della vista.
G	1. Il secondo forame dell'osso cuneale.
H	1. Il terzo.
I	1. Molti pertugietti, che veggoni nell'ottauo osso.
K	1. 2. Il buco, che fa si nell'osso della fronte.
L	1. Vna spaccatura, a cui s'attacca la dura madre.
M	1. Vn fossetto, nel qual s'incassa la glandola, che riceue la flemma della testa.
N	1. La radice commune all'osso delle tempie, & a quel della collottola.
O	1. Il rinolo dauanti, pe'l qual va la flemma, che hauemo detto raccogliersi nella glandola; il qual non puo dimostrarsi piu, perche nel naturale quasi non si vede.
P	1. L'ultimo rinolo.
Q	1. Il quarto buco del cuneale.
R	1. Il quinto.
S	1. Il sexto.
TT	1. 2. Alcuni rinoli, come solchi, che si fanno nel craneo per le vene della dura madre.
XX	1. Il quinto buco dell'osso delle tempie.
Y	1. Il forame commune all'osso delle tempie, al cuneale, & a quello della collottola.
a	1. Il buco dell'orecchio.
c	1. Il forame commune all'osso della collottola, & a quello delle tempie.
d	1. Il secondo buco dell'osso della collottola.
e	Il primo buco, per lo qual passa la mca.
g	1. il quinto forame di quest'osso.

Tauola IIII. del Lib. I.

TABVLA IIII LIBRI I

30


FIG. I



II




III



VII



IIII




VIII



V



VI



Dichiar. delle Fig. del Lib. I.

- b b i i* 1. Due seni, che fanfi nell'osso della collotta, ne quali s'incassa il cerebro.
- K* 1. Vna costicciuola, che fassi nel mezzo di questi seni.
- ll* 2. Vn fosso, che fassi nel craneo della fin di questa costicciuola, che notamo con la *k*, fin'al processo dell'ottauo osso dalla testa, che notamo con la *n*, nella prima figura.
- m* 1. La parte di questo sopra detto, che fassi nell'osso della fronte.

Figura. III.

Q Vesta figura rappresenta il settim'osso del capo chiamato il Cuneale. Et insieme l'ottauo, dalla parte che risponde alle ceruella separate dall'altr'ossa del craneo. Et è rotto vn poco del mezzo dell'osso cuneale, accioche meglio si potessero veder le cauerne, che sono in lui.

- A A* L'ottauo osso della testa.
- B* Il processo piu alto di quest'osso.
- C D* Le due maggior cauerne dell'osso cuneale.
- E* Il tramezzo di queste due cauerne.
- F* Il forame dell'vna di queste due cauerne, che risponde al naso.
- G* Vna concanità, che è posta nella parte piu bassa del tramezzo, & diuide le due maggior cauerne di quest'osso. Il resto de i buchi, che veggionfi in questa parte, son quegli, che notamo nella prima figura di questa tauola.
- H* I processi piu bassi di quest'osso, simili all'ali del pipistrello.

Figura. IIII.

Q Vesta figura rappresenta vna gran parte dell'osso delle tempie, spaccato per mezzo fin presso al buco dell'orecchio, accioche meglio si potessero vedere gl'osficiuoli, che son ne gli orecchi, & le tele, che sono nel concauo d'essi.

- A A* Vna parte del buco, che va dall'orecchio in dentro:
- B* La tela che è attrauerzata in questo buco.
- C* Il primo osficiuolo dell'orecchio simile ad vn martello.

- D* Vn neruo del quinto paro di quei della testa.
- E* Vn ramo di questo neruo, che esce dal buco cieco, & va al musculo delle tempie.
- I F* Vn altro ramo dell'istesso quinto neruo, ch'esce dal buco, per lo qual entra la vena, che va all'orecchio.
- G* La distribuzione del quinto neruo della testa per la concanità del buco dell'orecchia.
- H I* Vna concanità tonda, nella cui parte d'auanti è il secondo osficiuolo notato con la *I*.
- K K* Certe cauerne, che fanfi di dentro a l'orecchio.
- L* La parte d'auanti del primo osficiuolo libero di tutte le parti.
- M* Quella di dietro.
- N* La parte d'auanti del secondo osficiuolo.
- O* Quella di dietro.
- R* Il terzo osficiuolo, di cui niuno ha fatto mentione auanti me.
- T* Tutti tre gl'osficiuoli insieme, come son nell'orecchio, guardati dalla parte d'auanti.
- Q* Gli medesimi mirati di dietro.

Figura. V.

Q Vesta figura dimostra tutti i denti d'vn lato, cosi quegli d'vna mascella, come dell'altra, cauati tutti dell'osso, accioche meglio si potessero veder le lor radici.

- A A* I denti della mascella superiore.
- B B* Quegli della inferiore.
- 1. 2.* I due denti d'auanti.
- 3.* Vn canino,
- 4. 5.* 6. 7. 8. Quattro mascellari.
- C* La parte di sopra de i mascellari.
- D* La parte di sopra de i denti.
- E* Vn mascellare spaccato, accioche si veda il voto di dentro.


Figura. VI.

Q Veste tre figure rappresentano i sette nodi del collo; la prima dalla parte d'auanti; la seconda in lato; la terza dalla parte di dietro.

- A B* 2. 3. I processi di dietro di questi nodi diuisi in due.
- C C* 2. 3. I seni ouati, che fanfi nella parte piu alta de i processi de l'ari del prim'osso.

La legatura

TABVLA V LIBRI I



Dichiar. delle Fig. del Lib. I.

D	1. 2. 3. La Legatura del primo nodo del collo, che abbraccia il dente del secondo nodo, che nota la D.
EE	1. 2. 3. I processi de i lati del prim'osso.
F	2. 3. L'asprezza ch'ha il primo nodo nella parte d'auanti in luogo del processo di dietro, il quale similmente nota la M.
M	2. 3. Il processo di dietro del settimo nodo, il quale non è spaccato.
HH	1. 2. 3. I processi piu alti di questi nodi.
III	1. 2. I corpi di questi nodi.
K	1. 2. I due primi processi straordinari, che sono vn per lato, presso alla parte piu alta de corpi de i nodi.
LL	1. 2. La parte de i processi de lati straordinaria.
MN	1. 2. I processi piu bassi di questi nodi.
O	1. 2. I buchi de i processi de i lati.

Figura. VII.

Queste due Figure rappresentano l'osso della radice della lingua chiamato Hyoide. La prima dimostralò dalla parte d'auanti insieme con li suoi processi, che si congiungono a i processi dell'ossa delle tempie simili al puntaruolo. La seconda il dimostra per la parte di dietro, e tolti via i processi.

AB	1. La parte d'auanti del maggior officiuolo dell'osso hyoide; & in particolare la A, & la B, notano vna costiciuola; la * stella nota vn tubercolo; la C, vn seno, che faffi in questa parte.
C	2. La parte di dietro di questo maggior officiuolo, laquale è alquanto compressa.
D	1. 2. I lati piu bassi dell'osso hyoide, li quali insieme con l'officiuolo di mezzo rappresentano la Ipsilon v.
EF	1. 2. La congiuntione di questi lati piu bassi col primo officiuolo.
G	1. 2. La punta del lato piu basso, laqual si giunge al processo della cartilagine, del gargarozzo simile ad vn scudo.
H	1. 2. I lati piu alti, & piu sottili, & tondi dell'osso hyoide.
IK	1. Tre officiuole che si giungono ordinariamente alle punte de i lati piu alti dell'osso hyoide.
LMN	

Tauola. VI. Figura. I.

Questa Figura rappresenta tutta la schiena insieme con l'osso grande, & il codione, da vn lato.

AB	Il collo, i sette nodi del quale mostrano i sette numeri, che sono fra la A, & la B.
CD	La parte della schiena, che fa le spalle, i dodici nodi della quale segnano i numeri, che veggionsi fra la C, & la D.
EF	I cinque nodi de i lombi.
GH	L'osso grande, ilqual faffi di sei nodi.
IK	Il codione, che si fa di quattro.
LL	I corpi de nodi della schiena. Et nota, che quello ch'io segno in alcun modo, s'ha da intendere in tutto il resto.
MM	I processi de i lati di questi nodi.
NN	I processi da basso di questi nodi.
OO	I processi di sopra.
PP	I processi di dietro.
QQ	I buchi, di doue escono i nerui della midolla spinale.
RR	La cartilagine, che è fra l'vno, & l'altro nodo.

Figura. II. & III.

Queste due Figure rappresentano l'osso grande, o venerabile, insieme co'l codione. La piu alta mostra la parte d'auanti, & la piu bassa quella di dietro, & la terza nota il codione per se stesso.

AB	C D E F G H I K 1. Queste lettere notano dieci nodi, che seguitano dopo l'ultimo de i lombi; i sei primi de i quali notano l'osso grande, i quattro vltimi il codione.
LL	M R 1, 2. I processi de i lati di questi nodi, & in particolare le due L L notano il largo del processo del secondo nodo. La R il tubercolo del processo del lato del quinto nodo, nel qual diremo non inserirsi legatura alcuna.
NN	O O P Q 2. Il lato sinistro dell'osso grande, nel qual s'incassa l'osso del gallone. Et in particolare le due N N, notano il seno longo, che vedesi nella parte d'auanti di questo lato. La P Q & mostrano quel che si vede nella parte di dietro. Le due O O, la costiciuola, che diui-

de questi

	de quasi due seni . Et nel seno di dietro la P, nota il seno , che faffi nella parte piu alta . La Q, quel che faffi nella piu bassa, la P, la costicciuola , che gli diuide .	AB	1. 2. Il seno nel qual s'incassa l'osso dell'homero; & in particolare nella seconda figura la A, nota la parte sua piu alta, ch'è piu stretta ; la B quella ch'è piu alta e piu larga ; e nella prima la A nota la parte piu rileuata di questo seno , di cui diremo nascer due legature , che legano questa congiuntura, et il principio di fuori del primo musculo, che piega il gomito.
S	1. 2. Il processo piu alto del lato sinistro del primo nodo dell'osso grande .	CD	1. 2. Il collo della paletta; & in particular la C, nota la radice del processo di dentro di questa paletta .
T	2. Vn seno, che si vede nella parte piu alta di dietro di detto process, nel qual s'incassa vn tubercolo , che tiene il processo piu basso dell'ultimo nodo de i lombi .	E f F	1. 2. Il processo di dentro di questa paletta; & in particolare lo F nota il tubercolo di lei, che giungefi alla clauicola. La E, nota la giunta, che si vede nella punta del processo. La f, nota l'asprezza di cui nasce la legatura , che va à inserirsi nel processo piu alto di questa paletta chiamata la punta dell'omero .
VX	2. Le labbra di questo seno detto . Et particolarmente la V nota il labbro dauanti; è la X, nella prima & seconda figura nota quel di dietro .	GH	2. La radice , o nascimento della spina c'hauemo detto hauer questa paletta nella parte di fuori .
Y	1. 2. La congiuntura de i processi piu bassi del primo nodo di quest'osso co'l piu alto del secondo, la qual vedesi in molti; & è simile a quella che fanno i medesimi processi ne nodi de lombi .	K	1. 2. 3. La spina di questa paletta; & in particolare dalla H, alla K, notasi il processo ch'hauemo detto chiamarsi la punta dell'omero ; & la K nota la giunta di questo processo . La I la parte piu grossa di questa spina .
Z	1. 2. La congiuntura de i processi de i lati de i due primi nodi di quest'osso .	I	1. 3. Vn seno nel qual s'incassa la clauicola.
a	1. 2. Il tubercolo del sesto nodo, che giungefi al primo del codione .	L	1. Certe impressioni , che fanno le coste in questa parte .
bb	1. 2. 3. Una legatura ch'è di natura di cartilagine , ch'è fra nodo & nodo nel codione .	MM	1. Il piu profondo della parte d'auanti della paletta, che risponde alla G & alla H della seconda figura .
c	2. 3. La cartilagine , ch'attaccasi all'ultimo osso del codione .	NO	1. L'orlo che fa il lato d'auanti della paletta .
dd	2. I processi di dietro dell'osso grande .	T	1. In questa parte faffi il primo lato piu stretto; & è piu rileuata, accioche di lei nascesse il terzo musculo , che muoue il braccio .
efg	h i k 2. Queste lettere sono alquanto coperte con l'ombra , & notano il forame di questo osso, per lo qual passa la midolla della schiena & i spilli , che tal volte veggionfi fra i processi di dietro .	P	1. Vn seno, che faffi in questo lato d'auanti, del qual nasce il secondo musculo , che stende il gomito .
1. 2	3. 4. 5. 6. 1. 2. Questi numeri notano i buchi di doue escono i nerui .	Q	2. L'orlo della parte di fuori del lato d'auanti della paletta delle spalle .
		S	2. Il seno di cui nasce in buona parte il terzo musculo , che muoue il braccio .
		T	2. In questa parte la paletta è alquanto piu scanata dalla parte di fuori per cagion dell'orlo c'ha il lato dauanti, perche quello ch'è fra le due V V, & tra la G, & la H, è piu sottile , & massiccio .
		VV	
		X	1. 2. 3. La giunta del maggior lato della paletta presso

Figura. IIII.

Queste tre figure notano la paletta delle spalle da tre parti. La prima d'auanti; la seconda di dietro; la terza in lato, la quale è di figura triangolare. Il cui maggior lato è di verso dietro, & piglia dalla Y alla Z, passando per la X. Il minore è piu alto, dalla Z alla A, passando per la a. Quel di mezzo è d'auanti dalla B alla Y.

Dichiar. delle Fig. del Lib. I.

- ta presso al principio della spina.
- Y** 1. 2. 3. La giunta del canto piu basso della paletta.
- Q** 1. La parte del piu alto canto di questa paletta, che si rileua alquanto verso la parte sua d'auanti.
- Z** 1. 2. 3. Il canto piu alto del maggior lato di questa paletta.
- a** 1. 3. Vn mezzo cerchio, che fassi nel lato piu alto di questa paletta.
- b c** Il seno, che fassi nella parte di fuori di questa paletta, fra la spina, & il processo suo piu alto; & in particolare la *b*, nota la parte piu sottile, & trasparente di questa paletta; la *C*, nota vn spillo, che vedesi molte volte in questa parte, di doue entrano le vene, che mantengono questo osso.

Figura. V.

Queste Figure mostrano la Clauicola finestra; la prima per la parte dauanti, & di sopra; la seconda per la parte di dietro; la terza dalla parte di sotto.


- A** 1. 2. 3. La testicciuola della Clauicola, che giungesi all'osso del petto.
- B** 1. Il primo canto della testicciuola.
- C** 1. 2. 3. Il secondo.
- D** 1. 2. 3. Il terzo.
- E** 1. 3. Vna riga rileuata, che vedesi nella parte d'auanti della clauicola all'incontro del primo angolo, che notamo con la *B*.
- F** 2. 3. Vna riga rileuata, che vedesi nella parte piu bassa della clauicola; & in particolare la *G*, nota vn'asprezza, che è al fine di questa riga.
- G** 1. 3. La parte di mezzo piu sottile & massiccia, & quasi tonda.
- HI** 1. 2. In questa parte caminando la clauicola verso il processo piu alto della paletta della spalla fassi piu larga; & per la parte piu alta, che si nota similmente con la *I* fin' alla *K*, fassi gobba.
- K** 1. Vna asprezza, che vedesi nella parte d'auanti della clauicola, ch'è molto scauata.
- L M** 3. La scauatura, che fassi nella parte piu larga del lato di sotto della clauicola, la quale è alquanto aspra.
- N** 3. In questa parte la clauicola è alquanto

- aspra, & anchora presso la *M*, della quale asprezza nasce vna legatura, che s'inferisce nel processo di dentro della paletta della spalla.
- O** 2. 3. La gobba della clauicola, che risponde al concauo del petto; & in particolare vn tubercolo, che fassi in questa parte.
- P** 3. Vna asprezza, che vedesi nella parte piu bassa della clauicola, finisce inui, doue si giunge al processo piu alto della paletta delle spalle.
- Q** 1. 2. 3. Nella terza nota il tubercolo, che congiungesi al processo detto; nella prima & seconda, è il luogo, doue è questo tubercolo.

Figura. VI.

Queste due figure rappresentano l'osso dell'omero sinistro; la prima per la parte dauanti; la seconda per quella di dietro.

- ABC** 1. 2. La testa dell'osso dell'omero, che giungesi alla paletta delle spalle, la quale è fatta di vna giunta.
- DE** 1. 2. Il tubercolo di fuori della testa, o giunta, atui s'appoggiano le legature di questa congiuntura; & in particolare la *D*, nota la parte sua d'auanti; & la *E*, quella di dietro.
- FG** 1. 2. L'impressione che diuide la testa di dentro del tubercolo, che fassi nel lato di fuori.
- HI** 2. Il seno, che diuide la parte di fuori della giunta dell'omero in due; & in particolare la *H*, nota la parte del seno, che è dell'osso.
- KLM** nella giunta; la *I* quella, che è nel collo.
1. 2. La girella di quest'osso, sopra la quale giuoca il gomito; & in particolare la *K*, nota il seno di questa girella; & la *L* & *M*, i suoi lati.
- N** 1. Il fosso, che fassi sopra la girella nella parte d'auanti dell'omero.
- O** 2. Il fosso, che fassi nella parte di dietro di questo osso sopra la girella, nel qual s'incassa il processo di dietro del maggior stinco del braccio.
- P** 1. 2. La testa di fuori dell'osso dell'omero, nella quale s'incassa il minor stinco.
- Q** 1. 2. Vna riga rileuata, ch'ha quest'osso in questa parte.



Dichiar. delle Fig. del Lib. I.

R	2. Vn seno che faffi in questa parte pe'l quarto neruo che va al braccio.	E	1. 2. Il seno del maggior fusello, che s'incassa nella girella dell'osso dell'omero.
S	1. 2. La testa di dentro dell'osso dell'omero.	L	1. Certe asprezze, che si veggono nella radice del processo di dentro del maggior fusello, che segnato con la S.
T	1. Vn seno, che faffi nella parte d'auanti della testa di dentro, per lo qual passa il terzo neruo, che va alla mano.	M	1. 2. Il collo del minor fusello.
V	1. Il seno, che faffi nella parte di fuori di questa medesima testa, per lo qual passa il quinto neruo, che va alla mano.	N	1. 2. La testa del minor fusello, che si congiunge alla testa di fuori dell'osso dell'omero, mediante vn seno, che si fa nel suo mezzo.
XY	Z 2. La parte di dietro de' osso dell'omero, & in particolare la X, nota la parte piu alta, che e' alquanto scauata; & la Z, mostra la piu bassa, ch'è rileuata; & la Y, la impressione, per la qual passa il quarto neruo, che va al braccio.	P	1. 2. Il collo del maggior fusello.
abcd	1. La parte d'auanti di quest'osso; & in particolare la a, nota la parte piu rileuata; e la b, & la c, le parti piu basse, che sono dai lati di quella che è rileuata. Et le tre prime notano la parte piu bassa di questo osso, che e' alquanto scauata; e la d, nota la piu alta, che è piu rileuata.	Q	1. 2. La testa di questo fusello presso al bracciale.
e	Vna asprezza, che è presso al lato d'auanti dell'osso dell'omero.	R	1. 2. Il processo del maggior fusello simile ad vn puntaruolo.
f	Vn'altra asprezza, ch'è nella parte d'auanti di quest'osso, presso al seno, di doue passa il principio di fuori del primo muscolo, che piega il gomito.	T	1. 2. La cartilagine, ch'è tra vna gran parte della congiuntura del minor fusello, & il bracciale; & particolarmente nella prima figura, nota la parte di questa cartilagine, che nasce dalla radice del seno della giunta del minor fusello, il qual notaremo con la x y z; & nella seconda nota la parte di questa cartilagine, che giungesi alla congiuntura del minor fusello.
		V	2. Vn seno, che faffi nella giunta del maggior fusello, e nell'istesso, per lo qual passa vna corda del secondo muscolo, che stende il bracciale.
		XYZ	2. Vn triangolo, che faffi nella parte scarnata del maggior fusello; & in particolare la Z nota la testa del triangolo.
		aa	1. 2. La prima riga rileuata del maggior fusello.
		βb	1. 2. La seconda; & in particular la β nella prima nota la parte di questa riga, che piega verso il collo del maggior fusello.
		cc	1. 2. La terza riga di questo maggior fusello.
		d	1. Il lato di questo fusello, che è fra la prima & seconda riga.
		e	2. Il lato del medesimo, che è fra la prima riga, & la terza.
		f	1. Il lato ch'è fra la seconda riga del maggior fusello, & la terza.
		gg	2. Vna riga, che vedesi nel lato notato con la e.
		hi	1. Doue si giunge il minor fusello al maggiore: & in particolare la h, nota la parte verso il gomito: & la i verso il bracciale.
		kk	1. 2. Il vacuo, che è fra l'vn fusello, & l'altro.

Figura. VII.

Queste due Figure rappresentano i due fuselli del braccio diritto; la prima dalla parte di dentro; la seconda dalla parte di fuori.

AB	1. 2. Lo spatio che è fra queste due lettere, è quello, ch'è dal gomito al bracciale; & la A nota la parte verso il gomito; & la B verso il bracciale.
C	1. Il processo d'auanti del maggior fusello, che s'incassa nel seno, ch'hauemo detto farsi nella parte d'auanti dell'osso dell'omero sopra la girella, & in particular la parte di fuori di questo processo.
D	1. 2. Il processo di dietro, che chiamiamo comunemente il gomito, & particolarmente la parte di dentro di questo processo.

La parte

- n* 1. La parte di dentro della giunta piu bassa del minor fusello.
- p* 2. La parte di fuori di questa giunta.
- q* 1. 2. Il processo aspro del minor fusello, che è presso al suo collo.
- r* 1. 2. Vna riga aguzza del minor fusello secondo il suo lungo, che guarda al maggiore.
- ss* 1. Il lato di dentro di detta riga.
- tt* 2. Quello di fuori.
- u* 2. In questo luogo vedesi alquanto aspro il minor fusello per cagion de i muscoli, che l' muouono, che s' inseriscono qui.
- xyz* 1. Il seno, che fassi nel minor fusello, nel qual s' incassa il bracciale: & in particolare la *z*, nota vn tubercolo, che vedesi in lui alquanto rileuato; la *y*, & la *x*. notano due seni, ne quali il tubercolo diuide tutto il seno.
- a* 1. La parte piu rileuata della giunta del minor fusello, la quale accresce la parte piu alta del seno, a cui si giunge il bracciale, & esce piu in fuori, che l' processo del maggior fusello simile ad vn puntaruolo.
- γδεξ* 2. Queste lettere tutte notano l' vnione della giunta del minor fusello presso al bracciale; & in particolare la *γ* nota il primo seno, che fassin questa parte; la *δ*, il secondo; la *ε*, & la *ξ*, il terzo; e la *κ*, il quarto.
- θ* Il seno commune a i due fuselli.

Figura. VIII.

DI queste due Figure, la prima mostra la mano per la parte di dentro; la seconda per quella di fuori.

- I. 2.* 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. L' otto ossa del bracciale secondo che si mostrano stando in suo luogo ciascun' osso; & ogni osso serua il nome del numero dal quale è segnato.
- I. II.* I I I. I I I I. 1. 2. Le quattr' ossa della palma, le quali anchora pigliano il nome dal numero, dal quale son segnate.
- AB* C. 1. 2. Le tre ossa del pollice.
- DE* F. 1. 2. Le tre dell' indice. Ne piu, ne meno veggionsi nelle altre dita.
- N* 1. 2. Vn' officiuolo, ch' è dal lato di fuori della congiuntura dell' ottau' osso del bracciale, & quello del pettine, che sostiene il

- dito picciolo.
- O* 2. Il processo dell' ottauo osso del bracciale, ch' è rileuato verso la parte di dietro del bracciale.
- P* 2. Il processo del quint' osso del bracciale, di cui nasce quella legatura attrauerfata, che diremo inserirsi nel processo dell' ottauo, che notamo con la *O*.
- Q* 2. La giunta piu alta dell' osso della palma, che sostiene l' indice, laqual si giunge al sesto, & in parte al quinto osso del bracciale.
- R* 2. La giunta dell' istesso osso, che fa vna testicciuola, che s' incassa nel seno del primo osso del dito indice.
- S* 1. 2. Il vacuo fra l' osso della palma, che sostiene l' indice, & quel, che sostiene quel di mezzo; & lo medesimo debbesi intendere dell' altre ossa della palma, cosi ne gli spatij, come nelle congiunture.
- T* 1. 2. Le due officiuole simile al seme del sesame, che veggonsi nella parte di dentro della seconda congiuntura del pollice; nella prima mostrasi quel piu di dentro; & nella seconda quel piu di fuori.
- VV* 1. Due officiuole simile al seme del sesame, che son nella prima congiuntura del dito indice.
- X* 1. Vn' officiuolo come i sopra detti, & vn piu picciolo, che vedesi nella seconda congiuntura dell' indice.
- Y* 1. Vn' altro officiuolo, che vedesi nel terzo articolo del pollice. Ne gli altri diti se ne veggono, ne piu, ne meno, che nell' indice, & per ciò non curarò di segnarli con lettere.

Figura. IX.

AMendue queste Figure mostra no i stinchi della gamba; la prima dalla parte d' auanti; la seconda per quella di dietro.

- AB* 1. 2. La piu alta giunta del maggior stinco, & particolarmente nella seconda mostra la congiuntura di questa giunta.
- C* 1. La giunta piu alta del minor stinco.
- D* 1. La giunta da basso del maggior stinco.
- EF* 1. 2. La giunta piu bassa del minor stinco.
- GF* 2. I seni, ne quali s' incassano le teste dell' osso della coscia.
- KI* 2. Il tubercolo, che diuide questi due seni, & s' incassa

Dichiar. delle Fig. del Lib.I.

	s'incassa fra le due teste dell'osso della coscia.		
V	2. La congiuntura piu alta di questi due stinchi.		
X	2. La piu bassa.		
Y	1. 2. Il spatio fra questi due fuselli.		
Z	1. 2. In questa parte il minor stinco non cammina diritto, anzi si piega alquanto verso in dentro, facendosi scauata di fuori, & rileuata di dentro.		
ab	1. La parte d'auanti del maggior stinco, nel laqual s'inferiscono i muscoli, che stendono la gamba.		
Φi	1. 2. La giunta del maggior stinco, che fa il tallone di fuori; & in particolare notano il processo di questa congiuntura,		
l	1. Vn seno aspro, che faffi nella parte d'auanti della giunta piu bassa del maggior stinco, del qual nasce vna legatura di natura di cartilagine, che s'inferisce nel collo dell'osso del tallone.		
m	1. In questa parte vedesi vn seno, per lo qual passano tre corde, che vanno alla pianta del piede.		
op	1. La parte del minor stinco, che è scaricata.		
qq	2. Vn seno del minor stinco, per lo qual passano il settimo, & ottauo muscolo, che muouono il piede.		
r	2. Il seno, che faffi nella giunta piu bassa del minor stinco, da cui nasce vna legatura, che va all'osso del tallone.		
ss	1. Il primo canto del minor stinco.		
tt	1. 2. Il secondo.		
uu	1. 2. Il terzo.		
xx	2. Il primo lato del minor stinco; & in particolare notano vna riga rileuata, della qual nasce il muscolo, che stende il pollice.		
aa	1. Il secondo lato del minor stinco.		
ββ	2. Il terzo.		
γγ	1. Il primo canto del maggior stinco.		
δδ	1. 2. Il secondo.		
εε	1. 2. Il terzo.		
ζ	1. Il primo lato del maggior stinco.		
η	1. Il secondo.		
θ	2. Il terzo.		
κκ	2. Vna riga aspra, che vedesi nel terzo lato del maggior stinco, nella qual s'inferisce il muscolo, che s'asconde nel chimo del ginocchio.		
		Figura. X.	
		Q ueste due Figure mostrano il piede sinistro; la prima per la parte di cima; la seconda per la pianta. Et debbesi auuertire, che per la trascuraggiue dell'intagliatore le lettere sono intagliate secondo il lungo del piede.	
		Γ 1. 2. L'osso che è veramente il tallone.	
		Δ 1. 2. L'osso del calcagno.	
		Θ 1. 2. L'osso simile ad vna nauicella.	
		I. 2. 3. 4. 1. 2. Le quattro ossa del collo del piede, delle quali ciascuno ha il nome del numero, dal quale è notato.	
		I. II. III. IIII. V. 1. 2. Le cinque ossa del pettine del piede. Nella seconda non ho posto segnali per esser chiara senza loro.	
		ΛΞ 1. 2. L'ossa de i dadi.	
		c 2. La parte di dietro dell'osso del calcagno.	
		de 2. La parte di dentro di questo medesimo osso; & in particolare la e, nota il seno, per lo qual passano le corde, che vanno alla pianta del piede.	
		fg 1. Il lato di fuori dell'osso del calcagno; & in particolar la g, nota la parte di questo lato, per laqual passano le corde del settimo, & ottauo muscolo del piede.	
		ζη 2. Il lato piu basso dell'osso simile ad vn dado; & in particolare, la η, nota il seno, per lo qual passa la corda del settimo muscolo, che muoue il piede.	
		μ 1. 2. Vn osicciuolo simile al seme del sesame, che è dal lato di fuori della congiuntura dell'osso del pettine, che sostiene il dito picciolo con quel che è simile al dado.	
		vv 1. 2. Quei vacui, che son fra l'ossa del pettine.	
		ξξ 1. 2. Le testicciuole dell'ossa del pettine, nelle quali s'incassano le prim'ossa de i dadi.	
		π Questa lettera non mostra processo alcuno particolare dell'osso del pettine, che sostiene il pollice (come dice il Vesalio;) perche quest'osso non ha particolar processo in questa parte, piu che gli altri, anzi ha vn seno, nel quale s'inferisce il settimo muscolo, che muoue il piede.	
		ρ 2. Il processo dell'osso del pettine, che sostiene	

il dito

- STV 1. 2. Le tre ossa del dito indice, & l'istesse hanno quel di mezzo, & quel del cuore, & il picciolo.
- x p 2. Le due ossa del pollice.
- ↓ w 2. Dui ossicciuoli, che veggonfi di sotto all'osso, che sostiene il pollice, presso al primo articolo del dito sopra detto.
- * 2. Vn ossicciuolo, che si troua nel secôdo articolo del pollice. Il resto delli ossicciuoli come seme di sesame, che veggonfi ne gli altri articoli, non l'ho notate con lettere, parendomi cosa superflua.

Tauola VII. Figura I. & II.

DI queste due Figure la prima rappresenta il gargarozzo per la parte d'auanti insieme con la canna del polmone, & con tutti i suoi rami, che si distribuiscono per lo polmone. La seconda rappresenta solamente il gargarozzo, & il tronco della canna del polmone per la parte di dietro. Et perche il modo, nel quale questi rami si distribuiscono per lo polmone, vedesi chiaramente senza lettere, per ciò non mi sono curato di ponerle.

Figura III. IIII. V. VI. VII.
VIII. IX. X. XI. XII. XIII.
XIIII. & XV.

DI queste Figure tutte la terza rappresenta la prima cartilagine del gargarozzo simile ad vn scudo antiquo (chiamata per ciò scutiforme) dal lato dritto; La quarta mostra la medesima cartilagine per lo lato di dietro; La quinta per quello d'auanti. La sesta mostra la seconda cartilagine del gargarozzo per la parte d'auanti; la settima per lo lato dritto d'auanti; l'ottaua per quel di dietro. La nona rappresenta la terza cartilagine del gargarozzo per lo lato dritto; la decima per la parte d'auanti; l'vndecima per quella di dietro. La duodecima mostra la parte piu bassa della coperchia del gargarozzo chiamata Epi-

- glottis; la terza decima la piu alta, che mira verso'l palato. La quartadecima rappresenta vna cartilagine della canna del polmone simile ad vna C, per la parte d'auanti; la quintadecima per quella di dietro.
- AB 3. 4. 5. I processi piu alti della prima cartilagine del gargarozzo.
- CD 3. 4. 5. I due processi piu bassi dell'istessa cartilagine.
- EF 7. 8. La parte della seconda cartilagine, a cui si congiungono i due processi da basso della prima cartilagine; ben che nella settima non vedasi piu della E.
- GH 3. 4. 5. In questa parte la prima cartilagine pare piu stretta, & corta, che in niun'altra; & tra la G & H vedesi vna radice, che diuide tal cartilagine in due.
- I 6. 7. La parte di dentro della seconda cartilagine, che risponde al voto del gargarozzo.
- KL 6. 7. La parte da basso di questa medesima cartilagine, che fa vn cerchio tondo; & in particolar la K, nota la parte d'auanti di questo cerchio, che si può toccar co'l dito di sotto della noce; la L, quella di dietro, la qual scende in giù, come vn processo; & e anchora notata nella figura ottaua con la L.
- M 7. 8. Vna riga rilenata, che si vede nella parte di dietro della seconda cartilagine.
- NO 7. 8. Dui seni, che fansi, vno per lato, secondo il lungo di questa riga.
- PQ 6. 7. 8. Dui tubercoli, o testicciuole della seconda cartilagine, che s'incassano ne i seni della prima.
- RS 9. 10. 11. Le due parti della terza cartilagine.
- T 10. 11. In questa parte della terza cartilagine non è altro che le tele, & legature del gargarozzo.
- VX 9. 10. 11. Le parti della terza cartilagine, col mezzo delle quali si giunge alla seconda.
- YY 9. 10. I processi di questa terza cartilagine, che fanno la linguetta del gargarozzo, col cui mezzo la voce fassi piu grossa, o sottile, secondo che questo processo piu si ferra, od apre.
- Z 9. 10. 11. La parte della terza cartilagine simile alla bocca del boccale da dar acqua a le mani.
- a 12. 13. La radice del coperchio del garga-

Dichiar. delle Fig. del Lib. I.

	<i>rozzo, laqual nasce della prima cartilagine.</i>
<i>b</i>	<i>12. 13. La punta di questo coperchio, la quale cammina verso dietro, & cuopre il gargarozzo, quando inghiottiamo alcuna cosa.</i>
	Oltre a queste Figure mira nella tavola sedicesima del Libro secondo, le prime quindici figure, le quali ti serviranno assai ad intender queste.
	Figura XVI.
	Q uesta Figura rappresenta, libere da tutte le parti, le cartilagini di sopra, & di sotto, delle palpebre, delle quali nascono le pene degli occhi; le quali non segno qui con lettere essendo senza loro chiarissime.
	Figura XVII.
	Q uesta Figura rappresenta le cartilagini simili alla Luna nuova, che veggonsi nel seno della parte più alta della giunta del maggior stinco della gamba.
<i>M</i>	<i>La cartilagine, che è nel seno del lato diritto della parte più alta, della giunta del maggior stinco, nel qual s'incassa la testa di fuori dell'osso della coscia.</i>
<i>NN</i>	<i>La cartilagine, che è nel lato sinistro, nel quale s'incassa la testa di dentro dell'osso della coscia.</i>
<i>OO</i>	<i>In questa parte paiono due cartilagini più grosse, che in alcun'altra.</i>
<i>PP</i>	<i>In questa parte si congiungono le cartilagini del lato diritto a quelle del lato sinistro, col finire amendue in una punta aguzza.</i>

Figura XVIII.

A Mendue queste Figure rappresentano l'vngne della mano; ne più, ne meno, che quando si scauano dal dito, dappoi ch'è cotta la mano, quando si vuol fare il scheleto. Et la prima di loro, che è notata con le lettere, mostra la vngna per la parte di dentro, che è attaccata alla carne; la seconda per quella di fuori.

La parte dell'vngna, che vedesi fuori della pelle.

La radice dell'vngna, la quale è tenera, & è coperta con la pelle.

Figura XIX.

Questa Figura rappresenta la cartilagine, che vedesi nella congiuntura della clauicola, col processo della paletta della spalla chiamata la punta dell'omero.


Figura XX.

Questa Figura rappresenta la cartilagine, che trouasi nella congiuntura della clauicola col l'osso del petto.





Et così questo hauemo finito la dichiarazione delle Figure del primo libro, con le quali non ho posto da per se tutte quelle ossa, che ne gli scheletri non si possono ageuolmente considerare.



Fine del primo libro.

FIG. I



II





LIBRO SECONDO

dell'Historia dell'Anatomia del
corpohumano.

COMPOSTA PER GIOVANNI
VALVERDE MEDICO,

NEL QUALE SI TRATTA DELLE
LEGATURE, ET MUSCVLI.

Delle Legature.

Cap. I.



AVENDO trattato, nel primo libro, dell'Ossa, & cartilagini, che sono, come fondamento, & armatura dell'altre parti del corpo; sarà ragioneuol trattare in questo secondo, delle lor Legature, della carne, de muscoli, della tela carnosà, del grasso, della pelle, & della pellicciola, & vltimamente della tela, che rauuolge tutte queste ossa, chiamata per cio perioftion; col mezzo delle quali l'ossa, & cartilagini si congiungono, & si vestono, faccendo principio dalle Legature; lequali communalmente nò meno si chiamano nerui (come nel primo libro hab-

biam detto) che i capi de muscoli, o che gli instrumenti, & vasi, per doue la virtù del sentore passa dal ceruello, all'altre parti del corpo. Queste Legature son composte di parti fra se stesse simili, & dure, (benche nò tanto, quanto le cartilagini) bianche, senza sangue, & massiccie, & nascono per la maggior parte d'alcun'osso, o cartilagine, o da alcuna dura tela. Il primo loro offitio è legare l'vn osso coll'altro; dal che, per essere il piu importante, pigliarono il nome. Il secondo è abbracciare le corde de muscoli in guisa, che nò possano scuiare dal cammino, per doue passano; hor faccendosi vn pòte, sotto del quale passano, come si vedrà nella parte di dentro del^a bracciale, & nel collo del piede; hor anelli, come nella parte di^b fuori del medesimo bracciale notaremo. Il terzo loro offitio è far pauimento, o letto, alle corde de muscoli, quando passano per sopra alcun'osso aspro, & aguzzo; come si vedrà, quello nella parte di dentro^c del bracciale; questo nell'osso^d dell'anche. Il quarto è coprir le corde de muscoli, come si vede nella parte di dentro^e del braccio. Il quinto è separare i muscoli, l'vno dall'altro, facèdo vn tramezzo, come fanno nella^f gamba, nel braccio, & ne buchi^h dell'osso del pettignone; nelle quai parti queste legature separano i muscoli di fuori da que di dentro. Il sesto offitio (non meno importante che'l primo) è aiutare alla còposition deⁱ muscoli, nel modo, che nel seguète capitolo diremo. Senza queste legature, ne son molt'altre, che si potrebbero chiamare del medesimo nome, parlando piu licentiosamente; come son le tele, che cuoprano i muscoli; il peritoneo; le tele del cuore; quelle, che abbracciano le coste, quelle, che fendono il petto pel mezzo, & la dura madre; le quali tutte nascono da osso o cartilagine, non meno, che qual si voglia delle sopradette, & legano, o abbracciano sempre alcuna cosa. In questo modo si potrebbe anche chiamare ogni musculo legatura; principalmente que, che nascono d'osso o cartilagine, & finiscono in vn'altro; come fan que, che nascono del^g gal-lone, & s'inferiscono nell'osso della coscia; i quali non ostante, che seruano a m^uuella coscia, aiutano anchora manifestamente a legare, difendere, & vestire la congiuntura. Ma tutte le legature son differenti fra se stesse secondo il numero de loro offitij, che hanno; perche alcune ne han molti insieme, altre ne hanno vn solo; come nel progresso dell'istoria noteremo. Sono anchora nel medesimo modo diuerse nel nascere, & finire,

*Di che son fatte
le Legature.*

*L'offitio delle le-
gature.
Il secòdo offitio.*

Il terzo offitio.

Il quarto.

Il quinto.

Il sesto.

Altre legature.

*Differenza fra
le legature.*

G 3 perche

a t. iij. 0
b t. ij. iij. 1.
2 3. 4. 5. 6.
c t. vij. s
d t. xij. αβλ
e t. iij. βγδ.
f t. xv. fig. xv.
g t. vij. v
h t. xiiij. b
i t. xv. fi. vij.

k t. viij. A. t.
ix. 0 II

Libro Secondo

perche alcune nascono di sole cartilagini, & finiscono parimente in loro, come sono alcune del gargarozzo. Alcuni altre nascono d'ossa, & s'inferiscono in loro, come quelle del ginocchio, quelle dell'omero, & quasi tutte l'altre. Alcune son comuni, & all'osso, & alla cartilagine, come quelle che congiungono l'osso del petto cō le cartilagini delle coste. Altre nascono d'osso o cartilagine, & finiscono in qual si voglia altra parte del corpo, come sono quasi tutte le tele. Alcune nascono d'un osso, & finiscono in lui, come le cinque legature delle sei, che sono nella parte di fuori del bracciale, perche la prima appartiene al maggior fusello, & al minore. Sono anche le legature differenti in sustanza; perche alcune son piu tenere, & di natura di tela, come son quasi tutte quelle che abbracciano le congiunture; quantunque fra queste ne siano delle piu tenere, l'une, che l'altre, come son quelle de gli articoli delle dita, piu che quelle dell'omero, & quelle dell'omero piu tenere, che quelle della coscia. Alcune ve ne sono piu dure, che le sopra dette, ma ben piu tenere, che le cartilagini, come quella, che nasce dal mezzo della testa della coscia, & s'inferisce nel fosso dell'osso del gallone, & come quelle, che stāno tra corpi de nodi ^m della schiena, & come quella, che dicemmo nascer del tubercolo, che sta in la parte di sopra della ⁿ giunta del maggior stinco della gāba, che s'inferisce nell'osso della coscia, & in vna parola, quale son tutte quelle, che sono fra osso, & osso. Son differenti anchora in sito; perche alcune stan di fuori, come son le piu tenere, altre di dentro, come quelle, che sono di natura di cartilagine. In figura; perche alcune son larghe, & sottili, come quelle, che sono fra gli due fuselli, cosi della gāba, come del braccio, & molt'altre, che abbracciano le congiunture tutto intorno. Altre son strette, & grosse, & di queste alcune son tonde, come ^o quella, che nasce del processo simile ad vn dente del secondo nodo del collo, & s'inferisce nella collottola, & ^p quella, che abbraccia l'istesso dente, per di dietro, & ^q quella, che è nel mezzo della testa dell'osso della coscia, che s'inferisce nel fosso del gallone. Alcuni altre son piane, come la terza legatura particolar dell'omero, & quelle, che legano il ginocchio, lequali se ben son grosse, nō sono tonde, come ne anchora sono le legature di natura di cartilagine, che legano l'osso del tallone, col minor stinco della gamba. Son finalmente differenti le legature, perche alcune son massiccie, come si vede nel piu di loro. Altre son pertugiate, come quelle del bracciale, che dicemmo essere come anelli, per dar luogo alle corde de muscoli, & ^r le tele de buchi dell'osso del pettignone, per le quali passano vn neruo, vna vena, & vna arteria, & quella che sta fra l'vno, & l'altro stinco della gamba, che parimente è forata per dar luogo ad vna vena, che passa per lei. Queste differenze sono fra le legature. Ma tutte concordano in non esser molto sensitiue, perche meno si straccassero nel continuo moto delle membra; per la cui ragione fu anchora ordinato quell'humor vntuoso, che nelle congiunture si vede, il quale hu mettandole di continuo, fa, che piu facilmente si muouano l'ossa.

Della Pelle, et Pellicciola, et della Tela carnosā, che cuopre tutto'l corpo, et del Grasso, che sta tra la pelle, et la detta tela. Cap. 2.

PER CHE parlando de muscoli, potrei causare alcuna oscuritade, per nō hauer trattato della Pelle, della Pellicciola, del Grasso, & della Tela carnosā, le qual parti sono vna vniuersal coperta di tutto il corpo, serā bene dichiarare prima, che cosa siano, cominciando dalla pelle. La quale è mezzana tra dura, & tenera, simile ad vn neruo pieno di fangue; anzi è vn corpo mezzano tra carne, & neruo (ne molto pieno di fangue, come la carne, ne in tutto senza, come nerui) fatto del seme non meno, che l'altre parti spermatiche del corpo; per la qual cosa, se si rompe, non può tornare a cōsolidarsi senza lasciar al cun segno. Questa pelle s'attacca alle parti, che le son di sotto, i diuersi modi; perche d'altra sorte s'attacca alla palma della mano, & pianta del piede, che alla fronte; d'altra sorte alle labbra, naso, orecchie, & al fondamēto, che all'altre parti. Ma tutte si possono molto ben scorticare, ne piu, ne meno, che la pelle di qual si voglia altro animale, & pcio i Greci la chiamarono Derma, che vuol dir cosa facile da scorticare. Ma è da notare, che si come è diuersa nell'attaccarsi, cosi è anche in riceuere la distribution de nerui, che vengono a lei.

l t. xv. fi. xvij.
o
m ta. xv. fig.
xxviii. z
n ta. xv. figu.
xxvij. x

o ta. xv. fig.
xxviii. l
p la med. K
q la med. fig.
xvij. o.

r t. xliij. b b
f t. xv. fi. xv.
T

Della Pelle.

lei. Perche la pelle della palma della mano riceue molti ramuscelli di nerui, come al suo luogo diremo; quella della testa ne riceue pochissimi, non ostante, che non vi sia alcuna sua parte priuata totalmente di loro. La qual cosa dimostra manifestamente, quanto credito si deggia dare a coloro, che negano il sentimento della pelle, non ostante che l'esperienza ci dimostri ogni giorno il contrario ne feriti, che l'hanno scorticata; ne quali non si ricucie senza lor gran dolore, anzi con molto maggiore, che alcun'altra parte della ferita. E cosi anchora differete questa pelle, nell'essere in alcune parti piu grossa, come nelle piatte de piedi, & nel capo, in alcun'altre piu sottile come nella faccia, in alcun'altre mezzana, come nella parte di dietro della mano; ma tutt'ella è piu sottile ne gli huomini, che ne gli animali di quattro piedi. Nò meno è differente la pelle nel muouersi, o nò; perche in tal parte si muoue, come nella frôte, & in alcun modo nella collottola, & nella faccia, & nella parte dināzi del collo, in alcun'altre nò, come in tutte l'altre parti del corpo. La parte, che si muoue o lo fa mediāte alcun particular musculo, come nella frôte, collo, mascelle, & labbra, o medianti le parti, che le son vicine, come fa la pelle delle guance. E anchora questa pelle da vna parte pelosa, come nella testa, di sotto alle ascelle, nel pettignone, & ne gli huomini nella barba, in altre parti nò, come nella parte di dietro delle mani, e di sotto de piedi. Ma tutt'ella è piena di certi picciol spiragli, chiamati da Greci Poros, per gli quali si purgano le superfluitadi del corpo, & nascono i capegli. Questi spiragli son piu piccioli nella palma delle mani, & nelle piante de piedi, che in alcun'altra parte. Senza questi buchi ne ha parimente la pelle de gli altri; liquali manifestamente si conoscono, come son que del naso, occhi, bocca, orecchie, membro, fondamēto, & vgne. Perche cagione sia fatto ognundi questi buchi, quando tratteremo delle parti, che stāno di sotto alla pelle, lo diremo piu particolarmente. Hora è da sapere, che questa pelle è couerta tutta d'vna pellicciuola, senza sangue, sottile come tela di cipolle, quantunque in alcune parti (massimamēte nella palma delle mani, nella pianta de piedi) sia piu grossa; la quale chiamarono i Greci Epidermida, cioè fior di pelle. Questa pellicciuola se tal volta si rōpe, come ordinariamente fa ne rognosi, o si spicca, come quando si fa alcuna vessica, facilmente torna a regenerarsi, senza lasciar segno alcuno; quello, che nò fa la pelle, si per la ragione detta, si perche finiscono in lei molti rami di vene, arterie, & nerui; anzi pēsarono alcuni nò esser la pelle altra cosa, ch'vna mescolāza di tutte queste cose. Sotto a qsta pelle è di molto grasso, ne piu, ne meno, che ne porci; il qual si vede in qual si voglia corpo, che non sia molto magro, & percio si puo l'huomo facilmente scorticare, senza toccar niente la detta tela carnosā; il che non intrauiene nelle simie, & ne cani, come bene in loro notò Galeno, & haurebbe notato il contrario nell'huomo, se hauesse potuto far di lui esperienza. Questo grasso si fa del sangue, ilqual rifuda delle vene, che passando per la tela carnosā s'inferiscono nella pelle. Il qual sangue si per esser priuo di sufficiente calor naturale, si per esser appresso questa mēbrana, che di sua natura è fredda, si congela, & conuerte in grasso. Et per cio ne gli animali freddi, & humidi, come sono la donna, & il porco, se ne troua maggior quantità, che ne gli caldi, & secchi, come sono il cane, & il leone, & la simia, & altri, ne quali se ne ritroua molto poco, o niente. Anzi tolto via l'huomo, il porco, il riccio, la pecora, & il ghiro, niun'altro animale di quattro piedi ho veduto, che habbia grasso fra la pelle, & la tela carnosā. Trouasi anchora questo grasso in altre molte parti del corpo; allequali aiuta, & souuene, con dar lor nutrimento, se ne han bisogno, & faccendole parer piu grosse, & piene; per la qual cosa credo, che i Greci lo chiamarono Pimeli. Questo grasso è piu bianco, secondo che l'huomo è piu giouane, & piu giallo, cò piu è vecchio. La cagione di sua bianchezza attribuir la (come fanno alcuni) al tuo essere di natura d'aere, parmi cosa da ridere; perche l'olio, secòdo questa ragione, dourebbe esser bianchissimo, & i denti negrissimi, poi che non è cosa manco aerea, che questa, ne piu che quello; ma lasciamo questo, che importa poco all'historia. Di sotto a questo grasso si troua vna tela piu forte, & grossa, che la pellicciuola, & ha certi fili sparti per essa, i quali passando per lo grasso, vanno fin' alla pelle; col mezo de quali s'attacca anchora a muscoli, che le son di sotto, & s'attacca molto forte anchora alla pelle, col mezo di molte vene, & d'alcune arterie, che vanno a nutrire la pelle, & anchora con alcuni rami de nerui che le comunicano la virtù sensitua, iquali passando per questa tela & grasso s'inferiscono nella pelle. Questa tela è vgualmente grossa da ogni parte, & non ha mouimento, eccetto

La pelle ha molto acuto senso.

I picciol buchi della pelle.

La pellicciuola.

Il grasso.

Perche il grasso è bianco.

In che parti la tela carnosā è piu grossa, & si muoue.

Libro Secondo

eccetto che nel collo, nella fronte, & nella collottola, & nella faccia; doue s'ingrossa, col mezzo di certe fibre di carne, di sorte, che piglia nome di musculo. Ben è vero, che tal volta si son veduti huomini muouerel'orecchia, il che ho io veduto in Roma in vno Siuigliano, che si chiamaua il Manfiglia; altri muouono il fil della schiena, & alcun'altre parti; nelle qual tutte questa tela è piena di fili di carne, come la pelle de caualli, & asini. Questa tela la chiamarono i Greci Imina, che vuol dir Tela; dipoi gli Arabi gli aggiunsero, con gran ragione, Carnosa, del qual nome communalmente si chiama; benché chiamano essi anchora i musculi del ventre tutti insieme di questo nome. Di sotto a questa tela, fra lei & i musculi, vi è vn lento, & lubrico humore, che serue a ciò, che con manco fatica si muouano i musculi; il che è comune a tutte le tele, che cuoprono alcun corpo, che si ha da mutare tal volta dal suo luogo. Perche questo humore le tiene vnite, accioche piu facilmente scorrano; come si vede nella tela, che cuopre gl'intestini, chiamata Peritoneo, & nelle legature, che stanno pertugiate, perche per loro passino le corde alle dita del piede, & delle mani, & nelle tele del cuore.

De Musculi, & prima che cosa sia Musculo. (Cap. 3.

Che cosa è Musculo, & di che compone.

La figura del musculo.

MVSCVLO è vna parte^a instrumentale del nostro corpo, col cui mezzo ci muouemo, secondo il voler nostro; composto d'vna legatura neruosa, diuisa in molti fili, & di molte fibre di carne, che abbracciano, & vestono i fili, & anchora d'alcuni rami di vene, arterie, & nerui, che gli danno nutrimento, vita, & sentire. Le^b legature subito al principio del musculo si diuidono in molti fili, che camminano tanto, che aggiungono al fin del musculo; doue tornandosi a congiungere fanno^c vn forte cordone, o cintura massiccia, detta da Latini Tendo, & da noi altri Corda. Questa corda non fanno i musculi, eccetto allhora, che si vanno ad inserir lontano; & la lor carne impedirebbe molto il luogo, per doue passano. Et è da notare, che così come la prima diuisione delle legature, fa la testa del musculo, così la congiuntion loro fa la coda, & il lor mezzo^d fa il corpo, e tutto insieme in alcuni musculi fa la figura d'vn torzo o topo; per la qual cosa da Latini fu chiamato Musculo. Chiamasi anchora Pesce per assimigliarsi in certo modo a lui; benché verissimamente non si troua alcuno di queste figure, se non vno nel braccio, & vn'altro^f nella coscia. Et ogni musculo ha vna tela, o camicia, che lo cuopre tutto; la qual nasce dalle legature, che congiungono il suo principio, & fine, all'osso. Di questi musculi, alcuni son corti, alcuni lunghi; quegli sono del tutto carnosi senza fare alcuna notabil corda; questi hanno tutti la sua corda, benché non vguale, ne d'vna istessa figura; perche alcune son lunghe; alcune tonde, alcun'altre d'altre diuerse figure, come subito diremo.

a ta. xv. fig. xvij.

b la med. C

c la med. D

d la med. E

e t. j. d. t. iij. a

f t. iij. a

Delle differenze de Musculi.

(Cap. 4.

In quante cose son differenti i Musculi fra se stessi.

Il nascimento.

SONO differenti fra se stessi i Musculi in nascimento, offitio, figura, colore, & sito, & nella sorte de fili; perche inquanto alla compositione si fanno tutti di fili, vene, arterie, nerui, carne, & grasso; ne vi è musculo alcuno, che non habbia tutte queste parti, quantunque al Vesalio paia al contrario. Ben è il vero, che in alcuni non si vede (per esser tato piccioli) la vena, il neruo, & arteria; come intrauiene in quel, che fa la tela della palma della mano. Et del grasso, che si fa ordinariamete tra le fibre della carne, ne gli huomini vecchi, & maggiori, se ne ritroua poco, o niente; ma ne grassissimi sempre se ne vede gran quantità; massimamente in due musculi, che fanno^a le natiche. Sono adunque diuersi i musculi nel nascere. Perche alcuni nascono d'osso, come que, che muouono la coscia, & la gamba. Alcuni nascono di cartilagine, come quel del^b gargarozzo, & come que, che nascono tra le^c cartilagini del petto. Alcuni altri d'alcun'altra dura tela, come tutti que degli occhi, & i due^d che abbracciano la canna della gola, dalla parte di dietro, & finiscono nella prima cartilagine del gargarozzo, & quel del collo^e della vessica, & quel del fondamento. Alcuni nascono delle tele, che rauuolgono le corde de musculi, come son quelli, che storcono le quattro dita della mano verso il pollice, & l'aiutano a indrizzare. Alcuni nascono da legature, come son que, che piegano^f il primo articolo del pollice della mano, & que, che muouono le dita de piedi in fuori. Alcuni altri nascono d'altro musculo,

a t. ix. n

b t. xvj.

c t. vij. x

d ta. xvj. f. iij.

iiij. v. l

e la med. fig.

xv. M. fig.

xvij. N

f t. vij. d

g t. vij. a

h t. vij. a

i t. xvi. fi. xv. sculo, come¹ quel, che nasce del musculo del fondamento, & abbraccia il collo della vescica appresso il membro. Alcuni altri non nascono di parte alcuna, se non che le tele si fanno carnosae in alcune parti, & pigliano nome di musculo, come son quelli, che si veggono nella parte dinanzi del collo, & nella faccia, & fronte, & quel che nasce della tela rossa, o carnosae, che rauuolge i testicoli. Sono oltre di questo differenti, nel nascere, alcuni da piu ossa, come fanno quei che muouono il petto, & il primo^a del ventre, & il primo, & il secodo, che muouono il braccio, alcuni nascono d'un solo, come è quasi tutto il resto, & di questi alcuni nascono d'un processo, o d'una sol parte, come ordinariamete si vede, altri di piu d'una, come fa il primo, che piega il gomito. Altri nascono d'osso, & cartilagine insieme, come fanno i due^a diritti del ventre. Sono i musculi differenti in fine. Perche alcuni finiscono in cartilagine, come que del gargarozzo, quelli delle palpebre de gli occhi, quelli delle finestre del naso. Alcuni altri finiscono nella pelle, come que delle labbra. Alcuni altri in alcuna tela, come que de gli occhi. Alcuni altri finiscono in diuerse parti, come i quattro del membro, che finiscono ne corpi sui, & nel principio del canale dell'orina, quel de testicoli, che finisce nel condotto del seme, che ritorna da i testicoli in su, quelli del fondamento, che s'inferiscono nella tela di fuori dell'intestino retto, quello del collo della vescica, che va a mancare ne corpi del membro vicino alla sua cannella. Differiscono oltre di ciò che Alcuni finiscono in vna parte sola, se ben nascono di molte, come quel, che cògiunge il braccio al petto, & quel, che l'alza, & ne piu, ne meno, quel, che l'abassa, & que, che muouono le palette delle spalle. Altri al contrario nascono d'un sol luogo, & s'inferiscono i molti, come quel, che nasce del maggior lato della palette, & s'inferisce nelle prime otto coste, & que, che distendono le quattro dita del piede, & della mano, & quelli, che aprono le finestre del naso, & il labbro di sopra, che finiscono in cartilagine, & pelle, ne piu, ne meno la Diaframa da vna parte finisce i osso, da vn'altra in cartilagine. Alcuni altri cominciano, & finiscono i molti ossa, come il terzo: che muouez il petto (che nasce de processi di dietro de nodi del collo, & finisce in alcune delle prime coste), & come son tutti gli altri, che muouono le spalle. Sono differenti i musculi in officio, perche alcuni nascono d'un osso, & muouono quel, che sta attaccato con lui, come i tre^a musculi, che nascono dell'anca, & finiscono nella coscia, & que che nascono della coscia, & finiscono nella gamba, che sono il settimo, & ottauo, che la muouono. Alcuni altri nascono d'un osso, & non muouono l'altro, che sta cògiunto a lui, come son tutti que, che aiutano al mouimento della gamba, (acceto il settimo, & ottauo, che, come habbià detto, nascono dell'osso della coscia, & finiscono ne stinchi della gamba), & que, che nascono de fustelli del braccio, o della gamba, muouono le dita. Son differenti in figura, perche alcuni paiono lucertole senza piedi, o forzo, o pesce: come e il primo, che piega il brachiale, & il secodo, che aiuta alzare il piede, & altri molti, che in certo modo rappresentano questa figura, se ben niunno propriamete la rappresenta, acceto quelli, che separano il pollice & il picciolo da gli altri, i quali la rappresentano assai bene. Da questa figura pigliarono tutti i musculi nome, (come dicemo) non ostante, che molti di loro la hanno assai differete. Perche alcuni son triangolari, come il primo, che alza il braccio. Altri sò quadrati, come il terzo della palette della spalla, & il primo del minor fustello del braccio, & i primi, che aiutano a dimenar le guanze. Ve ne sono di quelli, che han cinque lati, come il secondo, che muoue il braccio, & il secodo di que, che muouono il petto, il quale se ben par quadro, nondimeno, considerato il fine, tanti sono i lati, quante le dita, colle quai s'inferisce. Di questa medesima figura e il principio del primo^a del ventre, & assai piu lati ha il musculo, che fa la tela della palma della mano, & tutti que, che finiscono in diuerse corde. E parimente strana cosa à vedere la figura del quarto della schiena, il cui corpo e simile alla radice dell'Aloe, & le sue corde alle barbe di quella, ne piu ne meno e l'undecimo, & piu lungo di que, che muouono la schiena, E parimente da notare la figura della Diaframa, che sarebbe molto simile al pesce chiamato Razza, se tal pesce hauesse fessa la coda. Ve ne son d'altri, che sò tondi, come quello del fondamento, quel del collo della vescica. Altri sono aguzzi in punta, & altri d'altre diuerse forme, che per non esser prolisso mancherò di dirle, fin'al trattar di loro particolarmente. Per hora basti sapere, che altri hanno largo principio, & stretto fine, altri al contrario, alcuni altri sono stretti, & lunghi, alcuni altri son larghi, & corti, hano alcuni il principio

In fine.

In officio.

Differenza tra Musculi in figura

Libro Secondo

Differenza tra muscoli in sito. cipio stretto, alcuni largo; alcuni son forati, alcuni nò. Et quasi tutti son d'uno istesso colore, eccetto, che quādo sono scarnati, biācheggiano, come nerui; quādo pieni di carne, sono del suo colore, quātunque si vegga sempre alcun segnal de fili neruosi, che passano per loro. Et se ben alcuni di loro paiono liuidi, ò di color di piombo, non e perche sian cosi; ma e, perche son couerti d'una tela tanto grossa, che non lascia vedere chiaramente il musculo, & fa vn colore mischiato fra biancho, & nero. Son anchora differenti i muscoli in sito; perche alcuni stanno piu in fuori, alcuni piu in dentro; alcuni scendono in obliquo verso innanzi, alcuni montano anchora in obliquo, pur innāzi, alcuni montano diritti, alcuni intrauerfando ò aggirando. Ma tutti serbano sempre la medesima maniera di fili, che caminano, secōdo l'andare del lūgo del musculo, dal principio al fine, eccetto in quelli delle labbra, & gote, che pare, che habbiano molte sorti di fili intricati, l'uno coll'altro. Secondo la diuersità di questi fili ha ogn'uno de muscoli, diuersi offitij, & per cioque, che fanno piu mouimenti, come quelli della lingua, labbra, & guance, hāno piu forte di fili, tanto intertessuti gl'uni con gli altri, che con difficultà grandissima si possono distinguere. Gli altri, che habbiam detto hauere vna sola sorte di fili, non li hāno da ogni parte vgualmente raccolti, ne vguali; perche quelli che hanno stretto principio, & largo fine, hāno i fili nel mezzo del corpo del musculo, piu sottili, & piu separati, che al principio o fine, que, che hāno larga testa, & sottil coda, li hāno piu diuisi nel principio, che al fine; quelli, che son piu sottili da capi, che nel mezzo, li hāno al contrario; que, che sono vguali, li hanno anchora vguali. Ma i muscoli, che hāno vn principio, & due corpi, hanno similmente due sorti di fili, ogni corpo la sua; & oprano, come se fussero due muscoli, vno dietro l'altro, che haueffero il principio aguzzo, & il fine finisse i vna corda tō da. Ci e anchora molt'altre differenze fra i muscoli; perche alcuni son grossi, alcuni sottili; alcuni carnosì, & con alcuni fili sparti; altri neruosi al principio, & di poi si fāno carnosì, alcun'altri son cosi per tutto; alcuni hāno vn nascimēto, alcuni due; & questi nasci menti so no, od amendue neruosi, od amēdue carnosì, o vno carnosò, & l'altro neruoso. Sono anchora differēti ne lor corpi (corpo chiamo quella parte del musculo, doue i fili stā piu appartati, & ha piu carne in mezzo); perche tal volta il corpo del musculo sta al principio, tal volta al fine; alcun'altra sta i mezzo, alcun'altra e tutto corpo. Alcuna volta e il musculo diuiso in due corpi; & delle volte ha nel mezzo certe impressioni biāche, & neruose, che lo fanno parere di diuersi corpi. Sono anchora differēti nelle corde, per che alcuni le hanno larghe, alcuni tōde, alcuni corte, alcuni lūghe, alcuni diuise in molte, alcuni nò, anzi delle corde di molti muscoli se ne fa vna. Ci e vn'altra differenza nell'offitio, perche alcuni aiutano à muouere dirittamēte, alcuni in trauerfo, alcun'altri fanno amendue tali mouimenti. Presuppōsto questo cosi in cōmune, serà ben trattare particolarmente d'ognun di loro, cominciando da que della faccia, ne quali serbarò tal'ordine, che si possino tutti vedere in vn corpo.

r. t. iiii. Δ
MN

De Musculi della Fronte:

Cap. 5.

I muscoli della faccia son cōfusi

La fronte ha due muscoli.

I fili di questi muscoli.

L'offitio di questi muscoli.

I Muscoli della Faccia son tanto confusi, & intricati, che hāno caulato gran contradictione tra gli Anatomisti; di modo, che ne il Vesalio s'accorda con Galeno; ne il Realdo, col Vesalio. Io seguirò in questa parte il Realdo, che mi pare gli habbia meglio di uisi che niun'altro, come diuerse volte ne ho fatta esperiēza. Dico adūque, che la Fronte ha ^a due muscoli, che nascono (come gia dicemo) della tela carnosā; anzi piu tosto son parte di lei; & in q̄sta parte questa tela si congiunge in tal modo alla pelle, che molti hāno pensato, che la fusse vna parte di lei; ma chi con diligenza guarderà, conoscerà facilmente la differenza. Ogn'uno di questi muscoli comincia dal suo lato dal principio de capelli, & scende in arco verso l'angolo di dentro dell'occhio, doue s'inferisce con vno largo fine, che piglia, quāto e il lūgo delle ciglia, & ha ogn'uno i suoi fili, che caminano in obliquo, quasi in arco verso innāzi, d'alto à basso, i quali son piu carnosì nel mezzo secondo il lungo del musculo, che in altra parte. Et e offitio di questi muscoli alzar le ciglia, & aiutare ad aprir gli occhi. Si congiungono questi due muscoli nel mezzo della fronte, mediante l'istessa tela carnosā, tanto distintamente, ch'io non so come il Vesalio cio non habbia auuertito, massimamente, che ogni di si vede l'esperienza in que, che hanno

at. i. A

hanno alcuna ferita nella fronte; che se lor tagliano vn sol musculo a trauerfo, non possono aprir l'occhio da quel lato, senza hauere impedimento alcuno nell'altro; & anche senza ferita si vede in alcuni naturalmente; il che esser non potrebbe, se fussero tutto vn musculo. Et per ciò han da risguardare i Chirurghi di non cadere nell'error di coloro, che volendo rimediare ad alcun male de gli occhi, tagliano questi muscoli al trauerfo de fili, & fanno, che dipoi non possono aprir gli occhi.

Nella fronte nò
si debbe tagliar
al trauerfo.

De musculi delle palpebre de gli occhi.

Cap. 6.

A Mendue le palpebre de gli occhi, cosi quella di sopra, come quella di sotto, si fanno d'vna tela, che cuopre la caluaria, chiamata volgarmente Pellicraneo, (la quale fa vn corpo istesso con la tela dell'occhio, chiamata la bianca, o aderente) & della tela carnosa, che parimente si congiunge con la pelle; benché non in tal modo, che si faccia d'amendue vna cosa. Questi tre corpi si congiungono all'orlo delle palpebre, iui doue è la cartilagine, che habbiamo detto chiamarsi ^a Tarfus, di cui nascono i peli dell'occhio in tal modo, che tutti quattro i corpi insieme fanno il corpo delle palpebre tanto singulare, che niun'altra parte dell'huomo se gli rassomiglia. Ma in tutto il resto delle palpebre, eccetto che in questa parte, doue nascono i peli, la tela carnosa è attaccata alla pelle, senza hauere altra cosa in mezzo, che vn certo humor vntuoso. Ha questa tela carnosa, si nella palpebra di sopra, come in quella di sotto, certi fili carnosì, che fanno due muscoli, tra questa tela, & la bianca, o aderente; i quali son sottili, larghi, & vguale. Et piglia, l'vno l'vn canto dell'occhio, l'altro l'altro. Quello, che sta ^b nel maggior canto, nasce dal mezzo della palpebra da basso, & passa per lo lagrimale; & iui piglia anche principio dal ciglio del suo lato; & d'indi cammina fin' alla metà della palpebra di sopra, inferendo si così il fine ^c largo, nel qual finisce, come tutto il suo resto, nella metà della cartilagine del suo lato, della qual nascono i peli dell'occhio. L'altro ^d musculo, che occupa tutto il minor canto, è vguale al primo; perche nasce dal mezzo della palpebra di sotto, & s'agira per lo detto canto, fin alla metà sua di sopra; doue si congiunge al ^e primo in tal modo, che se non fussero le diuerse opre, che fanno, benché ordinate ad vn medesimo fine, (perche il secondo musculo, che occupa il canto di fuori, tira verso il suo principio, che è la metà della palpebra da basso; & il primo tira parimente verso il suo principio, che è l'altra metà della medesima palpebra) parrebbero amendue vno, per esser le fila tanto simili, & per star essi così giustamente attaccati, & vniti. L'offitio di questi due muscoli, è di chiuder le palpebre di sopra; quali sole dimenano gli huomini, stando ferme quelle da basso. Oltre a questi due muscoli ne ha la palpebra parimente ^f vn'altro, che l'aiuta ad aprire, del qual subito farò mentione.

Di che si fanno
le palpebre.

Il primo muscolo
lo delle palpebre
dell'occhio.

Il secondo.

L'offitio di que
sti muscoli.
Il terzo.

De musculi de gli occhi.

Cap. 7.

IL numero de muscoli, che mette il Vesalio ne gli occhi, mi fanno alquanto dubitare di sua diligenza; anzi certamente mi dimostrano lui hauer trattato piu tosto de gli occhi di qual si voglia altro animale, che di quei dell'huomo. Perche oltre, che dice, che'l neruo della vista nò si cògiunge nel mezzo della parte di dietro dell'occhio, scontro alla pupilla, dice anchora esserui vn musculo, che abbraccia questo neruo; il quale ne buoi, ne castrati, & altri animali bruti sempre si ritroua; ne gli huomini io mai non l'ho veduto; ne meno il Realdo, secòdo ch'egli mi ha referito. Imperò, quantunque così fusse, che si ritrouasse alcuna volta, (quello, che come ho detto fin' a qui mai non ho veduto) doueua almeno auuertire, che ordinariaméte non si troua. Mette anchora vn'altro musculo ^a nel numero di quei, che muouono l'occhio; il qual realmente niuna cosa fa meno, che muouerlo. Perche nasce della tela carnosa, vicino al fine del musculo della fronte, & finisce nella palpebra di sopra, senza toccare in modo alcuno l'occhio. Anzi serue ad alzar la palpebra (nella qual s'inferisce) quado apriamo l'occhio; & perciò tal musculo sarà il terzo delle palpebre, alle quali debbesi attribuire. Et l'occhio ha sol cinque muscoli, de quali ^b quattro nascono di dentro della conca dell'occhio, pigliando principio della dura madre, che rauuolge il neruo della vista, & finiscono nel mezzo dell'occhio, circondandolo

L'occhio non ha
piu di cinque
muscoli.

a lib. i. t. vii.
fi. xvi.

b t. i. c. t. xv.
fi. xx. c.

c t. i. c. t. xv.
fi. xx. f.

d t. i. d. t. xv.
fi. xx. c. df.

e t. i. d. t. xv.
fi. xx. e.

f t. xv. fi. xx. B

a t. xv. fi. xx. B

b la med. fi.
xxii. HILM

Libro secondo

Quattro muscu-
li dell'occhio.

L'offitio di que-
sti muscoli.

Il quinto muscu-
lo dell'occhio.

dandolo tutto, ogn'uno vguualmente; & di tutti insieme si fa vna sottil tela trasparente, che cuopre tutto il suo bianco, che si vede stando l'occhio in suo luogo. Tutti questi muscoli son molto sottili, & posti due in la parte di sopra, due in quella di sotto, ogn'vno dal suo lato; & tutti nascono con vn principio stretto; ma dipoi s'allargano a poco a poco fin'al'arriuare al mezzo dell'occhio, che è il cerchio di sua maggior tódezza, in guisa, che fa ognun di loro vna figura triagolare. Questi muscoli oltre che aiutano á tenere l'occhio legato dètro del craneo, seruono anchora a muouerlo, tirando ogn'vno verso'l suo principio. Et per cio, quãdo opra vn sol di loro, voltiamo l'occhio verso quel lato; piu in su, o piu in giu, secondo che mouemo il piu alto, o il piu basso; quando oprano i due del l'vn lato, voltamo l'occhio dirittamente verso quel canto; quãdo oprano tutti insieme, se tirano al pari, tenemo l'occhio quieto, & diritto; se l'vno dietro l'altro, mouemo l'occhio tutto intorno, senza esserui di bisogno per cio di niuno particolar musculo, come il Vesalio pensò. Il quinto nasce anchora della tela carnosà; & si va a inferire nella parte di sotto dell'occhio; & tirando verso'l suo principio (come fa qual si voglia altro musculo) dice il Vesalio, che volta l'occhio in su; come quando lo gettiamo in bianco, come si dice volgarmente. Questo musculo, se ben ha il medesimo sito, ché dice il Vesalio, non puo in modo alcuno voltar l'occhio in su, inferendosi, come fa, nella parte sua di sotto.

De muscoli del naso.

Cap. 8.

Quattro muscu-
li del naso.

Il primo & se-
condo.
Il terzo, &
quarto.

Due muscoli,
che mette il Ve-
salio.

HAbbiã già detto, come dell'ossa del naso vsciũano due cartilagini; delle quali ne nasceuano altre due, chiamate le ali, che fanno le finestre del naso. Hor è da sapere che queste cartilagini, o ali, son mosse da quattro musculi; de quali i due ^a primi nascono ogn'vno dal suo lato, dal principio del naso appresso il lagrimale; & scendono per li suoi lati, infino all'inferirsi nella cartilagine del suo lato, che dicemmo far le finestre del naso. Questi due muscoli son tanto manifesti nell'huomo, che, benche piccioli, & sottili, non so, come il Vesalio non gli vidde. Ha oltre di cio il naso altri due muscoli, ogn'vno ^b de quali nasce della punta della gota; & si va a inferire nel lato di fuori della finestra del naso dalla sua banda. Così questi, come i due primi, seruono insieme a aprir le finestre; ma in tal modo, che i primi tirando verso il suo principio, le alzano; & questi tirando verso il suo, le aprono. Mette anchora il Vesalio altri due muscoli dentro delle finestre del naso, che in niun modo son distinti dalla tela carnosà; i quali sono come due tele; & seruono (come egli dice) a chiuder le finestre del naso. Ma (oltre che in questa parte non si troua cosa alcuna, eccetto il cuoio, & la tela carnosà) il naso si chiude medianti i muscoli d'ogni lato del labbro superiore, senza esserci bisogno d'alcun'altro; come ogni vno potrà prouare in se stesso, tenendo fermo il labbro di sopra, perche in modo alcuno non potrà chiudere il naso. Si che, se bene questi muscoli son quattro, (come il Vesalio disse) pur non son que, che egli descriue; come ogn'vno potrà facilmente vedere, se vorrà mirarlo con alquanto di diligenza.

a t.i. D.t.ii.c

b t.i.H.t.ii.a

De muscoli delle guance.

Cap. 9.

Quattro muscu-
li che muouono
le guance.
Il primo, & se-
condo.

Quattro lati di
questi muscoli.

IMuscoli, che muouono le guance son quattro, de quali il ^a primo, & il secondo, che stanno ogn'vno dal suo lato, son sottili, & neruosi, & molto larghi; perche cominciano, non di vicino a processi simili alle poppe, dell'ossa delle tempie, come dice il Vesalio, (perche iui non anchora si è conuertita la tela in musculo) se non d'appresso alla punta delle ganascie; & d'indi scendono fin'alle palette delle spalle, & passando per sopra le clauicole, arriuano all'osso del petto; & iui si congiungono, l'vno all'altro, mediante la medesima tela carnosà; & formótano per mezzo della gola fin'al labbro superiore; & d'indi tornano (attrauerlando per mezzo della faccia) per sopra la punta piu bassa di fuori del musculo delle guance (che diremo chiamarsi il masticator) fin'all'arriuare, donde incominciano; & in alcuni formontano tanto, che gli fanno muouer l'orecchia. Ogn'vno di questi muscoli ha quattro lati; vno, secondo il lungo, dal principio del labbro superiore, fin'alla punta delle ganascie; vn'altro da q̃sta p̃ta fin'à quella dell'omero; gli altri due nō sono tãto distinti; perche quel, che comincia dal principio del primo; & va fin'all'osso del

a t.i.r.

a t.v.g.

b t.j.H.

del petto, non è molto vguale, anzi va alle volte di sopra della clauicola, & alle volte di sotto; il quarto piglia dall'osso del petto, fin' alla punta della barba, & si cōgiunge col suo compagno, mediante la medesima tela carnosa, (di cui nascono) tanto distintamente, ch'io non so, che potesse muouere il Vesalio a dire, che in questa parte pareuano vn solo. Questi musculi nascono della tela carnosa, & non d'osso alcuno, & hanno alcuni fili interressuti di carne, che gli fanno di natura de musculi, & insieme molti rami di nerui, che escono de musculi, che gli stan di sotto (come al suo luogo diremo) & seguono il diritto de fili. I quali dal principio dell'osso del petto, fin' alla metà delle clauicole formontano diritti, & d'indi innanzi fin' alla punta dell'omero, montano tutti in obliquo, & tanto piu, quanto piu s'appressano verso la detta punta. Appaiono questi fili chiaramente, cosi nel collo, come di sotto alla barba, & appresso all'orecchie; ma quando arriuan al labbro inferiore (perche a quel di sopra non arriuan, se non fin scontro al naso) si mischiano gli vni con gli altri in tal maniera, che in niun modo si possono distinguere, o conoscere. L'offitio di questi musculi (secondo che Galeno, & il Vesalio dicono) è aprire il labbro inferiore, & tirarlo dallati, insieme col labbro superiore, o aiutare a muouere tutto il resto della faccia, che non muouono i musculi della fronte, ne quei del naso, ne quei delle palpebre. Ma io penso, che aiutino ad aprire la mascella inferiore, come chiaramente il dimostra lo stare tanto fortemente attaccati a lei; anzi al mio giuditio non è altro il loro principale offitio. Il secondo paio ^b de musculi, che muouono le guancie, nasce della mascella superiore sopra le radici delle gengiue, secondo tutto il lungo loro, & s'inserisce nella inferiore, secondo tutto il lungo suo, vicino alle radici delle medesime gengiue. Questi musculi son neruosi, & interressuti di molti, & diuersi fili, & occupano, vno per lato, tutta quella parte delle guancie, che potemo gonfiare, & risponde dentro della bocca, doue si vede conetto d'vna sottilissima tela, che in tal modo è attaccata con lui, che in niuna guisa si può scorticare intera. La sustanza di questo musculo è fatta di molti, & diuersi fili, carnosì, & interressuti. Ha similmente tutta la pelle della faccia (eccetto le gote) oltre a questo secondo paio di musculi, & quei del naso, & labbra, attaccata tutta a lei la tela carnosa, che si conuerte in musculo, & l'aiuta a muouere. Et nelle gote, se ben non si conuerte in musculo, non per ciò lascia di muouerli la pelle, che le cuopre; perche è attaccata per la parte di sotto con la pelle, che cuopre le guancie; per quella di sopra, con quella, che cuopre la fronte; alche aiutano anchora i due musculi ^c larghi, che habbiam detto farsi della tela carnosa; come si vede facilmente, tenendo serrati i denti, & dimenando le labbra da diuerse parti. Et è da notare, che a questi musculi delle guancie, entrano da ogni parte due nerui; vno che esce per lo buco della mascella inferiore, & si distribuisce per lo labbro superiore; vn'altro, che esce del concauo de gli occhi, & passa alle gote, come al suo luogo piu chiaramente diremo.

L'offitio de due primi Musculi delle guancie.

Il secondo, & terzo.

La sustanza di questo Musculo.

De Musculi delle Labbra.

Cap. 10.

MVOVONO le Labbra particolarmente quattro Musculi; i quali, quando incominciano, innanzi che arriuin alle labbra, si distinguono chiaramente; ma di poi si confondono in tal modo, che non si possono conoscere. Perche le labbr si fanno della pelle, & della tela, che cuopre la bocca per la parte di dentro; mischiandosi ambedue questi corpi con vn'altro, fatto di molti musculi insieme intricati, & d'vna parte di carne ^a spugnosa, di cui di poi faremo mentione. Questi quattro musculi stan situati da lati delle labbra, da ogni lato due, mediante i quali hanno quattro mouimēti. I due ^b primi (che seruono al labbro superiore,) stāno, vno da ogni lato, & nascono della pūta della gota, con vn principio carnosò, & scendono alquāto in obliquo verso innanzi, fin'al'interirsi ognuno nel principio del labbro del suo lato. Ne piu, ne meno, ne stanno altri due nella parte di sotto (da ogni lato vno) alquāto piu corti, ma ben piu larghi, & nascono della parte piu bassa della mascella inferiore, quasi da lati di dentro de mascellari, & d'indi mōtano in obliquo verso innanzi, fin'all'inferirsi cō vn fin largo in tutto mezzo il labbro dal suo lato. Di sorte, che tutti quattro son larghi, & pare, che habbiano ognuno due principij per la diuersità de fili, i quali al principio sono alquāto separati, & di poi si vanno congiungendo in forma, che quando arriuan al labbro, si caualcano, gli vni, con

Quanti musculi hanno le labbra.

I due primi.

Il terzo, & quarto Musculo delle Labbra.

H gli

b ta. iiii. M.
t.v.E

c t.j. I

a t.v.G
b t.j.H

Libro Secondo

L'offitio di que
sti Musculi.

gli altri, mischiandosi, o intricandosi con la pelle delle labbra. Mediante questi quattro muscoli fanno le labbra dodici mouimenti, quattro al trauerso, ogni labbro due, & otto diritti, ogni labbro quattro. I diritti si fanno quando gridiamo & quando chiudemo la bocca, & quando mouemo le labbra in dentro, o le cauamo in fuori; benché il mouimento verso dentro si fa mediante i fili di dentro di questi muscoli, & il cauarli in fuori mediante que di fuori. I quattro mouimenti storti si fanno, oprando vn muscolo solo, & consentendo l'altro; perche se opra il diritto, consentendo il manco, alziamo la parte di ritta del labbro in obliquo, & la manca in pendente. Della medesima sorte si fanno gli altri tre mouimenti; ma perche il labbro di sopra si mouesse piu forte, & fusse tutto lui pieno d'alcun muscolo, se gli inserisce da ogni lato vn capo di quel muscolo, che habbiam detto nascere della punta della gota, & finire alla finestra del naso dal suo lato, per la parte di fuori, & aiutare ad aprire le finestre del naso, tirandole in sù.

De Musculi della Mascella inferiore.

Cap. II.

Il primo muscu-
lo della mascel-
la inferiore.

GIA habbiam detto, come nell'huomo, & in tutti gli altri animali (eccetto, che nel crocodillo, & nel pappagallo) si moueua la Mascella inferiore, stando ferma la superiore. Hor è da sapere che questo mouimento si fa in tre modi, o in su, come quando chiudemo la bocca, o all'ingiu, come quando l'aprimo, o verso in fuori, & verso dentro, & da lati, come si vede, quando mastichiamo. Questi mouimenti si fanno mediante otto muscoli, e' quali per diuersi mouimenti, che fanno, che pare che tirino tutto intorno la mascella, furono chiamati da Greci Masleteres, che vuol dir masticatori, & non sol chiamarono questi muscoli di questo nome, ma anchora que tutti, che aiutano in alcun modo a masticare. Ma io per schifare confusione, chiamerò Mastificatore quel solo, che principalmente aiuta a masticare, gli altri, ognuno secôdo il luogo, che occupa. Hor è il masfeter^a o mastificatore, il primo muscolo di questa mascella; il qual comincia d'appresso alla riga, che si vede nel mezzo della gota, cò vn largo, & neruoso principio, che piglia fin' all'orecchia; nascendo per càmino da tutta la parte di sotto dell'osso^b giogale; come facilmente puo, chi si voglia, sentire con le dita in se stesso, mettendo il dito fra l'orecchia & il mascellare, & il dito di mezzo nella guancia, & strignendo, come chi lo volesse ponere in bocca; perche sentirà fra l'vno, & l'altro dito, manifestamente il muscolo, principalmente se chiude i denti, perche all'hora, come si tira, pare piu duro. Ma è da notare, che si come il principio del nascimento di questo muscolo è neruoso, così anchora è quel suo resto, che nasce della parte di sotto verso a dentro dell'osso giogale. Et la parte, che nasce del lato di fuori del medesimo osso giogale, è assai piu carnosà, come anchora è tutto il resto del muscolo; ma dopo el principio, il quale va all'ingiu, fin che (abbracciado tutta la parte di dietro verso fuori della mascella inferiore, con vn capo, parte neruoso, parte carnosò) s'inserisce fortemente in tutta questa parte, & principalmente in certi tubercolotti, che habbià detto essere nel piu basso di questa mascella, & faccendosi in questa parte piu stretto, finisce in vna punta, come di triangolo sodo. Anzi tutto'l muscolo è quasi, come vn triangolo; il cui primo lato piglia tutto il suo principio, che è tutto il lungo, dell'osso giogale; il secondo piglia dalla punta della gota, fin' alla detta asprezza, che è nella mascella inferiore; il terzo dall'orecchia, insin' al fine del secondo, col quale si congiunge, & fa vn canto tãto sodo, che pare vn'altro lato. Et così questo muscolo haurebbe quattro lati, tre grandi, & vn picciolo, nel quale vengono a finire tutti i suoi fili; i quali comincia no da vn largo principio, & si vanno congiungendo tutti, come raggi di carretta, insin' al l'arriuare a lui, camminando dirittamente dal principio al fine. Per la qual cosa mi marauiglio d'alcuni, che subito dicono, che in vn muscolo vi son diuersi fili, perche veggono, che hanno, al parere, diuerso andare, piu vno, che vn'altro. La qual cosa non è così, anzi tutti seguono vniuersalmète il medesimo modo di procedere, cioè diritti dal principio al fine; ma, come accade essere il principio largo, & il fine stretto, pare che que, che nascono del mezzo del principio, siano diritti, & que, che nascono da lati, intrauerfati. Il secôdo muscolo, che moue la mascella inferiore, nasce dell'osso^d della coronella, & da, quel della fronte, & da quel delle tempie dal suo lato, con vn principio largo, & inarcato; che comincia prima dall'osso della coronella, & da quel della frôte, vn dito piu alto della cò
mefura

Il secondo mu-
sculo della ma-
scella inferiore.

a t.ij. C. t.iiij.
Δ t.v. D

b t.ij. B t.iiij.
D

c ta. ij. A
t.iiij. r
d lib. j. t.ij. a

la mede. ^d
li. ij. t.v.G

messura delle tempie, & cala, faccendosi, a poco, a poco, piu grosso, & carnosio, ma piu stretto, & empie quella cōcauità, che si fa fra l'osso giogale, & l'ossa del capo, dalle quali piglia principio, come poco fa habbiamo detto. Ma quando arriua all'osso giogale, si fa molto grosso, & stretto, & pigliando anchora principio dalla parte di sopra di questo osso, si congiunge in tal forma col principio del masticatore, che non è marauiglia, se alcuni han detto essere amēdue vn solo. Il corpo di questo musculo sin'all'osso giogale è tutto carnosio; ma per la parte di fuori, la tela, che lo cuopre, è tanto grossa, che l fa parere liquido, principalmente al principio, & iui, doue si congiunge coll'osso; ma per la parte di dentro è dell'istesso colore della carne, & scende, nascendo delle commessure, che in questa parte habbiam detto fare l'ossa del capo, & della mascella, fin'al finire in vna corta corda, ma molto forte, & neruosa, & tanto larga, che abbraccia tutto'l processo aguzzo della mascella inferiore, nel quale s'inserisce fortissimamēte. In questa corda finiscono i fili tutti di questo musculo; nella qual si vengono a congiungere, come fette di mellone. Et suo offitio è chiuder la mascella; ilche fa con tanta forza, con quanta ce'l dimostrano coloro, che leuano grandissimo peso co denti. Il terzo ^f musculo, che muoue questa mascella, sta nascosto nella bocca, & nasce con vn principio neruoso, di tutta quella cōcauità, che si fa ne processi di sotto dell'osso cuneale, simili all'ali di pipistrello; ma come esce di questa cōcauità, subito si fa grande, carnosio, & grosso, & quasi della figura del primo, chiamato il masticatore; perche s'inserisce fortissimamente con vn largo fine nella parte di dietro della mascella inferiore, verso dentro, iui, doue è meno larga, che in niuna altra parte, & ha vn seno (come habbiam detto) nel qual nascondendosi questo musculo, occupa manco luogo. Et suo offitio, & de i due detti, insieme con gli altri tre suoi cōpagni, che stanno dall'altro lato, è chiuder la mascella di sotto, & particolarmente i due primi seruono anchora, quando oprano i lor principij dinanzi, a cauar la mascella innāzi; quando oprano quei di dietro, a metterla verso di dietro, & così fanno i mouimenti necessarii al masticare, aiutati in certo modo da muscoli delle tempie, secondo che allentano, o tirano gli vni fili, o gli altri. Seruono anchora questi masticatori, aiutati da quei, che stanno nascosti nella bocca, a muouere questa mascella da lati; perche tirando il masticatore dal lato diritto, & quel, che sta nascosto dal lato manco, torcono la mascella a man dritta, & oprando quei dall'altro lato, la sfiorcono a man manca. ^h Resta a dire del quarto musculo, & suo compagno; ognuno de quali nasce, dal suo lato, del processo dell'osso delle tempie, simile al puntaruolo, con vn principio neruoso, & alquāto largo; ma subito si fanno carnosio, & sottili, & camminando verso la punta della barba s'inseriscono sotto a lei, congiungendosi l'vno all'altro, in quella parte, che si vede aspra, & piena di certi disuguali, & piccioli tubercoli. Questi due muscoli seruono ad aprir la bocca, & hanno vna particolarità (la quale non ha alcun'altro musculo, eccetto quel, che s'inserisce nell'osso hyoide) che ognun di loro tra il principio, & il fine, si fa neruoso, & sottile, iui, doue si congiunge colla fauce, conuertendosi in vna corda, o legatura; di modo, che ognun di loro pare fatto di due. Ilche fu fatto non senza gran mistero, a ciò occupassero men luogo, come bisognaua in quella parte del collo.

L'offitio di questo musculo.

Il terzo musculo.

L'offitio de muscoli di questa mascella.

Il quarto musculo.

L'offitio del quarto paio de muscoli, della mascella inferiore.

De Musculi dell'Osso chiamato Hyoide.

Cap. 12.

a ta. ij. F ta. iij. C t. iij. S

b lib. j. t. v. fi. vij. * ABC

D ICEMMO gia come l'osso chiamato Hyoide sta posto sopra il gargarozzo, & come è vna radice, o fondamento della lingua, sopra il quale esso si muoue. Hora è da sapere, che di questo osso nascono dodici muscoli, de quali otto il muouono, & quattro nò, & per ciò quelli chiameremo proprij, quelli communi. I proprij stanno, quattro per lato, che fanno quattro paia; il Primo, ^a & piu forte de quali nasce dalla parte piu alta dell'osso del petto, alquanto verso a dentro, con vn principio largo, & carnosio, & sormonta sopra la canna del polmone, & la prima cartilagine del gargarozzo, saluando sempre la medesima grādezza fin'all'inserirsi ^b nella parte dinanzi di questo osso, & abbracciando con vn carnosio fine tutta la parte sua di mezzo. Et nel mezzo (dal principio al fine) ha vna riga, mediante la quale si congiunge al suo compagno, che sta dall'altro lato. Hanno di piu questi due muscoli vn segnale, tra la canna del polmone, & il gargarozzo, che par che diuida ognun di loro in due altri; ma nel vero no'l fa. L'offitio d amēdue è di

Il primo paio de muscoli de proprij dell'osso Hyoide.

H 2 tirare

Libro Secondo

tirate all'ingiu' l'osso hyoide alquanto in fuori, quantunque molto oscuramente, & non altrimenti se nò quãdo que di sopra lo tirano d'auuantage in sù. Seruono anchora eper c t. v. N Q²

Il secondo paio. difesa alla prima cartilagine del gargarozzo, & alla canna del polmone. Il secondo paio è posto al contrario del primo; perche nascono amendue della mascella inferiore, di sotto la punta del mento, & caminano alquãto in giu', faccendosi vn poco piu stretti, fin all'inferirsi nella parte dinanzi di questo osso, presso a due primi, & nell'istesso modo che essi. L'offitio di questi due muscoli è di tirare in su questo osso, & alquanto in fuori.

Il terzo. Quelli ^d del terzo paio son molto sottili, & tondi, & nascono, ognuno dal suo lato, e dal processo dell'ossa delle tempie, simile al puntaruolo, vn poco piu in giu', che'l quarto musculo della mascella, & vãno a inserirsi nell'osso hyoide, al lato de quattro primi, che è, doue si congiungono gl'officelli de lati di questo osso con quel di mezzo. L'offitio di questi muscoli è di tenere questo osso diritto, senza storcerli da lati, & insieme alzarlo vn poco, & tirarlo verso dietro. Quelli ^s del quarto paio si veggono, ognuno dal suo lato; lunghi amendue, & sottili piu, che alcun'altro musculo del corpo. Et ognun di loro si fa in mezzo neruoso, come ^h habbiam detto farsi il quarto musculo della mascella inferiore. Et nascono, ognuno dal suo lato ⁱ dalla parte piu alta della paletta della spalla appresso il suo collo, & appresso la radice del processo, simile all'anchora, con vn principio carnosio, che si asconde sotto al secondo musculo dell'osso della spalla, & monta poi in obliquo ^k sotto al primo musculo della testa, il quale preme tanto questo musculo (di cui parliamo) che'l fa in questa parte esser piu neruoso, & sottile; ma tosto, che gli esce di sotto, ritorna ad esser carnosio, come prima, fin all'inferirsi nell'istesso luogo dell'osso hyoide, nel quale s'inserì il terzo paio. Son questi ^l i muscoli particolari, o proprij dell'osso hyoide. I comuni son quattro; due, che nascono ^m della parte piu bassa di questo osso, & si distendono pe lati della prima cartilagine del gargarozzo, secondo il lungo suo, fin che arriuanò alla parte piu bassa della cartilagine, nella qual s'inferiscono secondo tutto il suo largo; Gli altri due ⁿ (che sono quasi tondi, & sottili & del tutto carnosì) nascono del lato di mezzo di dentro di questo osso, & s'inferiscono nella radice della couerta del gargarozzo. L'offitio di questi quattro muscoli latciarò di dirlo, fin'al trattare de muscoli del gargarozzo; perche seruono piu a lui, che a questo osso.

De Musculi, che muouono la Lingua. Cap. 13.

La sustanza della Lingua. LA Lingua è fatta d'vna carne tenera, & spugnosa; grande, quanto la bocca richiede; & tanto piena di varie sorti di fili (per ragione di molti mouimenti, che fa) che con difficoltà grande si può distinguere l'uno dall'altro, quantunque nella radice siano alquanto distinti. Tutta la Lingua si diuide per mezzo, secondo il lungo, mediante vna ^a sottilissima tela, larga, quanta è la grossezza della lingua, come facilmente in qual si voglia huomo si vede. Di modo, che si fa tutta di due ^b corpi, & della tela, che li diuide; & di molte vene, arterie, & nerui, & di due tele, che cuoprono tutte queste cose. Delle quali quella di dentro è come quella, che ha tutto il resto de muscoli, & l'altra è parte di quella, che circonda tutta la bocca, & di quell'altra, che abbraccia per la parte di dentro tutta la canna del polmone, & quella della gola; nella qual s'inferiscono particolarmente certi rami ^c del terzo paio de nerui delle ceruella, per virtù de quali gusta la lingua il pasto. Ma venendo a distinguere i muscoli della lingua, dico, che son tutti dieci, se ben il Vesalio non ne mette, che noue. De quali ^d i due primi son piu grossi, & diritti, & in alcune parti stan distinti (benche molto oscuramente) come se fussero piu di due, & nascono ^e nel mezzo della parte di sopra dell'osso hyoide, cò vn principio carnosio, & alquanto spugnoso, & camminano innãzi fin all'inferirsi nella radice della lingua. L'offitio di questi muscoli è di raccogliere la lingua in dentro. Il terzo, ^f & quarto, nascono ordinariamente de due ^g officelli piu alti, che gia dicẽmo hauere l'osso hyoide da lati, & distendersi fin'a i processi dell'ossa delle tempie, simili al puntaruolo. Benche tal volta cominciano da lati di ^h sotto dell'osso hyoide, che si congiungono co processi di sopra della prima cartilagine del gargarozzo, & è, quando i lati di sopra di questo osso son come cartilagine, o legatura; la qual cosa accade molte volte, massimamente nelle donne. Nati che sono questi muscoli dall'vna di queste parti, camminano alquanto in trauerso, & di poi

i ta.xv.fig.
xxij.F
k lib.i.t.iiij.
fi.vj. I

l ta.xv.fig.
xxij.xxv.
G

m la med.
H H
n li.i.t.iiij.
fi.vij.H

o ta.xv.fig.
xxvj.KKLL
p la med. II

& di poi s'inferiscono ne lati della lingua. L'offitio loro è, tirando amēdue insieme, metter la lingua in dentro, alquanto in giu; & tirando l'vno, & cōsentendo l'altro, tirarla dal lato di quello, che opra. Il ⁱ quinto, & sesto, sono medesimamente carnosì, & in certo modo grossi; & son fatti al cōtrario de due passati; perche nascono da ^k i processi dell'os-
fa delle tempie, simili al puntaruolo, & s'inferiscono nella radice della lingua, iui, doue finirono il terzo, & quarto. L'offitio loro è, oprando insieme, tirar la lingua dentro, alquanto in su; oprando vn sol di loro, tirarla da vn lato, similmente in su. Il settimo, & ottauo, nascono ⁱ della parte di dentro de lati della mascella inferiore, a canto la radice de denti mascellari, con vn principio largo, & alquanto neruoso; & s'inferiscono sotto alla lingua da i lati, secondo il lungo suo, con vn fine tanto largo, che piglia dal filello fin a doue finirono i due primi. L'offitio di questi musculi, oprando insieme, è d'abbassare quella parte della lingua, che si vede aprendo la bocca; oprando vn solo, abbassarla dal lato di quello, che opra. Il nono, ^m & decimo, nascono della ⁿ parte piu bassa di dētro della mascella inferiore, appresso la punta del mēto, di que tubercoli, che si veggono in lui; & d'indi montano alquanto, camminando verso le fauci, fin'all'inferirsi nella radice della lingua, con vn largo fine, simigliante al principio. Questi musculi (secondo che dice il Vesalio) non son piu d'vno, che serue a premer la lingua con la mascella inferiore, quando dirittamente, quando da lati, secondo i fili, che oprano. Ma a me pare, che siano due; & che seruino piu tosto a cauar la lingua, che a premerla in dentro colla mascella. Oltre a questi musculi ha la lingua (come diceuano) molte ^o differēze di fili, mediant i quali fa tutte le differenze de mouimenti, che ogni di prouiamo. Et tutti questi fili si legano, & sustentano nella ^p legatura della lingua; la quale se bene è assai sottile, & di natura di tela, serue alla lingua, come per spina tenera, & facile a piegarfi, secondo che la lingua hauea di bisogno.

Il quinto, & sesto.

Il settimo, & ottauo.

Il nono, & decimo.

Le differēze de fili della lingua.

De Musculi, che muouono il Gargarozzo. Cap. 14.

a li.i.t.vij.fi.
ix.x.xj.

b t.xvj.fig.j.
iiij.N.h.v.
O

c li.i.t.vii.fi.
iii.iii.v.CD
d t.xvi.fi.vi.
vii.P

e lib.i.t.vii.
fi.vi.vii.L
f in la med.
il P Q del
la vj.& vii.

figura si congiunge al V
X della decima & vndecima.

g t.xvi.fig.
vii.viii.R
h la med. fi.
viii.ix.T

HAbbiamo detto, come il Gargarozzo ha tre ^a cartilagini, o cinque parlando piu rigorosamente; le quali tutte si muouono, mediant dieci musculi proprij, & otto comuni. De proprij, i quattro primi stanno da ogni ^b lato due, situati nella parte sua dinanzi verso i lati; & son corti, larghi, & sottili, & carnosì; & sta l'un sopra l'altro; & nascono della parte della seconda cartilagine, che sta sotto alla prima, cō vn principio carnosò; & s'inferiscono nella parte piu bassa della prima cartilagine. Et quel di sopra ha i fili, che cominciano dal fine della prima cartilagine; & scendono in obliquo verso in nāzi, infino al finire nella parte della seconda cartilagine, che risponde al lato di nāzi del gargarozzo. Et quel di sotto ha i suoi fili, che montano al contrario, in obliquo similmente innanzi. Di modo che questi fili di sopra, da ogni lato, co i fili di sotto, fanno vna ⁺. L'offitio di questi musculi è di congiungere la prima cartilagine colla seconda, per chiuder quella fessura del gargarozzo, simile alla linguetta de Flauti. Questi quattro musculi si trouano ordinariamente nella guisa detta; pure in alcuni se ne troua vn solo da ogni lato, alquāto piu grosso. Et in questi si trouano (come molto bene notò il Vesalio) due picciol musculi, che nascono, vno per lato, nel mezzo della riga della seconda cartilagine, secondo il lungo suo; ognuno de quali scende in obliquo fin'all'inferirsi nel processo di sotto del suo lato della prima cartilagine; & amēdue soppliscono al difetto di quei che mancano. Gli altri quattro stan posti, da ogni lato due, in tutta la parte di dietro della seconda cartilagine, secondo il lungo suo, iui, doue si congiunge alla canna della gola. Et ^d i due primi di loro nascono, ognuno dal suo lato, cō vn principio carnosò, della parte ^e di sotto della seconda cartilagine; & mōtano diritti, facendosi alquāto larghi, fin'all'inferirsi con vn fin neruoso nella parte ^f della terza cartilagine, che si cōgiune con la secōda. Ognun di questi musculi fa vn seno nella cartilagine, tecōdo in lungo suo, tanto profondo, che tolti via i musculi, resta la cartilagine nel mezzo dell'vno, & dell'altro, rileuata, come schiena. Gli altri due stāno ^g attaccati a questi; & son del tutto carnosì, & nascono, ognuno dal suo lato, della parte della seconda cartilagine, che rispōde alla parte di dentro della prima; & ticeue il processo ^h piu basso di lei, cō vn principio carnosò; & quindi monta in obliquo, fin'all'inferirsi in tutta quella parte dal suo cāto della terza cartilagine, che lasciò scoperta il primo. L'offitio di questi quattro musculi è di tirare la

Il primo, secondo, terzo, & quarto Muscolo del Gargarozzo.

Vn Muscolo, che si troua in alcuni.

Il quinto, & sesto.

Il settimo, & ottauo.

Libro Secondo

Il nono, & decimo.

L'offitio del quinto par del Musculi del gargarozzo.

Due Musculi, che mette il Vesalio.

I due primi muscoli comuni del gargarozzo.

L'offitio di questi due. Il terzo, & quarto.

Il quinto, & sesto.

L'offitio di questi muscoli.

Il settimo, & ottavo.

terza cartilagine, verso i lati del gargarozzo, alle parti di dietro, & conseguentemente aprire la fessura del gargarozzo simile alla lingua de flauti. Il nono, ⁱ & decimo, stan situati nel fin della terza cartilagine, iui, doue il gargarozzo si congiunge alla canna della gola, & doue la terza cartilagine si congiunge colla seconda. Et ognun di loro nasce dal suo canto del fine della terza cartilagine, iui, doue s'appressa alla prima, & monta pel mezzo del corpo, o fondamento, della terza, fin nel suo mezzo, iui, doue si congiungono le due parti di questa cartilagine; nella qual parte finisce congiungendosi col suo compagno. Questi due musculi, son corti, & tondi di fuori, come vna pera, ^l & son di dentro della figura di quella cartilagine, a cui sono attaccati, & son piu larghi, & grossi, nel fine, che nel principio. Et è lor offitio premere il corpo della terza cartilagine, & vnire i due suoi lati, & per conseguente premer la linguuccia detta. Mostrano chiaramente questi musculi questa cartilagine esser diuisa per mezzo; perche in altro modo non potrebbero doppiarla, o chiuderla questi; ne aprirla i quattro, che congiungono la prima colla seconda. Oltre a questi dieci musculi, ne mette il Vesalio altri due, che stringono la terza cartilagine colla prima, li quali dice essere larghi, & carnosì, come gli altri, & che stiano situati da ogni lato vno, & che nascono insieme del mezzo della prima cartilagine, si condo tutto il lungo della parte sua di dentro, & che ognun di questi musculi ha tre principij in tal guisa distinti, che par, che siano tre musculi, ma che in effetto nò sono, che vno; il quale nel principio móta in obliquo, infino all'inserirsi nella parte dināzi della terza cartilagine dal suo lato, & che l'offitio suo, & insieme del suo compagno, è di discostare i lati della terza cartilagine, in tal guisa, che la linguuccia, che sta nel suo mezzo, si chiude rāto, che non lascia vñcir fuori l'aere. Questi due musculi io nò mai gli ho potuti vedere, ne meno il Realdo; quantunque tal cosa amendue insieme assai volte l'habbiamo, & nò senza diligenza, cercato; anzi dentro del gargarozzo non si vede alcun segno di carne, & per ciò non mai affermerò essere tai musculi nell'huomo, fin che no i vegga. Non per ciò ho voluto mancar di porgli, per dar materia ad alcuni curiosi di vedere, s'esser potessero piu diligenti di me. Di tutto il resto de musculi detti, quattro aprono il gargarozzo, che son quei, che congiungono la seconda cartilagine con la terza; gli altri, o sian sei, od otto, serouono a chiuderlo. I musculi comuni delle fauci, così chiamati, perche nò nascono del gargarozzo, son otto. De quali i due ^m primi cominciano dalla parte di sotto ⁿ dell'osso hyoide, & son larghi, & carnosì, & si congiungono molto da canti, & quindi vanno all'ingiu, diuidendosi alquanto, l'vno dall'altro, fin all'inserirsi, ognuno dal suo lato nella parte piu bassa ^o della prima cartilagine, con vn fin largo, & carnosò, quanto era il principio. Ma tutta la parte di questi musculi, che scende per lo lato dinanzi della prima cartilagine, si congiunge a lei con certi fili, come fa l'vn musculo cò l'altro. Et l'offitio di questi musculi è separar la prima cartilagine dinanzi del gargarozzo da quella di dietro, tirandola alquanto in sù. Vicino al fine di questi due musculi se ne inseriscono ^p altri due nella prima cartilagine, quasi tanto larghi come quegli; i quali nascono dalla parte di dietro dell'osso del petto, appresso la canna della gola, con vn carnosò, & stretto principio, & d'indi montano per sopra il gargarozzo, faccendosi a poco, a poco, piu larghi, fin all'inserirsi nella parte gia detta della prima cartilagine. Et l'offitio di questi musculi è di premere le parti di sotto della prima cartilagine, tirandola all'ingiu & insieme stringere vn poco la canna del polmone; laqual cosa aiutati, che non raddoppiamo la voce nel parlare; si che il gargarozzo non si slarghi d'auuantaggio. Il quinto, & sesto, ^q stanno intrauerfati, & nascono insieme d'vn medesimo principio, della parte di dietro della canna della gola, che risponde alla schiena, ognuno dal suo canto, secondo il lungo suo, & quindi si ite dono al trauerfo innanzi, attaccandosi sempre alla canna della gola, per tutto lo spatio, che lor toccano, & faccendosi continuamente piu larghi, & carnosì, fin all'inserirsi ne la ti della prima cartilagine, secòdo il lungo suo. L'offitio di questi musculi è di tirare verso dietro i lati della prima cartilagine, & congiungerla in tal modo con la seconda, che stringendo la lingua del gargarozzo, facciano vñcir fuori la Noce. Il settimo, ^s & ottauo, che sono quasi tondi, nascono del mezzo della parte di dietro dell'osso hyoide, & s'inseriscono nella radice ^t della couerta del gargarozzo, chiamata da Greci Epiglottis, perche sta sopra la lingua delle fauci. Si veggono chiaramente ne buoi, & in alcun altri animali; nell'huomo fin'ad hora (se ben ne ho aperto molti) in niuno gli ho potuti vedere. Anzi la medesima

i la me. fi. vi. vij. viij. V
k la med. fig. ij. iij. v. H

l la mede. fi. vj. vij. P

m la mede. fi. j. ij. F. t. v. O
u la med. A
o la med. appresso l' N

p la mede. G t. v. P

q t. xvj. fi. j. ij. iij. v. I
r la med. fig. ij. iij. v. H

s la med. fig. v. vj. L
t la med. fi. ij. iij. iij. v. L

medesima couerta fa da per se questo officio, medianti certi fili neruosi, che haue, assai sufficienti a farlo, senza aiuto d'altro musculo. La qual cosa mi fa vn'altra volta dubitare della diligenza del Vesalio; benche in tanto gran volume è degno di perdono, se tal volta fu straccurato. Tornando al mio proposito, dico, che'l gargarozzo non ha particolar legatura; eccetto che vna sottil tela, che abbraccia le congiunture delle cartilagini; ma ha da ogni lato, appresso la terza cartilagine, vna glandola, che'l mantiene humido.

De Musculi, che muouo il Braccio.

Cap. 15.

PER CHE non si possono bene veder que musculi, che muouono la paletta della spalla, & molto meno que della testa, & della schiena, senza scoprire que, che muouono il braccio; Per cio mi par da trattar prima di que, che muouono il braccio; i quali sono in tutto sette. Il primo ^a comincia di mezzo ^b di tutto il lungo del petto, ognuno dal

Il primo musculo del Braccio.

a t.j.ij. iij. Δ

t.ij. L

b t.j. dal K al R

c la med. dal R al S

d la med. dal R al L

e t.j. iij. Q

f t. iij. Q

g t.j. dal L al K

h dal K al R

i dal R al Q

k dal Q al L

l t.j. p. t.ij M

t. iij. K. t. iij.

E. ta. v. γ. ta.

ix. L. t. x. Δ.

t. xj. fi. ij.

m t. xj. fi. ij. D

n t. xj. P

suo lato (nella qual parte si toccano quasi, l'vno l'altro), & delle cartilagini, che s'inferiscono in lui, & così anchora delle cartilagini della settima, & ottaua costa, & della ^d metà della clauicola, verso l'osso del petto. La parte, che nasce della clauicola, è più carnosà; quella, che nasce dell'osso del petto, è più neruosa, & sottile; quella, che nasce delle cartilagini, che s'inferiscono nell'osso del petto, è del tutto carnosà; quella, che nasce delle cartilagini della settima, & ottaua costa, vicino alla forcella dello stomaco, p vn poco di spatio è sottile, & neruosa. Dopo a questi principij si fa questo musculo assai più carnosò, & grosso; ma si va ristignendo, fin'all'inferirsi con vna larga, forte, neruosa, & corta corda, di sotto al collo della testa dell'osso dell'omero, nella parte di dentro, alquato verso innanzi, secondo il lungo suo. I fili di questo musculo nō paiono tutt'vni, per esser il principio molto largo, & il fine molto stretto. La qual cosa fa, che que, che nascono della parte del principio, che è appresso la clauicola, scendano, & que, che nascono delle cartilagini della settima & ottaua costa, montino, in tal modo, che quando si vengono a scontrare, que di sopra passano per sopra que di sotto, & fanno cō loro vna. ⁺ Que, che nascono dell'osso del petto, attrauerlano dirittamēte, senza montare, o calare. Ma, perche tutti essi seruano vn medesimo andare, che è dal principio al fine, io mai nō direi, che fussero diuerse forti di fili; anzi gli chiamo tutt'vni. Chiamigli, che vuole, diuersi, cō questo, che intenda il lor progresso. Potrebbe anchora alcuno dire, che si diuida in due, guardando alla differenza de fili, che ha. L'offitio di questo musculo è di tirare il braccio al petto, senza essere aiutato da alcun'altro musculo; perche egli serue per tre, per quegli tre principij, che hà. Quando oprano i fili, che nascono della clauicola, lo tirano più in sù; quando que delle cartilagini della settima, & ottaua costa, il tirano all'ingìu; quando que, che nascono dell'osso del petto, lo tirano dirittamente, verso il petto; quando oprano que di sopra, & que di sotto insieme, tēgono il braccio fermo, p la ragione vniuersale, che ogni filo tira verso il suo principio. Questo musculo per la parte dināzi è tutto carnosò, fin'al fine; per quella di dietro si fa liuido, & neruoso innāzi, che finisca. Et tutt'egli ha cinque lati disuguali; il primo ^g piglia dalla metà della clauicola, fin'alla parte più alta dell'osso del petto; il secondo ^h tutto l'osso; il terzo ⁱ piglia dalla punta della forcella dello stomaco, fin'alla parte più bassa, doue s'inferisce (questo lato è quello, che fa l'orlo dinanzi del fosso dell'atcelle); il quarto secondo il lungo del capo del musculo; il quinto ^k dal capo fin'alla metà della clauicola. Il secondo ^l musculo, che muoue il braccio è similmente molto carnosò; & ha assai varij principij, benche continuati in tal forma, che pare vn musculo solo, fatto di molti. Et nasce di mezzo della clauicola, secondo il lungo suo, verso l'omero, appresso il sopra detto, & del processo della paletta della spalla, chiamata la punta dell'omero, iui, doue si congiunge alla clauicola, & di tutta la spina della paletta, con vn principio neruoso, che si fa subito carnosò, grosso, & rileuato, & nell'istesso modo si va ^m ristignendo, come vn triangolo, fin'all'inferirsi nell'osso ⁿ dell'omero, secondo il lungo suo, alquanto in obliquo dalla banda dināzi a quella di dietro, assai più basso del tuo collo, con vna molto forte corda, mischiata fra carne, & neruo, ma più neruosa di dentro, che di fuori. La figura di questo musculo è simile a quella lettera de Greci, chiamata Delta Δ, per la qual cosa lo chiamarono Deltoida. Alcuni altri il chiamarono Epomis, che vuol dir cosa, che stia sopra l'omero; perche abbraccia, & cuopre la cōgiuntura dell'ho-

L'offitio di questo musculo.

Il secondo musculo, che muoue il Braccio.

La figura di questo secondo musculo del Braccio.

Libro Secondo

dell'omero. Io lo chiamerò sempre quel, che alza il braccio; ò il secondo, che'l muoue. I lati di questo musculo son tre. ° Il primo piglia dal mezzo della clauicola, fin' alla punta dell'omero; & d'indi passa per sopra la spina della paletta della spalla, fin'al suo lato maggiore. Il secòdo P dalla medesima clauicola, all'ingiù, fin'al lato di dentro del fin di questo musculo; mediante questo lato si congiunge questo musculo al primo. Il terzo q lato cammina in obliquo, alquanto verso in nanzi dal lato maggiore della paletta della spalla (iui, doue nasce la spina di questa paletta) fin'al lato di fuori del capo di questo musculo. Di questi tre lati il primo è maggiore, & gl'altri due minori. I fili di questo musculo son diuersi, (come nel primo) secondo, che sono i suo principij. Perche que, che nascono della spina della paletta, vanno in obliquo verso innanzi; que, che nascono della punta dell'omero, vanno dritti all'ingiù; que, che nascono della clauicola, vanno in obliquo verso dietro, ma quando arriuanò al fin del musculo, non s'incruciano, come que del primo, anzi si confondono alquato. L'offitio di questo musculo è d'alzar il braccio verso diuerse parti, secondo i diuersi fili, che hà. Perche, quãdo oprano i fili, che nascono della clauicola, l'alzano verso la parte di nanzi del collo, & della faccia; quando, oprano que, che escono della punta dell'omero, & della clauicola, che sta attaccata con esso, l'alzano dirittamente; ma se ritirano que, che nascono della spina della paletta della spalla, l'alzano verso dietro. Et è da notare, che questi principij non nascono di tutto il largo delle sopra dette ossa, ma delle parti loro piu rileuate, facendo come vn'a riga alquanto larga. Il terzo r musculo, è carnosò, & grosso, & in certa forma tondo, comparandolo à gli altri muscoli di questa congiuntura, & nasce con vn principio carnosò del fine s del maggior lato della paletta della spalla; & in parte anchora del medesimo lato; benche molto piu da quel dinanzi, à cui s'attacca fin' alla metà. Et poi si separa subito dalla paletta, & monta verso inanzi, fin'all'arriuare all'osso dell'omero, nel qual s'inferisce con vna forte, & corta corda, nel medesimo modo, che habbiamo detto inferirsi il primo; & tanto vicino à lui (benche alquanto piu à dietro) che non v'è piu luogo di quanto si possa inferire la t corda del quarto musculo del braccio; è ben vero, che tal volta s'inferisce alquanto piu verso la resta dell'osso dell'omero, che'l primo. Et è offitio di questo musculo tirare il braccio verso le spalle, al contrario del primo, che lo congiungeua col petto. Il quarto u musculo nasce delle punte de processi di dietro de nodi della schiena, dal x sesto nodo delle spalle fin' alla metà dell'osso grande, con vn principio diritto, & sottile come vna tela; & monta y in obliquo da amendue i capi del principio, per sopra i muscoli, che muouono il petto, fin'all'arriuare à quella parte delle coste, che esce piu à dietro; & iui si fa carnosò, & grosso; & da poi cammina risfrignendosi à poco, à poco; & facendo il lato di fuori del fosso dell'ascella, finisce di sotto al collo dell'osso dell'omero, secòdo il lungo suo, nel mezzo delle corde del z primo, & a terzo musculo, con vn fin forte, largo, & corto. Di modo che'l musculo ha tre lati disuguali; il piu lungo de quali è quel, che monta in obliquo, dall'osso grande verso in nanzi, per sopra le punte delle coste illegitime, fin doue habbiamo detto finire; dopo questo, quel che va secondo il lungo del filo della schiena, dall'osso grande fin'al sesto nodo delle spalle; il terzo, & minore è quello, che si parte dal processo di dietro del sesto nodo delle spalle; & passa per sopra la punta piu bassa della paletta della spalla, montando parimente in obliquo fin'al capo. I fili b di questo musculo son differenti fra se stessi; perche que, che montano dall'osso grande, son piu dritti, & lunghi; il resto di mano in mano son piu corti, & piu intrauerfati, secondo che cominciano di piu in su. Questa differenza de i fili nasce, così in questo musculo, come negli altri, dalla larghezza del principio. L'offitio di questo musculo è di tirare il braccio in giù alquanto in dietro, piu ò meno, secondo che oprano i fili piu alti, ò piu bassi. Il quinto e musculo, che muoue il braccio, è molto carnosò; & nasce del maggior lato della paletta della spalla, & empie tutto d quel seno, che è fra il piu alto lato di questa paletta, & la sua spina; nella qual parte si congiunge all'osso, come se di tutto quello nascesse. Ma come arriua alla parte piu alta del collo di questa paletta, passa verso in nanzi, sotto e a vna molto forte legatura, che congiunge il processo di questa paletta, simile ad vna anchora, con la punta dell'omero; & finisce in vna molto larga, & forte corda, che s'inferisce al trauerfo nella legatura di questa congiuntura. Questo musculo è alquanto lungo, gobbo di sopra, di sotto

L'offitio di questo musculo.

Il terzo musculo.

L'offitio di questo musculo.
Il quarto musculo.

L'offitio del quarto musculo del Braccio.
Il quinto musculo.

o ta. xi. f. ij.
dal A al C
passando per
il B
p la med. da
A al D
q la med. dal
Cal D

r ta. xiiij. S. t.
vii. M. t. viii
K ti. ix. N. r.
x. xii. R. t. xi
L
f t. xi. T. li. i.
t. vi. fi. iiii. y.

t vii. O
u t. ij. r. t. ix.
o. t. x. xi. e
x ta. x. dal T
al S
y t. ii. l. m. cā
minando ver
so l'n

z t. iiii. Q
a t. vij. M

b t. ix. O

c t. xii. H. ta.
xiii X. t. vi.
k. t. vij. I t. x.
L. t. xi. G
d lib. i. t. ii. R.
t. vi. fi. iiii. b.
e t. v. c.

f ta vij. r ta. vij. H
g t. vij. fra le due L L
h la med. K

otto è simile al seno, che empie, & ha i fili secôdo il lungo, & è suo officio tirare il braccio verso dietro, rileuandolo alquanto. Il sesto ^f musculo è molto carnosio, & occupa la parte di dentro di questa paletta, che risponde alle coste, & cominciando del 3 maggior lato suo si va ristignendo, fin' all'arriuare alla parte di dentro di questa cōgiuntura, nella qual s'inferisce con vna ^h larga corda, che fa come vn mezzo cerchio. La figura di questo musculo è molto simile a quella della paletta, & il suo più alto lato sta tanto attaccato al quinto musculo, che paiono amendue vno, che tiri la paletta innanzi; ma se ben si riguarda, non è così, anzi questo musculo aiuta a tirare il braccio a dietro, torcendolo alquanto innanzi. L'ultimo musculo, ⁱ che muoue il braccio, occupa tutta la parte di fuori della paletta, dalla spina in giù, & è tutto carnosio, & nasce del ^k maggior lato di lei; dipoi si va faccendo stretto secondo la figura della paletta, fin' all'inferirsi nella parte di fuori della legatura di questa congiuntura, con vna corda ^l larga, & corta, & come vn mezzo cerchio; di modo, che i capi di questi tre vltimi muscoli pare, che abbracciano, tutto intorno, questa congiuntura. Et è l'offitio di questo musculo storcere il braccio alquanto in fuori, & l'offitio di tutti tre e' muoue il braccio tutto intorno.

L'offitio di questo quinto musculo.

Il sesto musculo.

L'offitio di questo musculo.

Il settimo musculo.

L'offitio di questo musculo.

Delle Legature, che congiungono l'Osso dell'Homero con le Palette delle spalle. Cap. 16.

LEGANO l'Osso dell'Homero con le Palette delle spalle, tre molto forti legature, & vna ordinaria, che hanno tutte le congiunture, simili ad vna tela; La quale in questa cōgiuntura comincia, come in arco, da gli orli del collo di questa paletta, & circondando tutta la cōgiuntura s'inferisce, prima nel fine del lato di dietro, della testa dell'osso dell'homero; dipoi in tutto il lato di fuori, & finalmente nel collo di detto osso. Di queste tre legature, le due prime son tonde, come nerui, & la terza è alquanto larga. La ^a prima di tutte nasce della punta del processo di ^b dietro della paletta, & s'inferisce nelle parti di dentro, & dinanzi, della testa dell'osso dell'homero, & abbracciandola s'attacca fortissimamente ad vna ^d impressione, o seno, che habbiam detto farsi in questa testa. ^e La seconda legatura (che è assai più grossa, & forte) nasce della ^f parte più alta del collo della paletta, iui, doue si mette di sotto alla punta dell'homero, & s'inferisce in ^g tutta la parte di fuori del maggior tubercolo della testa dell'osso dell'homero, vicino al seno, per doue passa il ^h principio di fuori del primo ⁱ musculo, che piega il gomito. Et il lato dinanzi di questa legatura s'attacca al lato di dietro della prima, & amēdue insieme fanno vna legatura intrauerata, che abbraccia la testa di questo musculo detto. La terza ^k legatura nasce dell'istesso luogo, che la prima, & indi va in obliquo, fin' all'inferirsi in tutto il tubercolo di fuori della testa dell'homero, circondando la parte di dietro di questa congiuntura; perche non meno è largo il suo fine, che'l principio. Oltre a queste tre legature, le quali principalmēte aiutano a questo, che l'osso dell'homero nō si disluoghi, o all'ingiù, o in fuore, ve n'è parimente vn'altra, ^l che comincia dal processo di dentro della paletta; & s'inferisce (senza toccar l'osso dell'homero) nella punta del più alto processo della medesima paletta, & difende, che l'osso dell'homero non si disluoghi verso quella parte. Alche anchora aiuta il principio neruoso del primo musculo, che piega il gomito; il qual (come diremo) nasce della più alta parte del collo della paletta, & passa fra q̄ste legature, per la impressione, che si fa nella testa dell'osso dell'homero, scendendo verso il gomito.

La legatura ordinaria di questa cōgiuntura.

La prima straordinaria.

La seconda.

La terza.

La quarta legatura dell'osso dell'Homero.

De Musculi, che muouono le Palette delle spalle. Cap. 17.

LA Paletta della spalla si muoue nel medesimo modo, che'l braccio, eccetto, che non si muoue tutto intorno, & tutti i suoi mouimenti fa col mezzo di quattro muscoli. Il ^a primo de quali nasce della seconda, terza, quarta, & quinta costa, & tal volta della sesta, innanzi, che si facciano cartilagini, cō vn ^b principio largo, & diuiso, come in molte vgne, o dita, che si attaccano, ognuno alla sua costa. Et quindi cammina verso dietro, faccendosi sempre più stretto, & grosso, infino al finire in vna ^c corda larga, tra neruosa & carnosia, che s'inferisce nella parte di dentro del processo di questa paletta, simile ad vna anchora; faccendosi più neruoso, iui, donde nasce (dalla giunta di questo processo) il principio

Il primo muscolo della Paletta della spalla.

Libro Secondo

L'offitio di questo musculo. cipio ^d neruoso della partè di dentro del primo musculo, che diremo piegare il gomito. Questo musculo è carnosio tutto, eccetto al principio, & ha suoi fili, che camminano, senza incaualcarsi, dal principio infino al fine, & è suo offitio tirar la spalla verso il petto, in sù, o in giù, secondo che oprano i fili, alti, o bassi, & dirittamente, secondo che i fili tutti insieme oprano. Il secondo ^e musculo nasce della riga, che habbiamo detto hauere al tra- uerso l'osso della collottola, dal mezzo fin'all'orecchia; il lato di fuori della quale è si di- scosto dal pizzo dell'orecchia, quanto è dal fosso della collottola; si che diuidendo in due parti vguale la parte dell'osso della collottola, che è fra il suo fosso & l'orecchia, si vedrà manifestamente, che'l principio di questo musculo occupa quella metà verso il fossetto, & congiungendosi nel suo mezzo, col suo compagno, amendue scendono per sopra le punte de processi di dietro dell'ossa della schiena, fin'all'ottauo nodo delle spalle. Ognu- no di questi muscoli ha quattro lati; vno, che attrauerfa l'osso della collottola, & è largo, quanto il suo principio, il quale, bêche sottile, è carnosio, l'altro, ^f che cala per mezzo del- le punte de processi di dietro dell'ossa del collo, fin'all'ottauo nodo delle spalle. Il terzo ^g comincia dal fin del primo, appresso il fosso della collottola, & scède in obliquo verso dietro, infino all'arriuare alla punta del processo di dietro, dell'ottauo nodo delle spalle; nella qual parte faccendosi alquanto neruoso, si congiunge col suo compagno, & amen- due fanno vna punta, comè di cocolla di cappuccio da frate; anzi questi due muscoli in- sieme son molto simili alla cocolla del detto cappuccio, & ognun di loro appresso il fine è tra neruoso, & carnosio. Il ^h quarto comincia dal collo della paletta, appresso alla cla- uicola, & scende fin'all'ottauo nodo delle spalle, & è alquanto inarcato, & sottile come vna tela; ilche fu fatto, perche pesasse meno, & per conseguente desse meno impedinen- to, o disturbo a muscoli, che stanno nella parte di fuori delle spalle, sopra le quali passa. Questi due muscoli son carnosii da ogni parte, eccetto iui, doue si congiungono alle pun- te della schiena, & tutti essi son sottili, toltane via quella parte, che s'inserisce fortemente nella punta dell'omero, & nella parte piu larga della clauicola. I fili ⁱ di questi muscoli non serbano tutti vn medesimo andare, per esser tanto largo il principio; anzi que, che nascono della collottola, & del collo, calano in obliquo verso gli homeri, fin'all'arriuare alla spina della paletta della spalla, & alla punta dell'omero, & alla testa della clauicola, & tanto piu sono intrauerfati, quanto di piu giù cominciano, infino all'arriuare al fin del collo; nella qual parte son giustamente intrauerfati. Ma que, che nascono de nodi delle spalle, montano parimète in obliquo verso gli homeri, & tanto piu s'intrauerfano, quā- to piu montano verso il collo, fin che vengono ad essere tanto intrauerfati, come gli vlti- mi, che habbiamo detto scendere per lo collo. Questi fili dimostrano l'offitio d'ognuno di questi muscoli essere, non solamente tirare in sù la paletta della spalla, ma parimente in giù, & verso le spalle, secondo le lor differenze; di modo, che e' fanno mouimenti con- trarij, senza hauere segno alcuno di diuisione, per la qual possiamo giudicare, esser piu di due. Ma se alcuno volesse dire, che e' son quattro, (come dicèmo, che erano que delle pal- pebre di sopra de gli occhi) mosso solo da gli offitij contrarij, nō mi parrebbe, che andas- se molto fuori del cammino, & allhora la ^k diuisione loro farebbe dalla pūta dell'home- ro, al primo nodo delle spalle. Il terzo ^l musculo, che muoue la paletta, nasce del proces- so de lati del primo, terzo, quarto, & quinto nodo del collo, in tal modo, che pare, che habbia due principij separati mediante il secondo nodo; benchè tal volta nasce anchora in parte, del processo de lati del secondo nodo. Et questi principij nell'uscire fra gli altri muscoli, che abbracciano i nodi del collo, subito si congiungono, & fanno vn sottile, & forte musculo, alquanto piu largo, che grosso; il quale s'inserisce con vn largo, & carno- so fine, nella parte di dentro del piu alto canto, del maggior lato della paletta della spal- la, & la tira in sù verso innanzi, a lati del collo. Il quarto ^m musculo è largo, & sottile, & da ogni parte carnosio, & nasce dal quinto, sesto, & settimo nodo del collo, & de processi di dietro de tre primi nodi delle spalle, & s'inserisce ⁿ quasi in tutto il maggior lato della paletta, con vn fine carnosio, & largo, quanto il principio, & ha i fili, che calano in obli- quo, da i nodi delle spalle, fin'al maggior lato delle palette. Questo musculo sta subito dopo quello, che habbiamo detto essere simile al cappuccio de frati, & tolta la pelle si veg- gono nelle spalle (da lati di sotto del sopra detto musculo) le punte piu basse di questo, & del suo compagno; L'offitio de quali è, di tirare la paletta a dietro, alquanto in sù.

De

d la mede. b
t.vj. n

c t.ix. r a ta.
ij. LK t.ij.
G t.ij. b

f ta. ix. dal L
al G passan-
do pel K
g la med. dal
L al H pas-
sando pel r

h la med. dal
H al G

i t. ix. o

k la med. dal
H al K
l t.vj. K t.vij.
H ta. viij. I
t. x. xj. C t.
xij. G ta.
xij. Q

m t. x. HI

n t. x. tra'l I
e'l K

PARLANDO del primo, & secondo nodo del collo, diffi, come la Testa si mouea; per se sola, & al mouimento del collo; per se sola si muoue innanzi, & all'indietro; mediante il collo da lati, come ognuno puote in se stesso prouare. Amendue questi mouimenti si fanno, mediati molti musculi. De quali tratteremo hora, cominciando da que, che la muouono particolarmente, i quali sono quattordici, sette per lato. Il primo, ^a & secondo nascono, ognuno dal suo canto, della punta de processi di dietro, del quinto, quarto, terzo, & primo nodo delle spalle, con vn lungo principio, che subito, che si parte dal quinto nodo, si fa aguzzo, & formonta allargandosi a poco, a poco, in modo, che quando arriua al terzo, ^b & secondo nodo delle spalle, è tanto largo, quanto son larghi i processi de lati di questi nodi, & con questa medesima larghezza monta, nascendo leggermente delle punte di dietro, de gli cinque ultimi nodi del collo. Ma tosto, che passano il terzo nodo, si separano, l'vno dall'altro, a poco, a poco, infino all'inferirsi ognun di loro nell'osso della collottola, con vn fine ^c intrauersato, & largo, quanto è lo spatio tra'l lato di fuori dell'vno di questi musculi, & l'orecchia, & il lato di dentro del medesimo, & il fosso della collottola. Di modo, che'l fine d'amendue è tanto largo, quanto è lo spatio, che lasciano scuerto, fra l'vna orecchia, & l'altra, & il voto, che si fa tra l'vno, & l'altro, quando si separano, rappresenta la figura ^d d'vn triangolo. Non meno rappresenta ognuno di questi musculi la medesima figura in certa forma, se bene i lati son molto disuguali; perche il primo è molto grãde, & passa per mezzo della schiena; il secondo è vguale al primo, & passa per la parte di fuori; il terzo è molto picciolo, & è quel capo intrauersato, col qual s'inferiscono nella collottola. I fili di questi musculi caminano in obliquo al l'insù, incominciando dalle punte de processi di dietro de nodi piu bassi, & camminano verso i processi de lati dell'ossa piu alte, infino al finire tutti insieme nell'osso della collottola; perche a processi de lati s'attaccano molto poco, o niente. Il terzo, ^f & quarto musculo, cominciano con vno aguzzo principio, di mezzo de processi de lati del quarto, & quinto nodo delle spalle, faccendosi dal principio carnosì, & di figura di lucertola; ma come arriua al principio del collo, si conuerte ognun di loro in vna corda tonda, & di poi tornano subito a essere carnosì fin'all'inferirsi nel mezzo della collottola, faccendosi nel mezzo sottili, ne piu, ne meno, che habbiam detto farli il ^h musculo, che mouea la mascella inferiore. Ad ognuno di questi musculi, innãzi che s'inferisca, sene congiunge vn'altro, che nasce del processo di dietro, del settimo nodo del collo, con vn principio neruoso, & tondo, il quale formontando si fa carnosò, & finisce insieme col sopra detto nel mezzo della collottola, ⁱ congiungendosi nel finire, i lati del lato dritto, a lati del lato mào. Si veggono così anchora in questa parte altri due musculi, vno ^k per lato; che nascono delle punte de processi de lati, del secondo & primo nodo delle spalle, con vn principio, parte neruoso, & parte carnosò, & montano alquanto innanzi, faccendosi piu carnosì, & larghi, fin'all'inferirsi fortemente nella radice del processo dell'osso delle tempie, simile alla mammella. Sotto a ^l questi musculi, da ogni canto, è gran quantità di carne, che nasce de processi de lati de nodi del collo, & monta in obliquo verso i processi di dietro infino all'inferirsi nell'osso della collottola; la qual carne ha i fili, che montano in obliquo, da fuore in dentro. Tutti questi quattro musculi si veggono distintamente separati; ma perche paiono parte del secòdo paio, & perche seruono al medesimo offitio, che è alzare il capo, & in certo modo il collo, & oprando que d'amendui i lati insieme, aiutano a piegare la testa dirittamente verso dietro; oprando solo que dell'vno; aiutano a riuoltarla intorno. Il quinto, ^m & sesto, son molto sottili, & nascono delle punte de processi di dietro del secondo ⁿ nodo del collo, con vn principio non molto neruoso, & caminando in sù dirittamente, (benche non tanto, che non stiano piu separati, quãdo finiscono, che quando cominciano) s'inferiscono con vn capo tòdo, nel mezzo dell'osso della collottola. L'offitio di questi musculi è, oprando insieme, alzar la testa verso dietro; oprando vn solo, aiutare a dimenarla intorno. Il settimo, ^o & ottauo, stanno sotto al terzo paio, & son simili a lui in sustanza, forma, & sito, & nascono, ognuno dal suo canto, con vn principio carnosò, & sottile, da lati del ^p tubercolo, che habbiam detto hauere il primo

Il primo, & secondo Musculo della Testa.

Il secondo paio de Musculi, che muouo la Testa.

Vn'altro Musculo.

Altri due.

La carne, che sta fra questi Musculi.

Il terzo paio de Musculi della Testa.

Il quarto.

a t. xij. r. t. x.
xj. A

b t. xij. A

c t. xij. B C

d la mede.

B E D

e la mede.

B C A

f t. x. xj. B ta.

xij. F F ta.

xij. A t. v. f

g t. xij. A

h t. v. H I

i t. xij. dal C

al D

k t. xij. F F

l t. xij. G G.

m t. xij. A B

n t. xij. fig.

ij. E

o la md. F G

p lib. j. t. v. f.

vj. M

Libro Secondo

Il quinto. primo nodo del collo, nella parte di dietro, nel luogo, dove gli altri hanno i processi di dietro. Questi due muscoli si toccano nel principio, ma di poi nel progresso si separano alquanto, & così separati s'inferiscono nell'osso della collottola. Et l'offitio d'amendue è d'aiutare a alzare il capo. Il nono, 9 & decimo, son carnosì, lunghi, & quasi tondi, & nascono dell'osso della collottola, appresso il lato di fuori del quarto paio, & scendono in obliquo fin'all'inferirsi nella punta de i processi de lati, del primo nodo del collo, ognuno dal suo lato. L'vndecimo, 11 & duodecimo son dell'istessa figura di quelli, de quali ho ra habbiam parlato, & nascono del processo di dietro del secondo nodo del collo, & montando vn poco in obliquo, s'inferiscono ne processi de lati del primo nodo del collo, nella medesima forma, che i sopra detti. Ognuno di questi muscoli insieme cō ognuno di que del terzo, & quarto paio del suo lato, fanno vn triangolo perfetto, di modo, che'l terzo, il quinto, & sesto paio, tutti insieme fanno due triangoli nella collottola, vno nel lato destro, l'altro nel lato manco. Il primo canto de quali è nel mezzo della collottola; il secondo appresso al processo di dietro del secondo nodo del collo; il terzo, (nel triangolo del lato destro) appresso il processo del lato del primo nodo del collo, del medesimo lato, & in quel del manco al contrario. L'offitio del nono, decimo, vndecimo, & duodecimo musculo è di voltare all'intorno il primo nodo del collo, sopra il secondo, & per conseguente la testa, & oprando que del lato destro, voltano il primo nodo del collo verso dietro, al lato manco; oprando que di man sinistra, lo voltano al contrario; di modo, che i muscoli, che tirano la testa verso dietro, son dodici, contando il secondo paio, come due muscoli soli. Restaci a contare que, * che la muouono innanzi, i quali son due soli, & nascono, y ognuno dal suo lato, di mezzo della parte piu alta del petto, & z della parte della clauicola, che si congiunge, a questo medesimo osso, con vn principio largo, & neruoso. Benche assai piu è neruosa la parte di questo principio, che comincia dall'osso del petto, che quella, che comincia dalla clauicola; ma non per ciò lascia di essere tutto il principio continuato, dal quale montando in obliquo si fa vn musculo, alquanto piu largo, che grosso, che s'inferisce con vn fin carnosio, & grosso, nel processo dell'osso delle tempie dal suo lato, simile ad vna tetta, lo quale abbraccia tutto. Ma è da notare, che tra la parte, che nasce della clauicola, & quella, che nasce dell'osso del petto, si fa vn a fossetto, come triangolo, il qual si vede in chi si voglia, senza torvia la pelle; anzi pare, che separi l'vn principio dall'altro b fin quasi a la metà del musculo, doue d'amendue i principij si fa vn corpo, che finisce, come habbiam detto. Questi principij, o sian due, od vno, importa così poco, come il sapere, se si diuide ognuno di questi muscoli in piu d'vno, come molti han pensato. Basti intendere, come sian fatti, & che è lor offitio contrario a gli otto primi, che tirano la testa verso dietro. Et per ciò oprado insieme, abbassano la testa, come quando diciam di Sì, tanto tenendo fermo il collo, quanto mouendolo, & oprado vn solo, abbassiamo la testa verso il lato di quel, che tira; tirando hora, l'vno, hora l'altro, voltano la testa in torno, come quando diciam di Nò, assai piu chiaramente, che niuno de sopra detti. * Oltre a questi quattordici muscoli, ve ne son parimente de gli altri, che son nascosti sotto alla canna della gola, & nascono de corpi de quattro primi nodi delle spalle, & di tutti que del collo, ne quali s'appoggiano nel passare, & dipoi s'inferiscono alquanto oscuramente nell'osso della collottola appresso alla parte dinanzi del buco della Nucà. Ma di questi muscoli, quando tratteremo di que, che muouono la schiena, faremo piu lunga mentione; perche piegano la parte sua piu alta, senza dimenare niente la testa. * Ci sono anchora altri quattro para di muscoli, da ogni lato due, che stanno da lati del collo; de quali ne anche tratterò fin'al capitolo di que, che muouono il collo, per esser quello lor principale offitio.

Delle Legature della Testa, et de due primi Nodi del Collo. (ap. 19.)

Altri quattro. **La Legatura,** che congiunge la Testa al primo Nodo del Collo. **H**ABBIAMO detto nel passato libro, come si congiunge la testa al primo nodo del collo, & questo primo al secondo, & il secondo dipoi alla testa. Restaci a dire delle Legature, che congiungono queste ossa. a La prima delle quali è molto forte, & circonda tutta la congiuntura, fra'l primo nodo del collo, & la testa, senza ha-
uere

q t. xliij. HI

r la med. D

s la med. KL

t la med. appresso al E

u t. xliij. A.H
K B L I

x t. iij. F. t. ij.

I. t. iij. O. r.

v. K

y t. iij. x

z la med. y

a la med. tra

il Y e l X

b t. iij. F

c ta. vj. P. ta.

vij. CD. ta.

vij. AB

d lib. j. t. iij.

fi. vj. o

e ta. viij. C

t. xliij. H

a ta. xv. figu.

xxvij. E E

E E

b ta. xv. figu.
xxvij. I
c la mede. H
d lib. j. t. iij.
fi. vj. o

e ta. xv. figu.
xxvij. K. li. j.
f. v. fi. vj. a

f ta. xv. figu.
xxvij. FF

uere altra particolarità alcuna. La seconda^b lega la testa col secondo nodo, & è tonda, & molto forte, & di natura di cartilagine, & nasce della^c punta del dente, che habbiamo detto hauere questo secondo nodo, & s'inserisce nell'osso della collottola vicino^d la parte dinanzi del buco della Nuca. Questa legatura, oltre al legare il secondo osso del collo a quel della collottola, fa similmente (aiutata dal detto dente) come vn Spigolo, sopra il quale si volta la testa all'intorno. La^e terza è quella, che habbiamo detto attrauersare da vn lato all'altro, nel primo nodo del collo, & abbracciar di dietro il dente del secondo nodo; la quale è molto forte, neruosa, & di natura di cartilagine, & sta fra la midolla spinale, & il dente del secondo nodo, & suo officio è tenere forte questo dente, quando facciamo forza all'indietro con la testa; perche non si dislogasse, & offendesse la midolla spinale, il che non potrebbe intrauuenire senza vn molto notabil danno. La quarta^f lega il secondo nodo del collo, col primo, & è sottile, come tela, & della medesima natura, & officio, che l'altre legature comuni a qual si voglia congiuntura.

La seconda Lega-
tura della testa,
& de due primi
nodi del collo.

Laterza.

La quarta.

De Musculi del Ventre.

Cap. 20.

a ta. j. t. iij.
O. ix. P
b. t. j. iij. PP
c. t. i. s. 6. 7. 8.
t. iij. iij. o o o

d t. xj. A
e t. j. dal R.
al X
f lib. j. t. j. ij.
iij. II. I. I.
I. j. I. 4.
g t. j. e

t. viij. e A
i t. iij. II. t. v.
a. t. xj. a b

k t. v. x. t. vj. b

l t. iij. PP

m t. v. x. t. vj. b

ANCHOR che non sia molto à proposito, trattar de Musculi del Ventre, subito dopo que della testa, pure lo farò così per seguirmi dal Vesalio, quanto meno potrà; & chi di ciò haurà fastidio, legga i capitoli per l'ordine, che più gli piacerà; poi che lo puote fare senza molto trauaglio, trapassando alcuni fogli. Hora sono i Musculi del ventre in tutti otto, che fanno quattro paia. De quali il^a primo sta sopra di tutti, & nasce con vn principio carnososo della^b testa, settima, & ottaua, & nona costa, innanzi, che si conuertano in cartilagine, appresso al^c secondo musculo, che muoue il petto, col quale fa vn'incastro; perche quello sta diuiso, come in certe vgne di dita, & questo empie lo spatio fra l'vna, & l'altra vna; ma passata la nona costa, se ben nasce nel medesimo modo dell'altre coste, non fa incastro col sopra detto musculo, se non col quinto, che diremo muouere il petto. Questo principio è sottile, & carnososo, & quindi scende innanzi, facendosi, a poco, a poco, più grosso, & pigliando sempre principio de processi di dietro^d de nodi de lombi, & congiungendosi nel mezzo del ventre, quel dell'vn lato a quel dell'altro, mediante vna riga^e bianca, scendono coprendo tutto il vacuo fra le coste, & l'ossa de galloni, insino all'inserirsi con vn fin neruoso in^f tutta la giunta, che hanno queste ossa delle anche, nella parte lor più alta, chiamata da i latini Spina. Et è da notare, che la parte carnososa di questi muscoli, cominciando di dietro, arriua solamente fin'al^g musculo diritto del suo lato, & iui si conuerte in vna sottile, & neruosa tela, la qual passa per sopra le tele, che diremo hauere il secondo paio insino a doue habbiamo detto congiungersi l'vno con l'altro, & s'inseriscono nella parte più alta de galloni, & in tutta la parte più alta dell'ossa del pettignone, eccetto nella parte, che passando cuoprono^h il sesto, & settimo musculo, che piegano la coscia. Questi muscoli hanno suoi fili, che scendono in obliquo, nel medesimo modo, che loro, verso innanzi, & per ciò furono chiamati Obliqui descendenti. Il secondo paio sta di sotto al primo, & nasce, con vn principio neruoso, & sottile, della punta della più alta parte de galloni, che habbiamo detto essere couerta con la giunta, & de processi di dietro dell'osso grande, & de nodi de lombi, & dopo el principio si fa alquanto più grosso, mediante certe fibre di carne, che gli si congiungono. Questo musculo e' il suo compagno montano in su in obliquo, fin'all'inserirsi nelle punte delle quattro ultime coste; ma, come arriua al mezzo del ventre, ognuno dal suo lato, che è appresso^k al musculo diritto, si couertono in vna neruosa, & sottil tela, la quale non è semplice, (come dice il Vesalio) anzi si diuide in due, che pigliano in mezzo el musculo diritto dal suo lato. Et dopo questo s'inseriscono di sopra nella forcella dello stomaco; & di sotto nell'osso del pettignone, & si^l congiungono nel mezzo del ventre d'alto, a basso, come fecero i due primi, in tal forma, che, se non si risguardano con gran diligenza, così la diuisione, come le differenze de fili, parrebbero tutti vno, non ostante, che nel mezzo del ventre, (che è fra l'vn musculo diritto, & l'altro) si facciano alquanto più grosse. Appresso al lato di fuori di questi muscoli diritti, secondo il lungo loro dalle coste fin'all'osso del pettignone, le tele di questi due secondi si^m congiungono fortemente a quelle del quarto paio, & alla tela, che cuopre gl'intestini, & le membra della

Il primo paio de
musculi del ven-
tre.

Il secondo, &
terzo paio.

Libro Secondo

digestione, chiamata il Peritoneo, in tal modo, che pare, che finiscano in questo luogo; ma risguardadoui bene, si vede, che e' passano innanzi. I fili di questi muscoli morano in obliquo in su, incrociandosi con que de due primi, che gli son di sopra, & per cio furono chiamati obliqui ascendenti. Fra queste due tele, che haue ognuno di questi due secon- di muscoli, sta situato vn' altro musculo, & amendue fanno il terzo paio di que, che muouono il ventre, nascendo ognun di loro dal suo lato, di mezzo dell'osso del petti- gnone, con due principij, vno piu alto, verso fuore, l'altro piu basso, & verso dentro, i quali, se bene non son separati, son di diuersa sustanza. Perche il piu alto verso la banda di dentro e' del tutto carnosio, & largo di sopra, & scende in obliquo verso fuori, faccendo fine in vna punta, innanzi che arriue alla metà del pettignone. Fra'l principio di questo musculo, & quel del suo compagno dall'altro lato, si fa, come vn triangolo. Il principio piu basso, che esce alquanto in fuore, e' del tutto neruoso, & formontando si allarga a po- co, a poco, infino che fa tutto il largo di questo musculo; il qual nascendo di questi due principij, monta per mezzo del ventre, attaccandosi al suo compagno dall'altro lato fin'al bellico; appresso il quale si discostano vn poco, & faccendosi alquanto piu larghi, cam- minano, infino all'inferirsi con vn fine largo, & carnosio, sopra la forcella dello stomaco, da lati dell'osso del petto, nelle cartilagini della settima, & testa costa. In questi muscoli sono certe impressioni, che gli attrauerano pel largo, delle quali due si veggono ordi- nariamente sopra il bellico, & vna di sotto, & tal volta stanno tre sopra il bellico, ma tut- te elleno son larghe, come vn dito, bianche, & neruose, & seruono, (come diremo) a ten- ner questi muscoli piu raccolti verso il ventre. I fili di questi muscoli non si distendono per tutto il lungo loro, anzi finiscono in queste impressioni dette, intrigandosi in tal mo- do, che pare, che naschino, gli vni de gli altri. Sotto a tutti questi muscoli, ne son altri due, da ogni lato vno, che abbracciano al trauero tutto il ventre, chiamati per cio Tras- uersales, & nascono de processi de lati de nodi de lombi, con vn principio, tra neruoso & carnosio, sottil come tela; & de muscoli, che muouono la schiena; & dopo questo fac- cendosi alquanto piu grossi, medianti certe fibre di carne, che lor si congiungono, nasco- no anchora della punta del gallone, & delle punte delle coste illegitime. Ma, come arriua- no, ognuno dal suo lato, a lati di fuore de muscoli diritti, alquanto di sotto loro, ritor- nano neruosi, & sottili, & faccendo vna tela sottile si congiungono, l'vno all'altro, nel mezzo del ventre, & abbracciandolo tutto, s'inferiscono nel mezzo dell'osso del petti- gnone, & nella forcella dello stomaco. Di sotto a questi muscoli sta quella tela, come carta pecora, che cuopre gli intestini, & tutte le membra, che seruono alla digestione, a cui s'attacca la tela di questi due sopra detti muscoli (secondo, che e' il lungo del lato di fuori de i muscoli diritti) in tal modo, che con difficultà si possono distaccare senza rom- perli. Il resto di questi muscoli, (che e' tutta la parte carnosia) e' attaccata alla detta tela nell'istessa forma, che sono attaccati, l'vn musculo all'altro. Tutti questi muscoli in sie- me (oltre che mantengono il ventre caldo, & aiutano alla digestione) seruono anchora a muouere il petto, quando risatiamo, & insieme, che con minor trauaglio facciamo i bi- sogni naturali, ritenendo il fiato, & premendo gli intestini in giù, & per tal ragione di- sturbano, che le fecce non montino allo stomaco, & aiutano nelle donne a partorire, come facilmente si vedrà, quando hauremo parlato della Diaframa.

De Musculi de Testiculi.

Cap. 21.

Due Musculi de
Testiculi del
l'Humano.

IN ogni Testicolo e' vn sottil musculo, che nasce della tela, che comincia dal Peri- toneo, & cuopre i vasi, per donde passa il seme a testicoli. La qual faccendosi nelle par- ti di dietro, tosto, che si parte dal Peritoneo, piu grossa, medianti alcune fibre di carne, che le si giungono, si conuerte in questi due muscoli; i quali scendono, attaccati sempre con la tela, che cuopre i testicoli; fin'all'inferirsi, cosi essi, come la tela, appresso la parte piu bassa de testicoli, ne vasi, per doue il seme passa da i testicoli al membro. Et e' da nota- re, che la detta tela in niun'altra parte si congiunge a i testicoli, ne a i canali del seme, ec- cetto in questa, & per cio questi muscoli non toccano in modo alcuno il testicolo, anzi son simili a que, che habbiamo detto nascer della tela carnosia. L'offitio di questi muscoli e' di tirare alquanto i testicoli in su, benche tanto oscuramente, che quasi non si sente, & aiutare

L'offitio di que-
sti muscoli.

aiutare a sostenerli, perche col peso non indeboliscano i vasi del seme, da quali parimente pendono. Hanno anchora le Donne^d altri due muscoli, simili a questi, i quali stan nascosti dentro del ventre, cosi come l'altre membra della generatione, che hanno le donne. Perche quella e parte del peritoneo, che si congiunge da ogni lato alla matrice, per la qual passano a lei molte vene, & arterie (come per lo Mesenterio a gl'intestini) & fa la prima tela della matrice, si fa parimente piu grossa mediante certe fibre di carne, che scendono in obliquo dalle punte dell'anche fin a i lati della matrice, facendo questi due muscoli simili (non meno in officio, che in figura, & sustanza) a quelli, che habbiamo detto hauere l'huomo.

Due muscoli ne
Testicoli della
Donna.

De Musculi, che muouono il Petto.

Cap. 22.

I Musculi, che muouono il Petto (contando anchora gli otto del ventre) sono ottanta noue, quaranta & quattro per banda, che fanno quaranta & quattro paia, & vno commune ad ambi i lati. ^a Il primo paio comincia con vn principio carnosio, dalla parte piu bassa di dentro della clauicola, secondo il lungo suo, iui, doue risponde alla prima costa, & s'inferisce nella medesima forma carnosio nella parte dinanzi della prima costa, vicino doue s'incassa nell'osso del petto, & è molto corto, ma molto largo, & sottile, & del tutto carnosio, & ha i fili, che vanno dalla clauicola in obliquo, quasi al trauerso verso innanzi, fin'all'inferirsi nella parte di sopra della prima costa, & nella parte dell'osso del petto, a cui la cartilagine di questa costa si congiunge. L'offitio di questo muscolo è di tirare in sù la prima costa alquanto in fuore, & per conseguente slargare il petto. ^b Il secondo muscolo è grande, & nasce con vn principio carnosio, dalla parte di dentro del maggior lato della paletta della spalla, & quindi cammina distendendosi sopra le coste, & facendosi assai piu largo, ma ben alquanto piu sottile, fin'all'inferirsi nella seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima, & ottaua costa, & tal volta nella nona, nel mezzo de ognuna di loro, secondo il lungo, vn poco innanzi, che comincino le cartilagini, con certe punte, come dita, od vgne, che fanno vno incastro, dalla sesta costa in giù, e col primo muscolo del ventre; perche questo secondo s'allarga sopra ogni costa, & il primo del ventre s'inferisce ne gli spatij fra l'vna, & l'altra. Il resto di questo muscolo si congiunge alle coste, ne piu, ne meno, che si foglia congiungere l'vn muscolo all'altro. Et è suo offitio tirar in fuori le coste, & per conseguente slargare il petto. ^d Il terzo muscolo nasce de processi di dietro de tre vltimi nodi del collo, & dell'istesso processo di dietro del primo delle spalle, con vn neruoso, sottile, & largo principio, & quindi scende verso innanzi per sopra e il primo paio de muscoli, che muouono la testa, & per f sopra alcun'altri, che muouono la schiena, & il petto, facendosi sempre carnosio, & largo, dipoi che ha passato il detto primo paio de muscoli, che muouono la testa. Ma, come arriua alla prima costa del petto, si distende alquanto verso i lati, & si diuide come in tre dita, che si distendono per gli spatij tra le quattro prime coste, & s'attaccano a loro. L'offitio di questo muscolo è slargare il petto. ^g Il quarto nasce, insieme col ^h piu largo muscolo, che muoue la schiena, della parte di dietro dell'osso grande, & di quella di dentro dell'ossa dell'anche, iui, doue escono piu in fuora, che l'osso grande, & quindi móta (attaccandosi a i processi de lati de nodi de lombi) insieme col duodecimo ⁱ muscolo, che muoue la schiena; col qual s'attacca di forte, che non senza ragione han detto molti essere vna parte di lui. Ma, come arriua al duodecimo nodo delle spalle, si separa tanto notabilmente da lui, che ha fatto pensare molti, che cominciasse in questa parte. Indi monta in obliquo alquanto in fuore, & getta certe corde quasi tonde, che s'inferiscono in que tubercoli, che habbiamo detto hauere le dieci prime coste, vn poco piu innāzi, di doue s'inferiscono ne processi de lati, de nodi delle spalle. Questo muscolo è carnosio fin doue cominciano le corde, & finisce ordinariamente appresso il primo nodo delle spalle; se ben alcune volte monta tanto in sù, che le sue corde arriuaano a processi de lati del settimo nodo del collo, attaccandosi a processi de lati de nodi del collo, ne piu, ne meno, che a tubercoli delle coste. Ma è da notare, che solo è carnosia quella sua parte, che s'attacca all'vndecima, & duodecima costa; perche, quanto piu monta in sù, tanto le corde son piu manifeste, & il muscolo piu neruoso, & sottile, come se si conuertisse in loro. Et l'offitio di questo

Il primo muscolo del Petto.

Il secondo.

Il terzo.

Il quarto.

Libro Secondo

Il quinto.

musculo è di tirare in giù le coste, & per conseguente strignere il petto. * Il quinto nasce con vn principio largo, & sottile, de processi di dietro dell' vndecimo, & duodecimo nodo delle spalle, & tal volta del decimo, & d'alcuni de nodi de lombi, & è intrauerfato sopra alcuni muscoli, che muouono la schiena, & sopra ^m il quarto, che muoue il petto, & cammina quasi diritto verso innanzi. Ma, come passa i sopradetti muscoli, s'inferisce nelle coste, & si fa piu grosso medianti certe fibre di carne, che gli si congiungono, & così finisce, diuidendosi come in tre ⁿ dita, che si mettono ne voti della nona, decima, & vndecima costa, inferendosi nelle medesime coste assai innāzi, che diuentino cartilagini, & faccendo vn'incastro col primo ^o musculo del ventre. L'offitio di questo musculo è

Il sesto.

slargare il petto, tirando verso dietro le coste, nelle quali s'inferisce. Il ^p sesto sta situato nel concauo del petto, & si distende per tutto il lato di dentro dell'osso del petto, secondo il lungo di tutte le cartilagini delle coste intere, alle quali s'attacca slargandosi tanto, che col lato di fuori arriua quasi al principio delle coste. Questo musculo è simile ad vn triangolo, fatto di due molto lunghi lati, & vno molto corto, & è sottile, & carnosio da ogni parte, & ha i fili, che montano al trauerfo dall'osso del petto verso dietro. Suo offitio è serrare il petto, tirando le cartilagini verso l'osso del petto, & congiungendo l'vna coll'altra. ¶

I Muscoli Inter costali.

Dopo questo musculo seguono trenta quattro da ogni parte, che empiono gli spatij delle coste, & per ciò furono chiamati Intercostales. De quali venti stanno tra le coste illegitime, tra ogni due coste dui, vno nella bāda di dentro, vn'altro in quella di fuori, & quaranta otto tra l'intere, tra ogni due coste quattro, dui nella parte di fuori, & altri dui in quella di dentro. Di que di fuori il primo nasce della parte piu bassa della prima costa secondo il lungo suo, cominciando, di doue si separa da processi de lati de nodi delle spalle, fin doue ritorna cartilagine, & quindi scende in obliquo, fin'all'inferirsi nel lato di sopra della seconda, con vn fine, vguale al principio. Il secondo nasce anchora della parte piu bassa della prima costa, dall'osso del petto fin'al fine della cartilagine, & scende, ne piu, ne meno, che'l primo, da cui solo è differente nell'andare de fili; perche in quello scendono in obliquo verso innanzi, in questo scendono in obliquo verso dietro. La qual cosa mi fa certo pensare esser questi, due muscoli, & non vno, come dice il Vesalio; perche, secondo che mostrano i fili, fanno contrario offitio, benché indrizzato ad vno istesso fine. Gli altri * muscoli della parte di fuore nascono, & finiscono, ne piu, ne meno, che questi due. Que di quella di dentro, amendue nascono della parte piu alta della costa inferiore, & montano fin'all'inferirsi nel lato di dentro della parte piu bassa della costa superiore vicina a lei, & sono parimente carnosii, come que di fuore, & hanno i fili, che montano in obliquo verso innanzi, incrociandosi co fili de muscoli di fuori. Restano altri venti, che sono fra le cinque coste illegitime, in ogni voto due, che rispondono a gli primi delle coste intere, & a que, che stanno di sotto a loro, & sono parimente carnosii, & sottili; & seruono a ristignere il petto, come manifestamente mostra il loro sito, perche nascono, gli vni al contrario de gli altri, & tirando al paro, quel di sotto, la costa di sopra, & quel di sopra, quella di sotto, congiungono le coste, l'vna all'altra. Questi son tutti i muscoli proprij (dell'vna banda), che muouono il petto, a quali ne corrispondono altrettanti simili nell'altra. Resta a dire ^s del musculo commune ad amendue i lati, che fa vn tramezzo tra le membra, che seruono alla vita, & quelle, che seruono alla digestione; per la qual cosa fu chiamato da Latini Septum transversum; noi altri (seguendo i Greci) lo chiamiamo la Diaframa. Questo musculo è differente da tutti gli altri del corpo; perche è largo, & tōdo, & ha il principio ^t nel suo mezzo, nella qual parte è molto sottile & neruoso. Di questo principio escono certi fili, come raggi, che camminano dal centro di questo musculo, fin doue egli è tondo, faccendo fine insieme col musculo, parte nella punta del petto, di sotto alla forcella dello stomaco, gli altri nella parte di dentro delle punte delle cartilagini, delle quattro prime coste illegitime, & in tutta la duodecima cartilagine, faccendosi in questa parte carnosio, & al fine delle ultime coste, si congiunge alquanto al secondo musculo del ventre, & molto piu al quarto. Et è da sapere, che i fili di questo musculo, che vanno diritti all' vndecimo osso delle spalle, nō s'inferiscono in lui, perche è coperto ^u dall'arteria grande, & dal sesto * musculo, che muoue la coscia, & per ciò in questa parte, questi fili si conuertono in due ^y legature, sottili, & forti, che scendono alquanto a canto a lati dell'arteria, faccendosi a poco, a poco, piu stretti, & mettendosi

Muscoli di dentro, di que, che sono fra le coste intere. Altri Vēti, che stanno fra le illegitime.

La Diaframa.

di sotto

k t.xi. A

l quelli, che son in questa parte, si veggono I la t. xiii. & xiiij.

m t.xii. A n t.ii.iii.ooo o la med. p p t. viii. &

q t.vi.v.x.ta. viii.EEE

r t.viii. EE

s t.vii. A. lib. vi.t.v. fi.x.A li.iii. t.i. fi. i.I fi.ii. R.R. fi.iii. H.fig. iiii. Q. fi.v. E. fi.vi. n. q. fi.xii. l t. vii. tra l k l m n

u la mede. q li.iii. t. v. fi. xxvi. Q x t.vii. t y la med.o p

y L'uno tra
la k l m n,
l'altro d'in-
di in là.

z t.vii. f

a la med. r

b la med. q

c t.vij. o p

d la med. q

di sotto all'arteria, vanno fin' all'inferirsi fortemēte con vn lungo capo in alcuni nodi de lombi, che stanno scouerti. Questo musculo è quasi tondo, & sta situato alquanto in obliquo di sù, in giù, secōdo il sito delle punte delle coste, nelle quali s'inferisce, & misurandolo dal mezzo, o centro suo, (dalla qual parte, come habbiam detto comincia) fin'al la metà, y è neruoso, & sottile, come tela; il resto fin' alle coste è carnosio. Et si come, quanto piu s'auuicina al suo centro, o principio, è piu sottile, & neruoso, cosi quanto piu s'appressa al suo fine, o tōdezza, è piu grosso, & carnosio, & la parte neruosa fa vna pūta aguzza, che monta verso innanzi, la carnosia scende all'ingiu, & fa la figura del fine d'vna Racheretta. Questa Diaframa è tutta couerta di due tele; per la parte di sotto, da quella, che fa scia il fegato, & tutte l'altre membra della digestione, che habbiam detto chiamarsi Peritoneo; per quella di sopra (che risponde a polmoni, & al cuore) da quella, che cuopre le coste, chiamata per ciò da Greci Pleura. Ha di piu questo musculo (quello, che in altri pochi si vede) due buchi, ^z Vno nel suo mezzo, alquanto verso il lato dritto; per lo qual passa il tronco della vena grande, chiamata da Latini per ciò Vena magna, a cui s'attacca questa diaframa fortissimamente, mediati le due tele, che habbiam detto coprirli. Il ^a secondo buco sta alquanto piu in giù della metà di questo musculo, vn poco verso il lato manco, & per lui passa la canna della gola, insieme cō due rami del sesto par de nerui delle ceruella, che scendono infino alla bocca dello stomaco. Oltre a questi due buchi ha la diaframa vna ^b incauatura appresso l'vndecimo nodo delle spalle, fatta di que ^c fili, che habbiam detto conuertirsi in due legature, & per lei passa ^d l'arteria grāde, & il fine della vena sola, chiamata per ciò da Latini Sine pari, che vuol dir, senza compagna. L'offitio di questo musculo è di tirare in dentro la forcella dello stomaco, & le punte delle coste illegitime alquanto in sù verso il suo principio, che è nel suo mezzo; come ce'l dimostrarono i due rami de nerui, che diremo inferirsi nel suo mezzo, alquanto verso innanzi, da ogni lato vno. Di modo, che raccogliendosi questo musculo, tira le punte delle coste illegitime verso il suo principio, & ferra la parte piu bassa dinanzi del petto, che è quello spatio, che occupano le coste mendose, & allarga il resto delle corde verso il fine, discostando le sette coste vltime, l'vna dall'altra; come vlando diligeza potrà ognuno notare in se stesso, tenendo le mani sopra le coste, & rifiatando gagliardamente. Ne si deue dar credito in questa parte a coloro, che dicono muouerfi la Diaframa all'ingiu, quando pigliamo aere; perche quelli, che viano forza nelli bisogni naturali, tal volta ritengono il fiato, & premono insieme assai strettamente il petto; la qual cosa non farebbero, se bisognasse nel pigliar aere sfargare il petto insieme. Questi sono i muscoli, che seruono al rifiatate; a quali si congiungono gli otto del ventre, che seruono anchora in parte a questo; il primo paio, premendo la piu bassa parte del petto; il secondo insieme col terzo tirando in giù le coste chiudono fortemente il petto; il quarto mette le coste in dentro, premendole alquanto. Oltre a questi muscoli aiutano anchora a respirare, que muscoli, che muouono la schiena, & le braccia; benché molto poco, & solo nel tempo di gran necessitā. Per il che è ben sapere, che il respirare si fa, o gettando aere fuori, o mettendolo dentro, & ognuna di queste cose si fa, o naturalmente, solo per rinfrescare il cuore, & ricreare gli spiriti; o per necessitā, come quando habbiam gran caldo, o finimo di fare alcuna gran forza. Nel medesimo modo gettiamo l'aere fuori, o naturalmente, come quando rifatiamo; o con forza, come quando parliamo, o soffiamo. Pigliasi adunque l'aere necessario alla vita, mediante la Diaframa sola; si manda fuori tornando il petto a suo luogo. Il che fa facilmente da se, quando consente la diaframa, per esser pesante, come vegliamo che fa vn Otte, se lo lasciamo sciolto, dopo all'hauerlo gonfiato. Ma se succede alcuna particolar necessitā, per esser troppo caldo il cuore, o per qual si voglia altra cagione, aiutano gli altri di mano in mano, secondo che piu gli è di bisogno.

I buchi della
Diaframa.

Delle Legature dell'Ossa del Petto.

Cap. 23.

Si come son l'Ossa del Petto diuerse, & molte, cosi anchora sono le Legature loro. Ma le piu notabili son quelle, che legano i dodici nodi delle Spalle; delle quali faremo mentione con l'altre legature della schiena. Quelle che legano le coste a questi nodi, sono simili a quelle, che comunalmente legano le congiunture; ben è vero, che in questa

Le Legature del
le Coste.

I 3 parte

Libro Secondo

parte si fanno dure, come cartilagini, principalmente tra le radici de processi de lati (che è iui, doue si congiungono le coste la prima volta a nodi) & la punta di questi medesimi processi, (che è, doue si tornano a cōgiungere la seconda volta.) Ne anchora hanno parti colar legatura, nella parte, oue si cōgiungono all'osso del petto, eccetto la cōmune, che è quella tela, che cuopre l'ossa, (chiamata per ciò da Greci Periostion) la qual cuopre l'osso del petto, & in questa parte è assai piu forte, & in certa forma doppia, & è la medesima, che cuopre le cartilagini, & il resto delle coste, chiamata perciò da gli Antiqui la Secōda tela, che cuopre le coste. Et è da notare che le coste non si legano alle cartilagini, anzi si conuertono in loro, come habbiam detto, & perciò non hanno particolar legatura.


De Musculi, che muouono la Schiena.

Cap. 24.

Il primo paio de
Musculi della
Schiena.

L'offizio loro.

Il secōdo paio.



Il terzo paio.

SE in alcuna cosa è necessario saper la figura dell'ossa, è nell'historia di questi Musculi. Già dicemmo, come la Schiena si diuidea in Collo, Spalle, Lombi, & Osso grande, a cui si congiunge il Codione, & parimēte notāmo la forma, nella quale queste ossa si cōgiungeuano, & la figura loro. Hor bisogna sapere, che la Schiena tutta, fin' all'osso grāde, si piega in arco, senza storcersi da niun lato, & si distende, & si muoue da lati, & i medesimi mouimenti fa il collo da per se, & i nodi de lombi fanno quasi il medesimo, che que delle spalle, eccetto che quelli si muouono, distintamente ognuno, que delle spalle tutti insieme. Queste differenze de i mouimenti si conoscono, così per le diuerse incassature de nodi, come per lo sito de musculi; i quali sono in tutti sedici, che fanno otto paia. ^a Il primo de quali nasce de lati del corpo del quinto nodo delle spalle, iui, doue se gli incassano le coste, con vn principio carnososo, sottile, & aguzzo, come punta di triangolo, & quindi mōta in obliquo, piu in sù del mezzo del corpo del quarto nodo dell'istesse spalle. Et ha certi fili, che montano nella medesima forma in obliquo, dalla banda di dietro verso quella dināzi, fin'al loro terzo nodo, doue s'accostano, quel dell'vn lato a quel dell'altro. Perche al principio sta nel mezzo dell'vn, & dell'altro, tutto il corpo del nodo, & dapoi si vanno cōgiungendo, a poco, a poco, fin che arriuanò alla parte dināzi del primo nodo del collo, doue s'inferiscono amēdue insieme con vn fin neruoso, & aguzzo, come la punta d'vn ferro di lancia, nel ^b tubercolo, che dicēmo hauere questo nodo in questa parte, & anchora in certo modo nell'osso della collottola, ^c appresso il buco della schiena. Questi due musculi, alcuni dicono, che son quattro, altri sei; fondati o in certi fili bianchi, come righe, che diuidono ognun di loro, o vero cōsiderando i suoi diuersi principij, & fini, che ha ognuno. Ma ne hanno i fili certo conto, ne sempre sono i medesimi, oltre che nō penetrano tāto, che diuidano i musculi; ne i principij sarebbero due soli, ma molto piu, perche ogni nodo haurebbe il suo, & così sarebbero tre musculi de nodi delle spalle, & sette del collo. Di modo, che o si hanno da contare per due (come habbiam detto), o per venti. L'offizio principal di questi musculi è di piegare il collo, & per conseguente in certo modo il capo; oprando amendue insieme, il piegano dirittamente verso nanzi; tirando vn solo, al lato di quel, che tira; come lo dimostra chiaramente il sito, figura, & fili loro; piegano anchora questi musculi i tre primi nodi delle spalle. ^d Il terzo, & quarto, nascono, ognuno dal suo lato, cō vn principio largo, & carnososo, dalla parte piu alta di fuori della prima costa, di doue si cōgiūge alla schiena, infino a doue si cōuerte in cartilagine; & da questo principio largo montano ristagnendosi a poco, a poco, & inferendosi nella parte di dentro de processi de lati di tutti i nodi del collo; anchor che malageuolmente s'attaccino al primo; perche quando arriuanò a lui, fanno vna punta, come di triāgolo; anzi amendue sono triangolari, o di figura d'Harpa. Il primo lato piglia tutto il lungo del l'osso della prima cartilagine; il secōdo tutto il lungo del collo; il terzo dal principio della cartilagine della prima costa, fin'al primo nodo del collo, & questo lato monta in obliquo verso dietro. I fili d'ognun di questi musculi mōtano in obliquo, di sù, in giù, come le corde d'vna Harpa, attaccandosi a medesimi processi, doue habbiam detto inferirsi il musculo, il quale ha vn buco, per doue diremo al suo luogo passare la vena del segato, accompagnata da vna arteria. ^e Il quinto, & sexto musculo, che anchora stanno, ognun dal suo lato, cominciano dalla radice de processi de lati, del sexto nodo delle spalle, al principio de processi di dietro, & montano, nascendo anchora de gli altri cinque nodi, delle medesime

a t.vij. CD
t.vij. AB

b lib.j. ta.v.
fi.vj. M
c lib.j. ta.iiij.
fi.vj. o

d ta.v. vi. Q:
t.vij. G. ta.
viiij. C. ta.
xiiij. N

e t.xij. H

- f** li. j. ta. v. fig. vj. vn poco piu in giu del terzo H medesime spalle, faccendosi, a poco, a poco piu forti, & grossi, fin'all'inferirsi fortemente nella parte di fuori de processi de lati del settimo nodo del collo, & di poi di mano in mano nella parte di fuori, di tutti gli altri processi de nodi del collo; benché nel primo lo fanno piu leggiermente, che in niuno de gli altri. Et l'offitio di questi due muscoli, & de due passati, è piegare il collo verso i lati; oprando que da man destra, a man destra; oprando que da man sinistra, a man sinistra; ma in tal modo, che, se tirano il terzo & quinto insieme, il piegano dirittamente; se tira il terzo, & consente il quinto, piegano il collo al tra- uerso innanzi; se al contrario, lo piegano verso dietro. <sup>L'offitio del se-
condo, & terzo
paio.</sup> Il settimo, & ottauo musculo, nascono, ognun di loro, della radice del processo di dietro del settimo, & di tutte l'altre ossa della spalla, iui, doue si cōgiungono, l'vn nodo a l'altro, & come arriuanò al settimo osso del collo, nascono piu fortemente, & con piu largo principio, da lui, che da niun'al- tro delle spalle, oltre che s'attaccano nella pūta sua certi fili di que, che prefero principio dall'ossa delle spalle, & vanno ad inserirsi nella punta del processo di dietro, di questo set- timo osso, & in q̄sta parte si toccano, l'vno l'altro. Et così insieme, senza esserui tra l'vno & l'altro altra cosa, che le punte de processi di dietro, montano pigliando sempre princi- pio dalle radici de processi, de lati di tutti gli altri nodi del collo, infino all'inferirsi in tut- ta la parte bassa del processo di dietro del secondo nodo del collo, amendue con vn me- desimo fine. Ma è da notare, che i fili, che nascono delle radici de processi de lati, monta- no in obliquo verso dentro, fin'all'inferirsi nel processo di dietro di quel di piu in sù. Et per ciò l'offitio di questi muscoli è, oprando insieme, alzar la testa dirittamente; oprando l'vno, alzarla vn poco alla bāda, verso il lato di quello, che tira. Questi sono i muscoli, che muouono il collo; i quali tutti aiutano per conseguente a muouere il capo. ^{L'offitio loro.} Il nono, & decimo musculo, che muouono la schiena, nascono (cō vn principio carnososo, & grosso) della parte piu alta di dentro verso dietro dell'ossa de galloni, che sta scontro alla parte piu alta de primi processi, de lati dell'osso grande, & anchora di tutta questa parte dell'os- so grande, & quindi monta faccendosi vn poco pin stretto fin' alla duodecima costa, inse- rendosi nella parte sua piu bassa, con vn fin carnososo. S'attacca anchora questo musculo per lo lato di dentro, nel montare, alla parte di dentro de processi de lati di tutti i nodi de lombi, secondo il lungo loro, & anche a lati de nodi appresso al buco, per dōde escono i nerui. Di modo, che questo musculo ha quattro lati ^k; il primo piglia dall'ossa dell'anche fin'all'osso grāde, secondo tutto il principio del musculo; il secondo piglia parte del lun- go della duodecima costa; il terzo tutti e nodi de lombi; il quarto dalla duodecima co- sta, fin'al lato di fuori del principio, che è quasi al mezzo della parte di sopra dell'ossa del l'anche, chiamata la Spina di queste ossa. I fili di q̄sti muscoli montano in obliquo dalla banda di fuori verso quella di dentro, & que, che nascono dell'osso grande, finiscono nel l'ultimo nodo de lombi; que, che seguono, finiscono di mano in mano in quei di sopra. L'offitio di questi muscoli è; oprando amendue, piegar i lombi dirittamente verso nan- zi; oprando vn solo, piegarli verso vn lato. Et è da sapere, che sol questi due muscoli pie- gano verso nāzi particolarmente i lombi, & che le spalle nō hanno particolar musculo, che le pieghi verso nāzi; ben è vero, che i due muscoli diritti del ventre aiutano alquan- to (tirando il corpo all'ingiu) a piegare le spalle, & i lombi. <sup>L'offitio del
quinto paio.</sup> L'vndecimo, & duodecimo musculo, sono i piu lunghi di tutto'l corpo, & nascono, ognuno dal suo lato, ^m del fine dell'osso grande, & finiscono ordinariamēte nel primo nodo delle spalle; se bene in alcu- ni io li ho veduti montare fin'al primo del collo, faccendosi molto simili alⁿ quarto mu- sculo, che muoue la schiena (il qual dicēmo nascer dell'istesso osso grande, & attaccarsi nel montare a nodi de lombi, & a i principij delle coste, iui, doue si separano da processi de lati de nodi delle spalle.) Perche questo musculo nasce del fin de processi di dietro del- l'osso grande, secondo il lungo loro, & di tutti que de lombi, con vn neruoso, sottile, & forte principio, che sta sotto quello, che subito chiameremo il^o decimo terzo. Ma la p par- te di questo principio, che nasce della parte di dentro dell'osso del gallone, che è piu so- spesa in fuore, che i lati dell'osso grāde, è del tutto carnososa, & aguzza in punta, ne piu, ne meno, che sia q̄lla parte di quest'osso. Da q̄sti principij neruosi cāmina questo musculo all'insù, faccendosi alquanto carnososo, tondo, & liscio di dietro, & il suo lato ^q di fuori s'at- tacca, nel passare a processi de lati de nodi de lombi, faccendosi in questa parte piu car- noso, & tondo; ma nella parte dinanzi tra la sua parte grossa & carnososa, & la neruosa & sottile,

L'offitio del se-
condo, & terzo
paio.

Il quarto paio
de Musculi della
Schiena.

L'offitio loro.

Il quinto paio.



L'offitio del
quinto paio.

Il sexto paio.

Libro Secondo

sottile, ci è vna^a alquanto cupa, & lunga impressione, che si fa nel decimo terzo muscolo, di cui subito parlaremo. Questo muscolo, come arriua all'vndecimo nodo delle spalle, si fa assai piu stretto, & cosi si va ristignendo a poco, a poco, fin'al primo nodo delle medesime spalle, attaccandosi molto leggermente ad ognuna delle punte di dietro de processi de nodi loro, & molto fortemente a tutti i processi de lati de gli istessi nodi, mediante certe corde, che si fanno come certi Anelli, che escono della parte sua dinanzi, & s'inseriscono nelle punte di questi processi, & anchora nella parte delle coste, che si congiunge a questi processi; ne piu, ne meno, che habbiamo detto fare il quarto muscolo, che muove il petto, il qual dicemo gittare vna corda ad ogni costa; se ben le corde di quello montano piu in fuori, & nascono del lato di fuori, & quelle di questo nascono della parte di dentro, & montano in obliquo verso fuori, come anchora montano i fili suoi. L'offitio di questi muscoli è alzare, o indirizzare i lombi, & le spalle, dirittamente, se tirano insieme; verso vn lato, se tira vn solo. ^u Il decimo terzo, & decimo quarto, stanno di sotto a i due passati, & nascono, ognuno dal suo lato, ^x dalla parte dell'osso grande, dal suo mezzo secondo il lungo, fin doue si congiunge co galloni. Et si come questa parte formontando si fa larga, cosi ne piu, ne meno, fanno questi muscoli, fin'all'arriuare a processi de lati del quinto nodo de lombi, nella qual parte son piu larghi, che in niun'altra, & quindi montano, attaccandosi anchora a processi de lati, d'ognuno dell'altre ossa de lombi, fin'all'arriuare al processo di dietro dell'vndecimo nodo delle spalle; nella qual parte s'inseriscono con vn fine aguzzo. Questi due muscoli si congiungono, l'vno all'altro, dal principio al fine, mettendosi ognun di loro fra lo spatio de processi di dietro; tanto che non ci è altra cosa nel mezzo, eccetto il largo della legatura, che diremo nel seguente capitolo metterli fra l'vn processo, & l'altro. I fili di questi muscoli montano in obliquo verso dentro dalla punta de processi de lati, & la radice de processi di dietro de nodi piu bassi, infino a tutto il largo della parte di dietro de nodi piu alti. L'offitio di questi muscoli è, oprando al paro, distender la parte della schiena, da doue nascono, fin doue finiscono; oprando vn solo, distenderla in obliquo, verso quel, che tira. ^z Il quinto decimo, & decimo sesto muscolo, cominciano dall'vndecimo nodo delle spalle, & montano fin'al primo, abbracciando per tutto il cammino i processi di dietro de nodi delle spalle. Questi due muscoli son del tutto carnosì, & interteffuti di molti, & molto forti fili, & son sottili appresso l' duodecimo nodo delle spalle, come anche sono il decimo terzo, & decimo quarto in questo luogo; ma montando in su s'ingrossano a poco, a poco, fin che arriuanò al processo di dietro del quinto nodo delle spalle, doue si fanno vn'altra volta piu grossi, & tornano a montare, assottigliandosi in tal forma, che appresso il processo di dietro del primo nodo delle spalle, son tanto grossi, come appresso il processo medesimo dell'vndecimo. Questi muscoli empiono anchora lo spatio tra gli vni, & gli altri processi di dietro, congiungendosi in questa parte l'vno all'altro, senza esserui altra cosa nel mezzo, che la legatura, che si distende dal processo di dietro del nodo superiore, al processo istesso del nodo inferiore; la quale è simile a quella, che è tra gli stinchi delle gambe, & braccia. Hano questi muscoli i fili assai piu diritti, che niun'altro della schiena, & per ciò la muouono dirittamente, senza storcere quasi niente a parte alcuna. Et l'offitio di questi muscoli è congiungere i nodi, a quali s'attaccano, & per conseguente distender tutta la parte della schiena, aiutati da gli altri muscoli, deputati al medesimo offitio.

Delle Legature de Nodi della Schiena.

(ap. 25.)

Le Legature de
corpi de Nodi
della Schiena.

GIÀ habbiamo trattato delle Legature del primo nodo del collo con la testa, & col secondo osso del medesimo collo, & anchora della legatura di questo secondo con la testa. Restaci a trattare di quelle, che legano l'altre ossa della schiena, cominciando da quelle, che congiungono i nodi del collo. E tra i corpi del secondo, & terzo nodo, & nella medesima forma tra tutti gli altri corpi de nodi del collo, non vna cartilagine (come dice Galeno) anzi vna^a legatura di natura di cartilagine, che lega queste ossa, l'vno con l'altro, senza esserui altra cosa nel mezzo. Ne s'ingane alcuno per vedere, che nelle vitelle, & capretti, si troua vna cartilagine tra nodo, & nodo; perche oltre a questa, di cui hora parliamo, si ritrouano cosi anchora ne bambini poco nati, come ne sopradetti animali

r la med. tra'l
R el Q

s t. xliij. MM

t t. xij. A M
M

u t. xliij. r
x la med. V

y la med. X

z la med. Y
a la med. ap-
presso al X

b la med. a

c la med. O

d t. xv. fi. xv.
T
e t. vij. V

a tau. xv. fig.
xxviiij. 3. h. i
t. vj. fi. j. R R

mali (quando son piccioli) due cartilagini, che stanno fra le giunte del corpo d'ogni nodo della schiena, & nel mezzo delle due giunte sta la legatura, che le congiunge, senza hauere nel mezzo tela alcuna, come facilmente, chi si voglia, potrà prouare. Si congiungono anchora oltre di ciò questi nodi, medianti certe fortissime legature, couerte d'un lubrico humore, le quali si riuoltano tutto intorno dell'ossa della schiena, & se bene sono assai grosse, & forti da ogni parte, pur piu chiaramente si dimostrano da amendue i lati della parte dinanzi, per esser piu grosse in questa parte, ch'in niun'altra. L'offitio di queste legature è d'aiutare a congiungere tutte l'ossa della schiena, & insieme non lasciar, che la schiena si distenda, o raccogli troppo, & sia cagione che la Vena grande, & l'Arteria (che le sono a canto) si rompano. Hanno cosi anchora questi nodi altre legature, sottili, come tele, che empiono lo spatio tra'l processo de lati dell'un nodo, & quel dell'altro, & altre, che legano i processi di dietro, l'vno coll'altro; le quali si fanno piu grosse appresso le punte de processi, & congiungendosi l'vne all'altre fanno come vna legatura, di natura di cartilagine, che passa per tutto il filo della schiena. Vi sono, oltre di ciò, altre legature, sottili, come tele, ma molto forti, che abbracciano le congiunture, medianti le quali i processi di sopra d'ogni osso si congiungono con que di sotto. Ci è anchora particolarmente tra ogni nodo vna legatura alquanto rossa, non meno forte, che qual si voglia altra del corpo; la qual nasce della parte di dentro del buco de nodi, per doue passa la midolla spinale, appresso alla radice de processi di dietro, tra quelle, che montano, & calano, & finisce nel seguente nodo nel medesimo luogo; la quale non è inconueniente dire, che nasce dal nodo piu alto, & finisce nel piu basso, o al contrario, perche d'amendue in vero nasce vguualmente. Restaci solo vna legatura, di cui (se ben nell'huomo non si ritroua) farò particolar mentione, per esser molto conosciuta da tutti. Hora hanno i cani, buoi, & altri animali, che alzano facilmente il collo, vna legatura, che comincia da lati delle punte de processi di dietro, del settimo nodo del collo, & monta verso la testa, senza attaccarsi ad altro nodo alcuno, infino che arriua ad inserirsi ne lati delle pùte de processi di dietro, del secondo nodo del medesimo collo, & in alcuni animali arriua fin'all'osso della collottola, come fa nella pecora. Questa legatura sta rauolta in vna molto sottil tela, & pare fatta di due, per ragione di certa impressione fonda, che si fa in lei, secondo il lungo suo, & è quella, che communalmente chiamiamo capelli, la quale è tanto dura, che in niun modo si puote masticare, & le Donne per burla danno ad intendere a lor figliuoli, che mangiandola fa loro i capelli bianchi.

Altre Legature.

L'offitio di queste Legature.

De Musculi, che piegano, & distendono il Gomito. Cap. 26.

PIEGANO il Gomito due musculi. Il primo de quali ha due molto forti, & distinti principij. Vno del tutto neruoso, & tondo, che comincia dalla parte piu alta del collo della paletta della spalla, appresso la sponda, od orlo del seno, nel qual s'incassa l'omero, & quindi cammina verso innanzi per di sotto la legatura di questa congiuntura, che l'attraversa, & per vn seno, che habbiamo detto hauere la testa & collo dell'osso dell'omero, nella parte dinanzi; Vn'altro, parte neruoso, parte carnososo, & assai piu largo, che'l primo. La parte neruosa di questo è grossa, & quasi tonda, & comincia dalla punta del processo di dietro della medesima paletta, simile ad vn'anchora; la carnososa è larga, & sottile, & nasce del resto del processo fin'alla sua radice. Queste due parti, se ben son differenti, non per ciò si separano, anzi insieme scendono senza attaccarsi all'osso dell'omero fin passato il suo collo, & iui si congiungono col principio neruoso, & d'amendue si fa vn musculo. La parte carnososa di questo principio s'attacca ad vna asprezza, che habbia detto hauere in questa parte l'osso dell'omero, con vn fin largo, & alquanto carnososo; ma tanto forte, che da occasione ad alcuni di pefare, che questo principio carnososo sia vn musculo da per se, che aiuti ad alzare il braccio. Da poi che son congiunti questi due principij, & passata questa parte, doue s'attaccano, il principio carnososo di questo musculo si distende alquanto dall'osso dell'omero, & passa per sopra l'altro musculo, che gli sta di sotto, faccendosi tondo, & carnososo, infino che arriua appresso al gomito, doue faccendosi piu neruoso finisce in vna grossa, tonda, & forte corda, la qual si distende sopra la congiuntura del gomito, & aiutato dal secondo musculo, che gli sta di sotto, s'inserisce

Il primo Muscolo, che piega il Gomito.

(attac-

Libro Secondo

(attaccandosi alquanto alla legatura della congiuntura) nella ^m parte di dentro della giun-
ta del minor fusello, che habbiam detto nel primo libro, esser disuguale, larga, & alquan-
to rileuata. Questo musculo è quel, che noi altri chiamiamo il Pesce del braccio, il qual si
vede chiaramente in qual si voglia uomo robusto, & magro, & pare alquanto liuido.

*Il secondo mu-
sculo.*

Il secondo musculo, che piega il gomito, sta sotto a questo, (come habbiam detto,) &
è del tutto carnosio, & assai piu largo, verso il fine, & nasce ^o della parte dinanzi dell'osso
dell'omero, appresso il suo mezzo, secodo il lungo, con vn principio largo, & carnosio,
che abbraccia questo osso pel largo, dalla banda di fuori verso quella di dentro, comin-
ciando iui, doue finiscono ^p il primo, & secondo musculo, che muouono il braccio, &
scendendo a poco, a poco, in obliquo, verso la parte dinanzi dell'osso, si fa tanto largo,
quato è il fin del musculo, che alza il braccio, & quindi storce dalla banda di fuori a quel-
la di dentro, alquanto all'ingiu, fin'all'arriuare al lato di dentro del fine del musculo det-
to. Dopo a questo torna a montare vn poco verso il medesimo lato del detto musculo;
ma non monta tanto, quanto il principio del lato di fuori; di modo, che l'vna punta di
questo principio sta nella parte di fuori del braccio, l'altra in quella di dentro, & il con-
cauo in quella dinanzi, & tutto il principio è nel mezzo incauato, & da lati appuntato;
la qual cosa ha dato occasione a molti di dire, che siano due principij, & non vno. Io lo
chiamerò vno per schifare confusione; chi vuole, lo chiami due. Tornando all'historia,
questo musculo dopo il suo nascimento scende dirittamente, faccendosi, a poco, a poco,
piu grosso & carnosio, & attaccandosi sempre all'osso dell'omero, del qual nasce; ben-
che piu fortemente, quanto piu scende, infino all'arriuare a coprire la congiuntura del
gomito, per tutta la parte dinanzi, con vn fine largo, & carnosio, mediante il quale s'infe-
risce molto forte nella legatura di questa congiuntura, & nella parte dinanzi della giun-
ta de due fuselli, trapassando vn poco la congiuntura, & faccendo la figura d'vn monti-
cello. I fili di questo musculo, & del primo, son diritti dal principio al fine, & per ciò l'of-
ficio d'amendue; è tutto vno, cioè piegare dirittamente il gomito, senza storcere da niun
lato; perche realmente (se ben si riguarda) il maggior fusello non puote storcere cosa al-
cuna, come in questo luogo chiaramente proua il Vesalio. Habbiamo detto de muscoli,

*Il primo muscu-
lo, che stende il
Gomito.*

che piegano il gomito, diciamo di que, che l'stendono. Il primo de quali nasce con vn
principio largo, forte, & neruoso, ^s del lato dinanzi della paletta della spalla, vicino al suo
collo, d'vn seno, che iui si vede, & poco di poi, che è nato, si fa piu carnosio, & scende dirit-
to fin'al lato di dentro della parte di dietro dell'osso dell'omero, inferendosi piu forte-
mente sotto al suo collo, iui, doue finisce il principio del ^s quarto musculo, che muoue il
braccio. Da questo principio carnosio scende diritto, attaccandosi sempre alla parte di
mezzo del lato di dentro, & di quel di fuori, dell'osso dell'omero, infino all'arriuare al
lato di dentro ^t del processo di dietro del maggior fusello del braccio, nel qual s'inferisce

*Il primo mu-
sculo.*

con vn fine, parte neruoso, & parte carnosio. Questo musculo alcuni il diuidono in due;
che nascono, vno della spalla, l'altro del braccio, & si congiungono, o mischiano nel mez-
zo. Altri lo fanno vn solo con due principij, come anchora fo io, senza obligare per ciò
niuno, che non lo possa chiamar due, se gli piacerà.

Il secondo.

Il secondo musculo di que, che di-
stendono il gomito, nasce con vn principio carnosio dell'osso dell'omero, dalla ^s parte
ultima del suo collo, fin'alla radice della testa del medesimo, & scende dirittamente per la
parte di fuori del lato di dietro di questo osso, a cui s'attacca anchora fortissimamente,
& faccendosi in questa parte carnosio, scede fin circa alla metà dell'osso, & iui si mischia
col ^v passato in tal modo, che non si possono distinguere; anchor che i fili d'ognun di lo-
ro vadino, senza confondersi, o mischiarsi, dirittamente dal principio al fine, & questo
terzo mantiene quasi sempre il segno, per doue scende, fin'all'inferirsi fortemente nel la-
to di fuori ^t del processo di dietro del maggior fusello, chiamato la punta del gomito. Di
modo, che di tutti questi muscoli insieme si fa vna corda, che abbraccia tutto il gomito,
ma di tal forma, che la parte, che cuopre tutta la punta sua (sopra la qual noi ci appoggia-
mo) è assai piu neruosa, che quella, che cuopre i lati, o la parte sua di sopra. Et è da nota-
re, che quando questi tre muscoli si mescolano, fanno vn corpo liuido, il qual tanto piu
si fa neruoso, quanto piu s'appressa al gomito. Et l'officio di questi due muscoli è disten-
dere dirittamente il gomito, senza storcere a parte alcuna il braccio.

Del

m t.vij. Q

n ta.vij. r.ta.
iij. SS. t.ij. N
t.xij. aa. ta.
iij. xx. ta.v.
t.vj. r.r. ta.
vij. P. t.ix. R
t.x.d. t.xj. g.
o t.vij. L M
p ta. iij. g h
t.xj. P

q t.xj. f. t.ij.
ix. xj. xij. T
ta. ij. P. ta. x.
xij. b. t.ij.
u. t. v. n. t. vj.
t. t. vij. N. t.
x. a
r lib. j. ta. vij.
fi. iij. Q
f. t. x. c. t. xj. g
t lib. j. ta. yj.
fi. vij. D

u t.ij. O. t.ij.
e t. ix. S. ta.
x. b. ta. xij. V
t. xij. C
x t. x. a
y t. xj. c. t. ij.
Q

z t.ij. R

De Musculi.

52

Del Muscolo, che fa la Tela della palma della Mano.

Cap. 27.

a t.ij. n. k. t.ij.
h. ta. iij. Y.
ta. iij. a
b t.ij. Y

HA la Palma della mano vna neruosa, & sottil Tela, che si fa della corda d'un^a musculo, che nasce con vn principio^b tondo, & neruoso, della testa di dentro dell'osso dell'omero, & tosto che è nato, si fa carnosio, & piu grosso, & cosi cammina fin circa alla metà del maggior fusello, doue si torna vn'altra volta a assottigliare, faccendo fine in vna corda sottil, & alquanto larga; la qual si va allargando, a poco, a poco, fin' alla palma della mano, doue si distende per tutta lei (eccetto che nella polpa del dito pollice, & nella polpa della mano, che risponde al dito picciolo) infino all'arriuare alla radice delle dita, doue finisce, come perdendosi, nella parte di dentro d'ogni lato loro. Questa tela è attaccata alla pelle mediante certo grasso, o carne, (nominandola come comunalmente la chiamano gli Anatomisti) che è tra la pelle, & lei. Et è da notare, che in alcuni huomini m'ha questo musculo; ne quali questa tela della mano nasce alle volte delle corde di due muscoli, che piegano il bracciale, le quali cōgiungendosi cominciano ad allargarsi, innanzi, che arriuino al bracciale, & alle volte nasce della legatura, che attrauerfa il bracciale dalla banda di dentro. Questa tela non è cagione (come molti han pensato,) che la palma non habbia peli; perche nella polpa del dito pollice, & nella polpa della mano, che risponde al dito picciolo, & ne lati delle dita, doue manca questa tela, non vi è anche pelo. Ne meno è suo principale offitio dar a questa parte piu delicato senso; anzi solo a ciò serue, che piu sicuramente, & fortemente strigniamo la mano Per la qual cosa fu anche necessario, che hauesse molti nerui, che la facessero piu perfettamente sentire, come a suo luogo piu lungamente diremo. Dal lato di fuori del principio di questa tela si troua ordinariamente^c vn molto picciol musculo quadro, (di cui niuna mentione fece il Vesalio); che nasce^d da quel, che separa il dito picciolo da gli altri, & s'inserisce nel lato di fuori di questa tela, dal suo principio fin circa la metà della palma. Et suo offitio è distender questa tela, quando stiriamo la palma della mano.

L'offitio della
Tela della Pal-
ma della Mano.

Vn'altro Muscu-
lo, che distende
questa Tela.

c t.ij. q.
d t.ij. f

Della Carne, che si ritroua nella parte di dentro della Mano.

Cap. 28.

Siritroua nella parte di dentro della mano, per tutto il lungo delle quattro dita, & il secondo, & terzo articolo del pollice, & le polpe di queste dita, chiamate da Chir-
manti Monticelli, & nel mezzo della palma, vn corpo, il qual nella parte, che cuopre la sopra detta tela, sta quasi tutto tra essa, & la pelle. Questo corpo non è del tutto car-
nosio (come sono i corpi de muscoli) anzi biancheggia, come ceruella, o grasso neruoso, & è pieno di molti capi di nerui, & di certe vene, che l'fanno parere tra carne & grasso indurito, & serue come per pauimento, o letto, a questi nerui, & mediati i nerui tutta la parte di dentro della mano ha cosi eccellente sentire. Serue anchora per conseguente a ciò, che le corde, che piegano le dita, non si ammacchino, battendo noi forte colla pal-
ma. Serue piu oltre a far le dita vguali, empiendo i voti dell'ossa; la qual cosa aiuta mol-
to, che meglio palpiamo con la mano.

De Musculi, che muouono le Dita della Mano.

Cap. 29.

a t.ij. b. t.v.
e. t.vj. s
b lib. j. ta. vj.
fi. yj. S
c t.ij. Y
d la med. XZ
e t.ij. y. t.v.
i. t.vj. x. ta.
vij. Q
f t.v. (ta. t.vj.)

MVOVONO le Dita della Mano vent'otto muscoli. Il^a primo de quali nasce con vn principio tondo, grande, & alquanto neruoso della^b parte di dentro della testa interiore dell'osso dell'omero, di sotto al principio del^c musculo, che habbiam detto far la tela della palma; ^d & de i due muscoli, che piegano la mano, & del^e piu alto di que due, che torceno il minor fusello in giù, alquanto innanzi. Et quindi scende allargandosi verso il mezzo tra i due fuselli, attaccandosi alquanto ad amendue, & dipoi scende piu, facendosi del tutto carnosio, & tondo, ma alquanto meno rileuato, secondo il largo, fin circa del bracciale. Ma molto innanzi, che arriu a quello, si diuide in^f quat-
tro parti carnose, ognuna delle quali si va faccendo piu sottil, & neruosa, fin'al conuer-
tirsi

Il primo Muscu-
lo, che muoue le
Dita.

Libro Secondo

tirsi in vna tonda corda, & tutte insieme si inuoltano in vna lubrica tela, & passano per s di sotto a quella legatura forte, simile(per la parte di dentro) ad vn'anello, la qual dicémo attrauerfare dal processo del quinto osso del bracciale, fin'al processo dell'ottauo. Passato il bracciale si separano l'vna dall'altra, & cosi camminano infino all'arriuare alle seconde ossa delle dita, nelle quali s'inseriscono, faccendosi piu larghe, & sottili, & distédendosi per tutto il lúgo loro. Et è da notare, che quando passano per lo primo osso delle dita, stan couerte d'vna ^h legatura, che le attrauerfa, nascédo da vn lato dell'osso, & faccédolo fine nell'altro, & faccendo come vn punticello, o canale, sotto al quale passano sicuramente, senza attaccarsi a niuna parte, insieme con altre, ⁱ che pariméte diremo passar sotto a loro, senza potere trasuiare a parte alcuna. Queste corde di questo primo musculo, innanzi che arriuinno al secondo osso delle dita, si diuidono, & per la lor fessura passa la corda del musculo, che segue. L'offitio di questo musculo è piegare il secondo osso delle quattro dita dirittamente verso il bracciale, doue le corde si congiungono. Ma è da sapere, che si comel'osso del dito picciolo è minore, che l'altre ossa dell'altre dita, cosi anchora la corda, che s'inserisce in lui, è piu sottile, & ne piu ne meno la parte carnosaf, di doue nasce. ^k Il secódo musculo sta sotto al primo, & vna picciola parte del principio suo nasce della ^m testa di dentro dell'osso dell'homero sotto al principio del primo; il resto nasce tutto della radice ⁿ del processo dinanzi del maggior fusello, mediante la quale si congiunge all'osso dell'homero. Et di poi che è nato di questa parte, si fa del tutto carnosof, & tondo, come il primo; & cammina fin' alla metà del braccio, tra'l gomito, & la mano, attaccandosi nel passare fortemente al maggior fusello, appresso il luogo, del qual nasce la ^o tela, o legatura, che empie tutto lo spatio fra l'vno, & l'altro. Ma come arriua vn poco piu innanzi della metà de fuselli, faccendosi alquanto piu stretto, si diuide in quattro parti carnose, ne piu, ne meno, che'l primo; le quali (innanzi che arriuinno al bracciale) si couertono in quattro corde neruose, & tanto piu grosse, che quelle del sopra detto, quanto questo secódo musculo è piu grosso di lui. Questi muscoli sono inuolti in vna molto lubrica, & humida tela, piu rossa, che niun'altra, mediáte la quale stanno attaccati, & cosi passano sotto alle corde del primo, per di sotto la legatura intrauerfata, che habbiamo detto essere nella parte di dentro del bracciale, fin' alla palma della mano, & iui s'appartano vgualméte, l'vna dall'altra (come habbiam detto far quelle del primo), & faccédosi tonde vanno parimente, ognuna al suo dito, per di sotto le corde del primo musculo. Et per tutto il lúgo del primo osso stanno quelle dell'vn musculo, & quelle dell'altro, legate con vna medesima legatura; ma innanzi che arriuinno al secondo osso (doue quelle del primo s'inseriscono faccendosi alquanto piu larghe) fu di bisogno, (accioche quelle di questo secondo passassero) che le corde del primo si ^r fendessero (come dicémo) mostrandovn marauiglioso artificio, & cosi per mezzo loro escono le corde del secondo musculo, camminando fin'al terzo osso delle dita, nelle quali s'inseriscono. Et si come nel bracciale & nel primo osso delle dita queste corde passauano sotto vna legatura, cosi ne piu, ne meno, quelle che passano per lo secódo osso, camminano per di sotto vn'altra simile, che cuopre tutta la parte di dentro delle dita senza attaccarsi in modo alcuno alle corde; quel, che nò fanno nella palma della mano, nella qual parte, queste corde hāno, ognuna la sua particolar tela, che lor si attacca, medianti certi fili neruosi. L'offitio di questo musculo è piegare il terzo articolo delle quattro dita. ^s Il terzo musculo, al mio giuditio, è molto distinto dal secondo; ma non per ciò toglia a niuno, che non lo conte per parte del secondo; ne meno vieto, che non diuidano questo secondo in cinque parti carnose, & consequentemente in cinque corde; cò questo, che mi lascino per adesso chiamarlo il terzo. Hora nasce questo musculo con vn principio carnosof, & tondo, del maggior fusello del braccio, appresso doue si ^t separa dal minore, & appresso il fossetto del maggior fusello, in che s'incassa la testa del minore, & di poi si stende sopra il minor fusello nascédo sempre da tutto il lungo di quello, & principalméte nasce da quella parte, oue la ^u legatura neruosa (che empie quello spatio, che è tra e' due fuselli,) nasce cominciando dal minor fusello; dalla qual legatura piglia anchor questo musculo parte del suo principio. Et in questa forma cammina verso il bracciale, distendendosi sempre sopra il lato piu alto del secondo musculo, senza attaccarsi a quello (eccetto appresso la congiuntura del gomito) piu particolarmente di quello, che foglia congiungerfi l'vn musculo all'altro.

L'offitio del primo musculo delle Dita.

Il secondo musculo, che piega il secondo articolo del Pollice.

L'offitio di questo secondo musculo.
Il terzo musculo.

g t.iiiij. 8

h Questa cosa nò si puo mostrare piu di come si vede nella mano della tau. iiij. i t.vj. 7

k ta.vj. z.ta. vij. c
l t.v. 8
m lib.j. ta.vj. fi.vj. S
n li.j. t.vj. fi. vij. c

o t.vij. v
p t.vj. 3

q t.iiiij. 8

r Nelle manne della tau. iiij & v.

t. vj. » t. v. p
ta. vij. b b.
ta. vj. z

t li.j. t.vj. fig. vij. L h

u t.iiiij. 8

Et come

- x t. vj. 9** Et come arriua al bracciale, subito si cōuerter in vna * corda tonda, couerta d'vna lubrica
y la med. 3 tela, diuersa da quella, che in questa parte cuopre le y corde del secōdo musculo, & passa
z t. iij. 9 per di sotto la legatura intrauersata del * bracciale, & per la legatura, che sta a canto la ra-
 dice del dito pollice; nella qual parte habbiam detto hauere l'osso del bracciale, (che so-
 stiene il dito pollice) vn fossetto a questo effetto necessario, verso il qual si storce, & passa
 nascosamente tra la ^a corda, che piega il primo osso di questo dito, & quella, che piega il
 secondo, fin' all'arriuare al secondo osso del dito; per tutto il lungo di cui passa sotto la le-
 gatura detta, fin' all'arriuare al terzo, doue s'inserisce fortemente, faccendosi alquāto piu
 largo. L'offitio di questo musculo è piegare il terzo articolo del dito pollice. Dopo a que-
 sti tre muscoli, ne seguono tredici; de quali, ad ognuno de primi articoli di tutte le dita
 ne seruono due, al secondo articolo del dito pollice tre. Di quelli, che seruono a gli primi
 articoli, que delle quattro dita^b son quasi del tutto carnosì, & vanno diritti secondo il lū-
 go della mano, attaccandosi all'ossa del suo pettine, insino all'arriuare alle dita, doue s'in-
 feriscono ne lati delle prime ossa loro. Ma de i due, che seruono al dito picciolo, & l'vno
 nasce della parte piu alta del lato di fuori dell'osso del pettine, che sostiene il medesimo
 dito, con vn principio carnosio, col quale s'attacca anchora alquāto al bracciale, & quin-
 di va diritto mantenendosi sempre carnosio, fin' al primo osso del dito, doue si conuerter
 in vna corda alquanto larga, con la qual s'inferisce nel lato di fuori del suo principio, al-
 quanto verso in dentro. ^d L'altro nasce dal lato di dentro dell'osso medesimo appresso il
 bracciale, & quindi va fra questo osso & quel, che gli è appresso, mantenendosi sempre
 carnosio, fin' al primo osso del dito picciolo, doue si conuerter in vna sottil tela, che s'infe-
 risce nel lato di dentro di questo osso. L'offitio di questi due muscoli è, oprando al pari,
 piegare dirittamente il dito picciolo; oprando vn solo, piegarlo alquanto in obliquo, ver-
 so quel, che tira. Et il medesimo, che habbiam detto di questi due muscoli, si deue inten-
 dere de gli altri, che stāno tra l'ossa della palma, che seguitano. Di modo che tra ogni due
 ossa stanno due muscoli, & e quel, che sta nel lato di dentro dell'osso, che sostiene il dito
 indice, nasce del lato di dentro di questo osso, piu verso la palma, che verso il pettine, tile-
 uandosi alquāto, come fa anchora tutto il resto de muscoli, che piegano i primi articoli.
 Questi muscoli son otto, & tre, che habbiam contato, che son vndici; segue subito il duo
 decimo. ^f Il qual nasce della parte di sopra della legatura intrauersata del bracciale, cō vn
 principio carnosio, & distendendosi per tutto il lato di dentro del medesimo lato, si mā-
 tiene sempre carnosio, fin' all'inferirsi quasi tutto in questo osso, & il suo resto nel secōdo
 articolo, benchè molto oscuramente. L'offitio di questo musculo, è di piegare il primo
 articolo del dito pollice. ^g Il decimo terzo è sotto a questo, & è piu picciolo di lui, & na-
 sce dell'istessa legatura intrauersata del bracciale, & anchora da quello osso del bracciale,
 che sostiene il primo osso del dito pollice, senza passar più in là della metà. Suo offitio è
 di separar questo dito dall'altre dita, & piegare il suo primo articolo. Er è da notare, che
 questo musculo, & il passato, fanno vna polpa di carne alla radice del dito pollice, che è
 quella, che i Chiromanti chiamano il Monte di Venere, o di Marte. ^h Il quarto decimo,
 quinto decimo, & decimo sesto, son piu differenti in sito, di que, che piegano le quattro
 prime ossa delle dita, che non fanno e' due, che piegano il primo osso del pollice; perche
 quelli, che muouono le quattro dita, stan diritti secondo il lungo della mano; quelli, che
 piegano il primo osso del pollice, vanno alquanto in obliquo, ma stanno alquanto intra-
 uersati. Perche nascono tutti della palma della mano, vn poco piu innāzi del cerchio, che
 fa quella riga, che circōda tutta la palma del dito pollice, chiamata da Chiromanti la Li-
 nea della vita. ⁱ Il primo di loro nasce con vn principio largo, & alquanto intorto, dell'os-
 so della palma, che sostiene il dito di mezzo, vn poco piu i giù della testicciuola dell'istef-
 so, che s'inferisce nel fossetto del primo osso del dito istesso, & di poi monta faccendosi
 carnosio, & alquanto piu stretto, insino all'inferirsi, con vna corda come tela, nel lato del
 secondo osso del dito pollice, che risponde all'indice, alquāto piu in dentro, che in fuori.
^k Il secondo nasce subito dietro a questo, camminando verso il bracciale, con vn princi-
 pio sottile, & neruoso, & largo, di mezo l'istesso osso, di cui nasce il primo, & anchora pi-
 glia vn poco di principio dall'osso della palma, che sostiene il dito picciolo, & quindi, fac-
 cendosi subito carnosio, va ad inferirsi nel mezzo della parte di dentro del secoudo osso
 del dito pollice. ^l Il terzo sta appresso a questo, dal lato di sotto, & nasce nella medesima
 maniera

L'offitio del ter-
zo musculo, che
muoue le dita.
Altri tredici mu-
sculi.

Il primo, che ser-
ue al dito piccio-
lo.

Il secondo.

Sei muscoli, che
seruono alle tre
dita.

Due Muscoli,
che piegano il
primo articolo
del pollice.

Tre, che piegano
il secondo.

Il Musculo deci-
mo quarto, che
muoue le dita del
la mano.

Il decimo quin-
to.

Libro Secondo

maniera, con vn principio largo, della radice dell'osso della palma, che sostiene il dito picciolo, appresso il bracciale, & quindi camina in obliquo verso il dito pollice, fin'all'inferirsi nel lato di dentro del secondo osso di questo dito, alquanto verso la banda dinanzi. L'offitio di questi tre musculi, oprando tutti insieme, è piegare fortemente il secondo artico del dito pollice; oprando il primo solo, muouerlo in su alquanto verso l'indice; oprando il secondo, muouerlo verso le dita di mezzo; oprando il terzo, muouerlo verso il dito picciolo. Questi tre musculi insieme co tredici passati fanno sedici; i quali tutti seruono, come habbiamo detto, a piegar le dita. ^m Il decimo settimo in ordine, & il primo di que, che stendono le dita, nasce con vn principio, mescolato tra carne & neruo, & alquanto largo, ⁿ dalla parte piu alta della testa di fuori, dell'osso dell'omero, & quindi scende faccendosi grande, & carnosio, & quasi tondo, per mezzo del braccio, fra e due fuselli, tanto che giunge al fin del minore presso al bracciale; doue faccendosi piu stretto ^o si sparte ordinariamente in tre, & rade volte in quattro parti carnose, & corte, non molto diuise, & couerte d'vna istessa tela, & attaccate con certi fili neruosi, & sottili. Ma subito, che si separano dal corpo del musculo, si couertono, ogni parte in vna corda, & tutte insieme passano ^p pel seno, che si fa nella parte di fuori del minor fusello, vicino a doue si congiunge col maggiore; nella qual parte tutte queste corde sono inuolte da vna legatura intrauersata, fatta particolarmente per questo. Passata tal legatura arriuan al bracciale, & subito s'allargano & si separano, l'vna dall'altra, vgualemete, & cosi caminano separandosi ogn'hor piu, fin che arriuan alle quattro dita; doue si fanno molto piu larghe, & sottili, & s'inferiscono nella radice del primo osso d'ognuno delle dita, & cosi si stendono per tutto il lungo dell'ossa. Queste corde ordinariamente son tre, che s'inferiscono in tre dita, & rarissime volte ho veduto, che vada corda alcuna al dito picciolo. Ma, in che modo queste corde si mescolino nella dita, colle corde de gli altri musculi, allhor si dirà, quando tratteremo de musculi, che separano le quattro dita dal pollice. ^q Il decimo ottauo è molto sottile, & lungo, & è attaccato col lato di sotto del decimo settimo, per tutto il lungo de fuselli del braccio, & nasce della testa di fuori dell'osso dell'omero, tra'l principio del decimo settimo, & quel ^r dell'altro musculo, che diremo s'inferirsi nell'osso della palma, che sostiene il dito picciolo, & distēde il bracciale. Questo musculo, come arriua al bracciale, si diuide in due corde, che passano per ^t lo seno commune alli due fuselli, & s'auuolgeno colle ^u legature loro, fin che passa il bracciale, & di poi ordinariamente si separano subito, & l'vna va al dito picciolo, & l'altra all'Annulare, inferendosi ognuna nel lato di fuori, (alquanto verso dietro) del primo osso del suo dito, con vn fine sottile, & largo, come tela; benché tal volta vanno amendue al dito picciolo. L'offitio di questo musculo, dice Galeno essere di separar queste due dita dall'altre; ma non pare a me cosi, per esser il sito diritto, anzi credo, che le distēda. Nascono dal processo di fuori del maggior fusello, che si congiunge alla parte di dietro dell'osso dell'omero, insino presso al bracciale, tre musculi dirittamente, l'vn dietro l'altro; i quali tutti stan situati in trauerso. ^x Il primo di loro (che è in ordine il decimo nono) nasce del maggior fusello, passata la sua metà, verso il bracciale, con vn principio carnosio, & largo, & dipoi si fa vn poco piu stretto caminando, & montando verso la giunta del minor fusello, appresso il bracciale, si diuide in ^y due parti carnose, che fanno due musculi distinti; la piu bassa delle quali fa il decimo nono; la piu alta diremo fare il ventesimo primo. Et anchor che questi due musculi habbino vn medesimo principio, ho voluto (per parlar piu chiaro) distinguergli, chi vorrà cōtargli per vno, potrà far, come gli piacerà. Hora nasce questo decimo nono musculo nella forma detta, & monta in trauerso fin'al processo del minor fusello; ma, innanzi che arriui a lui, si diuide in ^z due corde, le quali attaccate insieme, & infasciandosi in vna legatura, fatta per questo effetto, passano per vn seno, che per lor si fa particolarmente, nella giunta del minor fusello. Passato questo luogo, subito si separano, l'vna corda dall'altra, & la piu alta cammina verso il dito indice, la piu bassa verso quel di mezzo, & amendue s'inferiscono nel lato di fuori delle prime ossa di queste dita, alquanto verso la parte di dietro, & delle volte amendue le corde s'inferiscono nel dito indice. Et è da notare, che le corde del decimo settimo, decimo ottauo, & decimo nono musculo, se ben ordinariamente serbano l'ordine detto, molte volte s'allargano & diuidono in piu ramuscelli, mādando la corda dell'vn dito, vn ramuscello all'altro, & al contrario, mescolandosi in diuersi

Il decimo settimo.

Il decimo ottauo.

Il decimo nono.

m t.ij. v. t.ix.
az t.x.f
n lib.j. ta.vj.
fi.vj. P

o t.ix. b

p li.j. t.vj. fi.
vij. i

q t.ij. x. ta.j.
ix. o. t.x.f

r t.ix. A
s la med.d

t li.j. ta. vj. fi.
vij. o
u t.ij. i

x t.x. n

y t.x. op

z t.x. p q

diuerſi modi l'uno coll'altro, ſenza ſerbare in ciò ordine alcuno. L'oſſitio di queſto deci-
mo nono muſculo è congiungere il pollice coll'altre dita, & ſeparare l'indice, & quel di

a. t.iii. q. ta.
iii. t.ix. h

le corde loro. ^a Il ventefimo muſculo è molto corto, & forte; & naſce del quarto oſſo della palma, appreſſo il bracciale, con vn principio carnoſo, & coſi ſcende per lo la-
to di fuori del medefimo oſſo alquanto verſo la banda di dentro della palma, & faccen-
do la figura d'un ſorzo, s'inferiſce nel lato di fuori del primo oſſo del dito picciolo, cō vn
fine ſottile, & neruoſo, L'oſſitio di queſto muſculo è ſeparare il dito picciolo da gli altri.

Il ventefimo mu-
ſculo, che muoue
le dita.

b. t.i.d. t.ii.e.
t.ix. f. t.x.o.
t.xi.u
c. t.x.p

^b Il ventefimo primo è quella parte, che habbiamo detto eſſer diſtinta dal ^c decimo nono,
& naſce della metà del maggior fuſello ſecondo il lungo, dalla parte ſua di fuori, appreſ-
ſo la legatura, o tela, che ſta fra i due fuſelli, & camina in obliquo, (come habbiamo detto)

Il ventefimo pri-
mo.

d. t.xi. a.i
e. li.i. t.vi. fi.
vii. e
f. t.x. xi. e

verſo il minor fuſello. Ma in nanzì che arriui alla ſua giōta appreſſo il bracciale, ſi cōuer-
te comunalmente in vna corda quaſi tonda, la quale è inuolta colla legatura, che habbia
detto ſaſciar la corda ^d del quarto muſculo, che diſtēde il bracciale, & paſſado per l'iſteſ-
ſo ^e ſeno, che la ſopra detta, s'allarga ſubito, come è paſſata, inferēdoſi in tutto il lūgo del

Il ventefimo ſe-
conde.

g. ta.xi. a.ta.
iii. c. t.ix. e
h. t.ii. c.b. ta.
x. k.l

lato del dito pollice, che riſpōde al dito ^f dice. ^f Il ventefimo ſecōdo muſculo naſce del mag-
gior fuſello vn poco piu in ſù, che l'paſſato, cōvn principio largo; & mōta al trauerſo ſo-
pra il minor fuſello, paſſado p ſopra il ^g quarto muſculo, che muoue la mano. Ma ſubito,

i. ta. x. lm. ta.
xi. q. r.
k. t.x. k
l. lib. i. ta. vi.
fi. vii. a
m. ta. ii. iii. 6.

come arriua al ſopra detto muſculo, ſi diuide in ^h due parti diſuguali, attaccate, l'una coll'
altra, come ſe fuſſero due muſcoli. La parte piu alta ſi mātene per vn poco carnoſa, & di
poi ſi cōuerſe in vna corda quaſi tōda, che s'inferiſce nella parte di fuori dell'oſſo del brac-
ciale, che ſoſtiene il dito pollice. La piu baſſa camina ſimilmēte alquāto in nāzi, & ſubito

ſi ſparte in due ⁱ parti carnoſe, che ſi cōuertono in due corde, lequali inſieme cō la corda
della ^k parte piu alta paſſano per vn ^l ſeno picciolo, che ſi fa nella giunta del minor fuſello,
couerte con vna ^m iſteſſa legatura. Paſſato il bracciale l'vna di queſte corde di queſta par-
te piu baſſa s'inferiſce nella radice del primo oſſo del pollice, al lato ſuo di fuore; l'altra ſi

diſtēde per tutto il lūgo del pollice, attaccadoſi a lui, con vna ſottile, & larga tela, & in-
ferendofi particolarmente nel lato di dentro di queſto dito, dalla radice del ſecōdo oſſo,
inſino alla fin del terzo Di queſta ſola corda fecero mentione alcuni delli Antichi; & per

ciò contaſſano il muſculo per vn ſolo, alcun'altri veduto, che ſi ſpartiu in due corde, vna
che s'inferiu nel bracciale, l'altra nel dito pollice, diuiſero anche il muſculo in due. Io il
potrei, ſecondo queſta ragione, diuidere in tre, poi che hà tre corde, che muouono diuer-
ſe parti, & in diuerſi tempi, ma, perche facendo queſto darei occaſione, che molti voleſ-
ſero anche diuidere e muſcoli delle dita in tanti, quante ſonò le corde, nelle quali finiſco

no, mi par meglio contarlo per vno, come fecero e primi, non curandomi in ciò ſeguir il
Veſalio, il quale per diſtinguer gli muſcoli, che diuidono le dita, da gli altri, lo diuiſe cō
aſſai ragione in due. L'oſſitio principal di queſto muſculo, & del ventefimo primo, è,

L'oſſitio del ven-
teſimo ſecondo
Muſculo delle
dita.

oprando inſieme, diſtendere il dito pollice; oprando ognuno da per ſe, fare il medefimo
eſſetto, ſe ben il ventefimo ſecondo diſuia alquanto queſto dito dall'altre dita, il ventefi-
mo primo lo congiunge al pollice; di modo, che ſi puote contare tra que, che diſtēdono

le dita, & tra que, che le muouono da lati. Aiuta anchora il ventefimo ſecondo ad alzare
il bracciale per vittu della corda ſua, che s'inferiſce in lui, & perciò ſi potrebbe hanchè cō-
tare tra que, che l'muouono, come piu in giù diremo. Reſtaci a contare d'altri ſei, che

n. ta. iii. i. ta.
iii. u

muouono le dita da lati, de quali due ſeruono al dito pollice, gli altri all'altre dita. ⁿ Il
primo de due (che ſecondo l'ordine è il ventefimo terzo) naſce dalla parte di dentro del-
l'oſſa del bracciale, che ſuſtenta il dito pollice, con vn principio neruoſo, & ſubito ſi fa
carnoſo, & cammina, ſin'all'inferiſſi nel ſecōdo oſſo del pollice, con vna ſottile, & larga

Il ventefimo ter-
zo.

o. t. vi. xa

tela. Queſto muſculo, inſieme con ^o e due, che ſtanno ſotto a lui, & piegano il primo arti-
colo del pollice, fanno quella polpa di carne, che e nella palma della mano, appreſſo la ra-
dice di queſto dito. L'oſſitio di queſto muſculo è ſuiare il pollice dall'indice, aiutato dal
ventefimo primo. Et è da notare, che queſto muſculo ſolo tra que, che muouono la ma-
no & il gomito, par piu liuido; il che cauſa vna molto groſſa tela, che l'cuopre. PIl ſecon-
do di que, che ſeruono al dito pollice, (& è in ordine il ventefimo quarto) naſce dalla bā-
da di dentro dell'oſſo della palma, che ſoſtiene l'indice, con vn principio carnoſo, che ſi

Il ventefi-
mo quarto.

p. t.ii. d. t.ix.
g. t.x. t. t.xi.
f. t.xii. a

diſtēde ſecōdo tutto l'lungo dell'oſſo, & finiſce in vn fine carnoſo, il qual s'inferiſce in

Libro Secondo

Il ventesimo quin-
to, ventesimo se-
sto, ventesimo set-
timo, & ventesi-
mo ottauo.

tutto il lato di fuori del primo osso del pollice; & insieme manda vna sottile, & larga cor-
da, alla radice del secondo osso. I fili di questo musculo sono i certa guisa intrauerfati, &
camminano dal bracciale fin'al pollice; dal che è suo officio congiungere il dito pollice
all'indice, aiutato dal ventesimo primo, & Il ventesimo quinto, ventesimo sexto, ventesi-
mo settimo, & ventesimo ottauo, che congiungono le dita verso il pollice, aiutando a di-
stenderle, son sottili, & carnosi, & sono attaccati alle quattro corde del secondo muscu-
lo, che piega il terzo osso delle quattro dita, ognuno alla sua, nascendo della tela, che fascia
le sopra dette corde; & nel passar pel seno, che habbiamo detto farsi nella parte di dentro
del bracciale, sotto la sua legatura intrauerfata, camminano attaccate, ognuna, al lato di
dentro di queste corde, infino all'inferirsi nel lato di dentro della radice delle dita, mon-
tando fin'al congiungersi colle corde, che distendono le dita. Hanno anchora questi mu-
culi vna particolarità, che non nascono d'osso alcuno, come ne anche que de gli occhi.
Hora sono i Musculi, che muouono le dita, in tutto Veti otto, de quali Quattro le disten-
dono, Sedici le raccolgono, & Otto le muouono da lati.

q. t. x. o. u. ta.
vi. 44.

De Musculi, che muouono la Mano sopra il bracciale. Cap. 30.

Il primo Muscu-
lo, che muoue la
Mano.

M VOVONO la Mano quattro Musculi, Il primo de quali è attaccato al lato di
sotto^b de musculi, che nascendo dal gomito vanno a piegar le dita; & nasce della
c testa di dentro dell'omero, appresso il gomito, con vn principio tra carnosio & neruo
so, & dipoi scende attaccandosi a tutto'l lato di dentro del maggior fusello, & quasi alla
metà di quel di sotto, sopra il qual noi ci appoggiamo, quando scriuemo, secondo il lun-
go del fusello, attaccandosi fortemente a quello, principalmente nella parte piu alta
appresso il gomito. Ma arriuando al fine di questo fusello, vn poco in nanzi del braccia-
le, si conuerte in vna^d forte, & alquanto tonda corda, la quale va accompagnata da alcu-
ne fibre di carne fin'al bracciale, & di poi si fa del tutto neruosa, inferendosi fortemente
nel e quarto osso del bracciale, & nel primo della palma. La corda di questo musculo
non ha particolar legatura, che l'attrauerse al passar del bracciale, ma sta inuolta con
quella tela commune a tutti e musculi, la qual cõtaremo tra le legature, che sono tra'l go-
mito & la mano, perche lega fortemente il bracciale co fuselli. Il secondo musculo na-
sce anchora del tubercolo di dentro dell'osso dell'omero, vicino al gomito, appresso il
sopra detto musculo, & quello, che habbiamo detto far la tela della palma della mano,
& quindi camina alquãto in trauerfo verso il lato di sopra^h del primo, che chiude le di-
ta, passando la maggior parte sotto di lui, & attaccandosi al minor fusello. Et in nanzi che
arriue al bracciale, si conuerte in vna corda tonda, che pare che finisca nel bracciale, ap-
presso la radice del dito pollice, per esser couerta dal musculo, ^k che separa il dito pollice
dall'indice, & da li due, che piegano il primo articolo di questo medesimo dito. Ma tolti
via questi musculi, manifestamente si vede, che e passa per la parte di dentro del bracciale
fin'all'osso della palma, che sostiene il dito indice; nella cui radice s'inferisce, faccendosi
piu largo, & attaccandosi fortemente a questa parte nella^l legatura intrauerfata del braccia-
le. A ^m questi due musculi, che sono nella parte di dentro, ne rispondono altri due in
quella di fuori; il primo de quali (che è in ordine il terzo) nasce della radiceⁿ del turberco-
lo di fuori, della parte piu bassa dell'osso dell'omero, appresso il principio^o del muscu-
lo, che habbiã detto distendere il dito picciolo, piu appresso del maggior fusello, che niu-
no di quanti nascono di questo tubercolo detto; per la qual cosa nasce anchora in parte
del processo suo di dietro, che chiamiamo la punta del gomito. Quindi scende attaccan-
dosi al lato piu basso della banda di fuori del maggior fusello, tra'l P primo, che piega il
bracciale, & quel, che distende il dito picciolo, fin presso al bracciale; doue si conuerte in
vna tonda corda, che passa per lo seno, che è nella giunta del maggior fusello, appresso il
lato di dentro^r del processo suo, simile ad vn puntaruolo, fasciato con vnalegatura s'in-
trauerfata; la qual sola contaremo tra le proprie del maggior fusello. Passata questa lega-
tura cammina per sopra il bracciale, faccendosi, di mano, in mano piu larga, fin'all'infe-
rirsi molto lontan dal bracciale, nell'osso della palma, che sostiene il dito picciolo. L'al-
tro musculo della parte di fuore (che è in ordine il quarto) nasce cõ vn^u principio alquãto
largo dall'osso dell'omero, vn poco piu in sù del tubercolo di fuori dell'istesso osso, ap-
presso

Il secondo Ma-
sculo, che piega
la Mano.

Il terzo.

Il quarto.

a. t. iii. z. t. ii.
a. t. iii. z. t.
v. t. ix. z.
b. t. iii. z. t.
v. t. ix. z.
c. li. i. t. vii. fi.
vi. s.

d. t. iii. z.

e. lib. i. ta. vi.
fi. viii. 4

f. t. i. A. t. ii. g.
t. iii. x. t. iii.
g. t. iii. Y
h. t. iii. z.

i. t. iii. z.
k. la med. i

l. t. iii. z.
m. ta. ii. Y. ta.
ix. A. t. x. q.
n. lib. i. ta. vi.
fi. vi. P
o. t. ix. z.

p. t. x. xii. A

q. t. ix. d.
r. li. i. ta. vi. fi.
vii. R
s. t. ii. z.
t. t. i. c. t. ii. T.
t. iii. b. t. ix. y
t. x. f. t. xi. A.
t. xii. o
u. t. xi. i.

presso il gomito, iui, doue habbiam detto hauere vna^a riga rileuata, & aguzza. Et quindi cammina facendosi carnosio, & distendendosi sopra il minor fusello, fin quasi la sua metà; doue si conuertere in vna forte corda, che subito si parte^y in altre due tonde, benche alquanto piu larghe, che grosse; le quali scendono, senza separarsi notabilmente l'vna dall'altra, dirittamente per sopra il minor fusello, caminando verso la sua giunta, che è appresso il bracciale; nella qual parte diuidendosi alquanto piu (se ben poco) l'vna dall'altra, passano, ognuna, per vn seno, che per questo effetto si fa nella detta giunta, per di sotto la legatura, che abbraccia parimente il muscolo, ^a che muoue il dito pollice verso l'indice. Passata che hanno questa legatura, diuidendosi alquanto piu, s'inferiscono, l'vna nell'osso della palma, che sostiene il dito indice; l'altra in quel, che sostiene quel di mezzo. L'offitio principale di questi quattro muscoli, non è (come dice il Vesalio) distendere, & piegare principalmente il bracciale, poi che non finiscono in lui; anzi i due primi seruono a piegar principalmente la mano, nella qual s'inferiscono, & per conseguente il bracciale; i due vltimi seruono a distenderla; oprando al paro, dirittamente; oprando hor l'vno hor l'altro, fanno il medesimo offitio, ma piu verso il lato di quel, che tira. Aiuta anchora a questo quella parte del muscolo ^b ventesimo terzo di que, che muouono le dita, che habbiam detto inserirsi nell'osso del bracciale, che sostiene il dito pollice. Et è da notare, che medianti questi medesimi quattro muscoli si muouono anchora la mano, & il bracciale da lati; perche tirando quel di dentro, & quel di fuori, che risponde al dito pollice, & consentendo gli altri due, mouiamo la mano verso il petto; ma oprando i due, che rispondono al dito picciolo, & consentendo i sopra detti, mouiamo la mano in fuore. Aiutano cosi anchora questi muscoli (anchor che il Vesalio dica di no) a voltar la mano in su, & in giù, oprando successiuamente l'vn dietro l'altro, come habbiam detto far quei dell'occhio.

L'offitio di questi muscoli.

De Musculi, che voltano il minor Fusello in su, & in giù.

Cap. 31.

CHI haurà in memoria il modo, in che habbiam detto ^a nel primo libro congiungersi il minor fusello all'osso dell'homero, facilmente potrà intendere, come si muoua in su, & in giù, senza che il maggiore, o l'osso dell'homero si muouano, & anchora come al mouimento suo si muoue tutta la mano. Hora muouono questo Fusello quattro muscoli; da quali due seruono alla parte di sopra appresso il gomito; & due a quella di sotto appresso il bracciale. Et di questi quattro muscoli, due stanno nella parte di dentro, & altri due in quella di fuori; que di dentro la voltano in giù, que di fuore in su. Il ^b primo di que di dentro (che è situato appresso il bracciale) è tutto carnosio, & nasce d'appresso il lato di fuori del maggior fusello secondo il lungo suo, con vn principio largo, attrauerfando dirittamente fin'al lato di dentro del minore, nel qual s'inferisce con vn fine, simile al principio. Questo muscolo è quadro, & ha tutti quattro i lati vguale, & nel mezzo è alquanto piu grosso, che da lati, & fa come vn guancialetto alle corde, che passano a chiuder le dita. I fili di questo muscolo vanno dirittamente dal principio al fine, et per ciò è suo offitio, tirando la parte del minor fusello (che è appresso il bracciale) verso dentro, voltare il detto minor fusello in giù. ^d Il primo muscolo di fuori, & secondo di que, che muouono il fusello, è differente dal primo in sito, figura, & grãdezza; perche comincia dal lato di fuori dell'osso dell'homero (vn poco piu in su, che l'equarto, che distende la mano, quasi alla quarta parte dell'osso) con vn principio largo et carnosio, & quindi scende (facendosi piu largo, & forte) attaccato al lato di fuori del sopra detto quarto muscolo, che distende il bracciale. Ma come arriua al capo del minor fusello, appresso il bracciale, subito si conuertere in ^f vna corda larga, come tela, mediante la quale s'inferisce nella parte di sopra della giunta di questo minor fusello, distendendosi alquanto a dentro. L'offitio di questo muscolo è di tirare la parte di sotto del minor fusello, appresso il bracciale, in fuore, & per conseguente voltar tutto l'fusello. ^h Il secondo di que di sopra, & terzo in ordine, comincia dalla radice del tubercolo di dentro dell'osso dell'homero, & dal lato di dentro del maggior fusello, iui, doue si congiunge col minore, con vn principio forte, & carnosio, & quindi monta assai in ^k obliquo verso il lato di dentro del minor fusello, nel qual s'inferisce, cō vn fine parimente carnosio, vn poco innanzi del mezzo del

Il primo Muscolo.

Il secondo.

Il terzo.

K 3 fusello.

x lib.j. ta.vi.
fi.vi.Q

y t.xi.k

z lib.j. ta.vj.
fi.vii.s. 5

a t.x.o

b t.ii.b.t.x.k

a li.j.cap.xx.

b t.vii.x. tau.
vii. s

c t.vi. β. t.vi.

z. x

d t.i. d. t.ij. f.

t.ij. a. t.iiij.

a. t. v. k. t. vi.

A. t. vii. y. ta.

ix. x. t. x. e. t.

xj. h

e t. xi. A

f t. vi. u. t. xij.

b

g li. j. t. vi. fi.

vij. dal x

verso la z

h t. i. c. ta. ij. f.

t. iii. v. t. iij.

y. t. v. i. t. vj. x

t. vij. Q. ta.

viiij. R. tau.

xiiij. f

i li. i. t. vi. fig.

vii. sotto la

L

K t. xii. e. tau.

xiiij. g

Libro Secondo

fusello. Da questo fin carnoso nasce vn' altro capo neruoso, il qual si distende verso il mezzo dell'osso, secondo il lungo, inferendosi fortemente (per tutto quello spatio) al lato di fuori di questo fusello, in vna asprezza, che per questo effetto habbiam detto hauere questo osso in questa parte. Questo musculo volta il minor fusello all'ingiu, tirandolo in dentro. ^m Il quarto musculo, che sta dalla parte di fuori, & è quasi simile al sopra detto in figura, & sito, nasce ⁿ dalla parte di fuori della legatura, che circonda la congiuntura del gomito, & anche la punta del gomito, & quindi cammina montando verso la parte dinanzi, in fino all'inferirsi del minor fusello, o appresso il fin del terzo, cō vn fine meno neruoso, & largo, che quel del terzo. Et è da notare, che questi due muscoli, & il primo, nō finiscono in corda, per esser molto piccioli. L'offitio di questo quarto musculo è voltare il minor fusello in sù, tirando la parte sua di sopra in fuori in obliquo, di modo, che que di dentro il voltano in sù, que di fuori, all'ingiu.

Il quarto.

L'offitio del quarto musculo, che muoue la mano.

Delle Legature de Fuselli del Braccio, & della Mano. Cap. 32.

Diverse sorti di Legature.

Quelle, che abbracciano le corde de muscoli.

Quelle, che cuoprono e muscoli.

Quelle, che legano l'ossa.

Differenza tra le legature, che congiungono l'ossa dal gomito innanzi.

TR A le Legature de Fuselli del Braccio, & della Mano, alcune legano l'vn osso col l'altro; alcun'altre son come guardia de corpi, che stan di sotto loro, & come veste de muscoli che nfasciano; alcun'altre abbracciano, & congiungono le corde all'ossa in tal modo, che per gran forza, che facciano, non possono disluogarsi. Benche delle tele, che fasciano le corde, habbiam fatto particolar mentione parlando de muscoli, che moueano la mano. ^a Ma quelle, che son come difesa & aiuto, che le corde non escano del suo luogo, stan tutte intrauersate, & sono assaiissime, & vna di loro occupa tutta la parte di dentro di tutte le quattro dita, & vn'altra simile a questa si distende fin'al secōdo osso del pollice, & anche quasi fin'al terzo. ^b Se ne vede parimente vn'altra nella parte di dentro del bracciale, intrauersata dal quarto suo osso, infino al quinto, la qual abbraccia le corde de muscoli di tutte le dita. Questa corda è larga, & piu gagliarda, che niuna dell'altre; ma nō tocca e due fuselli, ne meno l'ossa della palma. Si veggono della medesima forma nella parte di fuori del bracciale ^c sei legature intrauersate, per le quali passano come per anelli, le corde de muscoli, che aprono le dita. Queste legature tutte per la parte di sopra paiono vna sola, lunga, quanto è il largo de due fuselli; ma, contandole diligentemente, subito si veggono come sei anelli, che seruono a mantenere le sopra dette corde, che non disuijino da e seni del minor fusello, per donde passano. La prima di queste legature va dal maggior fusello infino al minore, & cuopre il seno ^d commune ad amēdue, per lo quale (come dicēmo) passano le corde del musculo, ^e che distende il dito picciolo. La secōda sta dal lato di fuori della prima; ma nō occupa piu del maggior fusello, & per lei passa la corda del ^f quarto musculo, che muoue la mano sopra il bracciale. La terza stā dal lato di dentro della prima; & occupa solamente il largo del minor fusello, & per lei passano le ^g corde, che distendono le tre dita. La quarta stā dal lato di dentro della terza, & fa vno assai picciolo anello, per lo qual passa ^h la corda, che separa il dito indice, & quel di mezzo, dal pollice. Per la quinta passano ⁱ la corda diuisa, che distende la mano, & ^k quella, che congiunge il dito pollice all'indice; se bene tal volta il musculo del pollice ha la sua particolar legatura, & allhora son sette queste legature. Per la sesta passano ^l tre corde, delle quali la prima s'inserisce nell'osso del bracciale, che sostiene il pollice; la secōda nel primo osso del medesimo pollice; la terza nel secōdo, & terzo, & anche tal volta ognuna di queste corde ha la sua particolar legatura. Oltre a queste legature hanno e muscoli dalla mano al gomito vna molto gagliarda tela (che cōgiunge e muscoli, l'vno coll'altro, & nō gli lascia v'cir dal suo luogo, ne confonderfi, gli vni, con gli altri) simile a quella, che diremo esser nella gamba; benche tanto piu sottile, che quella, che non par distinta dalla propria tela, che communalmente infascia e muscoli. Ci sono parimente d'altre legature sottili, come tela, che abbracciano tutto intorno gli articoli, & son simili a quelle, che communalmente legano qual si voglia congiuntura; le quali legano tutte l'ossa della mano, quantunque tra lor ci sia alcuna differenza. Perche quelle, che congiungono l'ossa delle dita, son piu sottili, & abbracciano solamente l'articolo. Quelle, che congiungono l'ossa della palma con quelle del bracciale, son piu gagliarde, & abbracciano l'ossa piu innanzi della congiuntura. Quelle dell'ossa della palma, che legano l'ossa, l'vne coll'altre, da lati, sono

li. i. t. vi. fig.
vii. i. u
m. ta. x. A. ta.
xii. A. ta. xi.
m. t. xij. h
n. t. xii. c
o. t. xii. pref.
fo ale

a Molte di queste legature non si possono veder nelle figure per esser molto sottili.
b t. iij. θ
c Tutte sei si notano nella tau. ij. & iij. con questi numeri. 1. 2. 3. 4. 5. 6
d lib. j. ta. vi. fi. vii. θ
e ta. ii. X. ta. ix. θ
f t. ii. Y. t. ix. A
g ta. ii. V. ta. ix. b
h t. x. p
i t. xj. k
k t. x. o
l la mede. kl m

sono di natura di cartilagine, & non solo circondano l'ossa d'intorno, ma si pongono anche tra osso, & osso. Quelle, che legano l'ossa del bracciale, son molto forti, & anche di natura di cartilagine, & circondano da ogni parte l'ossa, eccetto in alcune, che le separano; principalmente in quelle del secondo ordine, alle quai si congiungono. Quelle, che congiungono e due fuselli al bracciale, son simili alle legature sottili come tela, dell'altre congiunture, se ben questa legatura si fa alquanto piu dura appresso la punta del processo simile al puntaruolo; anzi pare vna particolar legatura da per se, che è quasi tonda, & si va a inserire nell'osso del bracciale, che le stà all'incontro. L'offitio di questa legatura, è solamente legar questa congiuntura. Le legature, che congiungono e due fuselli, così appresso il gomito, come appresso il bracciale, son molto gagliarde, & abbracciano tutto intorno i capi dell'ossa. ^m Ci resta anche a cõtare quella cartilagine, che habbiam detto nascere del minor fusello, & metterfi tra lui, & il bracciale; la quale anchora fa l'offitio di legatura, congiungendo questo fusello al bracciale; Et la legatura, ⁿ che empie lo spatium tra la riga aguzza dell'vno, & l'altro fusello, che è molto forte, & sottile, & neruosa, & ha certi fili, che scendono dal minor fusello in obliquo, infino al maggiore; la quale oltre al diuidere i muscoli di dentro del braccio, da que di fuori, lega e fuselli, & insieme da forza ad alcuni ^o principij di muscoli, come habbiam detto; Et la legatura, che congiunge il minor fusello con la testa di fuori, dell'osso dell'omero, che è gagliarda, ma sottile come tela, ne piu, ne meno, che quelle dell'altre congiunture; Et quelle del maggior fusello col medesimo omero, che quantunque questa congiuntura sia da per se molto sicura, non per ciò lascia di hauere sue particolar legature, molto forti, che abbracciano l'ossa d'intorno. Queste sono tutte le Legature della mano infino al gomito, ne ve ne sono alcun'altre, eccetto se volessimo contare quelle, che concorrono alla compositione de muscoli, & fanno le tele particolari d'ognun di loro; le quali alle volte son tanto grosse, che fanno parere il muscolo liuido, come è quella, che cuopre il muscolo, che ^p separa il dito pollice dall'altre dita, & quella, che cuopre il primo, & terzo, che muouono il gomito.

De Musculi del Membro.

Cap. 33.

FASSI il Membro (come piu lungamente nel terzo libro diremo) di due corpi grandi di neruosi di fuori, & spugnosi di dentro. De quali il destro nasce dell'osso destro del pettignone, poco piu in giu, di doue comincia a separarsi da quel dell'altra parte, & s'allarga verso il lato manco fin'al congiungersi col suo compagno. Et quindi camminano amendue insieme fin'alla testa del membro. Sotto a questi due corpi, tra l'vno & l'altro, si fa ^a il canale dell'orina, per cui passa parimente il seme. Presupposto questo così in commune (che basta per quel, che tocca all'intendimento di quel, che si ha da dire) è da sapere, che questo membro ha quattro muscoli, che'l muouono. De quali ^b due nascono della parte dinanzi ^c del muscolo del fondamento, & son simili a que, che habbiam detto gire dall'osso del petto all'osso hyoide; perche stanno, l'vno appresso l'altro, & si congiungono per gli lati di dentro, & così montano verso innanzi, fin doue il detto canale si riuolta in su, & iui s'inferiscono nella parte di sotto de sopra detti corpi, da lati del canale, diuidendosi vn poco l'vno dall'altro, & abbracciandogli come con certe dita. ^d Gli altri due nascono (ognuno dal suo lato) della giunta dell'osso dell'ancha, vn poco piu in giu, di doue habbiam detto nascere i corpi del membro, con vn principio carnosio, & sottile, & quindi montano in obliquo mantenendosi sempre carnosio, fin'all'inferirsi nel corpo del membro dal suo lato, non molto lontano dal suo nascimeto. Per virtu di questi quattro muscoli mouiamo la radice del membro secondo nostra voluntade, aiutati dalla naturale inclinatione, che ha il medesimo membro. Benche i due primi muscoli aiutano anchora assai, così all'orinare, come a mandar fuori il seme, aprendo, come con le dita, il canale, per doue escono amendue, perche non si ritenessero in vn piego, che qui fa il membro, & principalmente il seme, al quale è necessario vscir dirittamente senza ritengo alcuno, con tanto impeto, come vscirebbe d'vna siringa, perche non si raffreddi, o risoluono e suoi spiriti nel cammino, o si resti, senza entrar nella matrice.

Di che si fa il Membro.

I due primi muscoli del Membro.

Il terzo, & quarto.

L'offitio de muscoli del Membro.

Del

Libro Secondo

Del Musculo del Collo della Vescica.

Cap. 34.

Il Musculo del
Collo della Ve-
scica dell' Huo-
mo.

Quel della Don-
na.

E Vn corpo, fatto come di Glandole, al principio del Collo della Vescica (secondo, che piu lungamente nel terzo libro diremo) tra'l quale, & il piego, che habbiamo detto nel capitolo passato far il membro, sta situato ^a vn musculo, tondo, come vno anello, alquanto piu grosso dalla parte di sopra, che da quella di sotto; il quale abbraccia tutta questa parte d'intorno, & ha certi fili, che lo circondano tutto. L'offitio principal di questo musculo è vietare, che l'orina non esca senza nostra volontà. Serue anchora in certo modo a lasciar vscire l'orina, allentandosi. Benche a questo piu seruono e fili intrauerfatti della vescica, aiutati tal volta, da muscoli del ventre, & della diaframa; la qual, ritenendosi il fiato, preme il ventre all'in giù. ^b Hanno, ne piu ne meno, le donne vn'altro musculo, che fa il medesimo effetto, che questo; ma hauendo elleno piu corto il collo della vescica, che gli huomini, non hebbero di bisogno di quel corpo, che par fatto di glandole, & per ciò questo musculo abbraccia tutto intorno il collo della vescica, il quale (come nel seguente libro diremo) piglia dal corpo della vescica, infino all'inferirsi nella parte di sopra del collo della matrice, non molto lontano dalla bocca della natura. Questo musculo, quanto è piu lungo, che quel degli huomini, tanto è piu sottile, & quanto il collo della vescica è piu corto in loro, tanto quello è piu grosso.

a ta.xvi. fig.
xviij. N. li.
vj. t.v. fig.
vj. w

b li.vi. t.v. fi.
viij. x

De Musculi del Fondamento.

Cap. 35.

I Musculi, che
muouono il Fon-
damento.

Il terzo Muscu-
lo del Fondamē-
to.

HA il Fondamento tre Musculi, che'l muouono. De quali vno il caua in fuori, quando vogliamo fare e bisogni naturali, o mandar fuori alcuna ventosità, & due il pongono dentro, quando è cauato fuori, & insieme disturbano, che non escano le fecce cōtro a nostra volontà. ^b Questi due musculi son larghi, & sottili, & non molto carnosì, o rossi, & non pigliano principio da osso alcuno, se non dalle legature, che nascono dell'osso grande, & di quelle dell'osso del pettignone, & di quelle dell'osso dell'anche, & della parte piu bassa della tela, chiamata peritoneo. Et quindi scédono ognuno dal suo lato, abbracciando l'intestino retto, & inferendosi nella tela sua di fuori. Questi due musculi son tato larghi, che oltre l'abbracciare, & finire nel detto intestino, s'inferisce anchora vna ^d parte di loro, ne gli huomini, nella radice del membro, nelle donne nel collo della matrice. La qual cosa ha fatto pètar a molti, che questi musculi fussen tre. Ma poco importa chiamargli due, o tre, poi che l'offitio di tutti loro è vno medesimo, cioè tirare in sù il fondamento dopo l'hauer fatti e bisogni naturali. A questi due musculi non rispōdono particolarmente altri, che cauino il fondamento in fuori; perche tal effetto lo fanno assai a bastanza i musculi del ventre, & la diaframa, & tutti e musculi del petto. Hora del fin di questi musculi nasce il terzo, ^e il quale è tondo, come anello, & abbraccia il capo dell'intestino Retto, fin'alla pelle di fuori. Questo musculo non è tanto carnosio, come i sopra detti, se ben è piu grosso al principio, che al fine, & il fine è simile alla pelle, nella qual finisce; ma tutto è couerto d'vn humor vntuoso. Et ha e fili che'l circondano d'intorno, medianti i quali si congiunge nelle dōne al collo della ^f matrice, appresso la natura; ne gli huomini al collo della vescica, & parimente al membro, medianti i ^g due primi musculi suoi, de quali nasce. Dalla parte di dietro si cōgiunge al codione; da lati a certe legature, che attrauerfano dall'osso grande, a quello dell'ancha. ^h Questo musculo non è tanto corto, come alcuni pèfano; anzi entra ben due dita a dentro, come si vede manifestamente in coloro, ne quali o per alcuna fistola, o per altra infermità gli è stato diuiso il suo principio. Perche, se ben costoro non ritengono tanto facilmente le fecce, come di prima, non escono però senza lor volontà, come farebbero, se'l musculo fusse del tutto fessò; perche a lui solo appartiene chiuder il fondamento, in modo, che non possa vscire cosa alcuna senza sua licenza.

a t.xv. fi. xxix.
E. li. iij. t. ij.
fi. vij. a

b t.xv. fi. xxix.
B. C. li. iij. t.
ij. fi. vij. b c

c la med. a Y
d la med. d D

e t.xv. fi. xxix.
E. lib. iij. t.
ij. fi. vij. a

f li. iij. t. v. fi.
xxvi. x, x
g ta. xvi. fig.
xiiij. xv. G

h la med. HI

De Musculi, che muouono la Gamba.

Cap. 36.

MVOVESI la Gamba dal Ginocchio in giù (come ognuno può in se stesso provare) distendendosi, & raccogliendosi dirittamente, senza declinare a lato alcuno, medianti

- a** t. i. t. iii. o
t. iii. 2. t. ix.
a. t. xv. fi. xvi
L
b t. i. f
c li. i. t. vi. fi.
ix. P
d t. xv. fi. xvi
Δ. t. iii. P. t.
ii. y. t. i. i. t.
iii. x. t. v. s.
t. ix. y
e t. xv. fi. xvi.
N
f li. i. t. i. s
g t. xv. fi. xvi.
presso all' M
h t. x. t. ii. s
t. ix. t. xi. s.
t. xv. fi. xvi.
R
i li. i. t. ii. 14
k t. xi. y
l t. x. y. t. xi.
op. ta. iii. u.
t. ii. a. t. vi. x.
y. t. ix. f. ta.
xii. p
m t. iii. o. ta
v. s. t. iii. f. t.
i. d. t. ix. y
n t. xi. p
o t. xi. y. t. ii.
s. t. ix. u. t.
x. s. t. xii.
p t. xi. y
q la med. o.
- medianti dieci muscoli. Il primo de quali nasce^a dalla parte di nanzi della punta del gal lone, con vn sottil principio, alquanto piu neruoso, che carnosio; ma poco di poi, che è na to, titorna del tutto carnosio, & tanto piu largo, che quando cominciò, che è sua larghez za al doppio di quel, che è grosso. Et in questo modo scende in obliquo verso dentro, per la parte di dentro della coscia, fin' alla sua metà, secondo il lungo; & di poi va diritto insi no all'arriuare alla testa di dentro dell'osso della coscia, appresso il ginocchio; doue volta alquanto in fuori, inferendosi nel ^c principio della prima riga del maggiore stinco della gamba mediante vna sottile, & tonda corda, che fa, quando comincia a voltare verso la parte dinanzi. L'offitio di questo musculo è tirare la gamba in sù verso l'Anguinaia del l'altra gamba, aiutato da muscoli, che muouono la coscia & la gamba: a i quali principal mente si dee attribuire questo mouimento. Perche senza dimenare il ginocchio ognuno facilmente può, stando a sedere, ponere l'una gamba sopra l'altra, & se non si accogliesse la gamba medianti è muscoli, che la muouono, & la coscia nō si alzasse in sù verso la bā da di dentro, medianti e muscoli, che la muouono, mal potrebbe vn cosi sottil musculo solo per se far tale offitio. Il ^d secōdo musculo nasce con vn principio largo, & del tutto neruoso, del ^e mezzo dell'ossa del pertignone, secondo tutto il lungo ^f della cartilagine, mediante la quale habbiam detto congiungerfi; nella qual parte si coniunge al secōdo, che muoue l'altra gamba, & passato il principio subito si fa stretto, grosso, & carnosio, in tal forma, che è poco meno largo, che grosso, & quasi tondo. Et cosi scende all'ingiu per la parte di dentro della coscia, faccendosi, a poco a poco, tanto stretto, che quando arriua alla testa di dentro della coscia, appresso il ginocchio, si conuer te in vna molto tonda corda, la qual s'inferisce appresso il fin del primo, attaccandosi a lui per la banda di dietro. Questo musculo nelle donne alquanto magre, pare vna legatura neruosa, dura, & aspra come vn neruo, perche essendo scarnato, & hauendo poco grasso di sopra, fa vn orlo sopra la carne. L'offitio di questo musculo è muouerel'una gāba verso l'altra, come quā do l'incalchiamo, aiutandolo i muscoli, che piegano la gamba, & que, che muouono o piegano la coscia verso dentro. Il terzo musculo insieme con alcun altri nasce della par te piu bassa della giunta dell'osso dell'anca, sopra la qual noi sedemo, con vn principio neruoso, & sottile; & scēdēdo alquanto in obliquo all'ingiu, si fa subito carnosio, & quasi tondo, & assai piu grosso, che al principio. Et cosi passa per la parte di dietro della coscia vn poco in obliquo, & per vn seno, che diremo farsi nel ^k quinto musculo, che moue la gamba, fin' all'arriuare alla parte di dietro della testa di dentro della coscia, appresso il gi nocchio; doue faccendosi piu sottile, & tondo, si conuer te in vna corda tonda, laqual tor cendosi vn poco in nanzi, s'inferisce appresso e due sopra detti muscoli, piu a dietro, che niun di loro. Ma la corda di questo musculo scende per la patte di nanzi della gamba, ap poggiata alla riga di dentro del maggiore stinco, fin' alla metà della gamba, il che non fa niuno de gli altri. L'offitio di questo musculo è piegare la gamba alquanto in dentro. Il quarto nasce della medesima giunta dell'osso dell'Anca, con vn principio piu stretto, che quel del terzo, ma piu gagliardo, & duro; il quale nascēdo appresso il lato di fuori del principio del ^m nono musculo, si nasconde alquanto sotto di lui, & da poi scende a basso & faccendosi subito carnosio, rappresenta la figura propria di musculo, assai meglio, che non faceva il terzo. Et cosi scende per la parte di dietro della coscia alquāto verso la parte di fuori, fin' al suo mezzo; doue comincia subito a farsi piu sottile, & neruoso di fuori, tan to, che pare, che si voglia conuertire in vna corda. Ma p la parte di dentro se gli cōgiunge vn ⁿ pezzo di carne, che nasce della parte di dentro della coscia, come se fusse principio d'un'altro musculo. Et d'amēdue se ne fa vn piu grosso, il qual scende infino all'inferirsi con vna gagliarda corda, in vna aguzza punta, che per questo effetto habbiam detto haue re il processo della piu alta giunta del minor fusello. Questo musculo è quel, che Galeno nel secondo libro dell'Anatomia dice, esser stato tagliato ad vn gran corridore; & suo of fitio è piegar la gamba senza sforcerla a parte alcuna, non ostante che stia situato alquan to in obliquo, ° Il quinto musculo nasce anchora della giunta detta dell'osso dell'anca sotto del principio del ^p terzo, & quarto, con vn principio neruoso, & cosi si mātene fin quasi la metà, doue si fa del tutto carnosio, & scēde per la parte di dietro della coscia, stor cendosi verso la parte di dietro della testa sua di dentro, appresso il ginocchio; la qual pas sata, subito si conuer te in vna corda tonda, che s'inferisce nel lato di dentro, della parte di nanzi

Il primo Muscu lo, che muoue la Gamba.

Il secōdo.

Il terzo.

Il quarto.

Il quinto.

Libro Secondo

dināzi del maggiore stinco, vicino a doue habbiamo detto inserirsi le corde del primo, & secondo, & terzo musculo, verso la parte di dietro. Benchè questa corda non scende tato in giù, come quella del terzo; anzi ordinariamente nō passa quasi niente la giunta di questo fusello, & tal volta finisce innanzi che lei. Questo musculo ^r ha vn seno dal principio al fine, secondo il lungo, che è tutto liuido, per lo qual passa il terzo musculo, che muoue la gamba, & suo offitio è piegar la gamba, come fa il terzo, al quale è simile in sito. ^s Il sesto nasce appresso il lato di fuori del principio ^t del primo, dalla parte piu alta dinanzi della punta del gallone; & ha per la parte di dentro vn principio ^u stretto, & carnoso, & subito s'allarga, come lucertola, & così scende verso la congiuntura dell'osso della coscia con quel dell'anca, doue si torna vn'altra volta a ristignere. Et innanzi, che arriue ^x al processo maggiore dell'osso della coscia, si conuertè in ^y vna sottile, neruosa, & molto larga tela, che abbraccia in prima vna parte de' muscoli, che cuoprono la congiuntura del gallone, & dipoi cuopre tutta la coscia, come vna pelle, fin sotto el ginocchio, doue s'inferisce nella parte di fuori della giunta del maggior fusello. Questa tela per la parte, che cuopre il lato di nanzi & di dentro, della coscia, è molto sottile, & tanto piu, quanto piu s'appressa al lato di dentro della coscia; ma per la parte sua di fuori è manifestamente piu grossa, & gagliarda, & molto simile alla corda de' gli altri muscoli. I fili di questa tela scédono diritti di sù in giù; & il suo fine si congiunge alle corde d'alcuni muscoli, che distendono la gamba; quantunque serua anchora questa tela ad abbracciare tutti e muscoli, che passano per la coscia, & a tenergli, che non escano dal tuo luogo, come fa la tela che habbiamo detto inuolgere tutti e muscoli dal gomito alla mano. ^z Il settimo nasce cō vn principio largo, & neruoso, della radice del processo di fuori dell'osso della coscia, laqual abbraccia tutta d'intorno, & subito da poi, che è nato, si fa carnoso, & grosso; & separandosi dall'osso passa per sopra l'ottauo musculo, occupando tutto il lato di fuori, & gran parte di quel di nanzi, & di dietro, della medesima coscia. Questo musculo è quasi tutto carnoso, fin' appresso la ^a rotula del ginocchio; doue si conuertè in vna larga corda, la quale insieme con quella ^b dell'ottauo, & nono musculo, abbraccia la detta rotula, inferendosi nella parte di nanzi del maggior fusello. Et anche la corda del sesto musculo si congiunge alquāto a quella del settimo, anzi cuopre la parte sua di fuori, piu, che niuno de' gli altri; alla parte di dietro si congiunge il quarto; a quella di nanzi el nono. ^c L'ottauo musculo (che abbraccia tutto il largo dell'osso della coscia, eccetto la ^d riga, che habbiamo detto hauer questo osso nella parte di dietro secondo il lungo, nella quale diremo inserirsi il quinto musculo, che muoue la coscia, & la parte di dietro appresso alla radice delle teste di sotto di questo osso, nella qual parte ne anche tocca l'osso) nasce del collo dell'osso della coscia, cō vn principio neruoso. Ma in nanzi che arriue al minor processo dell'osso, si fa carnoso, & piglia parte di suo principio da questo processo i tal modo, che par, che habbia due principij, da quali scende, abbracciando in tal modo l'osso, che quasi si congiunge l'vn latro all'altro, nella parte di dietro della coscia, & con piu va all'in giù, piu si fa carnoso, & grosso, fin presso alla rotula dei ginocchio, doue si rilieua alquanto, & fa come vn ^e mezzo cerchio carnoso, di cui nasce vna corda larga, che cuopre la rotula, come diremo. Ma è da notare, che tutto il lungo di questo musculo scontro a quel mezzo cerchio, è piu grosso, che la parte sua, che si mette di sotto il settimo, bēche anche questa parte è carnosa. Di modo, che stando questo ottauo musculo rileuato dal lato di nanzi secondo il lungo dell'osso della coscia; & ne piu, ne meno il settimo, secondo il lungo della parte di fuori, dell'istesso osso della coscia, resta nel mezzo dell'vno, & dell'altro, vn lungo ^h fosso liuido, che s'empie col ⁱ nono musculo. Il qual nasce del tubercolo, che si vede rileuato nella parte di nāzi dell'osso dell'anca, piu in sù del fosso, nel qual s'incassa la coscia con ^k vn principio sottile, & neruoso, & quindi scende diritto pigliando la figura d'vn pesce, o lucertola; per laqual cosa alcuni il chiamano il Pesce della gāba. Scédendo poi verso la parte di nanzi si fa alquanto piu largo fin presso il mezzo ^l della coscia secondo il lungo, & subito comincia a ristignersi, a poco a poco, & molto in nanzi che arriue al ginocchio, si conuertè in vna ^m larga, & sottil tela; la qual passando per sopra la rotula, si ritorna vn'altra volta a slargare, mescolandosi colle corde ⁿ del settimo, & ottauo muscolo, benchè non tanto, quanto si mescolano quelle del settimo & ottauo fra se stesse. Ma sia come si voglia, di questi tre muscoli si fa vna corda larga, a cui s'attacca in tal modo la rotula

r la med. y

s t.i. o. ta. iii.
q. ta. ii. r. ta.
iii. j. r. ix. p.
t. i. s.
u. i. dal x al
y
x lib. i. t. i. ii.
iii. T
y ta. i. ii. iii.
ix. o

z t.v. A. t. iii.
r. t. ii. t. t. iii.
o. t. vi. o. ta.
ix. r. t. x. v. t.
xi. t. xii. o

a t.v. j.
b t. viii. g h i

c t. v. vi. II. t.
vii. j. t. iii. g.
t. ii. n. t. ix. j.
ta. iii. j. r. ta.
viii. l. t. x. xi.
t. t. xii. n. ta.
xiii. o. ta.
xv. fi. xvi. Q

d t. xiii. s.
e la med. e
f t. vi. r.
g la med. u

h t.v. II
i t. iii. o. t.v.
j. t. i. a. t. iii.
sta. ix. j. ta.
xv. fi. xvi. P
k ta. iii. O
l la med. o

m la med. o
n t. viii. o, g
hi

- o la med. k • rotula del ginocchio da tutta la parte di fuori, che par, che nasca dile; . Et è da notare, che la parte di dentro di questa corda, o tela, per tutto lo spatio, che nō cuopre la rotula, sta piena di grasso, & d'vn humor vntuoso, che fa, che non s'attacchi all'osso della coscia; ma nel passar la rotula, subito si fa piu stretta inferendosi nella parte dinanzi della giūta del maggior fusello. L'officio di questi muscoli, & de due passati, è stender dirittamente la gamba. p t.xij. n. ta. xiiij. r Il decimo muscolo, che muoue la gamba, è molto picciolo, & carnosio, & è situato di sotto il chino del ginocchio, & couerto co muscoli della polpa della gamba, che nascono delle teste di sotto, dell'osso della coscia; per la qual cosa fu con gran ragione chiamato, Quel, che sta nascosto nel chino del ginocchio. Questo muscolo nasce del la parte di dietro d'vna grossa, & gagliarda legatura, di quelle, che cōgiungono l'osso del la coscia colla gamba, che è nel lato di fuori del ginocchio, con cosi largo principio, che cuopre la parte di dietro del ginocchio. Et subito da poi, che è nato, si comincia a far carnosio, & cosi scende verso dentro, a canto all'osso, faccendo vn muscolo vn poco piu lungo, che largo, che s'inferisce nella parte di dietro del maggior fusello, poco piu in giù del la sua piu alta giunta, con vn fin largo, quanto è il medesimo muscolo, & finisce anche in obliquo torcendosi dal lato di dentro della parte di dietro del detto fusello verso dentro; di modo, che la minor parte di questo muscolo s'attacca alle legature del ginocchio, la maggior all'osso della gamba, senza toccare in parte alcuna l'osso della coscia. L'officio di questo muscolo se ben non è quel, che dice Galeno, si per esser tanto picciolo, che con gran difficoltà potrebbe ritirar la gamba; si per nō esser posto diritto come dourebbe stare per ritirarla, non per ciò è del tutto inutile, come nella sua historia vuole il Vesalio. Anzi aiuta a voltar la gamba alquāto verso la banda di fuori, come potrà, chi si voglia, prouare in se stesso; perche tenendo forte la coscia con amēdue le mani, & volendo torcere la gamba, lo farà senza muouer la coscia; ilche esser non può, se non con questo muscolo, attento che gli altri tutti nascono dell'osso della coscia, o del gallone.

De Musculi, che muouono la Coscia.

Cap. 37.

- T**RATTA MMO de Musculi della Gāba prima, che di que della Coscia, p star questi di sotto a quelli. Hora sono e muscoli, che muouono la Coscia, al piu quattordici, al meno dieci; medianti i quali si distende, & ritira, & si muoue da lati, & d'intorno. ^a Il primo di que, che la distendono, sta subito dietro la pelle, & è tanto grosso, che fa tutt'vna delle natiche, & nasce con vn largo, & molto carnosio principio, della piu alta parte di tutto il ^b lato di dietro della punta del gallone, che sta rileuata verso l'osso grande, & in parte della spina, che habbiam detto hauer questo osso del gallone nella parte piu alta, & anche della parte piu bassa dell'osso grāde, & alle volte (bēche assai poche) del Codione, nella qual parte questo muscolo si ^c congiunge col suo compagno dell'altra banda. Hora nascendo di queste parti, con vn principio largo, come mezza ruota, scende in obliquo, & passa per sopra la ^d congiuntura della coscia col gallone; nella qual parte si fa piu stretto, & sottile, fin'al conuertirsi in vna ^e larga, & gagliarda corda, con la qual s'inferisce nella parte di fuori del ^f maggior processo dell'osso della coscia, secondo tutto il lungo suo, cominciando a inserirsi poco dopo la punta, alquanto verso la banda dinanzi, & scendendo alquāto a dietro s'inferisce anchora in tutta la parte sua di dietro in vna slunga riga, che scende per la parte di dietro dell'osso della coscia. Ha questo muscolo e fili, che scendono in obliquo verso innanzi. ^h Il secondo nasce appresso il primo con vn principio largo, & carnosio, che piglia quasi tutto il lungo della spina di questo osso, della qual non nasce il primo, & fa vn mezzo cerchio, ne piu ne meno, che fa lui; ma la parte di dietro del principio di questo secondo è couerta col primo. Da questo principio scende verso innanzi facendosi, a poco, a poco, piu stretto, ma non mettendosi tutto di sotto al primo, come vuole il Vesalio; perche si vede chiaramente i scoperta quasi la sua metà. Hora scendendo (come dico) cuopre anchora tutta la cōgiuntura dell'ancha, come fece il primo, & conuertendosi in vna ^k gagliarda, sottile, & larga tela, s'inferisce al trauerso, (comparandola al fin del primo) in tutta la piu alta parte del maggior processo della coscia, attaccandosi anchora alquanto nel lato suo dinanzi. Ma è da notare, che questo muscolo è molto liuido, principalmete ne gli huomini carnosì, & ha e fili quasi diritti di sù in

I mouimenti della Coscia.

Il primo muscolo, che muoue la Coscia.

Il secondo.

Libro Secondo

sù in giù, & innanzi, che finiscano, fanno co' fili del primo certe croci, & che in niuna par-
 te par piu carnosio, che doue, poi che è nato, si separa dall'osso dell'ancha, & passa per so-
 pra il terzo muscolo. ¹ Questo terzo è tãto minore, che'l secôdo, quanto il secôdo è mi-
 nore, che'l primo, & sta tutto di sotto el secôdo; perche ^m nasce della parte piu bassa di
 dietro dell'osso del gallone, con vn principio largo, grosso, & carnosio, come in mezzo ar-
 co, & quindi scende in obliquo verso nanzi, attaccandosi alle legature della congiuntura
 del gallone, & faccendosi, a poco, a poco, piu stretto, fin che si conuertere in vna ⁿ ga-
 gliarda, & larga corda; la quale abbracciando il maggior processo della coscia s'inferisce
 nella parte dinãzi, & nella punta sua. Questo muscolo pare in tutti liuido, & assai piu ne
 gli huomini robusti, ne quali habbiam detto essere parimente liuida la parte del secôdo,
 che sta sopra questo terzo; perche è couerta d'vna molto grossa tela, mediante la quale si
 congiunge fortemente al lato di sopra del primo muscolo, & in questa sorte d'huomini
 anche il primo par liuido. Ma ne grassì non è così, anzi ha questo terzo muscolo certi fili
 neruosi, sparti per se stesso tutto, e' quali nelle donne sono inuiluppati con grasso; anzi e'
 fili sembrano grasso mescolato con fibre di carne. ^o Il quarto muscolo, che parimente è
 quasi tutto liuido, & poco manco, che tondo, nasce de lati, & della parte di dietro de piu
 bassi nodi dell'osso grande, che non si congiunge all'ossa de galloni, con vn principio
 grosso, & carnosio, & tanto largo, che quasi si congiunge cò quel, che gli risponde dall'al-
 tro lato. Et da questo principio camina al trauerso diritto fin' al maggior processo della
 coscia, mantenendosi per alquanto carnosio, & ristrignendosi, a poco, a poco, si couerte,
 innanzi che arriue all'osso della coscia, in ^q vna tonda corda, che s'inferisce nella parte di
 dietro del ^r maggior processo del detto osso, appresso la sua punta. ^s Il quinto muscolo
 nasce dalla punta di sotto dell'osso del gallone, che non è occupata da principij del ^t ter-
 zo, quarto, & quinto muscolo (sotto de quali nasce) infino al fine della congiuntura del-
 l'ossa del pettignone; doue si congiunge al suo compagno con vn principio largo, & car-
 noso da ogni parte, eccetto che sotto e sopra detti tre principij, nella ^u qual parte di fuo-
 ri è neruoso, & di dentro carnosio, come è anchora tutto il muscolo. Da questo principio
 scende, abbracciando subito la parte di dietro del minor ^a processo dell'osso della coscia,
 & poco piu in giù s'inferisce in quella ^v aspra, & aguzza, & lunga riga, che habbia detto
 hauere questo osso nella parte di dietro secondo il lungo suo, cominciando dalla radice
 di questo minor processo. Et si come il principio di questo muscolo è continuato, così
 anchora è il fine, eccetto l'ultima ^z sua parte, che s'inferisce nella radice del minor pro-
 cesso della coscia; la qual nascendo della giunta dell'osso dell'ancha cò vn principio ner-
 uoso (come habbiam detto) fa come vn muscolo da per se; il quale allargandosi molto,
 scende diritto per la parte di dietro dell'osso della coscia, fin che tornandosi a ristrignere
 finisce in vna tonda corda, che s'inferisce nella testa ^a di dentro del medesimo osso, ap-
 presso il ginocchio, tanto distintamente, che, se non si mescolasse il fine ^b del quinto mu-
 sculo col principio di questo, sicuramente si potrebbe contar per vn' altro. Ma stãdo me-
 scolati non è inconueniente chiamargli vno, come fo io, o diuidergli in due, faccendo
 questa parte l'vno, & l'altro quella, che s'inferisce in quella detta riga aspra; bẽche nõ s'ò
 che officio potrebbe fare quel, che nasce del minor processo della coscia, inferendosi nel-
 l'istesso osso. Non manca anchora, chi diuida questo muscolo in ^e tre. Perche la parte sua
 dinãzi, che nasce della parte dinãzi della giunta dell'osso dell'ancha, (la qual piglia dalla
 parte di sotto dell'ossa del pettignone, iui, doue si separano l'vn osso dall'altro, fin alla par-
 te di sotto dell'ancha) si distingue dall'altra parte ^d dinanzi di questo muscolo (che piglia
 dal resto della giunta, fin alla parte dinanzi dell'ultima parte di tutto il muscolo) col mez-
 zo d'vn segnale. Et non sol si diuidono queste due parti dinanzi mediante questo segno,
 ma anchora mediante le differenze de fili, & diuersi fini, che hãno. Per l'istesse ragioni si
 distingue tutta l'ultima parte di questo muscolo da quella dinãzi. Perche la parte, che sta
 appresso la congiuntura dell'ossa del pettignone, ha e' suoi fili quasi intrauertiati; e' quali
 camminano dal suo nascimento verso la radice del minor processo della coscia, & in la
 parte piu alta si congiungono alla ^e riga aguzza della coscia. L'altra, che sta verso la parte
 piu bassa dell'osso dell'ancha, se bẽ ha e' fili in obliquo, pur son quasi diritti, & s'inferisco-
 no nella parte piu bassa della riga aspra, & riluata, dell'osso della coscia. In questa forma
 si diuide questo muscolo in tre, & così infino adesso farebbero sette in tutto. L'officio
 principal

Il terzo.

Il quarto.

Il quinto.

Come si diuida
il quinto muscu-
lo in tre.

L'officio di que-
sti tre muscoli.

l t.xj. z
m ta.xij t.ta.
xj.x y z

n la med. z

o ta.xj. o. ta.
xij. u
p li. j. t. vj. fi.
ij. D E F

q t.xj. b
r lib. j. t. j. ij.
ii. T
s t.xij. xij. z
z n. t. ij. e. t.
v. o. t. vj. s. t.
vij. b. t. vij.
o. c. t. ix. x. t.
x. p. t. xj. &
t. t. xj. a. u. v
u t. xj. d
x li. j. ta. ij. u
y la me. pref.
so al A
z t. xj. z

a lib. j. ta. ij.
16.
b come si con-
giungono
dal o al c in
la ta. vij.

c ta. xij. xij.
z z n

d la med. z n

e lib. j. ta. ij.
presso al A

principal de quali è distēder la coscia; & aiutarle anchora a muouerla da lati, & d'intorno, in questa forma. Il primo, se opera tutto, la distēde dirittamente, senza voltarla da lato alcuno; se tira con la parte piu alta o piu bassa del suo principio, la distēde, ma mouendola hora da questo lato, hora da quello, secondo la parte, che tira. Il secondo distēde parimente la coscia, tirandola anche in fuori, & mettendo la cocca nel fosso dell'osso dell'anca. Il terzo & quarto la distēdono, tirando alquanto in sù. Et oltre a questo il quarto la storce alquanto piu in fuori; & il terzo piu a dietro; & amendue la voltano d'intorno, benche assai piu debolmente, che quelli, che per tal' effetto son diputati, come subito dirò. Ma la parte di dietro del quinto musculo, la quale ha e fili diritti, tiene la gamba diritta; & posando il piede in terra distēde la coscia. Et il lato di dietro della parte di nanzi di questo musculo oltre a fare il medesimo offitio, che la parte di dietro, storce anchora alquanto la gamba di dentro. I fili piu alti, che stanno appresso la congiuntura dell'ossa del pettignone, nel principio di nanzi di questo musculo, tirano la coscia verso dentro, raccogliendola alquanto. Questi sono e muscoli, che distēdono la coscia in dentro, a quali ne rispondono tre altri, che la ritirano, cioè il sesto, settimo, & ottauo. ^f Il sesto nasce de corpi dell'vndecimo & duodecimo nodo delle spalle, & del primo, & secondo de lombi, con vn principio carnoso. Il quale tosto, che e nato, si fa topdo; & scende in obliquo in fuori, & passa per la parte di dentro dell'osso del gallone, mantenendosi sempre carnoso fin alla ^h riga, doue l'osso del pettignone comincia già a chiamarsi del gallone; & iui si conuerte in vna gagliarda, & tonda corda, che scende insino all'inferirsi nella parte piu alta del minor ⁱ processo dell'osso della coscia. Ma e da notare che per ragion di questo musculo si fa vna incauatura nell'osso del pettignone, couerta d'vna legatura neruosa, che nasce dell'osso medesimo, sopra la qual passa, come sopra vn pauimento; perche essendo l'osso in questa parte acuto, & la corda dura, facilmente si farebbe male strisciandosi sopra l'osso. Et anche aiuta, che non si disuij dal suo luogo. ^k Il settimo nasce da tutta la parte di dentro dell'osso del gallone, come da vn ^l mezzo cerchio, con vn principio carnoso; & di poi si va ristignendo a poco a poco, & facendosi piu grosso infino al farsi del tutto tondo; & cosi passa per la parte piu alta dell'osso del gallone, mantenendosi sempre carnoso, fin presso al ^m minor processo dell'osso della coscia; doue si conuerte in vna tonda corda, che s'inferisce nella piu bassa parte di questo processo appresso il fin del sesto. Ma e da notare, che nel passar questo musculo sopra la parte piu alta dell'osso del gallone, fa vn fossetto nell'osso, per lo qual passa piu sicuramente senza poter sciouolare. L'ottauo ⁿ musculo pare in alcuna maniera parte del ^o quinto, se non si guarda con diligenza; & nasce con vn principio ^p largo, & carnoso, da tutta la riga, che sta segnata nell'osso del pettignone, della parte di nazi del fosso del gallone, infino doue si congiungono l'ossa del pettignone; & scedendo assai in obliquo verso dietro, si mantiene della medesima natura, infino all'inferirsi nel lato di dentro dell'osso della coscia, scontro al tuo minor processo, con vna corda larga, & corta, che scede in obliquo verso dietro fin alla ^q sua metà. Questo musculo par liuido; & insieme co due palsati ritira la gamba, appressandola alquanto verso l'altra. Perche il sesto tira la coscia fortemete in su, piegandola, & mettendola in dietro. Il settimo fa il medesimo offitio, ma mette piu a dentro la coscia, che l'sesto. L'ottauo piega alquanto la gamba, & la mette piu a dietro, che l'settimo. Di modo, che i muscoli, che stendono, & ritirano la gamba, seruono anche a tirarla in dentro, & in fuore. Aiuta anchora in certo modo a raccogliere la coscia il ^r nono musculo di que, che muouono la gamba; perche nascendo d'vn tubercolo, dell'osso del gallone, & scendendo diritto fin sotto el ginocchio, doue s'inferisce, tirando verso il suo principio, necessariamente ha da piegare la coscia; come fanno anchora per conseguete tutti e muscoli della gamba, che nascono dell'osso del pettignone, o dell'anca, & finiscono sotto el ginocchio. Il nono musculo (che e tutto liuido, & carnoso, & scede in obliquo in fuori) cuopre tutto il buco dell'osso del pettignone, per la parte di fuori; & di poi scende per tutta la parte di fuori del collo della coscia, conuertendosi in vna gagliarda, & alquanto larga corda, che s'inferisce nel seno del maggior processo della coscia, che sta scontro al collo dell'osso, & della testa sua, che s'incassa nell'osso dell'Anca. L'offitio di questo musculo e voltare la coscia intorno verso dentro. ^t Il decimo (che tura il detto buco dell'osso del gallone per la parte di dentro) e assai piu forte, che l'nono, &

L'offitio di que
sti tre Musculi.
L'offitio di que
sti cinque primò
Musculi della
coscia.

Il sesto.

Il settimo.

L'ottauo.

Il nono.

Il decimo Mus-
culo che muoue
la coscia.

L piu

f t.viii. o. ta.
iii. o. t. v. x.
t. vi. o. t. vii.
i. t. xiii. o. t.
xiii. c. t. xv.
fi. xvi. x
g t. viii. a
h la med. b
i lib. i. t. i. ii.
iii. o.

k t. viii. A. ta.
xiii. y. t. i. ii.
t. v. o. vi.
o. t. vii. x. ta.
xiii. d
i t. viii. o. o
m t. xiii. y

n t. viii. x. ta.
i. o. t. iii. m.
t. iiii. o. ta. v.
y. t. vi. p. ta.
vi. a
o. t. viii. o
p la med. tra
p. e. & il b
q la med. f

r t. iiii. o.
t. i. f

s t. viii. y. ta.
xiii. a. t.
xiii. c

t t. x. a. t. xi. o
ta. xii. a. ta.
xiii. t. ta. xv.
fi. xvi. IGH

Libro secondo

piu degno di consideratione; perche nasce di tutta la riga, che piglia dalla parte di dentro dell'osso del gallone, appresso doue s'attacca al processo de lati del primo nodo dell'osso grande, per di dentro dell'osso del gallone, fin doue si congiungono l'ossa del pettignone. Questo principio sta diuiso con tre righe, o segnali; & e del tutto carnosio, come anche sono quasi tutti e principij di questi muscoli di questa cōgiuntura; & occupa tutta la parte di dentro dell'ossa dell'anca, & del pettignone; & tornando liuido si va a poco a poco restringendo, in tal modo, che non e piu largo di quāto e lo ^x spatio tra'l processo acuto di questo osso, & la parte di dietro della giunta dell'osso istesso. Per questo spatio esce fuori questo muscolo, come per vna incauatura, torcendosi nell'uscire, quāto se gli richiede, & faccendosi per la parte, che tocca l'osso, neruoso, & diuiso quasi in tre corde tonde, che si storcono verso il seno per suo ordine. Et in nanzi, che arriuieno al seno, son larghe, ma quando arriuiano a quello, si fanno piu strette, passando per tre piccioli seni, che si veggono nella detta incauatura, diuisi cō due linee rileuate, che sono in esso. Passato che hanno queste tre corde il seno, tosto si conuertono in vna, che s'inferisce nel seno del maggior processo della coscia appresso il fine del nono muscolo. Et e da notare, che tra l'osso, & le dette corde, sta vna forte, & grossa tela, couerta d'un humor vntuoso, che fa come vn suolo a questo muscolo; & fa, che piu facilmente giuochi sopra l'osso. L'offitio di questo muscolo, & del nono, è voltar la coscia intorno; questo verso la bāda di fuori, quello verso quella di dentro. Ci sono oltre a sopra detti, altri due muscoli carnosii, che passano, l'vno dalla parte di sopra del seno, o incauatura detta; l'altro da quella di sotto; & amēdue insieme abbracciano il decimo muscolo di modo, che non lo lasciano uscire dal suo luogo. Il primo di loro nasce dal processo acuto dell'osso del gallone, & s'attacca col lato di sopra del decimo muscolo dal principio al fine. Il secondo nasce dalla punta del processo medesimo, & è anche carnosio, & si congiunge al lato di sotto, dell'istesso decimo muscolo, dal principio al fine; perche amēdue finiscono nel seno del maggior processo della coscia, come fa il decimo. Nasce anchora dalla parte di dentro dell'osso del gallone, iui, doue il decimo muscolo (restādo di storcersi) scende fin' alla coscia, vn pezzo di carne, nel quale si pongono le tre corde del decimo come in vna borsa; & così vanno a inserirsi nel maggior processo della coscia. I due muscoli detti aiutano a voltar la coscia a dietro; & ordinariamente si cōtano, come parte del decimo; & così non farebbero piu di dieci, que che muouono la coscia. Ma contādo da per se questi, & i due, che si congiungono al quinto, farieno quattordici. Ma poco importa contar a vn modo, o a vn' altro, con questo, che la cosa s'intenda, come sta.

Alcune parti di carne, che si congiungono, a quella di sopra.

De Muscoli, che muouono il Piede.

Cap. 38.

Il primo muscolo, che muoue il Piede.

Il secondo.

Mouemo il Pie, ne piu ne meno, che la mano, in su, in giù, & da lati (benche oscuramente,) medianti noue muscoli. Il primo de quali nasce dalla radice della testa di dentro, dell'osso della coscia; il quale, se bene, a risguardario, alla continuatione e tutt'vno, pure considerata la diuersità della sustanza, si diuide in due parti; l'vna e piu alta, & verso dentro, al mezzo della coscia; l'altra piu bassa, & verso fuori, ne piu ne meno, che i principij de muscoli diritti del ventre. Perche la parte piu alta di questo muscolo e larga, & carnosia; & scendēdo a basso si mescola coll'altra parte del principio (la quale e del tutto carnosia, & liuida) poco piu giù del chino del ginocchio; & quindi scēde facendosi vn muscolo molto carnosio & grosso, che fa la verissima forma di muscolo; ma in nanzi che arriue alla metà della gamba, subito come passa la polpa, facendosi piu stretto si conuertē in vna corda larga, nel cui mezzo al principio si vede vn poco di carne. Questo muscolo empie la parte di dentro della polpa della gamba. Il secondo muscolo sta dal lato di fuori della polpa; & nasce della testa di fuori dell'osso della coscia; & di poi scende alla gāba, ne piu ne meno, che l'primo, faccēdo il lato di fuori della polpa. Questi due muscoli, poco poi, che son nati, si congiungono, attaccandosi l'vno all'altro medianti certi fili neruosi, co quali tato piu si mescolano, quāto piu scendono, fin sotto la polpa della gamba, doue d'amēdue si fa vna corda; anchor che il primo comince a restare di esser carnosio, vn poco piu giù, che l'secondo, come in molti huomini robusti si vede sopra la pelle. Questa corda si mescola o congiunge subito con vn'altra

u. t. xv. fi. xvi.
H
x lib. i. ta. ii.
tra l' 14. el
15.

y. t. xii. tra l' c
& l' x.

z. ta. xi. a. ta.
xii. b. t. xiii.
x. t. xiii. f
a. t. xii. b. y

b. t. xiii. x. y

a. t. xii. o. t. i.
p. ta. ii. m. ta.
iii. o. ta. viii.
p. ta. ix. a. ta.
xiii. c. t. iiii.
n. ta. xv. fig.
xvi. a
b. lib. i. t. iiii.
16.

c. t. xii. o
d. t. xii. f. ta.
iii. m. ta. ii. m.
t. iiii. 16. ta.
vii. 9. t. ix. g.
ta. xii. c. ta.
xiii. o. t. xv.
fi. xvi. b
e. t. xii. t. t.
f. la med. o
g. t. xiii. x

h t.xiii. v vn'altra corda d'un musculo, che le sta di sotto, che è il quarto, che muoue il piede, di tal modo, che p niuna via si può distaccar da qlla fin'al calcagno; anzi pare veramete, che di qsta corda, et di quella del quarto, se ne faccia vna, che s'inferisce nell'vltima parte di dietro del calcagno. Il terzo nasce dalla testa di fuori dell'osso della coscia, appresso il ginocchio, con vn principio tondo, & carnoso, & sottile; il quale poco poi, che è nato, si fa largo, facendo la figura propria di musculo. Ma subito di sotto al chino del ginocchio si torna a assottigliare, conuertendosi in vna molto sottil corda; la quale scende, così essa, come il musculo, per di sotto e due primi; & passando per di sopra il quarto, scende alquato in obliquo, infino all'arriuare al lato di dietro della corda de sopra detti muscoli, iui, do ue si cominciano a congiunger colla corda del quarto; & quindi scende fin' alla parte di dentro del calcagno, doue s'inferisce. Il quarto è maggior di quanti ne sono dal ginocchio in giù; & nasce della parte di dietro della congiuntura de due fuselli, cō vn principio neruoso, & forte; il qual scendendo alquato, si fa tanto largo, che cuopre amendue gli stinchi, & alquanto piu, ma non è tanto grosso, come largo; & così va slargandosi piu fin'al mezzo della polpa della gāba; & iui si torna a restringere, a poco a poco, fin presso al calcagno, doue si conuerte in vna gagliardissima, & grossa corda, fatta così di se stessa, come delle corde del primo & secondo; la qual s'inferisce nella parte di dietro del calcagno, che (come nel primo libro habbiamo detto) è aspra, & incauata, perche meglio s'attacchi la corda. Ma sporgendosi l'osso del calcagno piu in fuori, che nō fanno gli stinchi, & essendo questo musculo appoggiato a loro, fu necessario che la corda si separasse dall'osso vn poco in nanzi al fine, & facesse nel mezzo vno spatio di figura di triangolo; il cui fondamēto, o base, è tanto largo, quanto è quello, che esce il calcagno piu, che gli stinchi; & i lati fanno, l'vno la parte di nāzi di questa corda, l'altro la parte di dietro di que muscoli, che habbiā detto star sotto il quarto, nella parte di dietro della gamba. Nel mezzo di questi lati resta vn buco, per doue appiccano i macellari, o beccai i buoi; & per lo quale Achille legò Hettore, quando lo stralcinò d'intorno Troia, secondo che narra Homero. Tornado all' historia, il quarto musculo, dalla parte di fuori (che tocca e due primi) è molto liuido, come anche sono il primo, & secondo da quella, che toccano il quarto. Ma il quarto della parte di dentro non è molto liuido; & le corde sue hanno mescolate certe fibre di carne, che scendono piu per la parte di nanzi, che per quella di dietro; perche ci è molto poco, da doue questa corda e del tutto neruosa, fin'al calcagno. Il quinto musculo e anche situato nella polpa dalla gamba sotto e due muscoli, che diremo muouer le dita de piedi, attaccato alla tela, che congiunge l'vno stinco della gamba all'altro, d'alto a basso; & nasce d'amēdue, iui, doue si cominciano a separare; subito da poi si fa carnoso, & largo; & così scende fin' alla giunta di sotto del minor fusello, occupado con sua larghezza tutto il lato di dietro del maggior stinco; & attaccandosi alle volte alla legatura, & al lato di dentro del minor fusello, piglia forza da quello nel nascere, ma come arriua alla giunta di sotto del minor fusello, si conuerte la parte sua di dentro in vna tonda corda, che si cominciua a vedere nel medesimo musculo vn poco piu in sù; la quale, come si fa manifestamente neruosa, scende per sopra il seno, che habbiām detto hauere il processo del maggior stinco (che chiamamo il tallone di dentro) nella parte di dietro; nel qual seno sta vna legatura intrauerfata, che ha questa corda, perche non sdruccioli; & quindi cammina in obliquo verso la pianta del piede a cāto l'ossa infino all'inferirsi nella piu bassa parte dell'osso del collo del piede, che sta appresso quell'osso simile ad vn dado; il quale habbiām detto far giustamente la figura d'un cunéo, & hauere vna punta, nella qual questo musculo si doueua inferire. Questo musculo e simile al coltello de macellai; perche senza perder niente di carne secondo il largo manda vna corda tonda da vn de lati, la qual passa pel seno, che sta piu appresso il tallone di dentro de i tre, che habbiā detto star tra'l calcagno, & il tallone, & di sotto la legatura intrauerfata, che cuopre questo seno. Il sesto di que, che muouono il piede (che sta nella parte di nanzi della gamba sopra tutti gli altri, & ha propriamente la figura di musculo) nasce della parte di nanzi, doue si congiungono e due fuselli, pigliando principio da amēdue, & dalla lor legatura, con vn principio appuntato, che si allarga subito, facendo vn corpo poco piu largo, che grosso. Ma in nanzi che passi la metà della gāba, si comincia a restringere, fin che assai auanti del collo del piede si conuerte in vna tonda tela; la qual passando sotto d'v-

Libro secondo

na legatura, che attrauerfa dall'vn ftinco all'altro preffo il collo, fcende alla parte di dentro del piede, per vn feno picciolo, che fi fa nelle legature dell'offa del collo col naucolare, infino all'arriuare alla parte di dentro dell'offo del pettine del piede, che foftiene il dito pollice, inferendofi gagliardamente, non in vno proceffo (come dice il Vefalio) anzi in vn feno, che fi vede in quefta parte di quefto offo al principio fuo, (ne poffo penfare, che l'habbia moffo a dire, che quefto offo haueffe in quefto luogo particular proceffo,) & abbracciando la congiuntura delle due prime offa, della pianta, & del collo del piede. Quefto mufculo per lo lato di dentro fi congiunge al lato di fuori della riga acuta del maggior fufello, che chiamiamo lo ftinco, che fi ftorce verfo la banda di dentro, per dar luogo a quefto fefto mufculo, & a que, che diremo paffar fotto di lui. Et per lo lato di fuori fi congiunge dal principio al fine al feftimo di que, che muouono il piede. Il qual nafce con vn ftretto, forte, & neruofa principio, dalla parte di fuori della giunta del minor fufello, & dalle legature, che congiungono in quefta parte l'offa, iui, doue habbiã detto nafcere anche il quarto mufculo, che muoue il piede; & quindi fcende appreffo l'offo faccendofi alquanto piu largo, & pigliando la figura propria di forza. Ma poco dopo el fuo principio fi fepara dell'offo, & paffa fopra l'ottauo mufculo, che muoue il piede faccendofi per tutto lo fpatio, da che fi fepara dall'offo infino alla metà fua, per la parte di dentro carnofo, & roffo, & per quella di fuori, & da lati, liuido, & carnofo, cõuertendofi nel mezzo in vna gagliarda corda. La quale fe ben per la parte di dentro è couerta di carne, come fcende piu in giu della metà dello ftinco, fi fa del tutto neruofa; & conuertendofi in vna tonda corda, fcende alquanto in obliquo verfo dietro, lafciauo fcoperto il tal lone, & paffando per vn feno, che per quefto effetto habbiã detto effere nella parte di dietro della piu bafsa giũta del minor fufello, che è couerto d'vna legatura intrauerfata, che piglia dal minor fufello fin all'offo chiamato veramete il tallone, & infino al calcagno. Et quindi fcẽde verfo la parte di nanzi fin alla piãta del piede; & attrauerfando per quella paffa per vn mezzano feno, couerto d'vn humor vntuofa, & d'vna fottile tela, che fi fa nella parte piu bafsa dell'offo del collo fimile ad vn dado; & va a inferirfi nella radice dell'offo del pettine del piede, che foftiene il dito pollice, in vna afprezza, che per quefto effetto ha nella parte di fuori; & delle volte nella radice dell'offo del pettine, che foftiene il dito di mezzo, Ma nel paffar quefta corda pel feno fopra detto dell'offo del collo, fi fa piu dura, & di natura di cartilagine. L'ottauo mufculo (che fta tutto fotto el feftimo, eccetto la parte di nanzi della corda) nafce dalla parte di nanzi del minor ftinco, alquanto in nanzi, poco piu in giu della giunta di fopra, con vn principio carnofo; & mantenendofi femp̃re nel medefimo modo, fcende attaccato al minor ftinco femp̃re, infino al paffare la fua metà. Et da poi fi conuerte in vna tonda corda, che fi ftorce da canto la parte di nanzi della corda del feftimo mufculo, verfo la parte di dietro del tallone; & paffando anchora per vn feno, che fi fa nell'ultima parte della giũta del minor ftinco, & per di fotto vna legatura intrauerfata, fcende in nanzi, diuidẽdofi vn poco prima, che finifca, in due piccioli rami, che s'inferifcono nel proceffo dell'offo della pianta, che foftiene il dito picciolo. Il nono mufculo nafce d'appreffo la metà della gamba dal lato di fuori del quarto mufculo (che è nella parte di nanzi della gamba, & diftende le quattro dita del piede) con vn principio carnofo; anzi quefto mufculo non è altra cofa, che vn pezzo di carne; il qual fcendendo verfo il collo del piede fi conuerte in vna corda, che paffa per di fotto la legatura, che è intrauerfata fopra il collo; & mefcolandofi nel pettine del piede co mufculi, che le fon di fotto; medianti certi fili neruofi, fi diuide di poi in due parti, che s'inferifcono nella parte di fopra dell'offo del pettine, che foftiene il dito picciolo, vicino doue s'incassa coll'offo fimile al dado. Quefto mufculo lo fanno alcune parti di quel, che diftende le dita, per nafcer di quello, & finire in quello. Io lo contarò tra que, che alzano il piede, o lo ritirano, attento che nõ s'inferifce in niun'offo delle dita. Quefti fon tutti e mufculi, che muouono il piede. De quali il primo, fecondo, & quarto ftanno fituati nella parte di dietro, della gamba; & fanno tutti infieme vna corda; & tirando il calcagno in fu verfo dietro, poſano fortemente il reſto del piede in terra, aiutati alquanto dal quinto; il quale alzando il calcagno aiuta anchora, che ci poſſiamo tener fup̃le punte delle dita. Il terzo fa l'ifteſſo offitio, benchè affai leggiermente. Il feſto, feftimo, & ottauo, & nono (oprando al paro) fanno il mouimento in cõtrario; perche alzando la punta del

Il ſettimo.

L'ottauo mufculo, che muoue il piede.

Il nono.

L'offitio de mufculi, che muouono il piede.

f t. vi. o. t. i. a.
t. ii. x. t. iii. g.
ta. iii. 7. ta.
viii. 4. ta. ix.
x. t. xiii. k. t.
xv. fi. xv. V
g ta. vi. x. ta.
xiii. 9
h la med. x

i la med. 3.

k la med. 5.

l la med. 6.

m li. i. t. vi. fi.
x. a

n t. ii. iii. x.
t. iii. 15. ta.
v. 9. ta. vi. x.
t. ix. 9. t. xiii.
t. xiii. 1 m.
t. xv. fi. xv. a

o t. iii. a. ta.
iii. 8. tau. ii.
preffo l'offo. t.
v. & t. ix. a.
p t. iii. x

del piede dirittamente verso il ginocchio, fanno che noi ci fermiamo sopra il calcagno; oprando tutti que, che distendono il piede, & que, che l'piegano, hor l'vno hor l'altro, mouemo il piede da lati.

De Musculi che muouono le Dita del Piede.

(ap. 39.

MOVONSI tutte le Dita del Piede (eccetto il pollice), nel medesimo modo, che quelle della mano, & per cio hanno quasi e' medesimi musculi. ^a Il primo de quali è quel, che piega i secondi articoli delle quattro dita, congiungendo, quanto si può, la punta del piede col calcagno. Questo musculo è differente da quel ^b della mano, in questo, che è piu corto, & piu largo, & sottile a petto di sua grandezza, & che non nasce de gli stinchi, come fa quel della mano, ma della ^b parte piu bassa dell'osso del calcagno, dalla parte dinanzi del suo tubercolo, che posiamo in terra, con vn principio parte neruoso, & parte carnosio, & tosto che è nato ritorna del tutto carnosio, & allargandosi, a poco a poco, si fa piu largo, che grosso. Et come passa la metà del lungo del piede, si diuide in ^c quattro parti carnose; d'ognuna delle quali nasce vna corda, che va diritta ad inserirsi nella radice del secondo osso del dito, che gli sta all'incontro, & allargandosi di poi s'attacca a tutto l'osso. Queste corde passano in ogni dito per tutto il lungo del primo osso, sotto vna legatura intrauersata, come quella, che habbiamo detto esser nelle prime ossa delle dita, fin che diuidendosi (come quelle della mano) dan luogo, ognuna a quella, che le sta di sotto. ^d Il secondo, & ^e terzo musculo (che piegano il terzo articolo delle quattro dita, & il secondo del pollice) stanno sotto el quarto musculo, che muoue la gamba, & sopra el quinto, al quale son simili in figura, & grandezza, & nascono, ^f Il secondo della parte di dietro della congiuntura, doue si congiungono gli due stinchi, appresso al ginocchio, con vn principio carnosio; & cosi scende a canto al minor stinco, nascendo da lui per alquanto. Di poi passa sopra il terzo musculo, che segue, allargandosi alquato, & sotto el ^g musculo maggiore, che fa la polpa, infino al fine della gamba, & iui getta dalla parte di dentro vna ^h corda tonda, che comincia a vederli vn poco piu in su, & di poi passa sotto d'vna legatura intrauersata per ⁱ vn seno, che per questo effetto habbiamo detto farsi nel lato di dentro dell'osso del calcagno, nel qual s'incassa il tallone. Passato questo seno, & la legatura, entra subito in obliquo sotto el piede tra le ^k corde de musculi, che piegano e' primi articoli della dita, & que, ^l che habbiamo detto storcere le quattro dita verso il pollice; & caminando piu innanzi passa sotto vna legatura per tutto il primo osso del dito pollice; fin'all'inserirsi nel secondo articolo del medesimo dito. Ma nel mezzo della pianta getta questa corda vn ^m ramuscello, che si mescola con alcune corde del terzo musculo, che segue, & insieme con loro aiuta a piegare il terzo articolo del dito indice, & di quel di mezzo. Il ⁿ terzo musculo sta sopra del quinto, che muoue il piede, (come habbiamo detto, al quale è simile, ne piu ne meno, che'l secondo, & scende per la parte di dietro della gamba, insieme col secondo, benché alquanto piu a dentro di lui, perche piglia piu del maggior stinco, che del minore, mantenendosi largo. Et come arriua vicino al calcagno, getta anchora dalla parte di dentro vna ^o corda tonda, che passa sotto d'vna legatura intrauersata per vn ^p seno, che per tale effetto si fa nel mezzo de due seni, che si veggono in questa parte, & quindi scende alla pianta del piede per di sotto la ^q corda del secondo musculo, facendosi come bifurcato. Perche la corda del secondo va di fuori in dentro verso nanzi; quella del terzo, di dentro vn poco in fuori, ristignendosi alquanto, & diuidendosi in altre ^r quattro corde, che vanno, ognuna, ad inserirsi nel terzo osso del dito, che le sta all'incontro, diuidendo le corde del primo musculo, ne piu ne meno, che nelle dita ^s della mano contamo. L'offitio di questo musculo è piegare i terzi articoli delle dita. Di modo, che'l primo musculo piega il secondo articolo delle quattro dita; il secondo & terzo piegano i terzi articoli delle quattro dita, & il secodo del pollice. ^t Dopo a questi seguono dieci musculi, che rispondono a quelli, ^u che stanno fra l'ossa della palma della mano, e quali se ben non sono tanto distinti, come essi, anzi paiono tutti vn pezzo di carne, pieno di fili secondo il lungo della palma, che empie il voto fra osso & osso, & s'inserisce nella radice delle dita da ogni lato, alquato in dentro; pure, perche ci è alcu' segno di diuisione, & per la ragione, che a ciò ne guida, serà bene diuidergli in dieci

Il primo Musculo, che muoue le dita del piede.

Il secodo musculo, che muoue le dita del piede.

Il terzo.

Altri dieci Muscoli.

Libro Secondo

Il decimo quarto.

Il decimo quinto.

Il decimo sesto.

Il decimo settimo.

Il decimo ottavo.

parti, ponendo fra ogni due ossa due muscoli, che seruono a piegare gli primi articoli delle dita. Il * decimo quarto sta nella parte dinanzi della gamba sotto el 7 sesto, che muoueu il piede, & nasce del maggior fusello della gamba, iui, doue si cōgiunge al minore sotto el ginocchio, con vn principio 2 neruoso; dopo el quale subito si fa carnosio, & scende infino alla metà della gamba, & iui nasce di esso vn b pezzo di carne, di che habbiam detto farsi il nono musculo di que, che muouono il piede; & di poi scende per la parte dinanzi della gamba, fin presso alla legatura c intrauersata, che habbiam detto essere nel collo del piede; doue si conuerte in vna corda, che passa per questa legatura, come per vn anello. Ma innanzi che finisca di passare, si diuide in altre d quattro, che si vanno dirittamente ad inferire (faccendosi piu larghe) nelle quattro dita secondo tutto il lungo loro. Et suo offitio è distender le dita, nelle quali finiscono. Il e quinto decimo sta nella parte dinanzi della gamba, parte di sotto del sopra detto, parte sopra il lato suo di dentro, & nasce f del lato di fuori del maggior stinco (iui, doue nasce g la tela, che congiunge i due fuselli) con vn principio carnosio; & quindi scende attaccato alla medesima tela, per tutto il lungo dello spatio, che è tra gli due stinchi, torcendosi alquanto in fuori, & conuertendosi da poi in vna h corda, passa per di sotto la i legatura intrauersata, che sta nel collo del piede, & cammina dirittamente infino all'inferirsi in tutto il lungo del dito pollice. L'offitio di questo musculo è stendere dirittamente il pollice senza storcerlo da lato alcuno. k Il decimo sesto sta sopra il pettine del piede, & nasce delle legature, che congiungono l'osso fa simile ad vn dado al calcagno, presso al lato di fuori del suo osso, con vn principio carnosio (anzi tutto il musculo pare vn pezzo di carne), & camminando in obliquo verso nanzi verso le radici delle dita, si diuide in quattro parti carnose, d'ognuna delle quali ne nasce vna corda. Et di queste corde la prima s'inferisce nella parte di dentro del pollice alquanto in su; la seconda nel dito indice; & così di mano in mano quella, che segue, nel dito seguente, infino al picciolo, a cui solo ordinariamente non manda corda alcuna, eccetto quando ne ha cinque, che è rarissime volte. Questo musculo, benché si potesse, volendo usare vn poco di rigore, diuidere in molti, non dimeno per schifare confusione lo contarò per vn solo, il cui offitio è storcere le dita in fuori. m Il decimo settimo musculo sta nel lato di fuori del piede, & nasce del lato di fuori dell'osso del calcagno, d'vn tubercolo, che habbiam detto esser in questa parte, con vn principio neruoso. Ma poco di poi si fa carnosio, & della propria figura di musculo, & così cammina fin' appresso el dito picciolo, doue si cōuerte in vna corda, che s'inferisce nel lato di fuore del primo osso di questo dito. Mediante questo musculo si allarga il dito picciolo dall'altre dita, & supplisce al difetto della quinta corda, che nel decimo settimo musculo ordinariamente manca; come anchora habbiam detto far nella mano. n Il decimo ottauo sta nella parte di dentro del piede secondo tutto il lungo, & serba anchora la propria figura di musculo, nascendo delle legature dell'osso del calcagno, & del tallone, con vn principio carnosio. Et di poi si va allargando fin presso la metà del piede; doue torna a ristignerfi, facendo fine in vna tonda corda, che s'inferisce nel lato di fuori del primo articolo del pollice. L'offitio di questo musculo è separare il pollice dall'altre dita. Ci restano anchora altri o quattro muscoli, che storcono le p quattro dita in dentro; e quali stanno attaccati, ne piu ne meno, che nella mano, alle quattro corde, che piegano il terzo articolo delle dita. Ma son differenti questi da quelli in questo, che non nascono, come essi, delle tele, che n'falciano le corde, ma della parte di fuori delle legature, che congiungono l'osso del collo, & della pianta, & di poi si diuidono in quattro piccioli muscoli, & ognun di loro s'inferisce nel lato di dentro della radice del dito, che gli sta all'incontro. Hora sono e Muscoli, che muouono le dita del piede, in tutti Venti due.

Delle Legature della congiuntura del Gallone, & di quella del Ginocchio, & di tutte l'altre, che sono, si nella Gamba, come nel Piede.

Cap. 40.

LA Legatura, che congiunge l'Osso del Gallone, col grande, è molto gagliarda, larga, & fortile, come vna tela, & abbraccia d'intorno tutta la congiuntura, ponendosi vna sua parte tra osso, & osso, & faccendosi tanto grossa, & dura, che quasi pare cartilagine;

a t.iiiij. p. t.ij.
v. t.ij. o. t.
iiij. a. t.v. o.
y t.j. p.
z t.iiiij. iu
a la mede. i. r.
b la mede. o.
c ta. iij. o.

d t.iiiij. i. z.

e t.v. o. t.j. p.
t. ij. o. t. iij.
y. ta. iij. i. 4.
t. v. 7.
f lib. j. t. vj. fi.
ix. 5

g ta. xv. fi. xv.
T

h t.v. 7.

i t. iij. o.

k t.v. p. t. vj.
o. t. vj. o.

l lib. j. t. vj. fi.
x. il 4. col. 4.

m t. ij. p. t. iij.
a. t. iij. s.

n t. j. iij. 5. t. iij.
t. t. vj. x. ta.
vij. a. t. xij.
p. t. xij. j. t.

o t. xij. iij. a. t.
xv. fi. xv. H
p t. xij. o.

Gia altre volte si è detto, che le Legature non si possono mostrar nelle figure, per esser tanto sottili, & per ciò le lettere mostreranno solo il luogo loro.

a t. xij. o
b t. x. s

c t. xij. b

d per questa,
& per quelle,
che seguono,
guarda nella
ta. xv. fi. xvij.

e t. vj. o

f lib. i. ta. vii.
fi. xvii.

g tau. xv. fig.
xvii. Y

h la med. a

gine; per la cui virtù, & d'vna cartilagine si congiungono queste due ossa molto gagliardamente, ne piu ne meno, che fanno quelle del pettignone. Ha di piu l'osso grande vna altra ^a legatura tonda, che nasce al lato, doue si congiunge il quinto nodo dell'osso grande col sesto, & finisce in vn processo aguzzo dell'osso dell'ancha; & ^b vn'altra, che nasce del medesimo lato dell'osso grande, & s'inferisce nella giunta dell'osso dell'anche. Le quali (oltre al legare queste ossa piu gagliardamente) sostengono anche il fondamento, & li suoi muscoli. Si vede oltre di ciò ^c vna tela nel buco dell'osso del pettignone, simile a quella, che congiunge gli due stinchi secondo tutto il lungo loro, & diuide e muscoli di fuori da que di dentro. Questa tela ha e fili, che scendono in obliquo in fuore. ^d Le legature principali dell'osso del gallone cō quel della coscia, son due; la prima abbraccia tutta la congiuntura intorno intorno, come si vede in ogni altra congiuntura. Ma è questa legatura molto piu forte, & grossa, che niuna di quante ne siano nel corpo (quello, che uolea tal congiuntura, stando sopra essa armato tutto il corpo) & di tanta importanza, che piglia il nome dalla medesima congiuntura. Et oltre all'esser dura, & grossa, ha parimente vn'altra particolarità, che non s'attacca alla testa dell'osso della coscia, ne meno alla spoda del fosso dell'osso del gallone, ne nasce di loro; anzi abbraccia tutto il collo dell'osso della coscia senza attaccarsi a quello, eccetto appresso il maggior processo, doue s'attacca intorno l'osso; s'attacca anchora all'osso del gallone, poco piu in su dell'orlo del fosso del detto osso. Et questo fu fatto, perche piu facilmente si potesse muouere la testa della coscia; la qual tal volta quasi esce del suo luogo, come è, quando mettiamo il calcagno dell'vn pie nel voto dell'altro. Questa legatura (oltre al fare maggior il seno,) aiuta, che si facilmente non si possa muouere l'orlo del fosso, anchor che ci mouiamo noi con grande sforzo. La seconda legatura, che sta dentro la congiuntura, nasce di mezzo della testa della coscia, di quel picciol buco, che habbiamo detto esser nel suo mezzo, & finisce nel mezzo del fosso dell'osso del gallone, alquanto all'ingiu, in quella parte, nella qual si vede vn poco di grasso. Questa legatura è tonda, dura tra neruo & cartilagine, & serue a non lasciar disluogar la coscia in su, quando pigliamo alcun gran peso. Il ginocchio (oltre la legatura commune) ne ha parimente dell'altre molto gagliarde. Delle quali la prima, che è molto forte, & sta di sotto el chino, nasce di mezzo la parte di dietro del maggior stinco, & monta diritta, faccendo due capi, che s'inferiscono nella parte di dietro delle due teste della coscia, iui, doue stanno piu separate, l'vna dall'altra. La seconda, che sta nel mezzo della congiuntura, è molto gagliarda, & di natura di cartilagine, & nasce tutta della collina, che sta tra gli due seni della giunta del maggior stinco; & s'inferisce nell'ultima parte dell'osso della coscia, iui, doue le teste son piu separate appresso il sopra detto. Oltre a questa legatura, è anchora alle volte nel mezzo del ginocchio vna lubrica, & sottil legatura, dalla parte dinanzi della sopra detta, la quale va parimente dal maggior stinco alla coscia. La terza, che sta nella parte di fuori del ginocchio, è tonda, & forte, & lega gli due stinchi colla coscia, & la parte sua piu bassa sta sotto la testa del ^e settimo muscolo, che habbiamo detto muouere il piede. La quarta legatura sta nel lato di dentro; & è assai piu sottile, & tenera, che la seconda, perche in questo luogo non è bisogno di molto forte legatura, & nasce dal lato di dentro dell'osso della coscia, & cammina verso la quarta legatura, che sta nel lato di fuori verso nanzi. La parte dinanzi, se ben non ha particolar legatura; nondimeno sta molto ben legata colla rotula, & con le corde, che la nfasciano; le quali premon di tal forte la congiuntura, che non ci è bisogno di particolar legatura, ne meno commune. ^f Oltre alle legature dette, è di piu nel ginocchio vna cartilagine particolare, alquanto piu dura, che neruo, & meno che cartilagine; la quale quāto importi alla fortezza di questa congiuntura, gia nel primo libro lo dimostrāmo. Delle labbra di questa cartilagine nascono all'intorno certe legature, che la congiungono al maggior stinco, & all'osso della coscia. ^g Si congiungono anche gli due stinchi per la parte di sopra, mediante vna molto gagliarda legatura, la qual circonda queste ossa intorno intorno, per la banda di fuori (come comunamente fa qual si voglia legatura); per tutto il vacuo fra l'vno stinco, & l'altro, mediante vna ^h sottil, & larga legatura, simile a quella, che habbiamo detto esser fra gli due fuselli del braccio; la qual va dal maggior fusello fin'al minore, & ha certi fili, che scendono in obliquo dal maggior fusello al minore. L'offitio di questa

Le Legature del
l'osso del Gallone,
con la Coscia.

La prima delle
Legature del Gi-
nocchio.

La seconda.

La terza.

La quarta.

Le Legature de
gli stinchi della
Gamba.

Libro Secondo

questa legatura è congiunger gli due stinchi, & separare e muscoli del lato dinanzi, da quelli di quel di dietro, & dar piu forza a muscoli che nascono di lei. Già habbiamo contato alcune delle legature del pie, come son quelle che stanno intrauersate, sotto delle quali passano le corde d'alcuni muscoli; delle quali alcune aiutano anchora a legar l'ossa del piede; altre seruono solamente a guardare, & guidare le corde dette. La prima di queste legature intrauersate sta nel collo del piede, & congiunge gli due stinchi, oltre a che per di sotto lei passano molte corde. La seconda nasce del tallone di dentro, & s'infersisce nell'osso del calcagno, aiutando anch'ella a legar l'ossa. Questa, anchor che paia vna, se si considera con diligenza, son tre, come tre anelli; ognuna delle quali cuopre vn particolar seno, per doue passa vna corda in questo modo; Per quel, che sta piu appresso del calcagno, passa la corda del ¹ muscolo, che piega il secondo articolo del pollice; per la seconda (che sta appresso il primo) passa la corda del ^m muscolo, che piega il terzo articolo delle quattro dita; per la terza passa la corda del ⁿ quinto muscolo, che muoue il piede. La terza legatura intrauersata piglia dal minor stinco fin' al calcagno, & lega queste due ossa; nondimeno per la parte, che cuopre gli due seni, che si fanno in questo luogo, non ferue ad altro, che a tenere, che non sdruciolino le corde del ^p settimo, & ottauo muscolo, che muouono il piede, che passano per loro. Sono anchora nella parte di sotto delle dita del piede certe legature intrauersate, come quelle, che habbiamo detto esser nelle dita della mano, & senza queste di molt'altre. Primieramente vna, che piglia dal maggior stinco al minore, congiungendogli amendue per la parte piu bassa, la quale è larga, & sottile, come sono l'altre legature delle congiunture. Vn'altra, che congiunge gli due stinchi coll'osso del tallone, & è simile alle legature, che communalmente legano le congiunture. Et quattro, che congiungono i quattro lati di questo osso del tallone, con le quattro ossa, che habbiamo detto congiungerli a quello. Et di queste quattro alcune abbracciano l'osso intorno intorno; alcune entrano fra osso, ed osso. La prima di loro comincia dal lato di fuori dell'osso del tallone, & si congiunge nella parte di dentro del processo del maggior stinco, legando queste due ossa. La seconda sta nel lato di fuori, & è simile alla prima. La terza (che è molto gagliarda, & di natura di cartilagine) comincia dalla parte piu bassa dell'osso del tallone, appresso la radice del suo collo, doue si congiunge all'osso del calcagno, & finisce nell'osso medesimo tra e due lati, con li quali si congiunge all'osso del tallone. La quarta congiunge l'osso del tallone col naucolare, nascendo della radice del collo dell'osso del tallone, & inserendosi nel sopra detto, circondando tutta la congiuntura. Oltre a queste quattro, ci è parimente vn'altra legatura sottile come tela, la quale circonda tutta la congiuntura dell'osso del tallone con quello del calcagno, & vn'altra molto forte, che va dal collo dell'osso del tallone, infino all'osso simile ad vn dado. Vn'altra anchora ce n'è, che lega l'osso del calcagno col sopra detto simile ad vn dado; la quale è anche dura, & di natura di cartilagine, ma solamente abbraccia l'articolo. Congiungono l'ossa del collo del piede (come quelle del bracciale) certe legature dure, & di natura di cartilagine, mediante le quali si congiungono anchora al naucolare. Oltre a queste legature ha il collo del piede nella parte di sotto vna gagliarda, & particolar legatura, la quale non solo lega l'ossa sue, ma si pone fra osso, ed osso, congiungendole forte, l'vno all'altro. Restane a contare le Legature del Pettine del piede, & delle dita; delle quali non farò mentione, perche son simili a quelle della mano.

La prima Legatura intrauersata del collo del Piede.

Altre Legature dell'ossa del Piede.

Del Numero de Musculi.

Cap. 41.

HO contato, quanto piu breuemente hò potuto, l'istoria di tutti e Musculi. Il numero de quali difficilmente si può sapere; non perche non si possano contare, ma per esser sopra di ciò diuerse opinioni. Perche alcuni chiamano vn solo il muscolo, che tira il braccio verso il petto, come fo io, mirando la vnione sua; altri il chiamano due, mirando e' diuersi fili; o per auentura tre. Nell'istesso modo chiamo io vno, il secondo muscolo, che muoue le spalle; altri il chiamano due, mirando il vario offitio. L'istesso auuiene del muscolo, che alza il braccio, & di tutti e muscoli triangolari, che muouono la coscia. Contano anchora alcuni e muscoli, fra ogni due coste quattro, attento i diuersi offitij,

offitij, i fili, & il nascimēto, come fo io; altri per due. Nel medesimo modo ci sono molt'al tre differenze nel contare; pure contando secondo la diuisione, che ho fatta nell'historia loro, sono tutti quattrocento noue. Et di questi è da sapere, che due muouono la fronte; tre ogni palpebra de gli occhi; cinque muouono ogni occhio; quattro il naso; & altri quattro le labbra; quattro le guance; otto la mascella inferiore; altri otto l'osso hyoide; dieci la lingua; diciotto il gargarozzo, dieci proprij, & otto comuni. Quattordici muouono la testa; sedici la schiena; quattordici le braccia; otto l'ossa delle spalle; ottantanoue il petto, de quali otto seruono al ventre. Dieci muouono e gomiti; otto i minori fuselli del braccio; otto e bracciali; cinquantasei le dita della mano; quattro il membro; due i testicoli, si ne gli huomini, come nelle donne; vno il collo della vescica; tre il fondamento; venti la coscia; altri venti le gambe; diciotto e piedi; quarantaquattro le dita del piede. Et con questo habbiamo finito l'historia de musculi.

Della tela, che rauuolge l'ossa, detta Perioftion.

Cap. Quarantesimo secondo, et ultimo.

PEr compimento di questo libro restaci solo a trattare della tela, che n'fascia l'ossa per la parte di fuori, chiamata da Greci per ciò perioftion. La quale è vna parte spermatuca del nostro corpo, generata insieme coll'altre sue parti, senza pigliar particular principio da loro; & è fatta d'vna tela sottile & di molto acuto senso; il cui officio particolare è sopplire al difetto del sentire, che è nell'ossa. Habbiamo trattato della pelliciuola, della pelle, del grasso, della tela carnosaf, de musculi, & del perioftion, le quali son tutte le parti, che vestono, & cuoprono l'ossa;



Dichiar. delle Fig. del Lib. II.

Tauola Prima.



Ichiaratione delle lettere delle Figure del secondo libro; & principalmete di quelle della prima, la quale dimostra vn huomo, da cui è tolto la pelle, & il grasso, & le vene, che vāno tra cuoio, & carne, & tutta la tela carnosā, eccetto la parte di quella, che si cōuerie in muscoli. Et è da sapere, che questa è differente in questo da quelle del Vesalio, ch' in questa l'ombra mostrano l'andar de i fili della carne, secondo che particolarmente camminano in ciascun musculo.

- A* L'vn musculo della fronte.
B Quello delle tempie.
CC Quegli, che serrano la palpebra di sopra.
D Quel, ch' apre i ventagli del naso.
G La parte d'auanti dell'osso giogale.
H Vn musculo del labbro di sopra, che manda vn capo al naso.
I Il principio del masticatore.
I Vn musculo largo, il quale faffi della tela carnosā; & aiuta a muouer la mascella di sotto, & per conseguente le guance. Et in quello, che appartiene al principio di questo musculo, dalla K alla L si nota il principio, che nasce dall'osso del petto fin alla metà della clauicola; il quale ha e fili, che montano diritti fin alla M. E da l' L all' N si nota il principio, che nasce dall'altra metà della clauicola, & dalla punta dell'omero, dal quale monta in obliquo verso auanti fin alla O. Et è da considerare, che questo musculo non è ordinariamente tanto largo, come il Vesalio lo dipigne nella terza figura de muscoli; ne anchora si giunge l'vn musculo all'altro, senza il mezzo della tela carnosā, la qual in questa figura è tagliata, per lassar liberi i muscoli.
LK La diuision fra l'vn musculo di questi, & l'altro.
P Il musculo, ch' alza il braccio, di cui in questa figura si vede solo la metà; nella seguente vedrassi il resto notato con la M.
Δ Quello, che congiunge il braccio al petto; il qual vedrassi nella tauola quarta di-

staccato dal petto, & segnato con l'istessa lettera.

- R* La tela di questo musculo, che si giunge co'l primo del ventre.
S La parte carnosā dell'istesso, che nasce dalle cartilagini della sesta, & settima costa.
Q Il fin di questo musculo, il qual nella tauola seguente vedrassi chiaramente.
V Il musculo, che tira in giù il braccio.
5. 6. 7. 8. Questi numeri mostrano, oue s'inferiscono i capi del secondo musculo, che muoue il petto.
Θ Il primo musculo del ventre, il quale insieme col suo compagno lo cuoprono tutto. Et il principio lo mostrano i numeri, che mostrarono il fine del secondo, che muoue il petto; & la riga, che si vede nel mezzo del ventre dalla R alla X, mostra, doue questi muscoli si giungono insieme.
X Il membro scorticato.
Y I condotti del seme.
F I testicoli fasciati in la tela carnosā.
Z Il primo musculo, che piega il gomito.
aa Il secondo.
b Il musculo, che stende il gomito, & nasce dal lato d'auanti della paletta delle spalle.
c Il musculo, che finisce in due corde, & stende il bracciale.
d Quel, che storce il minor fusello all'insù.
e Il piu alto, che storce il minor fusello all'ingì.
Δ Il secondo musculo, che piega il bracciale; di cui la f mostra il principio, & la h la corda.
fb Il musculo, che fa la tela della mano; il cui principio dimostra la i, & il principio della corda la k.
Π Parte delle corde de i muscoli, che s'inferiscono, l'vno nel bracciale, l'altro nel pollice; & sono il musculo vent'vno, & ventidue, che muouono le dita.
i L'osso del primo articolo del pollice scoperto.
k Due muscoli si scuoprono in questa parte; de quali quel, ch' è notato con la p, s'inferisce nel bracciale; & quel, ch' è notato co la q, si diuide in due corde; vna, che s'inferisce nel primo articolo del pollice, & l'altra, che s'inferisce ne gli articoli, che seguono nel medesimo dito.
n Il primo musculo, che piega la gamba; il cui principio mostra la s, & la corda la t; &

TABVLA I LIBRI II



Dichiar. delle Fig. del Lib. II.

la quale

TABVLA II. LIBRI II.



Dichiar. delle Fig. del Lib. II.

	la quale dinisa in tanti anelli, quanti sono i numeri, quantunque quini non si possono ben mostrare.	L'istesso musculo si mostra nella settima figura, alla lettera β; & nell'ottava alla φ, & alla c; & nella duodecima alla ε, & ζ.
d	Il musculo, che congiunge il pollice all'indice.	η L'ottavo, che muoue la gamba.
e	La corda del musculo, che congiunge il pollice all'indice. Perciò di qui auanti fa bisogno anchora auuertire con le lettere del braccio sinistro, & considerarle nelle istesse, quelle, che si videro nel diritto, & alcune di piu. Et prima conuien sapere, che la N, P, S, T, a, b, c, d, e, & i numeri, 4, 5, 6, mostrano l'istesso nella sinistra, che in la diritta; ma particolarmente le lettere del braccio sinistro son le seguenti.	κθ La spina della gamba scoperta; e la θ dimostra la giunta piu alta; & la κ la piu bassa.
z	Il primo, che piega il gomito.	λ Il primo musculo, che muoue il piede; che è quello, che fa la maggior parte della polpa della gamba.
f	Il piu alto, che storce il minor fusello all'in giù.	μ Il secondo musculo, che muoue il piede.
g	Il piu alto di quei, che piegano il bracciale.	ν La piu sottil corda del corpo, che nasce del terzo musculo, che muoue il piede.
h	Quello, che fa la tela della palma.	ξ Il maggior musculo della polpa della gamba, quale è il terzo, che muoue il piede.
i	Quello, ch'empie la parte di fuori della palette delle spalle, & muoue il braccio verso dietro.	π Quello, che piega il terzo articolo delle quattro dita.
k	Il musculo, che tira il braccio verso dietro alquanto all'in giù.	ρ Vna parte del quinto musculo, che muoue il piede.
l. l.	m. n. Il musculo, che tira il braccio all'in giù; il qual nella nona figura si vede di sotto della o, & nella decima di sotto della θ.	ς La legatura attrauersata dal tallone, dentro al calcagno.
Δ	Il musculo, che congiunge il braccio al petto.	τ Quello, che scosta il pollice dall'altre dita.
vv	La punta del musculo, che muoue il petto; il qual s'inserisce nelle otto coste di mezzo, come con otto dita.	υ La legatura attaccata al musculo, che piega i secondi articoli delle quattro dita; che fa il medesimo officio, che la tela della palma della mano.
pp	Il nascimento del primo musculo del ventre.	φ Il sesto musculo, che muoue il piede.
*	Il musculo diritto, che si vede sotto del primo & secondo del ventre.	χ Il settimo.
q	Il primo musculo, che muoue la gamba; il quale nel seguente è notato con la o.	↓ L'ottavo; & la corda di questo, & quella del settimo si veggiono di sotto la ζ.
r	Il sesto musculo, che muoue la gamba.	ω Il musculo, che stende le quattro dita; il cui fine (che si diuide in due corde) è notato con la Ω in questa figura, & nella quarta.
s	Parte del nono musculo, che muoue la gamba; il qual nella quarta figura dimostra la φ.	ΔΔ La legatura, che attrauersa dal minor fusello al maggiore.
t	Il settimo, che muoue la gamba.	Θ La corda del musculo, che stende il pollice.
u	Il primo musculo, che muoue la coscia.	Ξ La giunta di sotto del minor fusello, che fa il tallone di fuori.
x	Il maggior processo dell'osso della coscia.	Σ La legatura, ch'attrauersa dal minor stinco all'osso del calcagno.
y	La parte, che si vede, del secondo musculo, che muoue la coscia; il suo resto è coperto col primo, che muoue la coscia, & col sesto, che muoue la gamba.	Π Il musculo, che separa il dito picciolo dalle altre dita.
a	Il quarto, che muoue la gamba.	
γ	Il secondo.	
β	Il terzo.	
δ	Il quinto.	
ζε	Il quarto, che muoue la coscia; la cui ultima parte mostra la ε; quella d'auanti la ζ.	

Tauola. III.

Questa Figura mostra vn huomo scorticato dalla parte d'auanti, & tolto via il cuoio, il grasso, la tela carnosa, le vene, che vanno tra cuoio & carne, con alcuni musculi; ch'ordinariamēte si leuano

nel

TABVLA

III > LIBRI > II >



Dichiar. delle Fig. del Lib. II.

nel scorticare; perche in tal figura solo si è cerco di dimostrare quello, ch'un buo Pittore suol dimostrare in vn corpo ignudo; a i quali in questa ho voluto feruire; & haurei lor fatto grã disturbo, s'io hauesse lasciato e muscoli; che nascono della tela carnosã. Cõ cio siacosa che non solamente sia necessario conoscer e muscoli superficiali, (se vogliono esprimer bene gli diuersi siti & attitudini, che fa il corpo) ma anchora quelli, che stanno di sotto loro; e così il nascimento loro & fine, come l'offitio, per poter far per meglio, quando hanno da fare vn musculo lungo, o corto; piu rileuato, o piu rimesso & basso. Quanto questo sia vero, ne l'han fatto vedere ne nostri tempi Michelagnolo Buonarruoti Fiorentino, & Pietro Rubiale Spagnuolo; i quali per essersi dati alla Anatomia insieme con la Pittura son venuti ad esser i piu eccellenti & famosi Pittori, che gran tempo si sian veduti. Ma tornãdo al mio proposito, dico che i Pittori hanno sempre da ricordarsi che ciascun musculo tira sempre l'osso, nel quale s'inferisce; e nel tirare si raccoglie verso il suo nascimento gonfiandosi nel mezzo; e quando consente, fa l'effetto contrario, perche fassi piu lungo, & si assottiglia piu nel mezzo. Per il che accade molte volte che tirando il musculo, che stã di sotto, si rileua quel, che stã di sopra; & pensando il Pittore che quel, che opera, sia quel di sopra, lo fa rãcorre.

- A* Le glandole, che stanno fra l'orecchi.
- B* Il musculo dell'osso hyoide, che nasce dalla punta del mento, notato nella seguente con la E.
- C* Il musculo dell'istesso osso, che nasce dalla parte piu alta dell'osso del petto, notato nella seguente con la F.
- D* Il musculo del medesimo osso, che nasce dalla parte piu alta dell'osso della spalla; il qual nella quarta figura sta notato cõ due *VV*; & nella quinta con vna *R* & vna *S*; da i lati della *D* si veggono certi rami del sesto par di nerui, accompagnati dalla ve-

na di fuori del gargarozzo, & dalla arteria del sonno.

- F* Il settimo musculo, che moue la testa; che nasce dall'osso del petto, et dalla clauicola, et s'inferisce nel pcesso simile alla mammella.
- G* Vna parte del secõdo musculo, che moue la paletta delle spalle; il qual tutto si dimostra nella nona figura, sotto della *T*, et della *A*; & nella seguente la metà sotto della *K*, & della *L*.
- H* Per questa parte passano le uene del gargarozzo, et sotto loro si veae il musculo dell'osso hyoide notato cõ la *D*; et è quello, che mostraremonell'ottaua figura sotto della *C*.
- I* La parte dinanzi della clauicola.
- K* Il primo musculo, che moue il braccio.
- L* Il secondo musculo, che moue il braccio.
- M* L'osso del petto.
- NN* Parte del terzo musculo, che moue il braccio, il qual nella tauola passata mostrò la *T*.
- OO* I capi del musculo, che moue il petto; il qual si mostra nell'ottaua figura sotto la *F*.
- PP* Il principio del primo musculo del ventre.
- AA* I muscoli diritti, che si veggono sotto el primo & secondo del ventre.
- Q* Il primo musculo, che piega il braccio.
- RR* La parte carnosã di dietro del detto musculo.
- SS* Il secondo musculo, che piega il braccio.
- T* Il primo musculo, che stende il braccio.
- V* Il piu alto musculo di quei, che storcono il minor fusello in giù.
- X* Il musculo, che piega la palma della mano.
- Y* Il primo musculo della mano, che fa la tela di quella; dalli cui lati si dimostra il musculo, che piega i secondi articoli delle quattro dita; il quale nella quinta figura è notato con la *Θ*.
- a* Il musculo, che piega il bracciale.
- b* Il musculo, che moue il minor fusello in sù.
- b* Il musculo, che stende il bracciale, & finisce in due corde.
- c* Due muscoli, de i quali l'vno inuia vna corda all'osso del bracciale, che sostiene il pollice; l'altro spartendosi in due, indirizza l'vna al primo osso del pollice, & l'altra al secondo & al terzo.
- d* La corda del musculo, che congiunge il pollice con l'indice.
- e* Le corde, che s'inferiscono nella parte di fuori dell'indice.
- 3.4.* 5. 6. Le legature attrauersate, che si veggono nella parte di fuori del bracciale; le quali nõ si possono bene mostrar in pittura.
- b* Il musculo, che congiunge il pollice all'indice.

i	Il muscolo, che separa il pollice dall'indice; e al cui lato è quello, che piega il primo articolo del pollice.
q	Il muscolo, che aiuta stender la tela della mano, del quale il Vesalio non ha fatto menzione.
k	La tela carnosaf, che inuolge i testicoli.
l	Le glandole dell'inguinaglie.
m	L'ottauo muscolo, che muoue la coscia, il quale nell'ottana figura è notato con la Z.
n	Il principio del sesto muscolo, che muoue la coscia, il qual nella tauola viij è notato con la O.
o	Il primo muscolo della gamba.
p	Il secondo, che muoue l'istessa gamba.
q	Il sesto, che muoue la gamba; la cui parte piu alta è carnosaf; & la tela, che nasce di essa, è rileuata, acciò che si vegga ne i muscoli.
r	Il secondo, che muoue la coscia; il quale nella decima tauola è segnato con la Z.
s	Il settimo, che muoue la gamba.
t	Il nono.
u	L'ottauo.
xy	La corda del quarto, che muoue la gamba.
z	Lo stincho tutto scoperto.
a	Il sesto muscolo, che muoue il piede.
b	Quello, che stende le quattro dita del piede.
c	Il nono, che muoue il piede.
d	La corda del muscolo, che stende il pollice.
e	La legatura attrauersata sopra il collo del piede, sotto la quale passano le corde d'al cuni muscoli, che vanno al piede.
f	Il tallone di fuori scoperto.
g	Il settimo muscolo, che muoue il piede.
h	Il secondo, che muoue il piede.
i	Il primo muscolo, che muoue il piede.
k	La corda del quarto muscolo che muoue il piede.
l	Il muscolo, che piega il terzo osso delle quattro prime dita.
m	Vna parte del quinto, che muoue il piede; ma così questo, come tutto'l resto di quei, che si veggono nella gamba sinistra, si veggono meglio nella figura passata.
n	Vna legatura attrauersata dal tallone al calcagno.
o	Il muscolo, che piega il pollice in dentro.
p	Il muscolo, che congiunge il pollice all'altre dita.

Tauola. IIII.

Questa Figura dimostra molti muscoli, che nelle passate erano in suo luogo, & hora ne pendono; & sono scoperti de gli altri, che nelle passate non si vedeano; & l'istesso mostreranno l'altre figure fin'all'ottaua, nella qual faranno gia quasi scoperte l'ossa.

T	Il muscolo delle tempie, il cui principio è notato con la A, B, C.
ABC	La parte di fuori dell'osso giogale.
D	Il masticatore.
E	L'un principio di questo muscolo, che comincia dalla mascella di sopra.
F	L'altro principio, che comincia presso all'orecchia; tutto il principio si vede dalla E alla F.
G	La parte piu bassa, doue tal muscolo s'inserisce.
H	Vn ramuscello del terzo paio di nerui della ceruella, che passa per questa parte al muscolo della fronte dal suo lato.
I	Vn altro ramuscello dell'istesso neruo, che va al labbro di sopra.
K	La cartilagine, in cui finisce l'osso del naso di questo lato.
L	I ventagli del naso.
M	Il muscolo, che muoue le guance; che nasce d'una mascella, & finisce nell'altra.
N	Il muscolo, che muoue particolarmente il labbro di sotto.
O	Vna parte del muscolo, che muoue la mascella di sotto, all'in giù.
P	Qui è posto l'osso hyoide, benché non si veda.
Q	Il muscolo, che nasce del processo simile ad vn punaruolo, & s'inserisce nell'osso hyoide.
R	Il muscolo, che nasce dalla mascella inferiore, & s'inserisce nell'osso hyoide.
ST	I due muscoli, che nascono dall'osso del petto, & s'inseriscono nell'osso hyoide.
VV	Quello, che nasce dalla parte piu alta della paletta delle spalle, & s'inserisce nell'osso hyoide.
Θ	Il settimo muscolo, che muoue la testa; il quale ha due principij notati con la X, & con la Y.
XY	Il fin di questo muscolo.
Z	La parte di nanzi della clauicola.
a	

Dichiar. delle Fig. del Lib. II

b	Il fine del secondo, che muoue la paletta delle spalle.	tro dita; la cui corda si vede nella palma notata co' l z, piu di sotto.
c	La vena giugulare esteriore; & alcuni nervi, che vanno al braccio.	≡ Quel che piega il bracciale; il cui principio dimostra la γ, & il fine la δ.
d	Il primo musculo, che muoue il petto; che nasce dalla clauicola, & s'inserisce nella prima costa.	γδ Il piu alto, che piega il bracciale; che è sospeso dal suo fine.
≡	La parte dinanzi del musculo, ch'alza il braccio; quella di dietro si vede nella decima figura sotto la lettera Δ; & la figura, che seguita, mostra questo musculo distaccato, & notato con la γ; ma in questa figura la e, & la f, & la g mostrano questo mezzo musculo, come in triangolo.	ζ Quel, che piega il primo articolo del dito picciolo in fuori.
e f g		η Quel, che discosta il dito picciolo da gli altri; che è sospeso dal suo fine.
h	Il fin di questo musculo, che congiunge il braccio al petto; il qual nel braccio sinistro è notato con la Q & la T; & il musculo è notato con la Δ, K, L, R, accio si potesse conferire con quel della tavola terza, al quale risponde in figura.	θ La legatura attraversata, che sta nella parte di dentro del bracciale.
QT Δ		ι Il maggior musculo, che piega il primo articolo del pollice.
K L R		κ Quel, che divide il pollice dall'indice.
i	L'osso del petto scoperto.	λ Il musculo, che fa la tela della palma; che sta sospeso dalle punte delle dita.
2.3.4	La seconda, terza, & quarta costa; il resto si conosce senza segnali.	μ Il secondo, che muoue la coscia.
k	Il primo musculo, che muoue la paletta delle spalle.	ν Il primo, che muoue la coscia.
l	Il secondo, che muoue il petto.	ξ Il lato di fuori dell'osso del gallone.
m	Parte del musculo, che tira il braccio in giù.	ϑ Il maggior processo dell'osso della coscia.
n	Il fin del musculo diritto del ventre.	ϕ Il nono musculo, che muoue la gamba; il cui principio dimostra la ο; & il principio della corda la π, & doue la corda si congiunge con l'altre, che le sono di sopra, dimostra la ρ.
o	Il primo musculo del ventre distaccato, & mandato verso dietro.	9π Il settimo, che muoue la coscia.
π	Il secondo musculo del ventre, che è circondato con la ο, con la η, & con le due pp.	ρ Il sesto.
pp	Vna parte del primo musculo del ventre, che restò attaccata alla linea bianca, che si vede nel mezzo del ventre; & la p piu bassa mostra particolarmente la sostanza del membro, & come sia attaccata all'ossa del pettignone; & i due cerchi maggiori son due corpi di lei; il minore è il canale dell'orina, & del seme.	υ L'ottavo.
r	I condutti del seme.	τ Il quinto.
s	Il musculo de testicoli, il quale mostra la figura xxij. del terzo libro.	φ Il secondo musculo, che muoue la gamba.
t	Il primo musculo, che piega il gomito.	χ L'ottavo.
q	L'osso del braccio.	ω Il settimo.
u	Quello, che stende il gomito; & nasce del lato piu basso della paletta delle spalle.	2 Il primo.
x	Il secondo, che piega il gomito.	3 Il sesto.
y	Il piu alto musculo, che sforce il minor fusello in su.	4.5.6 Il sesto, che muoue il piede, che pende dal suo fine, ne piu ne meno, che i due sopra detti.
a	Il maggior musculo di quei che storcono il minor fusello in su.	7 Il settimo.
β	Quel, che piega i secondi articoli delle quat	8.9. Il maggior processo scoperto, dal cui s'è tolto via il sesto musculo del piede; ma il 9 mostra particolarmente il tallone di dentro.
		ϑ Il musculo, che stende le quattro dita del piede; il cui principio dimostra il 10; & l'11 mostra, di doue nasce l'altro, che chiamamo il nono, che muoue il piede, & in questa figura è notato con la Ω; il 12 mostra, doue si sparte in quattro corde.
		Ω Il nono, che muoue il piede, che si divide in due corde notate con il 13.
		13 Quello, che stende il pollice.
		14 L'ottavo, che muoue il piede.
		16 Il secondo, che muoue il piede.



Dichiar. delle Fig. del Lib. II.

Tauola. V.

Questa Figura e differente da quella del Vesalio; cio è, ch'in questa non si vede altro, che i musculi, che si trouano nell'huomo; & nella sua se ne veggono alcuni, che si truouano nelle scimie & altri animali bruti.

- A** Il buco del ciglio, per lo qual passa vn ramo del terzo par di nerui al musculo della fronte.
- B** Il musculo delle tempie.
- C** Qui manca vna gran parte dell'osso giogale, acciò si possa vedere la congiunzione del musculo delle tempie con il masticator, la qual mostra la D.
- D** Il buco, per il qual esce il ramo del terzo par di nerui, che va al labbro di sopra.
- F** Il musculo delle guance, che nasce d'vna mascella, & finisce nell'altra.
- G** Dall'vna parte, & dall'altra di questa lettera passa vn neruo, che va al labbro inferiore; & dalla parte di sopra si dimostra la sustanza spugnosa del labbro.
- HI** Il musculo, che tira all'inghià la mascella inferiore.
- K** Parte del primo musculo della testa, che nasce dall'osso del petto.
- L** L'osso hyoide.
- M** Il primo, & secondo musculo della lingua, che nasce dell'osso hyoide.
- N** La prima cartilagine del gargarozzo, chiamato la Noce.
- O** Il musculo, che nasce dell'osso hyoide, & s'inferisce nella Noce.
- P** Quello, che nasce dell'osso del petto, & s'inferisce nella Noce; da i cui lati si veggono l'arteria del somo, e la vena giogolare interiore, & il neruo della testa notato con vna*.
- Q** La parte dinanzi della canna del polmone.
- RS** Il musculo dell'osso hyoide, che nasce dalla punta della paletta delle spalle.
- T** Parte del secondo musculo della testa.
- V** Il terzo, che muoue la paletta delle spalle.
- X** Il terzo musculo, che muoue la schiena.
- Y** La clauicola staccata dall'osso del petto.
- Z** Il primo musculo, che muoue il petto, il

qual è attaccato alla clauicola.

- a** Il piu alto processo della paletta delle spalle, chiamata la punta dell'omero.
- b** Il piu basso.
- c** La quarta legatura di questa congiuntura.
- d** Vn'altra legatura tonda, che nasce dalla punta del processo piu basso della paletta, & finisce nella parte dinanzi della testa dell'osso dell'omero.
- e** La seconda legatura tonda, che nasce dalla parte piu alta del seno della paletta, nel qual s'incassa il braccio, & finisce in la parte di nanzi della testa dell'omero.
- f** In questa parte si congiungono le due legature, notate con la d & con la e, & fanno come vna legatura attraversata; sotto della quale passa il principio di fuori del primo musculo, che piega il gomito, & è notato con la z.
- g** L'osso del petto, a cui da ciascun lato si congiungono 7 cartilagini delle sette prime coste.
- h** La prima costa.
- i k l** Il primo musculo della paletta delle spalle; il cui principio notano la i & la k, & il suo fine la l.
- m** Il musculo, che nasce dal lato piu basso della paletta, & s'inferisce nelle otto coste piu alte.
- n o** Il musculo diritto del ventre; il cui principio carnosio dimostra la n; il neruoso la o, del quale nasce quasi tutto il musculo; & dalla p alla q si congiunge al suo compagno dall'altro lato; pure dalla q, o da l'ombilico auanti si va sempre scostando a poco a poco, insino al fine; & la q dimostra, doue s'attaccano i muscoli, che vanno in obliquo a gli attraversati col mezzo d'vna tela sottile.
- u u r** Il fine di questi tre muscoli diritti; & le tre u, u, u, notano l'impressioni bianche, che in questi due muscoli si fanno al lor trauerso.
- x s** Questa riga nota vna parte del musculo, che monta in obliquo, iui, doue si congiungono al trauerso, che a gran fatica si possono dispartire.
- y** Il musculo attraversato del ventre.
- a** Il musculo del ventre, che monta in obliquo rinolto verso dietro.
- β** Parte dei condotti del seme.
- γ** La parte di dentro di quella di nanzi del primo musculo del braccio.

il fine

TABVLA V

LIBRI II



Dichiar. delle Fig. del Lib. II.

- δ Il fin di questo muscolo.
 ε L'osso dell'omero scoperto, fra i due principij del primo muscolo, che piega il gomito.
 ζ Il primo muscolo, che piega il gomito.
 η Il muscolo, che stende il gomito; & nasce dalla parte piu bassa della paletta delle spalle.
 θ L'ultimo muscolo, che piega il gomito.
 ι Il piu alto di quei, che piegano il minor fusello in verso giù.
 κ Il piu lungo di quei, che muouono il minor fusello.
 λ Quel, che piega il secondo osso delle quattro dita, il cui principio dimostra la λ & il fine, doue comincia a conuertirsi in corde, dimostra la μ.
 μ La legatura attrauersata, che è nella parte di dentro del bracciale; la qual è doppia verso i lati; & particolarmente la ν dimostra il muscolo primo, che piega il primo osso del pollice, & la ξ quel, che storce in fuori il primo articolo del picciolo.
 ο Le corde, che piegano i secondi articoli delle quattro dita.
 π Parte del muscolo, che piega il terzo articolo delle quattro dita.
 ρ La corda del muscolo, che piega il terzo articolo del pollice.
 * Il muscolo, che piega il bracciale; attaccato al minor fusello.
 ς Il secondo muscolo, che muoue la coscia.
 τ Qui si dimostra (ben che assai coperta) la testa dell'osso della coscia, che s'incassa nel gallone.
 υ Il maggior processo dell'osso della coscia.
 φ Il settimo muscolo, che muoue la coscia.
 χ Il sesto. ↓ L'ottauo. ω Il quinto.
 Δ Il settimo muscolo, che muoue la gamba; il cui principio dimostra il 2; & il luogo doue la corda si congiunge con le corde dell'ottauo & nono, che muouon la gamba il 3, & il fine, doue s'inferisce il 4.
 2. 3. 4. L'ottauo; & la Π mostra particolarmente la impressione, che facena il nono, che muoue la gamba, ch'è appiccato al ginocchio, & notato con vn ς.
 Σ Qui sta appiccato in secondo muscolo, che muoue la gamba.
 ζ Lo stinco scoperto da tutti i muscoli, eccetto quel che stende il pollice.
 φ7 Quello, che stende il pollice, la cui corda mostra il 7.
 8 Il settimo, che muoue in pie.
 9. L'ottauo.

- ν Quel pezzo di carne muscolosa, che si diuide in quattro parti, che mandano quattro corde, le quali separano il pollice, & le tre dita in verso fuori.
 ο Quel che stende le quattro dita insieme con la parte di quelle, che contano per il nono tra quei, che muouono il piede, il quale è notato con la ξ.
 &

Tauola. VI.

Questa Figura ha la Testa riuolta verso dietro; la Mascella inferiore diuisa nel mezzo del mento, e riuolta da i lati, accioche si vegga meglio il muscolo, che sta nascosto nella bocca, & le glandole delle fauci.

- A Qui si mostra, come s'inferisce il muscolo delle tempie nel processo della mascella; & perciò è tagliata vna parte dell'osso giogale.
 B Il processo aguzzo della mascella inferiore.
 C La parte di dentro di questa mascella.
 D Il muscolo, che è nascosto nella bocca.
 E La vngola appiccata al palato.
 F Le glandole o stranguglioni, o gangole.
 G La lingua, dopo la quale appare la coperta del gargarozzo, o gorgozzule.
 H Qui si veggono certi muscoli intricati, che muono la testa & il collo.
 I Il muscolo, che tira in verso giù la mascella inferiore.
 K Il terzo che muoue la paletta delle spalle.
 L Le glandole, che sono da i lati della Noce.
 M La canna del polmone.
 N Son qui certe vene, nerui, & arterie, che passano insieme alla canna del polmone.
 O Il terzo, che muoue la schiena.
 P Il primo.
 Q Il secondo.
 R Il secondo che muoue il petto.
 ST La terza costa & la terza cartilagine; come si vede in questa, puossi veder nel resto.
 VX La V mostra il muscolo fra la terza & quarta costa; e la X. dimostra quello, ch'è fra le due cartilagini di queste due coste.
 a La vena & arteria, ch'escono appresso la forcella dello stomaco, & si distribuiscono per li muscoli diritti.
 Δ Il muscolo attrauersato del ventre.
 b Il luogo, doue ql, che mōta l'obliquo, si cōgiū



Dichiar. delle Fig. del Lib. II.

	ge allo attraversato presso al musculo diritto.	λ	Il minore, che piega l'istesso articolo, che resta sotto el maggiore; & fra l'vno & l'altro resta l'osso scoperto.
c	L'asprezza, doue si congiunge il musculo, che monta in obliquo al suo compagno.	μ	Quel, che piega il primo articolo del dito picciolo verso fuori; & il principio, che si vede auanti il principio di questo musculo, e la testa del maggior fusello, di doue nasce vna forte legatura, che lo congiunge al bracciale.
d	Il pertugio, di doue escono i condotti del seme nell'huomo.	ν	Il terzo musculo, che muoue la coscia.
e	La vena & arteria, che si distribuisce per il musculo diritto a suoi contorni.	ξ	il maggior processo dell'osso della coscia.
f	L'vn musculo diritto, che pende dall'osso del pettignone.	ορ	Il settimo.
g	L'osso del gallone scoperto.	ρ	L'ottauo.
h	La pita della paletta delle spalle, nella qual s'inferisce il terzo musculo, che muoue questa paletta, notato con la K.	π	Il seflo.
i	Il processo piu alto di questa paletta.	ς	Il quinto.
k	il quinto musculo, che muoue il braccio.	π	L'ottauo musculo, che muoue la gamba, & abbraccia quasi tutto l'osso della coscia.
l	il processo di dentro di detta paletta.	π	Il seno di questo musculo, qual empie il nono, che muoue l'istessa gamba.
ο	Il primo musculo, che piega il gomito; il cui principio di fuori, che nasce dal labbro del seno, nel qual s'incassa l'omero, dinota la m; & il principio di dentro nota la n; & nell'altro braccio la n nota la parte nervosa, & la o la carnosia.	υ	La parte carnosia di questo musculo, che è rileuata come mezza palla.
mn		φ	Il settimo musculo, che muoue la gamba, che pende dal suo fine.
o		*	La girella del ginocchio.
p	Doue si congiungono questi principij.	χ	La parte del quarto musculo, che muoue la gamba, che nasce dall'osso della coscia; et la λ mostra la parte di quel, che nasce dalla giunta dell'osso del gallone.
q	Il principio della corda di questo musculo.	Σ	Il maggior stinco della gamba scarnato, & particolarmente la legatura, che lega i due stinchi dalla parte, oue son separati.
r	L'ultimo musculo, che piega il gomito.	ω	Il tallone di fuori, & vna parte del stinco minore scoperto.
s	Quello, che stende il gomito, & nasce dal lato piu basso della paletta.	φ	Il settimo musculo, che muoue il piede; il cui principio dimostra il 2; & il 5 il principio della corda; & il 4. dimostra la parte carnosia di nazi, et il 3 quella di dietro.
Δ	Il piu largo di quei, che muouono il minor fusello; la parte piu alta del quale (che può veder si) nota la t, & la fine la u.	3.	L'ottauo musculo, che muoue il piede, che resta quasi tutto sotto del settimo.
tu		ψ	La corda di questo musculo ripiegata ver la parte di dietro del tallone di fuori.
x	Il piu alto di quei, che storcono il minor fusello all'insù.	Ω	Quella carne muscolosa, col cui mezzo il pollice & le tre dita, che gli son vicine, si storcono in fuori.
Ξ	Quello, che piega il terzo articolo delle quattro dita; il cui principio dimostra l'a; et la β dimostra, doue si sparte in quattro parti carnose, di che nascono quattro corde, che vanno a inserir si nel terzo osso delle quattro dita, trapassando le corde di quello, che piega il secondo articolo de medesimi, come qui si vede. Et per maggior chiarezza la γ mostra la corda, che piega il terzo articolo del dito di mezzo; & la δ quella, che piega il secondo.	7	Il settimo, che stende il pollice.
αβ		8	Il musculo, che muoue il dito picciolo in fuori.
γ		9	Il secondo musculo, che muoue il piede.
δ		X	Quello, che muoue il pollice verso dentro.
ε	Quel, che piega il secondo articolo delle quattro dita.		
ζ	Queste lettere douriano mostrare i quattro muscoli, che congiungono le quattro dita al pollice, ma non si possono ben vedere in questa figura per esserui le corde di quei che piegano le dita di sopra.		
ηθ	Quel, che piega il terzo articolo del pollice, la cui corda dimostra la θ.		
κ	Il maggiore, che piega il primo articolo del pollice, che è sospeso dal fine.		

Tauola. VII.

Questa Figura resta alquanto cadete in dietro, accio possa meglio mostrar la Diaframa.

L'vgola



Dichiar. delle Fig. del Lib. II.

p114



Dichiar. delle Fig. del Lib. II.

L	piu alto e di dentro, dimostra la L; & il piu basso, e dalla parte di fuori, dimostra la M; & il suo fine mostra la N.	u	Parte del musculo, che piega il terzo articolo delle quattro dita.
MN	Il minor fusello del braccio.	x	Parte del quinto musculo, che muoue il piede.
O	Il maggiore.	y	Il piede nudato di tutti i muscoli, solamente con le legature, che sostengono l'ossa.
P	Parte della corda del primo musculo, che piega il gomito.	a	L'osso del petto insieme con le coste, riuolto quel di dietro in nanzi.
Q	Pende dal suo fine il piu alto musculo, che storce il minor fusello in giù.	1.2.	3, 4, 5, 6, 7. Questi numeri mostrano le cartilagini delle sette coste intiere; il resto son delle mendoze.
R	Pende dal maggior fusello del braccio il musculo piu basso, che storce il minor e i giù.	β	Il sesto musculo, che muoue il petto.
S	La legatura, che congiugne il maggior fusello del braccio al bracciale.		
TV	I muscoli, che piegano il secondo articolo del pollice.		
X	Gli otto muscoli, che si veggono fra l'ossa della palma della mano.		
Δ	Il musculo, che piega verso dentro il primo osso del pollice.		
Υ	Il sesto musculo, che muoue la coscia; il cui principio dimostra la a; & il b mostra, doue comincia a far la corda.		
Θa	Il settimo musculo, che muoue la coscia.		
b	L'ottauo.		
Λ	Il nono, che muoue la schiena.		
Σ	L'osso grande, da i cui buchi di nanzi si veggono uscire alcuni nerui.	A	Il musculo delle tempie.
Ξ	Il quinto musculo, che muoue la coscia; la cui parte d'auanti mostra la φ, & quella di dietro la c.	B	L'ossa giogale.
Π	La parte di nanzi dell'osso del pettignone scoperta.	C	Il musculo masticatore, appresso del quale si vede l'orecchio & glandole, che gli stian di dietro.
Φc	Il nono musculo, che muoue la coscia; ch'occupa la parte d'auanti del forame dell'osso del pettignone.	D	Il primo musculo, che muoue la testa.
e	La corda del settimo musculo, che muoue la gamba, notata con la g, & quella dell'ottauo notata con la h, & quella del nono notata con la i.	ΓΔ	Il secondo musculo, che muoue la paletta delle spalle, & della testa, simile alla colla del scapolare de i frati; il cui principio è notato con la E & la F. Nasce similmente dalla E alla G, di tutte le punte de i processi di dietro de i nodi del collo, & delle spalle, fin che giunge al loro ottauo nodo.
ghi	La girella del ginocchio.	EFG	In fin di questo musculo, che s'inferisce nella spina della paletta delle spalle, & nella punta dell'omero, & nella parte piu larga di dietro della clauicola.
k	L'ottauo musculo, che muoue la gamba.	HI	In questa parte fa questo musculo vna tela come vn mezzo arco.
l	La parte d'auanti del maggior stinco, scoperta del tutto.	*	In questa parte il collo si congiugne a i nodi delle spalle.
m	La parte d'auanti del minore, similmente scoperta.	K	Il secondo musculo, che muoue il braccio.
n	La legatura fra gli due stinchi.	L	Il quinto.
o	Qui si veggono quegli muscoli, che nella sesta tauola son notati con la φ & con la ψ; e quali sono il settimo & ottauo, che muouono il piede.	M	N Il terzo.
*	Il primo & secondo, che muouono il piede.	O	Il quarto; il quale nella tauola seguente mostreremo con la θ.
pq	Doue la corda di questi muscoli si congiunge alla corda del quarto dell'istesso piede.	P	Parte del primo musculo del ventre.
r	Il quarto musculo, che muoue il piede, di cui il principio della corda dimostra la f.	Q	Qui si scuopre il musculo, che piega il gomito.
st		R	L'ultimo, che piega il gomito.
		S	Quello, che stende il gomito, e nasce dal collo dell'omero.

L'altro

TABVLA IX

LIBRI II



Dichiar. delle Fig. del Lib. II.

T	L'altro, che'l stende, che nasce del lato piu basso della paletta delle spalle.				insieme con vna molto grossa vena, & vna arteria.
V	La punta del gomito scoperta.	e			Il primo musculo, che muoue il piede.
X	Il musculo, che volta il minor fusello verso in sù.	ζ			Il secondo. θ L'ottauo.
γ	Quel, che finisce in due corde, & stende il bracciale.	η			Il settimo.
Z	Il musculo, che stende le tre dita di mezzo; il cui principio nota la a; & la b mostra, doue resta d'esser carnosio.	ι			Parte del minor stinco scoperto, & il tallone di fuori.
ab		κ			Una parte del nono musculo, che muoue il piede.
⊙	Il musculo, che stende il dito picciolo. La mescolanza di queste corde con quelle delle altre dita in questa figura è notata secondo che piu ordinariamente si vede.	λ			Quel, che discosta il dito picciolo dell'altre dita.
Δ	Il musculo, che stende il bracciale; il cui principio è notato con la c, & il fine con la d.	μ			Parte delle corde ne nono musculo, che muoue il piede, che stendono le quattro dita.
cd		ν			Il tallone di dentro.
ΞΞ	Quel, che piega il bracciale, & finisce nel suo ottauo osso.				Tauola. X.
q;	Parte del musculo, che fa la tela della mano.				I N questa Figura manca tutto il musculo secondo, che muoue la paletta delle spalle, & il suo compagno; gli altri poi stan pèdenti dal suo fine.
e	Di questi due muscoli, che vanno in obliquo, l'vno è quel, che mada vna corda all'osso del bracciale, che sostiene il pollice; l'altro manda vna corda al primo osso del pollice, & vn'altra al secondo, & terzo.	A			L'vn musculo del primo paio, che muoue la testa.
f	Quello, che stende il pollice verso l'indice.	BB			L'vn musculo del secondo paio.
g	Quello, che congiunge il pollice con l'indice.	C			Il terzo, che muoue la paletta delle spalle.
h	Quel, che discosta il dito picciolo dall'altre dita.	D			La clauicola.
π		E			Il terzo, che muoue il petto; che nella seguente è notato con la F.
ikl		IG			Il quarto, che muoue la paletta delle spalle, notato d'intorno con la G, H, I, K.
mn	Il primo musculo, che muoue la coscia, ch'è notato d'intorno con la i, k, l, m, n, & dalla i alla k notasi il principio, che nasce dalla spina dell'osso del gallone; & dalla k alla l notasi il principio, che nasce del condione, & del fin dell'osso grande (nella qual parte si congiunge quel dell'vn lato a quel dell'altro); la m mostra la parte piu alta, doue s'inferisce; & la n dimostra la piu bassa.	HIK			Il quinto, che muoue il braccio.
		L			La spina della paletta delle spalle, & la punta dell'omero.
		M			Il secondo musculo, che muoue il braccio; la cui parte di dietro (che è quella, che si vede in questa figura) è notata cō la N, O, P.
		Δ			Il sesto. R Il terzo.
		NOP			In questa parte si veggono certi muscoli, che muouono la schiena; & il quarto, che muoue il petto.
		Q			Il quarto, che muoue il braccio; il cui principio piglia dalla S, alla T; & la V mostra quasi doue s'inferisce; & la X dimostra la parte, doue comincia a non nascer piu dell'osso del gallone.
		⊙			Il canto piu basso del lato piu largo della spalla.
		STV			Parte del primo musculo del ventre.
		X			Quello, che stende il gomito, & nasce del lato piu basso della paletta delle spalle.
		γ			Quello, che'l stende similmente, & nasce dal collo dell'osso dell'omero.
		Z			Parte del musculo d'auanti, che stende il gomito.
		a			Parte di q̄l di dietro, che fa l'istesso officio.
		b			Il piu lungo, che storce il braccio in sù.
		c			
		d			
		e			

Quello

TABVLA · X ·

LIBRI · II ·



Dichiar. delle Fig. del Lib. II.

f	Quello, che ha due corde, & stende il bracciale.	μ	Il settimo musculo, che muoue la gamba.
g	Vna legatura, che lega la parte piu alta del minor fusello all'osso dell'omero.	φ	Il terzo, il cui principio nota la v; & il principio della corda segna la ξ; & il fine si vede nella prima figura, segnato cō il 3.
h	Il maggior fusello scarnato.	χ	Il quarto musculo, che muoue la gamba.
i	Quel, che piega il bracciale, & s'inferisce nel suo ottauo osso.	π	Il quinto.
Λ	Queste tre lettere notano tre principij de musculi, che nascono del maggior fusello.	ρ	Parte del quinto, che muoue la coscia.
Π	Il primo de quali è segnato con la Λ; & è il minore, che storce il braccio in sù. Il secondo è notato con la Ξ; & è quel, che si diuide in due parti, segnate con la κ & con la λ; & la κ dimostra quella, che mada vna corda all'osso del bracciale, che sostiene il pollice; la λ mostra la parte piu bassa, la qual si diuide similmente in due; l'vna delle quali, ch'è segnata con la μ, s'inferisce nel primo osso del pollice; l'altra, che dimostra la ν, s'inferisce nel secondo & terzo osso dell'istesso. Il terzo principio, che è notato con la Η, si sparte anchora in due parti, che si mostrano con la ο, & cō la π; delle quali la piu alta s'inferisce nelle tre ossa del pollice; la piu bassa nell'indice, & in quel di mezzo.	σ	Il secondo, che muoue la gamba.
k	con la λ; & la κ dimostra quella, che mada vna corda all'osso del bracciale, che sostiene il pollice; la λ mostra la parte piu bassa, la qual si diuide similmente in due; l'vna delle quali, ch'è segnata con la μ, s'inferisce nel primo osso del pollice; l'altra, che dimostra la ν, s'inferisce nel secondo & terzo osso dell'istesso. Il terzo principio, che è notato con la Η, si sparte anchora in due parti, che si mostrano con la ο, & cō la π; delle quali la piu alta s'inferisce nelle tre ossa del pollice; la piu bassa nell'indice, & in quel di mezzo.	τ	Parte dell'ottauo, che muoue la gamba.
l	con la λ; & la κ dimostra quella, che mada vna corda all'osso del bracciale, che sostiene il pollice; la λ mostra la parte piu bassa, la qual si diuide similmente in due; l'vna delle quali, ch'è segnata con la μ, s'inferisce nel primo osso del pollice; l'altra, che dimostra la ν, s'inferisce nel secondo & terzo osso dell'istesso. Il terzo principio, che è notato con la Η, si sparte anchora in due parti, che si mostrano con la ο, & cō la π; delle quali la piu alta s'inferisce nelle tre ossa del pollice; la piu bassa nell'indice, & in quel di mezzo.		Tolto via il primo, il resto di questa figura s'è già mostrato nelle figure passate, & nella duodecima, nella quale vedransi notate con lettere.
m	Pende dal suo fine quello, che stende il bracciale, & non ha che vna corda.		
n	Quel, che principalmente stende il dito picciolo.		
π	Quel, che stende le tre dita di mezzo.		
op	Quel, che congiugne il pollice all'indice.		
q	Il secondo, che muoue la coscia; il cui principio, ch'è com'vn mezzo arco, dimostra la u, & la x; & il fine è notato con la y.		
r	Il maggior processo dell'osso della coscia.		
s	Il quarto, che muoue la coscia.		
t	La legatura attrauersata dal processo de i lati del quinto nodo dell'osso grande fino al processo aguzzo dell'osso del gallone.		
Σ	Vn'altra legatura, che nasce dell'istessa parte, che la sopra detta, & s'inferisce nella parte piu alta di dietro, della congiuntura dell'osso del gallone.		
u	Il decimo musculo della coscia, il quale stendendo verso dietro dall'osso del petri-gnone, fa che pare che stia vn'altro musculo sopra quello, così in sù, come in giù.		
x	Il quarto musculo, che va alla gamba; il quale nel chino del ginocchio si sparte in due rami, & l'vno dimostra (che è il maggior di lor due) la η, & il minore la θ.		
y	Il primo musculo, che muoue la coscia.		
a	La parte, doue questo musculo sta attaccato come vna tela.		
β			
γ			
δ			
ε			
ζ			
η			
θ			
ι			
κ			
λ			
μ			
ν			
ξ			
ο			
π			
ρ			
σ			
τ			
υ			
φ			
χ			
ψ			
ω			
Α			
Β			
Γ			
Δ			
Ε			
Ζ			
Η			
Θ			
Ι			
Κ			
Λ			
Μ			
Ν			
Ξ			
Ο			
Π			
Ρ			
Σ			
Τ			
Υ			
Φ			
Χ			
Ψ			
Ω			
Α			
Β			
Γ			
Δ			
Ε			
Ζ			
Η			
Θ			
Ι			
Κ			
Λ			
Μ			
Ν			
Ξ			
Ο			
Π			
Ρ			
Σ			
Τ			
Υ			
Φ			
Χ			
Ψ			
Ω			




Dichiar. delle Fig. del Lib. II.

	nasce tra l'a & la b, dalle punte della schiena.		sa il terzo della medesima gamba; & la o dimostra, oue questo musculo comincia a far la corda.
c	Pende dal suo fine il quarto, che muoue il braccio.	o	
d	Quello che stende il gomito; il cui principio è segnato con la d.	Ω	Parte del quinto musculo, che muoue la coscia.
f	Il secondo, che stende il gomito, & nasce dal lato di sotto della paletta delle spalle.	Θ	La parte di dietro di questo quinto musculo.
e	Doue quegli due muscoli si congiungono, che paiono vn solo.	ζ	La parte di nanzi del medesimo; & particolarmente la ζ dimostra la piu d'auanti; & la Ω quella, che è meno auanti.
g	Il secondo, che piega il gomito.	π	Il quarto musculo, che muoue la gamba; che pende dalla parte di quello, che nasce dall'osso della coscia, notato con la p.
h	Il piu lungo, che storce il braccio in fuori.	p	
Δ	Quello, che finisce in due corde, & stende il bracciale; il cui principio mostra la i; & doue fa la corda, illk; & il suo fine la l.	ς	Il terzo, che muoue la gamba, che pende dal suo fine.
ikl		τ	Parte dall'ottauo musculo, che muoue la gamba.
m	Il minore, che storce il braccio insù.		
n	Il minor fusello del braccio.		
o	Il maggiore; & nel mezzo d'amendue si vede la lor legatura.		
Ξ	Il secondo principio de i tre, che nascono del maggior fusello; il cui principio (che fa vna corda, che s'inferisce nel bracciale) dimostra la p; & la q mostra la corda, che s'inferisce nel primo osso del pollice; & la r quella, che s'inferisce ne secondo & terzo.		
pq			
r			
s	Quello, che congiunge il pollice all'indice.		
π	Il terzo principio di quei, che nascono del maggior fusello; la cui parte, che s'inferisce nell'indice, & in quel di mezzo, dimostra la t; & la u mostra quella, che va al pollice.	Γ	L'vno del primo paio de muscoli della testa, il cui principio mostra la A; la B & la C mostrano il suo fine; & la D mostra il luogo, doue questo musculo si comincia a scostare dal suo compagno; & la E mostra la fine del lato di dentro di questo musculo.
tu		AB	
Σ	Il terzo musculo, che muoue la coscia; il cui principio è notato con la z, y, x; il fine cō la a; il resto, che si vede all'intorno di questo musculo, così da i lati, come di sopra, è l'osso del gallone scoperto.	CD	
xyz		E	
a		FF	L'vno del secondo paio della testa.
	Il quarto musculo, che muoue la coscia.	G	Il terzo, che muoue la paletta delle spalle.
Φ		HH	Il quinto, che muoue il braccio.
β	Doue questo musculo comincia a far la corda.	I	La punta dell'omero scoperta.
γ	Il maggior processo dell'osso della coscia.	KL	Il quarto, che muoue il petto; il cui principio mostra la K; & la L mostra, doue comincia a non esser tanto attaccato all'vno del sesto paio, che muoue la schiena, come fa dalla K alla L.
δ	Il secondo, che muoue la coscia.	MM	Certe corde di questo musculo.
ε	Il settimo che muoue la gamba.	N	L'vno del sesto paio, che muoue la schiena.
η	La legatura, che va dall'osso grande al processo aguzzo dell'osso del gallone.	O	L'vno dell'ottauo paio.
θ	Il decimo, che muoue la coscia, che si rinoltra verso questa parte dalla parte di dentro dell'osso del pettignone, et passa fra i due, che son notati con la i, & con la x.	P	La gobba della paletta delle spalle scoperta.
ix		Q	Il sesto musculo, che muoue il braccio; il quale copriua la gobba di questa paletta; & sta penzoloni dal suo fine.
λ	Il principio del terzo, che muoue la gamba.	R	Il terzo.
μ	Il principio dal quarto.	S	Il secondo, che muoue il petto.
ν	Il quinto musculo, che muoue la gamba; il cui principio mostra la v; & la ξ mostra il seno di questo musculo, nel qual s'incas	T	Quello, che stende il gomito, & nasce dal lato piu basso della paletta delle spalle.

Tauola. XII.

IN questa Figura si veggono scoperte tutte le Costole, & l'Ossa de galloni, & le Palette delle spalle, & in alcune parti l'Ossa delle braccia.

Il primo,



Dichiar. delle Fig. del Lib. II.

V	Il primo, che stende il gomito, che pende di doue si congiunge a quel di dentro.		
X	Vn pezzo di carne, che in questa parte nasce dell'osso dell'omero, & conta si per lo terzo, che stende il gomito; il quale nella tauola seguente notaremo con la d.	De	tro; il qual nasce con due principij della giunta dell'osso del gallone; il neruoso mostra la d; il carnosio la e.
Y	Il secondo musculo, che piega il gomito.	ζ	In questa parte questo quinto musculo è mol to carnosio, & par vn sorzo.
ab	Quel, che storce in sù il minor fusello; il cui principio mostra la a, & la fine la b.	η	La corda dell'ultima parte di questo quin to musculo.
Δ	Il secondo musculo, che storce il minor fu sello in sù; il cui principio mostra la c, & il fine la d.	ΣΠ	Le parti d'auanti di questo quinto muscu lo; delle quali la Π mostra quella, che è piu in dietro; & la Σ mostra quella, che è piu in nanzi. Si veggono questi mu sculi nella seguente tauola alle istesse let tere.
cd	Vn fin neruoso del musculo piu alto, che storce il minor fusello all'in giù.	θ	Il settimo, che muoue la gamba.
e	Il minor fusello del braccio.	xx	L'ottauo.
f	Il maggiore.	λ	Vna parte larga e profonda dell'osso della coscia tra le sue due teste, che chiamamo il chimo.
g	La legatura, che congiunge questi due fu selli, là doue son separati.	μν	Il quarto musculo, che muoue la gamba, che pende dal suo fine; & la μ mostra il prin cipio di quel, che nasce dall'osso del gal lone; & la ν quello, che nasce dell'osso della coscia.
h	La congiuntura de i fuselli col bracciale; & alcuni seni, di doue passano le corde de i musculi, che vanno alle dita.	ξ	Il quinto, che muoue la gamba.
ik	Il bracciale.	φ	Il primo, che muoue il piede.
l	L'osso della palma, che sostiene il dito an nulare. Et nella istessa maniera nota il resto, & i musculi, che son nel mezzo.	Ψπρ	Il secondo; il cui principio carnosio mostra la π, & il neruoso la ρ.
m	Quello, che congiunge il pollice all'indice.	τ	La parte di questi due musculi si congiun gono.
n	Quello, che finisce in due corde, & distende il bracciale, pende dal suo fine.	ς	Fin qui son rileuati questi musculi, ma qui cominciano a non esser piu carnosio.
o	Una buona parte del musculo attrauersato del ventre.	υ	Il principio della corda di questi musculi.
p	La parte di dietro dell'osa de galloni scar nata.	ω	Il principio del terzo, che muoue il piede; la cui corda si vede nell'altra gamba, no tata con la &.
q	La testa dell'osso della coscia, che s'incassa nel gallone, & la legatura, che l'abbrac cia tutto intorno.	Ϟ	
r	La legatura, che va dall'osso grande fin al processo aguzzo dell'osso del gal lone.		
t	Il terzo musculo, che muoue la coscia, che pende dal suo fine.		
u	Il quarto, che similmente pende dal suo fine.		
x	Il maggior processo dell'osso della coscia.		
a	La parte del decimo musculo, che muoue la coscia; che si storce al seno, che fa si nel l'osso del gallone; & il suo resto vedrassi alla figura 16 alla Γ.	AB	C, D, E, F, G. L'vno del secôdo paio, che muo ue la testa; nel quale l'A dimostra il prin cipio di quello, che è del quinto & quar to nodo delle spalle; la B mostra, doue fa si neruoso, & similmente dimostra il mu sculo, che nasce dal processo di dietro del settimo nodo della schiena, & si me scola con questo secôdo alla lettera C, do ue fan si amendue carnosio; e la D mostra
β	Vn musculo, che nasce del processo aguzzo dell'osso del gallone, & passa sopra il de cimo musculo detto.		
γ	Vn altro, che passa, ne piu ne meno, per so pra la parte di sotto del decimo.		
≡	Il quinto, che muoue la coscia; & la ≡ mo stra particolarmente la parte sua di die		

Tauola. XIII.

Questa Figura è differente da
quella del Vesalio in questo,
che il Secondo paio de mu
sculi della testa non sta in questa, co
me in la sua, parendomi che nella sua
resti piu confuso.

Il fine



Dichiar. delle Fig. del Lib. II.

	il fine d'amendue questi muscoli; la E mostra il fine di questo secondo paio, il cui principio resta nascosto, & il suo fine mostra la F; & le GG mostrano la parte carnosa di questo secondo.		processo aguzzo della punta del gallone.
H	Il quinto, che muoue la schiena.	p	La testa dell'osso della coscia.
I	Parte del sesto.	q	Il maggior processo di questo osso.
k	Vno dell'ottauo paio, che muoue la schiena.	r st u	Il decimo muscolo, che muoue la coscia, & mostra il lato suo di dentro; & la s, t, u, le corde sue, che si storcono verso il gallone.
I L M	L'vno del sesto paio de muscoli della schiena; il cui principio nota la L, & le corde come clauicole, col mezzo delle quali s'attacca alle pùte de i processi di dietro de i nodi della schiena, mostrano le MM, & il suo fine la M piu alta, il quale in alcuni finisce (come dice il Vesalio) nella prima costa; pure ordinariamēte mōta fin'al l'inferirsi nell'osso della collottola.	x y z	Queste tre lettere mostrano vn pezzo di carne, che fa come vn fodero, il quale infasca il decimo muscolo appresso la punta del gallone; la x mostra la parte piu alta, la y quella di mezzo, la z la piu bassa.
*	L'vno del quinto par de muscoli della schiena.	a	Parte del nono muscolo che muoue la coscia.
OO	Il quarto, che muoue il petto.	β	Il fin del sesto.
TP	Queste asprezze delle coste mostrano i lor tubercoli, nelli quali s'inferisce il quarto muscolo, che muoue la schiena.	γ	Il fin del settimo; & amendue finiscono nel minor processo della coscia.
Q	Il terzo, che muoue la paletta delle spalle.	δ δ	L'ottauo, che muoue la gamba, et abbraccia quasi tutto l'osso.
R	La parte di dietro di questa paletta scoperta.	ε ε	Una riga aspra, che vedesi nella parte di dietro dell'osso della coscia, nella qual s'inferisce il quinto muscolo, che muoue la coscia.
ST	Il secondo, che muoue il petto.	Ξ Π Σ	Il quinto, che muoue la coscia, che pende dalla testa di dietro dell'osso della coscia; nel qual la Ξ mostra la parte sua di dietro; la Π & la Σ mostrano quella d'auanti, & di questa parte la Π mostra quella di dietro, & la Σ quella d'auanti.
V	La terza legatura, particolare alla congiuntura dell'omero.	Φ ζ	Il terzo, che muoue il piede; la cui corda mostra la ζ.
X	Il quinto, che muoue il braccio, che pende dal suo fine.	η η	Il muscolo, che sta nascosto sotto il chino del ginocchio.
Y	L'osso dell'omero scoperto.	θ θ	Il quarto che muoue il piede, il cui principio mostra la θ, & la parte, doue se gli congiugne la corda dei i due primi muscoli, che muouono il piede, mostra la η.
a	L'ultimo, che piega il gomito.	κ	Il fine, doue s'inferiscono le tre corde del primo, secondo, e quarto, che muouono il piede.
b' c d	Quelli, che stendono il gomito; la b mostra quello, che nasce dal lato piu basso della paletta delle spalle; & la c, quello, che nasce dal collo dell'omero; & la d quello, che nasce del mezzo dell'osso.	λ	Il maggior stinco della gamba scoperto, & vna gran parte della testa di dentro dell'osso della coscia presso al ginocchio.
e	Il minor fusello del braccio.	μ	La corda dell'ottauo muscolo, che muoue il piede.
fg	Il maggior di quei, che storcono il minor fusello all'ingiù; il cui fine mostra particolarmente la g.	ν	La corda del settimo.
h	Pende dal suo fine il minore, che storce il minor fusello all'in su.	Ω	Questa lettera mostra la gamba, che è appresso la figura intera, & è stata tolta via, accio, che meglio si possa vedere la pianta del piede; & le lettere, che seguono, trouansi in quella.
i	Il maggior fusello del braccio.	π	La legatura, o tela, a cui è attaccato il muscolo, che piega le dita; che serue, come la tela della palma della mano.
k	La legatura, che congiunge questi due fuselli per tutto l'luogo, oue son separati.		
I 2. 3	Compariscono tre muscoli in questa parte, che piegano il secondo articolo del pollice.		
l	Il muscolo, che piega il primo articolo del pollice.		
m	L'osso del gallone scoperto.		
n	Il codione scoperto.		
o	La legatura, che va dall'osso grande al		

Quel,

p	Quel, che si separa il pollice da gli altri.	QR	L'undecimo, che pende dal suo fine; & la R
s	Quel, che si separa il picciolo da gli altri.		mostra vn seno, che fafi in quello, nel qua-
rr	Il primo e secòdo di quei, che muouono il pie-	s	le s'incassa il terzo decimo; & il suo prin-
	de; i quali nella figura intera pendono dal	TVX	cipio mostra la S.
	quarto; & nella gamba tagliata sono in		Il terzo decimo; il cui principio nota la T
v	suo luogo.		V; & il fine la X, la quale ancora nota il
	La corda del terzo musculo, che muoue il		principio del quinto decimo.
	piede.	Y	Il quinto decimo, che muoue la schiena; il
Φ	Parte del quarto musculo, che muoue il pie-	a	cui principio si nasconde sotto, d'uno del
	de; il quale nella figura intera e notato		settimo, ch'è notato con la a.
	con la Φ.		Si deue similmente notare il sito, & l'andar
x	La corda, che fafi del primo, secondo, e quar-		delle coste in questa figura, perche in niu-
	to, che muouono il piede, che s'inferisce		na altra si mostrano meglio; ne piu ne me-
	nel calcagno; benchè in questa gamba la		no l'ossa de galloni, e delle coscie.
	x nota particolarmente vna certa conca-	bb	I buchi dell'ossa del pettignone, turati cò v-
	uità, che fafi tra la parte d'auanti di que-		na tela.
	sta corda, & la parte di dietro de gli al-	c	Il sesto musculo, che muoue la coscia, che
	tri muscoli, che occupano questa parte		pende dal suo fine.
	della gamba.	d	Il settimo.
yo	Il maggior stinco della gamba.	e	Il nono, che pende dal suo fine.
*	Qui si veggono in parte i muscoli, che occu-	fg	Vn pezzo di carne, o vero due muscoli, per
	piano la parte di dietro della gamba, ec-		mezzo de i quali passa il decimo; & son
	cetto i tre primi, che muouono il piede.		qui pendenti dal lor fine.
		ghi	Quello, che sta nascosto nel chino del ginoc-
			chio; il cui principio nota la h, & la fine
			la i.
		Kk	Il settimo, che muoue il piede.
		lm	La corda dell'ottauo musculo, che muoue il
			piede, il cui fine dinota la m.
		nopq	Quattro muscoli, che sono uniti al calcagno,
			la n & la o notano i due primi, che muo-
			uono il piede, la p il terzo, la q il quarto,
		r	& la r mostra, doue la corda del quarto
			s'inferisce.
		Δ	Questa lettera nota la mezza gamba, ch'è fra
			le gambe della figura; & succede in or-
		f	dine alla mezza della figura passata.
		t	La legatura del piede, che sta attaccata al
			musculo, che muoue i secondi articoli.
		u	Pende il musculo, che separa il pollice da
			gli altri.
		Θ	Pende quello, che diuide il picciolo da gli al-
			tri.
		xa	Quello, che piega il secondo articolo delle
			quattro dita; il cui principio, che nasce
		β	dal calcagno, nota la x, & la a nota, do-
			ue si sparte in quattro corde.
			Quel pezzo di carne, che piega il primo ar-
			ticolo del pollice; il qual nella mezza
			gamba passata mostramo con l'istessa let-
			tera.
		AAA	Il musculo, che piega il secondo arti-
			colo del pollice; il principio mo-
		γδ	stra nella gamba sinistra, la γ; &
			la δ mostra, doue manda da vn lato

Tauola. XIII.

A Questa Figura mācano le braccia, & la paletta delle spalle. Et non è differente da quella dal Vesalio, eccetto che in questa l'undecimo musculo della schiena, ch'è notato con la Q, monta piu in su.

AB	Il terzo paio di muscoli, che muoue la testa; che pende dal suo fine.
C	Il processo delle tempie, simile alle poppe, si nella figura intera, come nella testa sola.
D	Questa lettera, et alcune, che seguono, deuosi attribuire alla testa sola; et questa D mostra il processo del lato del primo osso del collo.
E	Il processo di dietro del secondo nodo del collo, & il medesimo nodo.
FG	Il quarto paio di muscoli, che moue la testa.
HI	Nella figura intera mostrasi il quinto, paio di muscoli, che muoue la testa; che nasce del la collottola, e s'inferisce ne i processi de i lati del primo nodo del collo.
KL	Il sesto paio.
M	Parte del terzo musculo, che muoue la paletta delle spalle.
N	Il terzo, che muoue la schiena.
O	Il settimo. P Il nono.

Dichiar. delle Fig. del Lib. II.

di dentro vna corda, che cominciò alquã to piu in sù della carne di questo musculo presso alla e, et in ciascuna pianta del pie de vedesi questa corda notata con la d. Quel, che piega il terzo articolo delle quat tro dita; il cui principio sta di sotto el mu sculo, ch'è nascosto nel chino sopra la ζ. E la n nota la corda di questo musculo, che nasce nella parte di dentro della par te sua carnosa, et si diuide in quattro cor de nella pianta del piede, in i, doue è la θ. Qui appare parte del quinto musculo, che muoue il piede. Quel pezzo di carne come musculo, che di uidesi in quattro parti; e s'appoggia alle corde, che piegano il terzo articolo del le quattro dita; il cui officio è stender le dita in obliquo verso il pollice; e la cor da, che va al pollice, mostra la μ, & quella, che va all'indice, la ν.		ferisce) in obliquo verso il pollice. O 1. Quel, che piega il secondo articolo del pollice. P 1. Quel, che piega il terzo articolo delle quattro dita. Q 1. Parte della corda, che piega il secondo articolo del pollice. R 2. Il maggior stinco. S 2. Il minore. T 2. La legatura come tela, che congiunge questi due stinchi, oue sono separati. V 2. Il settimo, che muoue il piede. X 2. Qui passa la corda del settimo musculo del pie, sotto dell'osso, simile ad vn dado, storcendosi & allargandosi. Y 2. La corda di questo musculo, che s'inseri sce nell'osso della pianta, che sostiene il pollice. ab 2. L'ottauo, che muoue il piede; il cui fine dimostra la b.
1. 2. 3		2. Questi tre segnali mostrano tre seni, che fanno nella parte di dietro del maggior stinco i muscoli, che vanno alla parte di sotto del piede. Et l'1 dimostra il seno, per lo qual passa la corda del quinto mu sculo, che muoue il piede, il 2. dimostra il seno della corda del musculo, che piega il terzo articolo delle quattro dita; il 3 mostra il seno, per lo qual passa la corda del musculo, che piega il secondo artico lo del pollice.

Tauola XV. Figura XV.


Q Veste due Gambe guardano
l'istessa attitudine, che la gāba
sinistra della quarta decima fi
gura; & seguita a quella, che
nella tauola passata notamo con la Δ.

- A 1. Il maggior stinco.
- B 1. Il minore.
- C 1. Pende il musculo, che sta nascosto nel
chino del ginocchio.
- DE 1. Il quinto musculo, che muoue il piede, il
cui principio nota la D, & la E la cor
da, che nasce dal lato suo di den
tro.
- F 1. Il seno, sopra cui passa la corda, che pie
ga il secondo articolo del pollice.
- G 1. Il seno, per lo qual passa la corda del mu
sculo, che piega il terzo osso delle quat
tro dita.
- H 1. Il settimo, che muoue il piede.
- I 1. L'ottauo.
- K 1. Il fin del sesto musculo, che muoue il pie
de.
- L 1. Vna massa di muscoli, che piega il primo
osso delle quattro dita.
- M 1. Gl'osicelli come seme di sesame, che son
nel primo articolo del pollice.
- N 1. Qui pende quella sustanza muscolosa, che
manda a i lati di dentro di ciascun dito
vna parte, che stende il dito (nel qual s'in

Figura. XVI.

Q Vesta Figura mostra la gāba tut
ta per lo lato di dentro, insieme
con il Gallone, & l'osso grande.

- A L'osso grande.
- B Il lato dell'osso grande, a cui si congiugne
na l'osso diritto del gallone.
- C Vna legatura dell'osso grande, fin alla con
giuntura dell'osso del gallone.
- D L'osso sinistro del pettignone, ilqual si con
giugneua al diritto.



Dichiar. delle Fig. del Lib. II.


E	il codione.	G	il seno della giunta piu bassa del maggior stinco, per lo qual passano molte corde de i muscoli, ch occupano la parte di nanzi del piede.
F	il quarto neruo, che va alla gamba.	H	il tallone di dentro.
G	il decimo musculo, che muoue la coscia, diuiso alquanto in tre parti, notate con la E, la F, & la G; il qual nasce dalla parte di dentro dell'osso del pettignone; & facendosi carnosio presso alla H, fassi piu stretto; & piegandosi sopra il seno, che per questo effetto è fatto nell'osso del gallone, va a inserirsi nel maggior processo della coscia.	IK	il minor stinco, & la K mostra il tallone di fuori.
H	fassi piu stretto; & piegandosi sopra il seno, che per questo effetto è fatto nell'osso del gallone, va a inserirsi nel maggior processo della coscia.	LMN	il quarto, che muoue il piede; la cui corda mostra la M; & la N mostra vna parte della corda del primo & secondo, che muouono il piede.
I	Parte del sesto musculo, che muoue la coscia.	O	Vna legatura tonda, che congiunge l'osso de la coscia a quello del gallone.
K	Parte del settimo.	PP	Vna legatura, che circonda la congiuntura della coscia.
L	il primo, che muoue la gamba, la cui corda nota la M.	Q	Parte delle legature, che nascono del maggior processo della coscia, & s'infasciano ne i muscoli, che nascono da quella, e principalmente nel settimo.
M N	O il secondo, il cui principio mostrano la N & la O; la corda mostra similmente la M.	R	Parte delle legature, che nascono del minor processo, e si smarriscono, principalmente nell'ottauo musculo, che muoue la gamba.
P	Vna picciola parte del nono.	S S	Vna legatura come tela, che abbraccia il ginocchio tutto, eccetto quella parte, che occupa la sua girella.
Q	L'ottauo.	T	Vna legatura particolar del ginocchio, ch'è dalla parte sua di fuori.
R	il terzo, la cui corda mostra la M, ne piu ne meno, che quella del primo & secondo.	V	Vn'altra legatura del ginocchio ch'è similmente al lato suo di fuori.
ST	il quinto, che muoue la coscia; la cui parte di dietro mostra la S, e quella d'auanti la T.	X	La legatura, che nasce dal processo dell'osso della gamba; il quale è segnato con la F, & s'inferisce nell'osso della coscia.
VV	il quinto, che muoue la gamba.	Y	La legatura, che congiunge la parte piu alta del minor stinco al maggiore.
XY	il maggior stinco scoperto, & la Y nota il tallone di dentro.	Z	La legatura, che congiunge la parte da basso di questo minor stinco al maggiore.
a	il primo musculo, che muoue il piede.	a	La legatura come tela, che congiunge amene due i stinchi per tutto quello spatio, oue son separati.
b	il secondo.	bc	Le legature, ch'abbracciano, come anelli, le corde de muscoli, che passano per lo pettine del piede; & perciò è aperta vna di loro, accio meglio si possino vedere.
c	La corda del terzo.	d	La legatura, che nasce del maggior stinco, e s'inferisce nell'osso del calcagno, & abbraccia le corde, che passano per questa parte alla parte di sotto del piede.
d	il quarto.	e	La legatura, che nasce del maggior stinco, e s'inferisce nell'osso del calcagno; sotto della quale passano le corde, che vanno alla parte di sotto del piede.
e	il quinto, che piega il terzo osso delle quattro dita.	f	Vna legatura come cartilagine, che va dal tallone di dentro al lato di dentro dell'osso, chiamato il Talo.
f	Parte del quinto, che muoue il piede.		
g	La corda del sesto musculo, che muoue il piede.		
h	Le corde, che stendono le dita.		
i	Quel, che separa il pollice da gli altri.		

Figura. XVII.

IN questa Figura vedesi l'Osso della coscia scoperto, & certe Legature della gamba.

ABC	D L'osso della coscia.
B	La testa dell'osso della coscia, che s'incassa nell'osso del gallone.
CD	Le teste di sotto dell'osso della coscia.
EFG	Il maggior stinco della gamba.
F	La parte piu alta del processo della giunta del maggior stinco; da cui nasce la legatura, ch'è notata con la X.

TABVLA XV. LIBRI II.



Dichiar. delle Fig. del Lib. II.

g Vna legatura come cartilagine, che lega il minor stinco al Talo.

Figura. XVIII.

Q Vesta Figura mostra il modo, nel quale il muscolo è fatto; benché realmente non si puon distinguer le sue parti.

Ω Fra queste due lettere vedesi la parte d'un neruo.

A La parte del neruo, che diuidesi in molti ramuscelli.

B Come entrano i rami del neruo nella composition del muscolo.

C La legatura, che nasce dall'osso, & entra nella composition del muscolo.

D La congiuntione del neruo, & della legatura per componere il muscolo.

E Doue son piu diuisi i fili, & fanno il corpo del muscolo.

F Doue tornano a vnirsi i fili, & fanno la corda del muscolo.

G La corda, che s'inserisce nell'osso.

Figura. XIX.

Q Vesta Figura mostra tutti i musculi del Braccio, in tal guisa scarnati, che si veggono i fili di ciascun di loro, & la maniera, nella quale i nerui & corde si distribuisceno per loro.

H La testa dell'osso dell'omero, che s'incassa nella paletta della spalla.

I Il quarto neruo, che va al braccio.

K Il principio del muscolo, che stende il gomito; che nasce dalla radice della testa dell'omero.

L Il principio dell'altro muscolo, che stende il gomito; che nasce dal lato piu basso della paletta della spalla.

M Il luogo, doue il quarto neruo, che va al braccio, manda i rami a i due musculi, che stendono il gomito.

N Il fin de i musculi, che stendono il gomito.

O La punta del gomito.

P Il quarto neruo, che va al braccio, si vede inui, doue s'appoggia alla parte di dietro del tubercolo di fuori dell'osso dell'omero, & manda rami a i musculi, che nascono di questa parte.

Q Il principio dell'ultimo muscolo, che piega il gomito.

R Il principio del muscolo piu lungo, che storce il minor fusello all'ingiu, & s'inserisce

nella giunta del minor fusello presso al bracciale.

S Il muscolo, che finisce in due corde, e stende il bracciale.

T L'altro muscolo, che stende il bracciale; che finisce nell'osso, che sostiene il dito picciolo.

V Il muscolo, ch'è attaccato al maggior fusello, e piega il bracciale.

X Quello, che stende il dito indice; quel di mezzo, & l'annulare.

Y Quello, che stende il dito picciolo.

Z La parte carnosita di quel muscolo, che diuidesi in tre corde; vna delle quali s'inserisce nell'osso del bracciale, che sostiene il pollice; l'altra nel prim'osso del pollice; la terza nel secondo e terzo osso del medesimo.

a Quel, che congiunge il pollice all'indice.

Figura. XX.

B Enche nella Prima & Seconda Tauola di questo libro si mostrassero in certo modo i due primi musculi, che ferrano la palpebra di sopra, pure ho voluto per maggior chiarezza mettere anchora questa, nella quale si veggono tutti tre.

A Il lagrimale.

B Il terzo muscolo, ch'alza la palpebra di sopra.

C La parte del primo muscolo, che muoue la palpebra, che nasce dal principio delle ciglia.

D Il canto di fuori dell'occhio.

E Il principio de i due musculi della palpebra; & il fin di ciascun di loro mostra la F.

Figura. XXI. XXII. XXIII.

Q Veste tre Figure insieme mostrano i Musculi dell'occhio. La ventesima prima mostra, come son posti. La ventesima seconda gli mostra tolti via dal suo principio, & pendenti dal suo fine, & leuato via tutto il grafso, ch'era fra loro & all'intorno del neruo della vista. La ventesima terza mostra l'occhio dalla parte d'auanti, tolte via le palpebre & i loro musculi, accio che si veda il sito de i musculi dell'occhio.

A 1. 2. 3. La parte di nanzi dell'occhio.

B 1. 2. Il neruo della vista, chiamato optico.

C D E 1. I due musculi dell'occhio, posti in suo luogo.

- FG 1. Il grasso, che vedesi fra i muscoli.
HI 2. 3. I due muscoli piu bassi dell'occhio.
LM 2. 3. I piu alti.
N 2. Il quinto muscolo dell'occhio; il cui offitio dice il Vesalio essere aiutare ad alzar l'occhio.

Figura. XXIII. XXV. XXVI.

LA Figura ventesima quarta mostra la Lingua con tutti i suoi muscoli, separata dal laltre parte del corpo. La ventesima quinta mostra similmete la Lingua & i muscoli suoi, ma ha il terzo, & il settimo alzati, accio che si possano vedere il nono & il primo. La ventesima sesta mostra la Lingua diuisa, e tutti i muscoli suoi tolti da lei.

- AA 1. 2. 3. La parte della lingua, che vedesi nell'aprir della bocca, coperta della tela, comune allo stomaco & a tutta la bocca.
BB 1. Parte di detta tela, tagliata dalla bocca secondo il lungo della mascella inferiore; la parte della lingua, ch'è sopra questa ra dice, è similmente coperta di tela, quella da basso nò.
C 1. Parte di detta tela, che è distaccata dal palato insieme con la lingua.
DD 1. 2. Il primo muscolo della lingua.
E 1. 2. Il terzo.
F 1. 2. Il quinto.
G 1. 2. Il settimo.
H 1. 2. Il nono.
I 3. La legatura della lingua, a cui s'attaccano le fibre de i corpi della istessa.
K 3. La forma delle fibre del corpo diritto della lingua.
LL 3. La forma delle fibre del corpo sinistro.

Figura. XXVII.

Questa Figura mostra il primo & secondo Nodo del collo dalla parte di dietro, insieme con le legature loro.

- ABC Il primo nodo del collo, attaccato al secondo; & la A & la B mostrano particolarmente i seni suoi, ne quali s'incassano le teste dell'osso della collottola; & la C mostra la parte di dietro di questo nodo, oue gli altri hanno vn processo.

- DEF G, H, Il secondo nodo, del collo.
EEE La legatura, che congiunge il primo nodo al secondo.
G Il corpo del secondo nodo, di cui nasce il processo come dente, notato con la H.
H Vna legatura tonda, che esce del dente, & s'inserisce nell'osso della collottola.
I La legatura attraversata, che mantiene il dente nel suo seno.
k

Figura. XXVIII.

Questa Figura mostra due Nodi delle Spalle d'un fanciullo, ne i quali vedesi, in che forma i corpi dei nodi delle spalle si conginugono e legano.

- 2 La cartilagine del nodo piu alto.
1 La giunta del medesimo.
3 Vna legatura di natura di cartilagine, che è fra la giunta dell'un osso & quella dell'altro.
5 La giunta dell'osso piu basso.
4 La cartilagine di questo medesimo osso, che congiunge la giunta al corpo.

Figura. XXIX.

Questa Figura mostra l'Intestino retto, & i muscoli suoi.

- A L'intestino retto.
BC I due muscoli, che tirano in dentro il fondamento.
D Vna sustanza come di muscoli, ch'è attaccata alla radice del membro ne gli huomini; e nelle donne alla parte piu bassa della natura. Mostra anchora la D due muscoli, del membro, che nascono di questa parte.
E Il muscolo, ch'abbraccia il fondamento all'intorno, e ritiene le fecce.

Tauola. XVI.

IN questa Tauola mostransi in prima tredici Figure, le quali mostrano le Figure del gargarozzo; perche nelle figure intere non si puotero bene mostrare.

La Prima mostra la parte d'auanti dell'osso hyoide scarnata, & la parte d'auanti

Dichiar. delle Fig. del Lib. II.

d'auanti del gargarozzo, e della càna del polmone, & certi muscoli di quei comuni del gargarozzo.

La Seconda è la medesima, che la prima, riuolta in lato, imperò tagliata la canna del polmone piu in su.

La Terza è la medesima, che la seconda, volta la parte di dietro innāzi.

La Quarta mostra la parte d'auanti del gargarozzo, & vn pezzo della canna del polmone; & le māca l'osso hyoide, & i muscoli, che si veggono nella parte d'auanti, della prima, & restanui de muscoli comuni el quinto e sesto.

La Quinta è la medesima, che la quarta, però riuolta in lato.

La Sesta mostra il gargarozzo tutto p la parte di dietro libero dalla càna del polmone, e dalla gola, e da tutti i muscoli comuni.

La Settima rappresenta il gargarozzo p lo lato sinistro, tolto via el coperchio suo, e de i muscoli, che cōgiungono la prima cartilagine alla seconda. Oltre di q̄sto il p̄cesso di sotto di q̄sto lato della prima cartilagine è separato dalla seconda, e la prima è tanto spartata dalla seconda, che può vederfi la parte di dietro della prima cartilagine scoperta.

L'Ottaua è differente dalla settima i questo, che sono tagliati i muscoli diritti de i quattro che congiungono la terza cartilagine alla seconda, la quale è alquāto piu scoperta.

La Nona è differente i q̄sto dall'ottaua; che oltre i sopradetti muscoli le mācano i quattro, che cōgiungono la seconda cartilagine alla terza, & sola mēte veggioſi quelli, che cōgiungono la terza cartilagine alla prima.

La decima mostra la pte d'auanti d'l gargarozzo, tolto via la prima cartilagine, e veggōſi i effa i muscoli, che congiungono la terza cartilagine alla prima.

L'Vndecima mostra la linguetta del gargarozzo; & per ciò s'è gettata a

dietro la sua coperta.

La Duodecima mostra il gargarozzo per la parte da basso, che si cōgiunge alla canna del polmone.

La Terza decima mostra la linguetta del gargarozzo alquanto piu chiusa, ch'in le due passate. (ture.

A 1. 2. 3. L'osso hyoide, libero dalle sue lega-

B 1. 2. 3. Il lato piu basso dell'osso hyoide, che si lega al processo piu alto della prima cartilagine. (gine.

C 2. 3. 4. Il p̄cesso piu alto della prima cartila-

D 1. 3. Il lato piu alto dell'osso hyoide, il qual tagliossi dal luogo della seconda cartilagine, ch'è notato con la E.

E 1. 2. Il muscolo, che nasce della parte piu bassa dell'osso hyoide, & s'inserisce nella parte piu bassa della prima cartilagine.

F 1. 2. Il muscolo, che nasce della parte piu alta dell'osso hyoide, & finisce nella parte piu bassa della prima cartilagine; la prima lo dimostra d'amendue i lati; la seconda dal sinistro.

G 2. 3. 5. La canna della gola.

H 1. 2. 3. 4. 5. Il muscolo, che nasce della parte di dietro della canna della gola, & s'inserisce nel lato della prima cartilagine del gargarozzo.

I 2. 3. 4. In q̄sta parte trouansi ne gli animali brutti due muscoli; nell'huomo fin'a qui non gli ho veduti; benchè il Vesalio dica che vi si trouano.

K 2. 3. 4. 5. 6. 11. La coperta del gargarozzo, detta in Greco Epiglottis, perche sta sopra la linguetta del gargarozzo.

L 2. 3. 4. 5. Le mollette, che stanno da i lati della canna del polmone presso alla radice del gargarozzo.

M 1. 4. Il muscolo, che nasce della prima cartilagine, et s'inserisce nella seconda. Et è questo quel di fuori di quelli, che cōgiungono queste due cartilagini.

N 5. Il muscolo, che nasce della seconda cartilagine et s'inserisce nella prima; ch'è quel di dentro, che congiunge la seconda cartilagine alla prima.

O 6. 7. Il muscolo, che nasce della parte piu bassa di dietro della seconda cartilagine, & s'inserisce nella terza.

P 8. 9. Il luogo, ch'occupaua il muscolo detto.

Q 7. 8. Il muscolo d'un lato, che nasce dal lato della seconda cartilagine, & s'inserisce nella terza.

R 8. 9. Il seno della seconda cartilagine.

Il pro-



Dichiar. delle Fig. del Lib. II.

- T* 8.9. Il proctfso piu alto della prima cartilagine, che s'incassa nel sopra detto seno.
- V* 6.7.8. Il musculo, ch'è posto nella parte piu larga della terza cartilagine; nella settima vedesi di lui vn lato solo.
- X* 9. Il seno della terza cartilagine, nel qual s'incassa il musculo sopra detto.
- ab* 7.8.9.10. I muscoli, che nascono di tutto il lungo della prima cartilagine, & si inseriscono nella terza; i quali congiungono la terza cartilagine alla prima.
- c* 11. La parte piu alta della linguetta del gararozzo.
- d* 12.13. La parte da basso di questa linguetta.
- ee* 12.13. In queste parti non è musculo alcuno, benchè il Vesalio dica che sì.
- f* 13. Vn callo, che si vede nel mezzo della apertura della linguetta del gararozzo.
- g* 1.2.3.4.5.12.13. La parte d'auanti della prima cartilagine.
- h* 6.7.8.9. La prima cartilagine per la parte di dietro.
- i* 2.4.5.7.8.9.10.12.13. La seconda cartilagine per la parte d'auanti.
- K* 7.8.9.11.12.13. La seconda cartilagine per la parte di dietro.
- l* 6.7.8.9.10.11. La terza cartilagine.

Figura. XIII. XV. & XVI. XVII. XVIII.

DI queste Figure la Quarta decima mostra il membro tolti via i testicoli, la borsa loro, la pelle, il grasso, le vene, & l'arterie sue.

La Quinta decima mostra l'ossa de i galloni scarnate, de quali pende vna parte dall'ossa delle coscie insieme con i muscoli del fondamento, e quei del membro; i quali pendono dal suo nascimèto, accio che si conosca il nascimento de corpi del membro, & il condotto comune all'orina & al seme, ch'è, doue comincia a storcerfi all'in su sotto l'ossa del pettignone.

La Sesta decima rappresenta il membro tagliato al trauerfo, accioche si veda la sustanza de corpi fuoi, & doue si congiungono al canal del l'orina.

La decima settima mostra el membro insieme con la vescica, accioche si vegga piu chiaro il musculo del suo collo.

La Decima ottaua mostra il mēbro, diuiso il suo canale fin'all'entrare nella vescica; & le glandole, nelle quali si conserua il seme.

La Decima nona mostra el membro, diuiso il tuo corpo secondo il lungo, accioche si vegga l'arteria, che si distribuisce per esso.

- AB* 1.2.3.4. I due corpi del membro.
- CC* 2.4. Il nascimento di questi corpi.
- D* 1.2.3.4. La testa del membro.
- EE* 3.6. La sustanza del membro, che è spugnosa.
- F* 3. Doue si congiungono i corpi del membro, & la lor sustanza neruosa, ch'infascia la parte spugnosa.
- G* 1.2.3.5. Il canale dell'orina.
- HI* 1.2. Il primo paio de muscoli del membro, ilquale nella figura quinta decima serua il suo sito naturale, & nella sesta decima pende dal suo nascimento.
- KL* 1.2. Il secondo paio, il quale nella figura quintadecima sta nel suo luogo, nella sesta decima pende dal suo fine.
- M* 1.2. Il musculo tondo, che chiude il fondamento.
- N* 4. Il musculo del collo della vescica, col cui mezzo ritenemo l'orina.
- OO* 1.2. La tela, che tura il forame dell'ossa del pettignone.
- P* 2. Vna legatura tonda, che nasce del fosso dell'osso del gallone, & s'inserisce nella testa dell'osso della coscia.
- Q* 4.5. La vescica.
- R* 4.5. Quel corpo spugnoso, nel qual si conserua il seme.
- SS* 4. Parte de i condotti, che portano l'orina da i rognoni o arnioni alla vescica.
- TT* 4. Parte de i condotti del seme.
- V* 5.6. L'arteria, che si distribuisce per l'vn corpo del membro; & per l'altro si distribuisce, ne piu ne meno, vn'altra.

Il fine della Tauola del
Secondo Libro.



Oltre le figure ordinarie del Val-
uerde hauendo noi hauute di
nuouo le seguenti quattro Figu-
re di Muscoli, per esser assai bel-
le, e differenti dalle altre, ci è parso, per mag-
gior perfettione dell' Opera di aggiugner-
uele, ponendole qui all' vltimo per non tur-
bar l'ordine vecchio de' numeri.



Figura I.



Figura II.



Fig. 11.

Figura II I.



Illegible text at the top of the page.



Figura IIII.



Figura III.



a lib. i. c. vi.
cux
b lib. i. c. vi.

LIBRO TERZO

dell'Historia dell'Anatomia del
corpohumano.

SCRITTA PER GIOVANNI
VALVERDE MEDICO,

NEL QUALE SI TRATTA
della Membra necessarie alla Digestione,
& Generatione.

*Della Tela, che rauuolge tutte queste Membra,
chiamata Peritoneo. Cap. I.*



PRATTAMMO nel primo libro de fondaméti, & armadura del
la humana fabbrica, che sono l'ossa, & cartilagini; & nel secon-
do della legatura, & ornamento suo. Tratteremo per conse-
guente in questo Terzo de gli instrumenti necessari al nutrimé-
to, & per la vicinanza delle parti parlerò anchora delle Mem-
bra della Generatione, cominciando dalla Tela, che rauuolge
tutte queste membra, chiamata per cio da Greci Peritoneo, &
da gli Arabi Sifach. Questa Tela è vn corpo semplice, o simlia-
re, & senza forte alcuna di fili, come quelle, che habbiam det-

*Il Peritoneo è
corpo semplice.*

to esser nelle tuniche delle vene; & è la maggior tela di quanto ne siano nel corpo, ec-
cetto la carnosa. Et cuopre in prima per la parte di dentro tutto'l voto tra la diaframa,
& l'ossa del pettignone, & dell'anche, & del codione, & rauuolge tutte le membra, che
si contengono in questa parte, cioè lo stomaco, il fegato, il fiele, la milza, la reticella, il
mesenterio, le budella, i rognoni o arnioni, la vescica, la matrice, & i testicoli. Per la par-
te di fuori stà attaccata a muscoli del ventre; perche nasce dalle legature, che congiun-
gono e nodi de lombi, & l'ossa dell'Anche col grande da ogni lato, faccédosi al principio
molto sottile, & di poi monta per sopra ^a i muscoli, che stanno attaccati a nodi de lom-
bi, & per que, che occupano la parte di dentro dell'ossa de galloni, attaccandosi a loro me-
dianti e fili, che congiungono i muscoli l'vno a l'altro, & per sotto ^b i muscoli attrauerfa-
ti del ventre, attaccandosi alla parte di sotto della diaframa, & a tutti quelli, & principal-
mente alle parti lor neruose, faccendosi come vna camicia a muscoli. Di modo, che la fi-
gura di questa tela è come vn outre da vino, & è liscia di dentro, & couerta d'vn lubrico
humore, & delle volte hà seco atraccato alcuno grasso (benche non vgualmente da ogni
parte, perche assai piu se ne vede verso lo stomaco & lombi, che verso il bellico), & è di
fuori aspra, perche meglio s'attaccasse a muscoli, & non danneggiasse gli intestini. Dalla
parte di dentro di questa tela, ne nascono alcun'altre, che cuoprono le mēbra, che sono
in questa concauità, o spatio, coprendo ogni membro come vna camicia per di fuori, ol-
tre le particolari, che hanno alcuni, o la piu parte di loro. Et per questa cagione hanno
pensato molti, che le membra, che nō hanno piu di due tuniche proprie (come lo stoma-
co, & intestini) ne habbiano tre, contando per vna la tela del peritoneo, & che quelle, che
non ne hanno che vna sola (come la matrice, la vescica, il fiele) ne habbiano due, & che
quelle, che non ne hanno niuna (come la milza, & il fegato) ne habbiano vna sola, che è
parte del peritoneo. Questa tela non è vgualmente grossa da ogni parte; perche la parte,
che si congiunge alle legature de nodi de lombi è molto grossa, & anche quella, che passa

*La grande X^a,
è sito del Peri-
toneo.*

La Figura.

*Le tele, che na-
scono del Perito-
neo.*

*Il Peritoneo nō
è vgualmente
grosso da ogni
parte.*

P per

^a lib. ij. t. vij.
t u x

^b li. ij. t. vj. Δ

Lib. terzo delle Membra

In quante parti
sia pertugiato il
Peritoneo.

per sopra i muscoli, che stanno attaccati a corpi de nodi de lombi; ma quella dinanzi dal la forcella dello stomaco fin di sotto il bellico, è molto sottile, & da indi in giù è anche sottile, come dice il Vesalio, ma è doppia, & fra l'vna, & l'altra tela passano l'arterie del bellico, & il condotto dell'orina, come a suoi luoghi diremo; benché questa cosa non auuertì il Vesalio. Et è da notare, che ne gli huomini in questa tela, appresso l'ossa del pettignone, da lati de principij de muscoli diritti si veggono due buchi, & vno per lato, per i quali passano a gli testicoli i condotti del seme. Ma non si deue per ciò intender che'l peritoneo in questa parte sia forato; perche senza rompersi in parte alcuna, scende insieme con i condotti del seme infino a i testicoli rinuolgendogli tutti. Hà parimente questa tela nella parte, che cuopre la diaframa, due^d buchi, come quelli, che habbiamo detto essere in quella, e quali ne anche si possono chiamar giustamente buchi, quãto che i sopra detti. Perche come questa tela arriua alla vena grande, & all'arteria, & alla cãna della gola (che son le membra, che habbiamo detto pertugiare la diaframa) le abbraccia intorno intorno; & scende attaccata a tutte loro abbracciando la^e vena & la canna della gola^f intorno intorno, & l'arteria^g sol per la parte dinanzi. Hà similmente questa tela altri buchi, per doue passano e' vasi^h del bellico, & il collo della vescica, & il fondamento, & molte vene, & arterie, & nerui, che vãno alla gãba, & alcuni muscoli della schiena, & molti ramuscelli di vene, nerui, & arterie, che escono de vasi, che sono attaccati a nodi de lombi, & vanno a muscoli, che lor son vicini, & alla pelle, & anche a questa medesima tela; la quale non tolliceue questi rami, ma anche que, che passano per la diaframa; per la qual cosa non mi pare, che manchi di sentimento, come molti han pensato. Nelle donne particolarmente hà vn buco, per doue passa il collo della matrice. L'offitio di questa tela è rinuolgere in particolare tutte le membra dette, & in commune abbracciarle, perche non escano del suo luogo, & principalmente aiuta a ciò nel ventre, & ne fiãchi; nelle qual parti se per disgratia si rompe, subito escono fuor le budella, & fanno come vn'ernia; ne bastano e muscoli attrauerfati del vêtre a difendere, che non escano, quantunque altrimenti paia al Vesalio.

L'offitio del Peritoneo.

Della Canna della Gola.

Cap. 2.

Il sito della Canna della Gola.

LA Canna della Gola chiamiamo quel^a budello, che nasce dal fine del palato, il quale sta attaccato alla radice della lingua, & tocca amendue le nuuollette, & bñcende dalla parte di dietro della canna del polmone, fin'al quarto nodo delle spalle, & di poi appresso il quinto si disuia alquanto a man destra, per dar luogo all'arteria grande; & scende attaccata a lei, fin'al nono nodo delle spalle, doue si storce per rispetto del fegato verso il lato manco, & allargandosi alquãto dalla schiena, passa^e per sopra la parte neruosa della diaframa a man manca, & va a dare^d dentro dello stomacho. Questa cãna della gola chiamarono i Greci, & anche i Latini Stomachus, che vuol dir Bocca; perche per lei (come per vna bocca) entra tutto quello, che mangiamo, & beuemo, eccetto alcuna ben picciola parte del bere, che entra per lo gargarozzo, & humettandolo fa, che meglio si possa allargare, & ristignere. Altri la chiamarono Meri, o Gula; Gli Spagnuoli la chiamano Tragadero o Herbero, o Gargante; noi altri la chiamiamo Gola, o Canna della Gola. La sua sustanza è fatta di certe tuniche neruose, perche piu facilmente potesse allargarsi, & raccogliersi; di dietro è liscia, & lubrica, di fuori aspra. Et hà due tuniche proprie (senza quella del Peritoneo) differenti in sustanza, durezza, grossezza, & diuersità di fili o fibre. Perche quella di dentro è piu neruosa, & dura, & sottile, & è attaccata con la tela o tunica, che cuopre tutta la bocca, & il palato, & ha i fili secòdo il lungo, medianti e quali tira (come con mani) il mangiare a basso, & il getta fuori vomitando; benché questo mouimento è piu dello stomacho, che della canna della gola. La tunica di fuori è piu grossa, & morbida, & alquanto carnosa come musculo, & hà i fili al trauerso o in giro, e' quali stringendo il mangiare lo aiutano a scendere, quando inghiottimo, & montare, quando vomitiamo. La terza tunica della canna della gola non hà fili alcuni, & nasce delle legature de nodi delle spalle, appresso il nono nodo, alla qual parte si congiunge essa canna della gola, & si fa delle tele, che nascono delle legature de nodi delle spalle dal nono in sù, & legano la canna della gola co corpi de nodi. Questa tela non hà filo alcuno; ne serue ad altra cosa, che coprire la seconda, come fa il peritoneo le membra, che e cuopre. Oltre

Di quante Tuniche si fa la Canna della Gola.

La terza Tunica della Canna della Gola.

fi. i. G. li. ij.
t. ij. k. t. j. Y

lib. ij. t. vij.
r. f

e la med. f
f la med. r
g la med. q
h fi. ij. F K L

i fig. xix. m,
m n.

a fi. xlii. xliij.
b lib. ii. t. xvj.
fi. ij. in. v. H
t. vij. F. passa
sopra l' B. &
sotto l' F
c lib. i. t. vij.
d fi. xj. presso
la R

a detti

e fi. xij. EE. a detti fili, che aiutano a inghiottire piu facilmente il mangiare, sono nella canna della gola quattro glàdole, che sempre la mātengono lubrica, & humida. *e* Due delle quali (che stāno appresso la bocca della canna della gola, & nelle fauci, & noi altri le chiamiamo le nuuollette) seruono anche a tener humido il gargarozzo. *f* Altre due sono nel mezzo della canna della gola secōdo il lungo, piu appoggiate alla parte sua di dietro; le quali son simili a quelle, che si veggono al principio del collo della vescica, così in figura, come in officio.

Dello Stomaco.

Cap. 3.

a fig. ij. P fig.
ii. F F. fi. xj.
P Q. fi. xij.
xij. xv. xvj.

ALLA Canna della Gola sta attaccato lo Stomaco; *a* il quale sta situato sotto la diaframa, tra'l bellico, & la punta dell'osso del petto (che volgarmente si chiama la Forcella dello stomaco) distendendosi per el lungo dal lato manco, al destro. Per la parte piu alta, & per quella dinanzi nel lato manco, è attaccato alla diaframa; nel lato diritto al concauo del fegato, per la parte piu bassa è attaccato alla reticella, & all'intestino colon; dal lato manco è appoggiato alla milza, & in questo lato sta la sua maggior parte in quel vacuo, che si fa tra'l fegato, & la milza, nel qual stà la bocca sua attaccata alla diaframa, vn poco piu alta, che'l fondo, il qual stà a man manca sotto el concauo del fegato. Ma così la bocca, come il fondo, stanno nel mezzo del corpo, misurando il corpo non secondo il lungo, ma secondo il grosso. Il resto dello stomaco, che rispōde innanzi, è sotto quella parte, che comunalmente chiamano la bocca dello stomaco, ingannati nel vedere che raffreddandosi, o riscaldandosi questa parte, duole o si conforta la bocca dello stomaco, secondo che egli è piu disposto. Ma in vero la cagion di questo non è, se non che riscaldandosi il corpo dello stomaco, o raffreddandosi, subito si comunica l'alteratione alla sua bocca per esser vn corpo continuo. Il perche non mi piace per questo l'opinione d'alcuni Medici, che mossi dal sito dello stomaco, pongono le medicine, che vogliono che giouino alla sua bocca, nelle spalle al fine delle coste alquāto verso il lato sinistro; perche essendo in questa parte tanto osso, & tanta carne, non possono così facilmente penetrare. Hora tornando al mio proposito la figura dello stomaco è tonda, & lunga, & larga verso il principio, & si va ristignendo a poco a poco verso il fine, & misurando per la parte di sopra dalla cima al fondo, vi è molto meno, che misurando da quella di sotto. Et egli è tutto vguale, & liscio; pur di dietro gli si vede vn seno, che fanno nel suo mezzo al trauerto i corpi de nodi della schiena, & la vena & arteria, che passano sopra loro. Questo seno non si vede nello stomaco se non quando sta nel corpo, & perciò gonfiandolo bene è in certo modo simile ad vna calza da far cristeri. Et hà due bocche; vna, per doue entra il cibo, detta da Greci Stomachus, che vuol dir Bocca, alla qual si congiunge la canna della gola nel lato manco sotto della diaframa, alquanto verso il mezzo del corpo, & vn'altra chiamata Pilon o Ianitor, che vuol dir portinaro, (perche per essa esce fuor la viuanda, da poi che è smaltita) laquale è nel lato diritto quasi in frōte della bocca. Di modo che'l mangiare facilmente si può ritenere nello stomaco, fin che sia cotto, senza per cio esser di bisogno, che la bocca di sotto si chiuda tanto strettamente, come alcuni han pensato. Di queste due bocche, quella di sopra è piu larga, che quella di sotto; perche piu facilmente potessimo inghiottire il mangiare, & con minor trauaglio il ritenessimo. Ma che quella di sotto sia anche molto grande, ce'l dimostrano alcuni, che a caso, o volendo eglino farlo, inghiottiscono anello, o scudo, od altra cosa simile. Et la glandola, che si vede nell'intestino, che è attaccato a questa bocca, di sotto, secondo il lungo suo, anche non aiuta, che meglio si chiuda questa bocca, ma a sostener gli rami della vena porta, che si diuidono in questa parte. Et le tele dell'vna, & dell'altra bocca sono piu grosse *b* alquanto, che'l resto dello stomaco, come facilmente si conosce premendole fra le dita, & assai meglio rouesciando lo stomaco; perche si vede manifestamente, che sono alquanto rileuate tutto intorno, & si conosce assai chiaro, doue la canna della gola, & l'intestino duodeno si congiungono alla bocca, & al fondo dello stomaco. Tali grossezze fanno, che la bocca & il fondo dello stomaco siano assai piu forti. Tutto il resto dello stomaco è liscio, & piano *e* di dentro, ne piu ne meno, che detto habbiamo esser di fuori, eccetto nelle due parti sopra dette, nelle quali si fanno certe crespe, quando lo stomaco è ben chiuso, & queste parti non sono così bianche, come il resto dello stomaco, principalmente dalla parte di

Il sito dello stomaco.

Doue si hanno da fare l'ontioni per lo stomaco.

La figura dello stomaco.

La bocca, & il fondo.

La bocca di sotto dello stomaco non è molto stretta.

Le tele dello stomaco doue son piu grosse.

b fi. xv. h i

e la med.

Lib. terzo delle Membra

*La grandezza
dello stomaco.*

*La sussistenza dello
stomaco si fa di
due tuniche.*

*Quante sorti di
fili ha lo stoma-
co.*

*La seconda Tu-
nica.*

Vn'altra Tunica.

*L'offitio dello
stomaco.*

dentro, nella quale sono alquanto rosse. Si vede oltre di questo alle volte vna gran quantità di grasso nel fondo dello stomaco. La grandezza dello stomaco è varia; perche oltre che alcuni l'hanno maggiore, che alcun'altri, in ognuno è maggiore o minore, secondo che piu o meno hà mangiato; perche s'allarga, & strigne, come vna vescica in tal modo, che o poco, o molto cibo, che habbia dentro, nella medesima maniera l'abbraccia, senza lasciar luogo alcuno voto; il che può egli molto bene, & ageuolmente fare, perche è neruoso, & comporta di allargarsi, & strignersi, senza pericolo alcuno. Et è fatto di due tuniche larghe, & sottili, & attaccate, ma alquanto differenti; perche quella ^d di dentro è neruosa, ne piu ne meno, che quella della canna della gola, & è continua con la tunica di dentro della canna della gola, & con quella del palato, & labbra, & anche cō la tela di dentro de gli intestini, anchor che alquanto piu tenera, che la tela della canna della gola, & quella della bocca, accioche nel masticare, & inghiottire alcuna cosa aspra, non si scorticasse, & per cio questa tela dalla bocca fin'al fondo dello stomaco va di mano in mano faccendosi piu morbida. Ha questa tunica vna sola sorte di fili, che vanno in obliquo; nella qual cosa è differēte dalla canna della gola, la quale hà molti fili diritti d'alto a basso, medianti e quali tira come con mani in giù il pasto. Ma lo stomaco (non hauendo offitio di tirar il pasto, ma sol di tenerlo, fin che sia cotto, & di poi gettarlo fuori, & il primo fa medianti e fili, che vanno in obliquo, il secōdo medianti e fili intrauerfati della seconda tunica) non hebbe di bisogno di fili diritti. La tunica di fuori è piu grossa, che quella di dentro, imperò piu morbida, & lenta, & stā congiunta con quella di fuori della canna della gola, & hà, com'ella, ne piu ne meno, i fili intrauerfati, e quali fanno certi quadri co fili della tela di sotto, fatti a scacchi. Sopra questa tunica ne stā vn'altra, che nasce del peritoneo, iui, done si congiunge a quella parte della diaframa, per doue passa la canna della gola, & la cuopre tutta in torno, mostrandosi in questa parte piu grossa, che in niun'altra, dando principio (come di poi dirò) alla tela di fuori della reticella. L'offitio dello stomaco è alterare il cibo, & conuertirlo in sua natura, & per tal ragione lo ritor na bianco, come lui, & cotto, ch'egli hà, & seruitosi di lui (o sia ricreandosi, o sia mantenendosi) l'auanzo tutto il getta per lo fondo medianti i fili attrauerfati; e quali premendo lo stomaco (come fanno le Donne le budella, quando fanno falsiccie) il gettano fuori. Di modo, che in lui (come in vn calderone o pentola) si cuoce la viuanda per tutto il corpo, & per tal ragione fu posto tra tante membra, che'l mantengono caldo.

d fi. xvj. m

e la med. l

f la med. k

De gl' Intestini.

Cap. 4.

*Tutti gl' intesti-
ni sono vn solo.
La prima diui-
sione de gl' inte-
stini.
Historia de gli
intestini sottili.*

*Historia de gli
intestini grossi.*

AL fondo dello stomaco si congiunge vn ^a Intestino, che cammina facendo molte girauolte, infino al fondamento. Il quale anchor che veramente sia vn solo, non dimeno gli furono dati diuersi nomi da gli Antichi & Moderni, si per la diuersa sustanza sua, come per lo vario offitio. In prima gli diuidono in intestini grossi, & sottili. I sottili ^b cominciano dal fondo dello stomaco, & scendono torcendosi verso dietro, per di sotto la parte di dietro dello stomaco, a canto del lato diritto de corpi de nodi della schiena, senza far pieghe, o girauolte alcune. Ma nell'arriuare alla parte piu bassa dello stomaco, subito si nascondono sotto l'intestino colon, al quale diremo star appoggiato lo stomaco, torcendosi verso il lato manco. Et di poi facendo di molti circoli di sù in giù, senza tenere in cio ordine alcuno, o numero, empiono tutto il voto tra lo stomaco, & l'osso del pettignone, & i galloni, eccetto i lati di tutto questo spatio, che occupa (come di poi diremo) l'intestino colon, serbando sempre la medesima grossezza, & larghezza; se ben alle volte è alquāto piu largo, appresso lo stomaco. La figura di questo intestino è tonda & liscia. La sustanza è neruosa, & sottile, & composta di due ^d tuniche; delle quali quella di dentro è dura, & neruosa, ma piu morbida, che la tunica di dentro dello stomaco; quella di fuori è manco neruosa; ma amendue sono assai sottili. Et hanno ognuna di loro vna sola sorte di fili, che l'attrauerfano d'intorno, & quella di fuori, vn poco innanzi, che arriue al cieco, hà alcuni fili diritti. Hà questo intestino sottile oltre alle tuniche dette, vn'altra, e che nasce del peritoneo. A gli intestini sottili ^f stanno attaccati i grossi al lato diritto sotto el rognone, alquanto piu verso il fianco; & quindi ritornano in sù d'intorno a gli intestini sottili, & riuolgendosi passano sotto el cōcauo del fegato, a cāto del

a fi. iij. v. ix. xj.

b fi. xj. s. fi. vj. H

c fi. v. V

d fi. viij. h. i

e la med. k
f fi. v. vj. vij.
ix. N. P. Q.
R. S. T. Y. a

g. fi. v. dalla P alla Q
h la med. G
i fi. v. viii. R
k la med. S
l la med. dalla T all'a
m fi. vi. tra la I. & la L. fig. xi. tra la S. & la c
n fi. vii. k. fi. xi. c
o fi. vi. L
p fi. v. vi. vii. ix. N
q la mede. o
r la med. dal P. al. Y
f fig. vii. VV
r fig. viii. h
u la med. i
x fi. vii. tra l'Y. & l'a
y fig. viii k

del fiele, nella qual parre sono alquanto gialle. Et di poi passano dal lato s diritto al manco, per sotto la parte piu bassa dello stomaco & arriuan alla ^h milza, doue fanno certe riuolte, & quindi scendono, a poco a poco, di sopra il rognone manco, appoggiate alla tela del peritoneo, in fino all'osso ⁱ del pettrignone, doue si storcono inuerso dètro, come che vadano ^k verso il bellico; ma subito ritornano faccendo vna riuolta, & si distendono sopra l'osso grande, & indi scendono ^l dirittamente in fino al fondamento. Questo è il progresso delle budella, il quale hà di lunghezza piu di venti braccia di misura. Et tutte hanno due tuniche proprie senza la commune; ma nelle sottili stà il cibo, com'esce dello stomaco, & da loro si separa quello, che si hà da conuertire in sangue, o in orina; nelle grosse stà tutto l'auanzo conuertito in fecce. Ognuno di questi intestini si diuide in tre parti; ^m la prima delle quali piglia dal fondo dello stomaco, fin doue comincia a storcersi & far delle girauolte. Questo intestino chiamarono gli Antichi Duodecimo, o Duodeno, perche ordinariaméte non è piu lungo di dodici dita. Et cosi lo chiamerò io sempre, poste da banda tutte le questioni, che senza vtile alcuno muouono alcuni. Se pur si deue chiamar cosi, o vero Ecphysis, che vuol dir processo, o principio; o se si deue chiamare il suo principio Ecphysis, & il resto intestino. Lo chiamino essi, come lor meglio piacerà: io sempre lo chiamero l'intestino duodeno. Al fine di questo intestino entra (come diremo) vn ⁿ spiraglio, che viene dal fiele, Il secondo ^o intestino comincia dal fin del primo, iui, doue comincia a far girauolte, & si chiama comunalméte l'intestino digiuno, perche stà quasi sempre voto, per ragion del buco, che habbiam detto essere al fin del duodeno, per lo qual entra la collera, & fa, che piu facilmente scenda il mangiare. Ma non percio la scia di non hauer sempre dentro alcuna cosa. A questo intestino si congiunge il terzo (che è il piu sottil di tutti, & chiamato percio Ileón;) anchor che, doue si coniungano, sia molto difficile a sapere, per non esserui segno alcuno di diuisione, & perche rade volte o niuna l'intestino chiamato duodeno nò è tanto voto, che non habbia sempre qualche cosa dentro. Ma io direi, che doue le vene, (che diremo stare nel mesenterio, che è attaccato a questi intestini) cominciano a esser piu grosse, & gli intestini piu pieni, finisca il digiuno, & cominci questo sottile; il quale va faccèdo di molti giri in fino al finire nel principio de gli intestini grossi. E quali si diuidono anche (come habbiam detto) in altri tre, cio è in cieco, in grosso detto Colon, & in retto. P Il Cieco dicono alcuni essere quella borsa, che fa l'intestino colon subito al principio, (che noi altri comunalmente chiamiamo il Cieco,) & che si chiama cieco, perche nò hà piu d'un buco. Alcuni altri dicono essere quel picciolo intestino, ^q che è attaccato al fin di questa borsa (come vna giunta) simile ad vn lombrico; il qual ne gli huomini stà cosi chiuso, che non vi possono entrar dentro fecce, & per questo il chiamano cieco; come chiamano ciechi il secondo, & terzo buco dell'osso delle tempie, perche non tralucono. Alcuni altri vogliono che per l'intestino cieco s'intenda la detta borsa insieme col lombrico. Sia la cosa, come vogliono questi, o quelli, poco importa, lo chiami ognuno, come gli verrà in fantasia, cò questo, che egli nò erri nell'historia, ne meno nel sito; che è (come habbiam detto) sotto el rognone diritto verso la banda di fuori, a canto del peritoneo. ^r L'intestino Grosso (che è il piu capace di tutti, & p cio credo fusse chiamato da i Greci & Latini Colon, che vuol dir ventre) piglia tutto il resto dell'intestino, in fino che arriua al principio dell'osso gràde. Non è del tutto tondo, anzi alquanto piano, & di sopra, & di sotto, & da lati è ^s tutto fatto a borse, benchè, quāto piu s'appressa all'intestino retto, tanto meno fa girauolte, & piu son grosse le sue tuniche. Et cosi in questo intestino; come nel cieco, la ^t tunica di dentro hà è fili attrauerati d'intorno, & molto spessi; quella ^u di fuori nell'intestino colò hà alcuni fili al trauerso, & ben assai secondo il lungo, nò tutto intorno dell'intestino, ma solamente per la parte di sotto, & per quella di sopra, che habbiam detto essere vn poco piu piane; perche per gli lati i fili attrauerano dirittamente, secondo le impressioni, che si fanno nell'intestino, faccèdolo in questa parte assai più gagliardo. Et ognuna di queste impressioni sta legata cò due assai forti legature, vna per lato, che vanno di sù in giù. ^x L'intestino Retto piglia dall'osso grande, in fino al fondamento, & è tondo, & liscio, senza alcuno giro; dal che fu chiamato Intestinum rectum, che vuol dir intestino diritto. Ha similmete due tuniche; delle quali quella di fuori hà è fili diritti, & molto spessi, & que, che vāno intorno intorno, piu rari, ^y La terza tunica (cosi di questo intestino, come de due sopra detti) nasce,

Le Tuniche de gl'Intestini.

Diuisioe de gl'intestini sottili.

Il Duodecimo.

Il Digiuno.

Il Sottile.

Doue finisce l'intestin Digiuno.

Gl'Intestini Grossi. L'Intestino Cieco.

L'intestino Colon.

L'intestino Retto.

Lib. terzo delle Membra

nasce, ne più ne meno, che quelle de sottili, dal peritoneo, & si distende per lo concauo loro, eccetto che la parte dell'intestino colon, che è attaccata allo stomaco, piglia questa terza tunica dalla rela di sotto della reticella, & mediante quella si lega alle spalle, ne più ne meno, che gli altri intestini tutti si legano alla schiena, mediante il mesenterio. Et così habbiamo contata l'historia tutta de gl'intestini.

Del Mesenterio.

Cap. 5.

Il sito del Mesenterio.

CHIAMANO i Greci ^a il Mesenterio, Mesenterion, o Meserion, che vuol dir mezzano, perche par che stia nel mezzo de gl'intestini. Altri lo chiamano le animelle, per esserne egli tutto pieno. Questo Mesenterio è situato dietro gl'intestini, fra loro & la schiena, & mediante lui stan legati gl'intestini alla schiena, & per poterlo far più sicuramente fu fatto di due tele ^b congiunte l'una coll'altra, che nascono del peritoneo, nel mezzo delle quali ci sono molte animelle, & grasso. Questo mesenterio non nasce da vn luogo solo; perche essendo differente il sito, & stando vna parte di lui nel lato ^c diritto; vn'altra nel ^d maco; vn'altra nel ^e mezzo, quella di mezzo (mediante la quale son legati l'intestino digiuno, & il sottile) nasce delle tele del peritoneo, che cuoprono ^g l'arteria grande, & la vena grande nel scendere per gli lombi. Perche di queste tuniche escono molti fili neruosi, e quali subito si couertono in due tele, le diritte nella diritta, le sinistre nella sinistra. Quelle, che legano l'intestino retto, & il colon, nascono della tela del peritoneo vicino doue passa. Perche in queste parti escono certi fili neruosi del peritoneo, che si conuertono nelle rele del mesenterio, che son due; nel mezzo delle quali sono molte animelle, p ragion delle vene, & arterie, che (come diremo) si spargono fra tela, & tela.

a fi. ix. x. MM

b fig. x. X. Y.

c la med.

PQ

d la med. R

ST

e la med.

NN OQ

f fi. xi. k l m

g fi. xix. PQ.

fi. xxi. g

Della Reticella.

Cap. 6.

Il sito della Reticella.

LA Reticella (che chiamano i Latini ^a Omentum) sta situata sotto la parte di nanzi del peritoneo, & cuopre gl'intestini, cominciando dalla milza, & dal concauo del fegato, & da tutta la parte più bassa dello stomaco. Et quindi scende distendendosi sopra le budella ordinariamente, infino a quattro, o cinque dita, più giù del bellico, & tal volta infino all'osso del pettignone; & dipoi ritorna in sù piegandosi in dentro, & facendo la figura naturale d'un carnieri, che sia tondo di sotto, & habbia la bocca tonda. Questa tela monta tra la tela di sopra, & gl'intestini, infino all'attaccarsi al concauo del fegato colla parte dell'intestino colon, che è attaccata allo stomaco. Et quando si discioglie tal doppiezza (quello, che intrauiene in alcuni) all'hora la Reticella è tanto lunga, che giunge non solamente alla bocca della matrice (come hanno detto alcuni) ma alla borsa anchora de testicoli, come accade in alcuni, che sono aperti. Questa reticella è fatta d'una tela doppia, liscia, & senza filo alcuno, & seminata di molte animelle mescolate con grasso, & piena di vene, & arterie, così in essa intrecciate, che la fanno parere vna rete; dal che i Greci la chiamarono Epiploon, che vuol dire intrecciamento. Et benché sia fatta d'una tela sola, pur perche è doppiata, diciamo che sia fatta di due; delle quali la seconda di verso dentro nasce del peritoneo (iui, douel'arteria grande passa per la diaframa, & s'attacca alla vena grande) delle telucce, che escono di quella parte di lei, che nasce de nodi delle spalle, & legano la vena, & l'arteria grande alla schiena, appresso l'undecimo nodo delle spalle, & cammina à man destra verso la parte del concauo del fegato, attaccandosi in alcuni luoghi al fegato, & alla parte della diaframa, che è attaccata alle coste; benché questo non accade assai volte, ne in tutti scontro a vna istessa costa. Dal concauo del fegato cammina verso il lato diritto dello stomaco, al quale anchora si attacca, & a tutto l'intestino duodeno, dal suo principio infino appresso il digiuno, & quindi monta in arco, attaccandosi alla parte più bassa dello stomaco, infino all'arriuare al concauo della milza. La tela di fuori nasce dalla parte più bassa della banda di nanzi dello stomaco, secondo il lungo suo, da man destra a man manca, & inferendosi dirittamente nel còcauo della milza, s'attacca alla tela di sotto, che habbiamo detto finire anchora in lei. Questa reticella non è attaccata in parte alcuna a gl'intestini, se non dalla parte di sotto, oue è attaccata a quella parte dell'intestino colon, che s'appoggia allo stomaco. Et è suo officio coprire tutti gli intestini

a fi. ii. iii. iii. xxv.

La figura.

La sostanza.

Di doue nasce la Reticella.

intestini, & mantenergli caldi, & riceuer sicuramente i rami delle vene; & arterie, che (come diremo) vanno allo stomaco, alla milza, all'intestino duodeno, & ad vna parte dell'intestino colon, a cui serue per Mesenterio.

Del Fegato.

Cap. 7.

GRAN disputa è stata tra i Medici; & Philosophi, se'l Fegato è principio del sangue, o vero il Cuore. Ma, chi vuol ben guardare il modo, nel qual si mantiene il bambino nel corpo, & da poi che è nato, & insieme la sustanza, & il color del fegato, non dubito che terrà per fermo il fegato esser principal membro, nel qual si fa il sangue, di cui tutte l'altre parti si nutriscono. Ma, perche nell'istoria delle vene si tratterà di ciò più lungamente, hora il presuppongo così, come cosa prouata. ^a Hora è il fegato situato sotto ^b la diaframa al trauerfo, da man destra a man manca; benché la sua maggior parte, & la più grossa, stà dal lato dritto; la quale tutta fin' alla sua metà stà appoggiata alla diaframa; il resto tocca solo la parte sua di nanzi. Et egli tutto stà attaccato in diuerse parti medianti molte tele, che nascono del peritoneo (come subito dirò,) & il tegono legato tanto strettamente alla diaframa, che (fuor che ne gli huomini molto stretti di petto) stà quasi tutto nascosto sotto la forcella dello stomaco, occupando tutto quel luogo, che abbracciano le coste mendose. La figura del fegato, corrisponde à quelle membra, che gli son vicine; & per ciò, per ^c la parte più alta (che è appoggiata alla diaframa, la qual fa vna figura incauata) è gobbo, liscio, & vguale, & come incassato in quella. Et nel mezzo di questa parte verso dietro ha vna intaccatura, della quale sicuramente senza poter esser offeso nasce ^d il tronco della vena grande. Per la parte ^e di sotto, che stà sopra lo stomaco (il qual dianzi habbiamo detto esser tondo, & largo) si fa il fegato concauo in tal modo, che par che l'abbracce; benché non è ne liscio ne vguale, come per la parte più alta, anzi è vn poco rileuato nella parte più bassa verso dietro, nella quale hà due tubercoli, & nel mezzo si fa come vna fessura, per doue diremo passar la vena ^g porta, & habbià detto passar l'intestino ^h duodeno. Fassi anchora vn seno nel lato dritto di questa parte, nel qual s'incassa ⁱ la vescica del fiele, & vn'altro nel manco, per lo qual passa la canna della gola, & pertugiando la diaframa, va a congiungerfi allo stomaco. Et la parte sua, che tocca il lato dritto, & la parte di dietro dello stomaco, è assai più grossa, & tonda; quella, che occupa il lato manco, è molto sottile, & finisce, come in ^k vna punta. Et egli tutto è assai più sottile dalle sponde, che nel mezzo, & principalmente per la parte di nanzi. Nella qual parte hà alcune fessure, che son tutte molto picciole, eccetto vna, ^l che stà nel mezzo di questa parte scontro alla forcella dello stomaco, alquanto verso man ritra, nella qual s'inferisce (come diremo) la vena ^m del bellico. Ne anche ha altre diuisioni il fegato dell'huomo, anchor che ne gli animali brutti ne habbia ordinariamente quattro, o cinque. In conclusione non ha il fegato altra particolar figura, che quella, che gli danno le parti che gli son vicine. Il che non fu fatto senza cagione; perche, si come gli fu di bisogno che fusse grade, & grosso, per rispetto delle molte vene, che si spargono per lui, così non gli fu necessaria particolar figura, stando fra tante membra. Fassi il fegato maggior, o minore, secondo che sono gli huomini più o meno golosi. La sustanza del fegato non è altro, che vn sangue congelato, per la quale stan seminate infinite sorti di vene, & tutto insieme stà inuolto in vna molto sottil tela, che nasce delle legature, che'l congiungono al peritoneo sotto della diaframa. Di queste legature le principali son due; vna dura, & molto gagliarda, ma sottile, come tela, la quale habbiamo detto ⁿ stare al lato dritto appresso la forcella dello stomaco; vn'altra molto gagliarda, & quasi tonda, che ^o nasce del peritoneo, al lato manco appresso la punta, che fa il fegato, & il legano in questa parte al peritoneo. Legasi anche il fegato al peritoneo, iui doue il tronco della vena grande esce del fegato, & anche si lega alla reticella appresso il principio della vena porta, & alla parte di nanzi del peritoneo, col mezzo della vena del bellico. Anzi pare che'l fegato sia legato al bellico, mediante questa vena; la quale ne gli huomini si secca, & fa dura, come legatura, o corda. Di tutte queste legature nasce la detta tela, che fascia tutto il fegato, nella qual diremo interirfi due rami di nerui. L'offitio del fegato già habbiamo detto non esser altro, che conuertire il mangiare in sangue, & perche meglio potesse farlo, fu fatto di tante vene.

Il Fegato è principio del sangue.

Il sito del Fegato.

La figura.

La sustanza.

L'offitio del Fegato.

Del

a fi. ij. H H.

fi. v. DD. fig.

xi. K. fi. xix.

B. fi. xxi. bb.

fi. xxvi. L. li.

vi. t. v. fig. x.

GG.

b lib. ii. t. vii.

Δ

c fig. xxi. bb.

fig. xvii. AA

BB

d fig. xvii. C

DE

e fig. xi. KI

f la med. PQ

g fig. xxi. f

h fig. xi. s

i la mede. V.

fi. xix. H li.

vi. t. v. fi. x. H

k fig. xix. c

l fig. ii. tra le

H H

m la med. G

n fig. v. c

o fig. xi. o

Lib. terzo delle Membra

Del Fiele.

Cap. 8.

HABBIAMO detto del membro doue si fa il sangue, hora fa bisogno parlar di quei, che'l purgano da alcune superfluità, con le quali fu di bisogno venire infino a lui, incominciando dalla vescica, che purga la collera. ^a La qual stà situata in quel seno (che habbiam detto farfi nel mezzo della parte diritta del concauo del fegato, che abbraccia il lato diritto dello stomaco) del qual nasce la metà del corpo suo; il suo resto insieme col collo esce fuori del fegato, infino all'arriuare al principio della ^b vena porta; & iui si diuide in due tronchi. Vno, che va in sù, & appoggiandosi alla parte di nanzi della detta vena si diuide in due ^c rami, che vanno, vno a man destra, l'altro a man sinistra; & si spargono per lo fegato, diuidendosi, ognun di loro, in molti ramuscelli, che camminano per la sustanza del fegato, fra le radici della vena grãde, & quelle della vena porta. Per questi ramuscelli va la collera dal fegato al fiele. ^d L'altro trõco cammina all'in giu, appoggiandosi alla tela di sotto della reticella; & così cammina in obliquo all'in giu infino al ^e fine dell'intestino duodeno, entrando tra tela & tela in tal modo, che da poi, che è uscita, si tornano ad accostare l'vna & l'altra tela dell'intestino, & non lasciano che piu tienti la collera; & così scende infino alli intestini, senza mai montare allo stomaco, eccetto in alcuni, che oltre all'esser molto collerichi patiscono gran fame. Questa vescichetta è luga, & tonda nel fondo; & si va ristignendo a poco a poco infino al collo, come vn pero; & è fatta d'una tela neruosa, & sottile, ma dura, & forte, & la quale facilmente s'allarga o strigne, secondo che piu o meno vi è collera dentro; & hà tre sorti di fili, i primi cominciando di dentro sono diritti, i secõdi obliqui, i terzi intrauersati. Questa tunica stà inuolta in vn'altra, che nasce di quella, che rinuolge il fegato; benchè non tutta è inuolta, ma sol quella parte, che habbiam detto vscir del fegato. L'offitio di questa vescica è nettare il sangue dalla collera per lo tronco, che entra nel fegato, & mandarla a gli intestini; per laqual cosa si va ad inferire nel fine dell'intestino duodeno, non senza grand'util nostro. Perche, si come è forte, & ha gran virtù di nettare, & in questa parte ordinariamete è molta flemma, che esce dello stomaco, così non la lascia per niun modo fermare; & per tal ragione aiuta anche, che piu facilmente escano le fecce de gli intestini. Questo tronco suole in alcuni huomini môtare al fondo dello stomaco; & que tali son forzati a andar sempre vomitando collera; per la qual cosa e Medici gli chiamano sgratiati nella creatione.

Il sito del Fiele.

Per doue entra & esce la collera al Fiele.

La figura del Fiele.

La sustanza.

L'offitio.

a fi. xi. xii. V. fi. xix. H. li. vi. t. v. fi. x. h

b fig. xi. h

c fig. xii. Y d fig. xi. xii. c

e fig. xii. d

Della Milza.

Cap. 9.

LA Milza è posta ^a nel lato manco, tra lo stomaco, & le coste, alquanto verso la schiena; & secondo il lungo piglia dalla diaframa infino al fine delle coste mendo se, senza calar piu in giu, in coloro, che non l'hanno grande fuor di misura; secondo il largo piglia dalla schiena, infino al principio delle cartilagini delle coste. ^b La figura della milza è conforme alle parti, che le son vicine; perche la ^c parte di sopra, che tocca la diaframa è alquanto rileuata; quella ^d di dentro, che tocca lo stomaco, è alquanto ammaccata. Et nel mezzo suo da alto a basso, hà vna ^e riga rileuata (benchè non vguale da ogni parte) nella quale s'inferiscono alcune ^f vene, & arterie, come al suo luogo diremo. Dal lato manco, che si congiunge ^g alla schiena, è vn poco incauata; ^h dal diritto che passa à canto le cartilagini delle coste, è gobba; da ⁱ quel di fuori, che è appoggiato alle coste, è alquãto gobba, & hà impressi in se i segnali delle coste, alle quali è appoggiata. Et la milza ne gli huomini è piu grossa, & larga, che ne gli animali bruti, ma nõ è tanto lunga, come in loro, anzi è quadra; solamente al doppio piu lunga, che largha; & finisce di sotto (volando si vn poco in nanzi) in vna punta sode; di sopra finisce come in arco incauandosi vn poco nel mezzo, di modo, che fa come due punte molto sode, delle quali quella di sopra è piu largha che quella di sotto. Et tutta la milza (così di dẽtro, come di fuori) è d'un color tanẽ molto oscuro. ^k La sustanza della milza è spugnosa, nera, & grossa; & per lei si veggono seminati molti, & assai sottil ramuscelli di vene, ^l & arterie. Et è tutta couerta d'una molto sottil tela, che si fa delle tele della reticella, che s'inferiscono nella riga, che si vede nel lato suo di dẽtro, le quale s'allargano & couertono in lei; ma perche la reticella nasce

Il sito della milza.

La figura.

Il color della milza. La sustanza.

a fi. xix. OO

P fig. v. G b fig. xvij. c la med. D d la med. tra l'F. el la G e tra le H H f B B g G h F i L L

k i x l lib. vi. t. iij. fi. i a a a. t. v. fi. iij. N

a fig. xix. a fi. xix. xxi. m. a. fi. xxi. TV

b fig. xix. a fi. xxi. xxi. m. a. fi. xxi. TV

c guarda m. la xxi. fig.

nasce del peritoneo, diciamo anchora, che la tela, che cuopre la milza, nasca di quello. Legasi la milza allo stomaco, & alla schiena, col mezzo della tela della reticella; alla diaframa, & alle spalle, medianti alcuni fili neruosi, & sottili, che nascono del peritoneo, iui, doue cuopre la diaframa; benché questi fili non tutta volta si trouano. Legasi anche tal volta la milza, per la parte sua gobba alla tela di fuori del rognone manco, che è piena di feuo, principalmente quando la milza s' incaualca sopra il rognone. L'offitio della milza è nettare il sangue della malinconia.

*De Rognoni o vero Arnioni.**Cap. 10.*

H A B B I A M O detto delle membra, che nettano il sangue innanzi, che esca del fegato; sarà bene trattare hora di que, che purgano le vene dalla superfluità, che è in loro. Per la qual cosa è ben sapere (come al suo luogo diremo) che, come il sangue si è generato nel fegato, entrando subito nelle vene, si distribuisce per tutte le parti del corpo; per il che fu di bisogno, che con esso si mescolasse alcuna parte di quel, che beuiamo, la quale faccendolo piu liquido, aiutasse, che piu facilmente potesse entrare per qual si voglia sottil vena. Questa acqua (dopo l'hauer fatto il suo offitio) parte si risolve per sudore; parte ritorna per l'istesso cammino, per doue venne, al tronco della vena grande, di doue va alla vescica, portādo seco vna gran parte dell'humor adusto, che s'ingenera nel corpo.

a fig. xix. xx.
xxj. xxij. T

Per la qual cosa furono fatti e rognoni, & a situati sotto el fegato; l'vno al lato destro, & l'altro al lato manco; anchor che poche volte stia l'vno scontro all'altro, & si come ordi-

Il sito de Rognoni.

nariamente sta il sinistro piu alto, & tal volta il diritto, cosi non mai sta l'vn piu alto, che l'altro, la metà della lunghezza dell'vno. La parte piu alta del diritto è appoggiata al fegato; quella del manco alle volte entra sotto della milza, & ordinariamēte la tocca, & amēdue per la parte di dentro appresso la schiena, stanno appoggiati alla parte piu bassa della diaframa, che passa per sopra la decima, vndecima, & duodecima costa, iui, doue le coste sono piu storte verso dietro; nella qual parte stanno tato nascosti, che quasi non impediscono punto. Sono i rognoni vguualmente grossi da ogni parte, & lunghi, & stretti; piani di dietro; & dinanzi, dal lato di fuori tōdi, & gobbi; da quel di dentro (oue son piu corti) curuati in dentro; son' anche piu larghi di sopra, che di sotto; in modo, che rappresentano giustamente la figura d'vn fagiuolo, & son di mediocre grossezza secondo il corpo, lisci di fuori, molto rossi, & lucidi di dentro. Et son fatti d'vna sustanza carnosa, dura, & massiccia, senza esser per essa sparto alcun filo, come ne anche ne sono nel fegato, & milza; perche le tele delle vene, & arterie, che sono seminate per loro, fanno l'offitio di attrahere, ritenere, cuocere, & mandar via. Ne manco si vede dentro de rognoni quel colatoio, ne que seni, che molti Medici si sono imaginati; anzi e' canali, che vengono, b l'vno dalla vena grāde, & l'altro dall'arteria grande, per e quali diremo succhiare e rognoni l'orina, tosto che entrano nel rognone, s'uniscono, faccendosi d'amēdue vn corpo, la cui tunica è grossa, come diremo esser la tunica dell'arterie, & si distribuisce per tutto il corpo del rognone in questa guisa. In prima faccendosi piu largo, si diuide in due parti, l'una che stā verso dietro, l'altra verso nanzi; quella dinanzi si diuide, quando in sei, quādo in sette, & quando in piu ramuscelli, ne quali si diuide anche la parte dinanzi della detta tunica. Et eglino tutti si distribuiscono per la parte dinanzi, & di dentro, del rognone, scostandosi vguualmente l'vno dall'altro, & cāminando verso il lato di fuori del rognone; doue diuidendosi in piu rami, si congiungono con quei, che per la parte di dietro, & anche di dentro, fanno il medesimo cammino, lasciando nel mezzo vna manifesta cōcauità, come vn mezzo cerchio. Questa tela nō è attaccata alla sustanza del rognone da ogni parte. Perche innanzi, che si diuida ne detti rami, s'attacca alla parte dināzi, & di dietro, & di dentro del rognone, separandosi da quella di fuori. Nondimeno e' rami stanno sempre attaccati alla sustanza del rognone; que di dietro dalla banda di dietro; que dinanzi dalla banda dinanzi, insino doue si tornano a congiungere. Et tra ramo & ramo fa il rognone come vna costicciuola, o tramezzo, che non è attaccato a rami, & nasce della sustanza del rognone, che s'inferisce ne rami, quādo si congiungono. Di sorte, che tra l'vna tela & l'altra si fa vn'altro picciol seno, il quale anche è diuiso in due. Perche se ben pigliā dolo p la parte, che guarda el lato di fuori della detta tela (iui, doue comincia a farsi rami)

La figura.

La sustanza.

b fig. xix. a. b.
fi. xxj. xxij.
m. n. fi. xxvj.
T V

c guarda nel
la xxj. fig.

Come stan fatto
e Rognoni di dietro.

pare

Lib. terzo delle Membra

pare semplice, pure, se lo miriamo, da doue nasce della sustanza del rognone, camminando in fuore, pare doppio; perche l'vna sua parte sta fra l'tramezzo detto, & i rami dinanzi, & l'altra tra l'istesso tramezzo, & i rami di dietro. Questa concauità ordinariamente si troua humida, & senza sangue, ma la tela detta insieme co rami (che pare, che potrebbe esser il primo seno) si vede sempre piena di sangue. Il secôdo seno si vede pieno d'vn seuo alquâto duro, & mescolato cō vno humore acquoso; il quale alcuni pensauano essere quel colatoio, del quale tanto parlano molti, più d'vdita, che di veduta, perche ne rognoni non è più colatoio, ne seni, de sopra detti. Et l'orina viene a loro per la vena chiamata fucciatrice; la qual (come al suo luogo diremo) s'inserisce nel mezzo della parte del lato di dentro del rognone, & cominciando dal lato di fuori della tela neruosa, iui, doue si comincia a diuidere in rami, & passando per mezzo di questo corpo, va di mezzo de rognoni a vscir per lo lato di dentro del rognone. Hanno e rognoni due^d tele, differenti così in sustanza, come in nascimento. La prima cuopre il rognone tutto intorno, & nasce del peritoneo, iui, doue i rognoni le stanno appoggiati, nella qual parte nascono certi fili di lei, & si couertono in questa tela. Questa tunica è tutta seminata di vene, ne più ne meno, che la reticella, & piena di grasso o seuo, mediante il quale aiuta, che meglio possano far suo offitio. La seconda tela è molto sottile & simile a quella dal fegato, & della milza.

Le tele de Ro-
gnoni.

d fig. xix. T.
fi. xxj oo pp

Della Vescica.

Cap. II.

Il sito della Vescica.
La figura.

LA Vescica^a è situata fra l'osso del pettignone, & l'intestino retto, come in qual si voglia animale si può vedere. Et è di figura ouata, più larga dal fondo, che verso la bocca; doue finisce in vn collo stretto assai più largo ne gli huomini, che nelle dōne; ne quali son differenti, così nell'offitio, come nelle parti, che se gli congiungono, anchor che simili nell'vscir per amēdue l'orina, & nell'hauere vn musculo d'intorno, come già habbiam detto. Nondimeno hanno gli huomini oltre di ciò vn^b corpo come spugna (nel qual si raccoglie il seme, da poi che è fatto), & cammina verso la parte dināzi dell'osso del pettignone, doue si^c congiunge alla radice del membro. Nelle donne non è questo corpo; anzi il collo medesimo si congiunge^d alla parte di sopra del collo della madre, & risponde al voto dell'osso del pettignone torcendosi vn poco in sù. Questa vescica si compone di due tuniche neruose, & molto arte a raccogliersi facilmete, & distendersi, come era di bisogno; questo, perche vi capesse più orina; quello, perche occupasse men luogo. La prima di queste tuniche è dura, liscia, neruosa, & gagliarda; la quale alcune volte par più grossa, & alcune più sottile, secondo che è più raccolta, o distesa. Nondimeno verso il collo della vescica, & verso il fondo, sempre è più grossa, per rispetto d'alcuni buchi, che si fanno in questa parte. Questa tela ha tre sorti di fili, come gonfiandola manifestamente si vede, i primi & di dentro son diritti, que di fuori intrauerfati, que di mezzo obliqui; con gli diritti attrahe l'orina, con gli intrauerfati la getta fuori, con gli obliqui la ritiene, secondo che dicono Galeno, & il Vesalio. Ma, quanto questo sia vero, spero alcun giorno di dimostrarlo, quando tratterò dell'offitio delle parti del nostro corpo. La seconda è quella, che rauuolge la prima dalla parte di fuori; la qual nasce del peritoneo, iui, doue la parte dinanzi, & il suo fondo, che si appoggiano all'ossa del pettignone, stanno attaccate al peritoneo in altra diuersa forma, che ne gli animali bruti. La parte di dietro della vescica (che tocca l'intestino retto, & nelle donne la^f matrice) è molto liscia, & lubrica, & couerta d'vna humidità acquosa. Alla parte più bassa di questo lato vègono due^g condotti, come vene, fatti d'vna tela alquanto più grossa, che quella delle vene, benchè intertestuta d'alcuni fili obliqui; e quali nascono del secôdo seno de rognoni, & passando per mezzo del primo, scendono alquanto innanzi per sopra i muscoli, che stanno attaccati a corpi de nodi de lombi, appoggiati al peritoneo, pigliando di esso vn'altra tela, che gli cuopre di sopra. Questi condotti chiamarono i Medici Vreteras o porus vriticus, che vuol dir condotti d'orina, perche per loro viene l'orina alla vescica, & entrādo^h tra due tele, ne più ne meno, che habbiā detto entrar la collera nell'intestino duodeno, fanno tanti giri, che, da poi che è entrata, non può tornare a vscire; anzi ne anche gonfiandola esce per queste parti l'aere, come ne anche esce de palloni da vento. Habbiamo finito l'historia delle membra, che seruono alla digestione, o nutrimento dell'huomo, in particolare. Restaci hora a trattare di quelle, che seruono alla cōseruatione dell'huomo in cōmune.

De gli

La prima tunica
della Vescica.

La seconda.

I Condotti dell'orina, come entrano nella Vescica.

a fi. ij. iij. N.
fi. v. g. fi. vj. L
fig. xi. o fig.
xix p. fi. xxj
xxij. V. fig.
xxv. T. fig.
xxvj. β li. ij.
t. xvj. fi. xvij
Q
b li. ij. t. xvj.
fi. xvij. a
c la me. fi. xv.
xvj. C C
d fig. xviii. g.
fi. xxix. L

e fi. xix. o. fi.
xxj. *
f fi. xxvj. x l
g fi. xix. o. fi.
xxj. xxij. qq

h fi. xxij. r

*De gli Organi dell' Huomo , che seruono alla Gene-
ratione .* (ap. 12.

TVTTI i Medici & Philosophi concordano, che'l seme dell'huomo concorre principalmente all'ingenerar la creatura. Ma, se la donna sparge seme o, nò; &, se la sparge, se serue per materia, & quel dell'huomo per dargli l'essere & la figura, come fa il quaglio al latte, quando si fa il cacio, o se si fa d'amendue insieme (benche non vguale) anchora da loro non è diffinito. Come ne anchora si conformano, in che cosa sia questo seme, & che parte del corpo. Ma perche non è questo il luogo da disputarlo, bastici sapere, che così la donna, come l'huomo sparge seme. Del che molte donne pratiche in tal cosa mi han fatto intera fede, & ne è inditio il vedere che hanno gli medesimi organi, che l'huomo; benche tal ragione al mio parere (se non fusse la fede, che di ciò m'hanno fatto diuerse donne) varrebbe poco; perche anche hanno gli huomini le tette o poppe, ne piu ne meno, che le donne, & non per ciò hanno latte; ne la natura loro le fece, perche con esse alleuassero le creature. Hora incominciando la cosa vn poco piu dal fondamento, dico che ciò, che l'huomo mangia, innanzi, che si còuerta nella sustanza del corpo, passa per quattro digestioni. In prima nello ^a stomaco si cuoce, & si conuerte tutto in vna sustanza bianca come latte, la quale i Greci chiamarono Chilo. Et è da notare, che quel, che entra nello stomaco, anchor che sia buon nutrimento, non si conuerte tutto ad vn tempo in chilo, come molti pensano. Ne si deue dar credito a quegli, che dicono che nò può cosa alcuna vscir dello stomaco, innanzi che sia tutto il cibo cotto, & conuertito in chilo; poi che ogn' hora veggiamo per esperienza il contrario in quei, che beono qualche picciol vino, principalmènte se è troppo; perche orinano indi a poco d' hora quasi altrettanta quantità d'acqua molto chiara; la qual non è altra cosa, che la stemma, o parte acqua fa di quel vino, & non ostante questo, non ha lo stomaco assai volte cotto il pasto, ne anche di li a dieci hore. Medesimamènte in quelli, che mágiano crescioni, sparagi, o ver agli, si vede che, se orinano indi a mezza hora, l'orina manifestamente ha l'odore di qual si sia di queste cose, che hanno mangiato; ilche esser non potrebbe, se stesse anche ogni parte di quel, che han mágato, rinchiusa nello stomaco. Ne piu ne meno veggiamo, che li fanciulli non restano mai di mangiare, & se non vscisse cosa alcuna dello stomaco, infino a tanto, che tutto quel, che sta dentro, si còuertisse in chilo, o e bisognarebbe che lo stomaco scoppiasse con tãto cibo, o che andassero eglino sempre cosa indigesta, ilche rade volte intrauiene; anzi veggiamo che quei, che fanno così, sono assai piu sani, & piu robusti. Per questa ragione anchora li Mulattieri, quando vogliono che li lor muli non si stracchino, pongono loro tutto il dì le gabbie alla bocca. Dico dunque che il mangiare, che entra nello stomaco, se egli è, quanto egli può riceuere senza pregiudizio suo, all' hora il cuoce tutto, ma non tutto ad vn tratto, anzi vna parte dopo l'altra. Et prima cuoce il tenero, & di poi il piu duro, & del tenero prima cuoce quel, che è caldo, & humido, che'l resto, & quel che ha cotto, sia quale egli si voglia, subito esce dello stomaco, senza aspettare, che tutto il resto si cuoca; ma non esce per la bocca di sotto dello stomaco, ma per certe bocche delle ^b vene del mesenterio, che si vengono ad inferire nella parte piu bassa del fondo, o corpo dello stomaco. Di modo, che e pare che'l fegato succi dallo stomaco, come per certe paglie o cannuccie, la parte piu sottile di quel, che gia si è conuertito in chilo. Et per tal ragione, anchor che vno vomite tutto il mangiare, non lascia di nutrirsi il corpo, & viuè l'huomo molti anni sano, & buono; quello, che si è veduto in molti. Il resto che è il piu grosso, esce per la bocca di sotto dello stomaco, & va a gli ^c intestini sottili, & iui si ritiene poco piu o meno di quello, che si è ritenuto nello stomaco, cocendosi, & affottigliandosi piu di quello, che era, quando vscì dello stomaco. Il che ordinò molto bene (come tutto il resto) il sommo Creatore ad effetto, che mancandoci per disgratia il mangiare, potesse indi il fegato medianti le medesime vene del mesenterio (che nascendo di quello vāno a seminarli per tutti questi intestini) succiar quel, che restaua di buono nel chilo, faccendo come vna ricerca di quel, che era restato nella prima vendemmia. Questo è così non mangiando l'huomo piu di quello, che può riceuere lo stomaco senza suo pregiudizio; ma, se mangia d'auuantage, succia il fegato sol quello,

Come si fa la digestione.

a fi. xj. P QR

b fig. ix. MM
N

c fi. ix. EEE.
fi. xj.

Lib. terzo delle Membra

che ha di bisogno, & il resto getta fuori lo stomaco, di mano in mano il peggio, & abbraccia il meglio. Come veggiamo auuenire ne gli cesti o vasi, doue è piantata alcuna herba o arbor, e perche, se ben l'annaffiamo di superchio, non mai pigliano piu acqua di quel, che hanno di bisogno, lasciando vscir quella, che auanza, per gli buchi, che sono da lati o nel fondo del vaso. Hora dico, che di quel meglio, che lo stomacho ritiene, succia il fegato nella forma detta il piu vtile & acquoso del chilo, & il resto di poi esce per la bocca di sotto dello stomaco, & si ferma ne gli intestini sottili nella forma, che poco fa habbiamo detta. Giunto che è il chilo al fegato si conuertere in sangue, & iui si netta della collera, malinconia, & acquosità, & si distribuisce di poi per tutte le vene, & essendo succiato, delle vene passa alle membra, mettendosi in certi bucolini, chiamati pori, che a tale effetto son fatti per tutta la persona. Et nell'vscire il sangue si conuertere in vn liquore, come rugiada, che è quello, che esce, quando scorticandosi alcuna parte del corpo, la spremiamo con le dita. Di questa rugiada si fa vn'altro liquore, di cui si nutriscono le membra, già quasi conuertito in la sustanza del corpo, chiamata perciò Cambium. Di quel, che auanza alle membra, di questo liquore, non dico della feccia, ma del suo meglio, si fa il seme; il quale tornando in dietro per lo medesimo cammino, per doue il sangue & la rugiada vennero a gli pori, torna^d alla vena grande. Et di quella (piu di sotto de^e rognoni) esce per certe^f vene, che in questa parte diremo al suo tempo essere, & va infino a testicoli; doue diuenta bianco per la ragione detta, Che ogni membro fa la cosa, che è in lui, del medesimo colore. Questi testicoli son posti in luogo, che tutti il fanno, & pendono fuori del corpo, si per temperare la calidità del seme; si per tenere distesi li condotti suoi, & sono ordinariamente due, per la qual cosa furono chiamati da Greci Didimi, che vuol dir Gemelli. Auuegna, che tal volte si veggano di quegli, che non hanno piu d'vno, & di quegli anchora, che ne hanno tre, ne quali il piu delle volte accade esserui inganno; perche fassi vn tubercolo dentro della borsa, & pare che sia vn'altro testicolo. Sono^g e testicoli tondi, vn poco piu lunghi, che larghi, o grossi, & piu acuti di sopra, che di sotto, non per ciò tanto, che paiano voua, come i testicoli d'altri animali. Questi testicoli dalla parte di fuori son lisci, & vguale, & di dentro son bianchi come latte, & tenersi vguale in ogni parte, eccetto che hāno alcuni ramuscelli di vene sparti per loro, che gli fanno parere alquanto spugnosi; non per cio hāno alcun'altro seno piu di quel, che fanno queste venucchie. Questi testicoli son couerti di molte tuniche o tele; delle quali alcune gli cuoprono amendue; alcun'altre gli cuoprono particolarmente, ognuna il suo. Perche la tela carnosā & la pelle gli fasciano amendue, & insieme i vasi del seme, ne piu ne meno, che fascino tutte l'altre parti del corpo, facendo ad ognun di loro due tuniche, o tele. Delle quali quella^h di fuori è la pelle, la quale in questa parte è piu sottile, che in niun'altra, ma piu intertessuta di vene. ⁱ La seconda (che si fa della tela carnosā) sta subito dietro la prima, senza essere nel mezzo grasso alcuno. Delle proprie che anche son due, differenti in grandezza, fattura, & nascimento) la^k Prima, & di piu in fuore, cuopre il testicolo, & i condotti del seme, fin doue forano il peritoneo sopra l'osso del pettignone. Questa tela è molto gagliarda, ma sottile, & piena di vene, & per la parte di fuori si congiunge alla tela carnosā, medianti alcuni fili neruosi, & tato spessi, che in alcuni pare che facciano vn'altra nuoua tela, principalmente in quei, che sono rotti, o hanno la borsa piena d'acqua; ne quali si vede questa tela, che si fa di questi fili, piena d'acqua. Questa prima tunica si congiunge alla sua compagna, che fascia l'altro testicolo, medianti alcuni fili neruosi, et per tal ragione son dalla parte di fuori (iui, doue si cōgiungono) alquanto aspre. Ma per la parte di dentro son lisce, & lubriche, & non si congiungono a corpo alcuno, eccetto nella parte di sopra, doue nascono, nella qual si congiungono al peritoneo, & nella parte piu bassa, oue s'attaccano fortemente alla parte piu bassa del testicolo. Attaccasi di piu questa tela per la parte di dietro, & di dentro, secondo il lungo, mediante vna sottilissima tela, che nasce del peritoneo, & inuolge i condotti del seme, & in questa parte si fa alquanto carnosā, conuertendosi in vn^l muscolo, rosso come al suo luogo notammo; per la qual cosa tutta la tunica fu chiamata da Greci Eritroides, che vuol dir rossa, o sia per lo gran numero delle venucchie, che passando per essa la fanno rossa, o sia per altro, poco importa saper la cagion del nome; basti intender la cosa. ^m La seconda tunica delle particolari, rinuolge solo il testicolo, & è dura, forte, & grossa, perche potesse mantenere

Di che si fa il Seme.

Il sito de Testicoli.

La sustanza & a figura.

Due Tuniche comuni.

La seconda Tunica. Altre due proprie.

La seconda Tunica del Testicolo.

d fi. xxi. g
e fi. xxvj. YZ
f fi. xix. e. fig.
xxj. xxij.
999.

g fi. xxiiij.

h fi. xix. t f
i la mede. u.

k li. ij. t. iij.

l fi. xvj. *

m fi. xxj. z. fi.
xxiiij. D

nere vnita la sustanza de testicoli, la quale è tenera, & mucida. Serue parimente questa tunica, che col suo mezzo l'altre si congiunghino al testicolo; & per ciò in la parte, oue l'altre si congiungono a questa tunica, è piu sottile, & mucida, che nel resto. Si congiungono anchora alla parte piu alta di questa tunica i condotti del seme; de quali escono molti rami, che vanno alla sustanza del testicolo, forando la detta tela, come a suo luogo piu lungamente diremo. Il resto di questa tela per la parte di fuori è molto liscia, & couerta d'un humor acquoso, & non s'attacca a parte alcuna; per la parte di dentro è tutta d'intorno attaccata alla sustanza del testicolo; & per ciò fu chiamata tutta la tunica Epididima, che vuol dir sopra e gemelli; posto da parte, che molti non hauendo notizia di questa tunica, hanno pensato, che gli antichi per epididima volessino intender altra cosa, ritrouando sopra di ciò, molte vanità. Fu anche questa tela chiamata da gli antichi dartos, che vuol dir cosa, che facilmente si scortica. Habbiamo contato tutto quello, che alle membra della generatione dell'huomo appartiene. Restarebbemi hora a trattare de condotti, per doue passa il semé; ma, perche mia intentione è trattar prima delle membra tutte del corpo, lo lascerò infino al suo luogo.

Del Membro.

Cap. 13.

Habbiamo detto, come il collo della vescica si congiungeua al membro. Il quale & in che luogo stia, & che sia suo officio, ognuno si ben, come io, lo puo sapere; ma, di che materia sia fatto, non tutti il fanno. Hora è da sapere^a che'l membro si compone di due corpi spugnosi, & molto differenti da tutte l'altre parti del corpo, eccetto il collo della matrice, col quale ha alcuna similitudine. Perche empiendosi questi corpi di spiriti, si gonfiano & distendono, & risoluendosi loro tornano a sgonfiarsi & ristrignersi; il che in niuna altra parte del corpo accade. Questi corpi non son vene, ne arterie, ne nerui, poi che non nascono ne del fegato, ne del cuore, ne del capo; dalle qual parti, come da tre principij, diremo nascer necessariamente qual si voglia di queste parti dette. Ne anche son corde, poi che non sono fine d'alcuno musculo; ne meno ossa, come ne i cani, poi che facilmente si puo piegare; ne sono legature, poi che son spugnosi di dentro & hanno molto acuto senso, & sono d'una sustanza morbida, & pieni d'un sangue nero. Di questi due corpi; & d'un canale, per doue esce il seme, & l'orina; & di quattro muscoli (che habbiamo detto nel secondo libro essere alla radice del membro); & di molti rami di vene, arterie, & nerui; & della tela carnosia; & della pelle, si compone il membro.^b I corpi suoi, che son quasi tondi, nascono dalla parte di nanzi piu bassa dell'ossa del pettignone, da lati della riga, che le congiunge; & camminano attaccati l'vno all'altro per la parte di dentro, ne piu ne meno, che se congiugesse vno il dito indice dell'vna mano al dito indice dell'altra; per che son questi corpi piani per la parte di dietro, oue si congiungono, & tondi per quella di fuori, & da lati. Per la parte di sotto si separano l'un corpo dall'altro, dando luogo al canale dell'orina; il qual nasce del collo della vescica, iui, doue habbiamo detto congiungersi e corpi del membro, passato quello spatio, che si fa tra'l forame, & i testicoli, detto dalli Spagnuoli torriglio; & camina sotto el membro tra l'un corpo, & l'altro, infino alla testa, doue entrado per la sustanza sua si fa il buco, per doue esce l'orina. Ognuno di questi due corpi da per se è lungo, & interressuto d'una sustanza neruosa, & molto simile ad vn Giunco; perche di fuori è rosso, & duro, come neruo; di dentro^c alquanto nero, & fungoso, pieno d'un sangue nero; & pare, come se vno hauesse intralciati molti ramuscelli di vene, come vna rete, & di poi l'hauesse riuolte i vn cuoio. Questi corpi hanno certe le gature neruose, & sottili, che legano la parte lor di nazi colla cartilagine, che congiunge l'ossa del pettignone, dal principio infino doue cominciano ad esser couerti dalla pelle; & di poi camminano mantenendo sempre la medesima figura, infino al fine, doue si fanno alquanto acuti; & di lor nasce la testa del membro, pel cui mezzo passa il canale dell'orina. Il qual camminando (come habbiamo detto) sotto el membro, tra corpo & corpo, arriva alla^d testa, & iui si fa assai piu largo; & di poi finisce restringendosi, & faccendo nel mezzo, come vna cassa di codotto, nella quale si ferma il seme nell'vicine, causando maggior di letto. Et per tal ragione que, che patiscono flusso del seme (che chiamano comunamente scolamento delle reni, o menstruo bianco); o ardor d'orina, o purgano flemme per lo

Di che si compone il membro.

Che cosa sia il membro.

Il canale dell'orina.

Q membro

a li ii. t. xvi. fi. xvi. AB

b li. ii. t. iiii. presso la p. c. xvi. fig. xv. xvii. cc

c lib. ii. t. xvi. fi. xviii. presso al V.

d la med. fi. xvi. xvii. D
e la med. fi. xviii. G

Libro terzo delle Membra

membro, sentono piu bruciore in questa parte, che in alcun'altra, per impiagarsi piu presto, che altra parte del canale, eccetto che fra gli testicoli & il fondamento, a mezzo ^f dello spatio, detto torriglio, iui, doue si comincia a storcere il canale; perche in tal parte, quei che patiscono tal flusso, sentono gran bruciore, quando loro s'indrizza il membro, per cagion della piega, che si fa in questa parte. Perche essendo ella piu bassa, che'l resto del canale, si ferma iui il seme, quando esce; & essendo corrotto la scortica alle volte in tal modo, che, se fanno alcuno eccesso, ne esce gran quantità di sangue d'vna vena, che indi passa. Questi corpi son couerti di due tuniche, vna, che si fa della ^g tela carnosaf, & l'altra, che si fa della ^h pelle; quella della tela carnosaf congiunge i corpi del membro con la pelle, senza esserui nel mezzo grasso alcuno. Resta da dire delle vene, arterie, & nerui, che vanno al membro, delle quali al suo luogo faremo mentione; perche de muscoli ne trattammo nel secondo libro.

f la med. fig. xliii. tra l'H & la I

Le tuniche del membro.

g fig. xix. r h la med. r

Della matrice, et di tutte l'altre membra della Donna, che seruono alla generatione. Cap. 14.

Il sito della matrice.
Il collo della matrice.

LA matrice ^a sta situata secondo il lungo tra la parte piu alta dell'^b osso grande, & la bocca della natura; secondo il grosso sta tra la ^c vescica, & ^d l'intestino retto; & si diuide ordinariamente in collo, & fondo, o per dir meglio corpo. ^e Il collo comincia dalla bocca della natura, sotto della cartilagine, che congiunge l'osfa del pettignone; & cammina dirittamente in su, appoggiato all'intestino retto infino all'arriuare scontro alla piu alta parte dell'osfa del ^f pettignone, doue nascono ^g e muscoli diritti del vêtre; & iui comincia il ^h corpo della matrice. Il qual monta verso il bellico, & si distende verso i fianchi, tanto piu, o meno, quanto è maggiore, o minore, senza offeruare in ciò ordine alcuno, eccetto che in quelle, che non son pregne, sempre si vede subito sotto la parte di nazi del peritoneo, piu alto, che l'osfa del pettignone, senza passar gia mai l'osso grande, ne stare appoggiato il collo, ne meno il corpo, ad altra cosa, che all'intestino retto. Sopra la parte di nazi di questo collo della matrice sta la ⁱ vescica, senza esserui cosa nel mezzo, eccetto in alcune, che nō si piega la reticella; perche allhora la parte sua vltima arriua tra la matrice, & quella; & in quelle, che sono grauide, cuopre tutto il corpo della matrice, & alquanto piu. Perche la matrice è legata con alcune legature tanto lente, che facilmente scende, o sale, piu, o meno, secondo che'l collo suo piu, o meno, si distende, o ritira; la qual cosa fa variar molto il sito della matrice. Ma io intēdo, che'l suo sito naturale sia stādo il suo collo increfpato come vn quagliere, come ordinariamente sta, nō gli accadēdo alcuna disgratia, che lo faccia allargare. Et nelle donne attēpate sono le legature del corpo della matrice tanto lente, & il collo tanto increfpato, che la ^k bocca della matrice scēde fin presso alla natura. Da lati, & il corpo della matrice, & il collo stanno appoggiati alle ^l tele, che gli tengono attaccati; & a gli condotti, che vanno a loro. In questo modo sta la matrice in quelle, che non son grauide, nelle quali non mai tiene vna medesima grandezza, se non che in alcune è maggiore, che in alcun'altra, non ostante, che nelle dōzelle sia sempre minore, che in quelle, che non sono. Nelle grauide monta tra la reticella, & ^m gli intestini sottili, fin'al bellico, allargandosi molto piu verso i lati, principalmente quando s'appressa il tempo del partorire; & per ciò in queste dōne la bocca della matrice sta assai piu alta, & il collo piu tirato, & stretto. Neanche sta la matrice in queste donne nel mezzo del corpo (come fa in quelle, che non son pregne) anzi declina a man manca, o a man diritta, quando piu, & quando meno. Ilche non dimostra (come alcuni dicono) che la creatura sia piu tosto maschio, che femmina; poi che in qual si voglia lato suo s'ingenerano indifferentemente l'vno, & l'altra, posto che il piu delle volte sia il maschio nel lato diritto, & nel manco la femmina. La figura della matrice ⁿ nelle grauide è molto simile ad vna gran vescica; perche è molto grāde di corpo, & ha molto picciolo ^o collo rispetto al corpo; ilche in quelle, che non son pregne, è al contrario. Perche il collo è molto largo, & il corpo molto picciolo, & non piu largo, che'l collo; oltre che'l corpo della matrice in quelle, che non son pregne, ne anche si puo agguagliare ad vna vescica. Perche la vescica è piu ouata, & la madre piana di nazi, & di dietro; la vescica per la parte piu alta e quasi del tutto tonda, & per quella, oue se gli congiunge il condotto, per cui

a fi. xxv. xxi. b li. i. ti. i. M c fi. xvi. g d la med. m e la med. dal l' alla bocca della natura. f lib. i. t. i. ii. iii. p g lib. ii. t. v. d h fi. xviii. o

i fi. xvi. g

k fi. xvii. D

l fi. xv. OP Q. fig. xxix. II

m fig. xxx. L

n la med. o la med. Q.

Il corpo.

Il sito della matrice nelle grauide.

La figura.

p r. xxv. T
q fi. xxv. dal
la i alla k
x la med. l

f fi. xix. AA
BB

t la me. CD

u la me. dal
la G cammi
nādo verso
l'EE

x la med. da
lati della F
y la med. F

z' fi. xxi. EE

a fi. xxii. II

b fig. xxix.

EEEE

c la med.

CC. D

d fig. xxvi.

e fi. xxv. RS.

fig. xxvii. L

EE

f fig. xxix.

EEEE

per cui la creatura getta l'orina per l'ombilico nella vescica, è vn poco rileuata, come se lui facesse vna punta; & il corpo della madre in questa parte è alquanto raccolto in arco (come vna Luna crescente) & fa da ogni lato vn cantoncello sodo, dal quale scēde allargandosi, a poco a poco, infino al collo, doue è al doppio piu stretta, che nel fondo. Et tutto il corpo è quasi tanto largo, come lungo, per la qual cosa alcuni dissero, che'l corpo della matrice era quadro. Tutto questo corpo (eccetto da lati, oue gli son attaccati i condotti del seme, & alcun'altre tele) è di fuori humido, vguale, & liscio, & alquāto rosso, & nel medesimo modo è humido, & liscio il collo per la parte di nanzi, & di dietro, dal principio suo fin quasi la metà; ma è alquanto piu bianco che'l collo della matrice. Il resto della matrice per la parte di fuori è aspro & disuguale, per rispetto delle parti, che gli sono attaccate. E per la parte di dentro (in quelle, che non son grauide) tutto il corpo è liscio, ne piu ne meno, ch'vna vescica, benché assai piu arrugato, che non e ella, & le rughe son maggiori. Et ha oltre di cio pel suo mezzo d'alto a basso vna riga rileuata (come e la collina, che si vede nell'huomo, tra il fondamēto, & la borsa de testicoli) che sparte il lato manco dal destro, & è al mio giuditio la cagione della diuisione del seme, quando s'ingenerano due. Et per l'istessa ragione e cagion, che nelle pregne la creatura non mai stia nel mezzo del corpo, se non da vn lato, o dall'altro, non ostante, che possono essere molte altre cagioni senza questa a fare questo tale effetto, delle quali a suo luogo faremo mentione. Fuori di questa riga non si vede altra cosa degna da notare dentro della matrice; ne in lei sono tante camere o celle, come alcuni sciocchi hanno ritrouato, & molti pigri hanno creduto. Questa concauità del corpo della matrice e molto stretta appresso la bocca; & si va allargando, a poco a poco, verso il fondo, nella qual parte fa da ogni lato vn picciol angolo, che risponde al canto o punta, che habbiamo detto fare per la parte di fuori; e quali alcuni hanno agguagliato alle corna d'vna vitella, quando vogliono spuntare; altri gli hanno agguagliati alla Luna crescente. Nel mezzo dell'uno, & dell'altro seno entra il corpo della matrice in guisa, che tutto il corpo fa la figura naturale d'vn pie di tazza per la parte di dentro; per laqual cosa e anche tutto couerto d'un humore lubrico, come moccia; ne si vede buco alcuno manifesto in lui, per doue entri il seme (come ne anche si vede ne gli huomini, di doue esca) eccetto che spremendo con le mani quelli canti detti, rifuda qualche poco di seme in alcune; & in quelle, che hanno scolamento di reni, si vede manifestamente entrare, perche i condotti stanno piu rallentati. Eccetto questo, ne vena, ne fesso, ne altra cosa vi si vede, anchor che molti dicano in altro modo, eccetto nelle pregne, & in quelle, che hanno partorito nuouamēte; nelle quali si vede nella parte di dietro, dentro il corpo della matrice certi fossi, quanto v'entrerrebbe vna lenticchia o lente; liquali i Greci chiamarono Cotiledonas, i Latini Acetabula (che vuol dir seni o fossi tondi) ne quali s'inferiscono certe coccole, che si veggono nella parte di dietro delle secondine; & medianti lo ro stanno attaccate alle spalle del corpo della matrice, & si distaccano nel partorire. Ne e altra cosa nella matrice, che si possa chiamar di questo nome, come molti pigri hanno creduto, per non prender fatica di trouare il vero. La sustanza della matrice e neruosa, grossa, & bianchetta, & alquanto carnososa, & nel medesimo modo è per tutto, eccetto che appresso alla bocca; nella qual parte è alquāto piu dura, & increspata, & ha alcune vene per la parte di fuori (come a suo luogo diremo) le quali passano tra due tuniche, che ha la matrice, vna di fuori molto gagliarda, & grossa, che nasce del peritoneo delle tele, che fasciano e condotti, che vengono alla matrice, & congiungono la matrice al peritoneo; le quali son due processi fatti, come di due tele, che paiono ali di Pipistrello, tra le quali passano molti rami di vene, couerte di molto grasso. Queste tele nascono, ognuna dal suo lato, dal peritoneo, & si vanno a congiungere a lati del collo, & corpo della matrice, facendo loro vna tela di fuori assai piu grossa, che quella, che gl'intestini pigliano dal mesenterio; perche questa e doppia da ogni parte, & l'altra e semplice; & oltre di cio questa e piu increspata. La tunica di dentro (che e la propria sustanza della matrice) in quelle, che non son pregne, e assai piu grossa, che niuna di quante ne siano nel corpo; ne si vede in quella particolarita alcuna; eccetto la collina, che habbiamo detto passar pel suo mezzo. La sustanza di questa tunica e intertessuta d'alcuni spessissimi fili, & di alcune vene sottili, come capelli, che si veggono semminate per lei; le quali infino adesso in niuna, che nō fusse pregna, ho veduto gōfie (come alcuni dicono;)

La parte di fuori della Matrice.

La parte di dentro.

La diuisione.

Le corna.

Le coccole delle secondine.

La sustanza della Matrice.

La tunica di dentro della Matrice.

I fili di questa Tunica.

Libro terzo delle Membra

anchor che morisse hauendo il suo fiore o vero i suoi mesi; come io vidi in Pisa l'anno 1545, in vna Donna, che hauea morto suo figliuolo in Firenze, & per cio il Duca Cosimo de Medici la condannò per fare Anatomia. I fili, de quali e intetessuta la matrice, son di tre sorti, que di piu in dentro, son diritti; que di fuori intrauersati, o circolari; que di mezzo obliqui. Medianti queste tre sorti di fili fa i suoi offitij la matrice (come habbiamo detto dello stomaco;) e quali si veggono assai piu chiaramente nelle grauide, per esser piu distesa la matrice, & le tele assai piu sottili. Il collo della matrice per la parte di dentro (quando stà accresciuto) si vede tutto pieno di crespe; & quando stà disteso è liscio, & lubrico da ogni parte, eccetto appresso la bocca della natura, doue oltre alcune doppiezze, ha certe carnosità (come crespe) che nò per cio in tutte crescono d'vna medesima forma.

Il collo della Matrice, come sia fatto di dentro.

Le Ninfe.

La sustanza di questo collo.

Queste son q̃lle Ninfe tanto celebrate da Poeti, dietro le quali fingeano essi andar errando gli Satiri p gli boschi. E parimente alquato aspro il collo, appresso doue entra il collo della vescica; nella qual parte cresce da ogni lato vna picciola parte del collo della matrice; che declina verso il lato dell'istesso collo, & son molto simili a que processi come tele, che detto habbiamo essere nell'intestino duodeno, al fine del condotto della collera, che vietano che l'orina, o qual si voglia altra cosa, non possa rientrare dal collo della matrice alla vescica. Il resto di questo collo va, mantenendo sempre l'istessa larghezza, fin' alla bocca della matrice. Et la sustanza sua è tra neruosa & carnosa, & spugnosa, quasi come i corpi del membro; & per tal ragione si gonfia vn poco, quando la Donna è tentata di carnale appetito, & principalmente quelle carnosità, o Ninfe, che habbiamo detto vederli appresso alla natura, le quali si ristringono, come se volessero abbracciare il Membro; & il collo s'indrizza, quanto basta a poter ben riceuere il seme. Et è da notare che, si come questo collo per la parte di dentro è molto liscio & morbido nelle Donzelle, cosi in quelle, che non sono, & principalmente in quelle, che l'vsano spesso, per lo continuo strisciare o fregare si fa duro, come callo, & tanto piu, se vsano lauande dissecatiue, & cosi nell'vne, come nell'altre si veggono le vene assai piu chiaramente nel collo della matrice, che nel corpo, eccetto nelle grauide, nelle quali si veggono molto meglio nel suo corpo.

Al fin di questo collo stà attaccata la bocca della matrice; & esce alquanto in fuore faccendo fine in vna punta tonda, larga, & alquato piana; & nel suo mezzo al trauerso si vede vna fessura o apertura, che la fa parere naturalmente simile alla bocca d'vn barbo. Questa bocca non si muoue in modo alcuno, benchè il collo s'astringa, o allarghi; & la punta sua non tocca e lati del collo; & nelle Donne pregne si chiude in modo, che niuna cosa vi può entrar dietro. Et se alcuno mi dicesse, che essendo questa cosa cosi, & insieme essendo vero (come habbiamo detto) che le Donne non meno hanno seme, che gli huomini, farebbe necessario, che il seme nelle donne pregne si ritenesse dentro della matrice; il che esser non potrebbe senza gran danno della donna, & pericolo della creatura. Risponde rei io, che le vene, o condotti, che vanno da i testicoli alla matrice, mandano anchora alcuni ramuscelli al collo d'essa; per li quali quelle, che sono pregne, & le dōzelle purgano il suo costume o mesi, & per quelle medesime puo vsare il seme, senza entrare nella matrice. Et quello, che dicono alcuni, che vna donna può concipere essendo grauida, appò me è cosa da ridere. Ne val niente la ragione, che li muoue a pensarlo, cio è il vedere, che vna dōna hora partorisce vna creatura, & indi ad vn mese o due vn'altra, & di poi vn'altra. Perche, si come d'vn granel di grano, o di qual si voglia altro seme, nascono molte spighe, ne per cio si maturano tutte ad vn medesimo tempo; cosi anche del seme dell'huomo possono ingenerarsi molte creature, & non nascere tutte ad vn tempo. Perche la parte del seme piu fertile piglia quasi tutto il nutrimento per se, & non lascia crescer l'altre; & cosi viene ad esser fatta, & perfetta la creatura, che di quello si fa in prima, & appresso nascere; & l'altre, che anchora non son ben fatte, si restano dentro, & la piu robusta piglia il nutrimento, del quale ha bisogno, fin che sia matura, & di poi esce, & cosi fanno di mano in mano quelle, che restano. Perche veramente il tempo del partorire non è limitato, come alcuni pensano, a sette, a noue, a dieci mesi, se non al tempo, che la creatura è finita & fatta tanto grande, che non le basta piu il nutrimento della madre; ne la può piu capire il luogo, nel qual si riposa, nel l'aere, che va per l'arterie a rinfrescarla, basta piu per temperare il suo calore: il che ordinariamēte suole auuenire dopo noue o dieci mesi. Per la qual cosa affannandosi dentro comincia a riuoltarsi tanto, che rompendo le tuniche,

Vnagrauida nò può concipere.

La figura della bocca della Matrice.

g fig. xxvii.
c D

fig. xxviii.

oue stà inuolta, & staccando le secondine esce fuori, disiosa di maggior casa, nutrimento, & refrigerio. Ma tornando alla bocca della matrice, torno a dire che nelle donne pre-

La bocca della Matrice, nelle grauide stà molto chiusa.

De Testicoli della Donna.

Cap. 15.

HAVREI voluto con mio honore poter lasciar questo capitolo, accioche non diuentassero le Donne piu superbe di quel, che sono, sapendo, che elleno hanno anchora i testicoli, ^a come gli huomini, & che non solo sopportano il trauaglio di nutrire la creatura dentro de suoi corpi, come si mantiene qual si voglia altro seme nella terra, ma che anche vi pongono la sua parte, & non manco fertile, che quella de gli huomini, poi che non mancano loro le membra, nelle quali si fa; pure sforzato dall'historia medesima non ho potuto far altro. Dico adunque che le Donne non meno hanno testicoli, che gli huomini; benché non si veggiano per esser posti dentro del corpo, come fu di bisogno, hauendo da concipere dentro di se stesse; per la qual cosa fu anche ordinato che tutti gli altri instrumenti delle donne, necessarij alla generatione, stessero dentro del corpo. Hora stanno e Testicoli della donna appoggiati a lati del corpo della matrice, al quanto piu alti di quella (benche nelle pregne par che non stiano tant'alti, perche il corpo loro monta piu in su), & sono attaccati molto lentamente al peritoneo (in quella parte, doue l'ossa dell'anche si congiungono col grande) medianti i condotti del seme, senza concorrerui altra legatura. Questi testicoli son assai piu piccioli, che que dell'huomo, & alquanto piu lunghi, che larghi; dinanzi & di dietro sono alquanto piani, da lati tondi, per di fuori disuguali, & fatti, come di molte glandole congiunte insieme. La sustanza loro di dentro non è ne eguale, ne morbida, come in quelli de gli huomini; anzi è dura, & simile a quella delle animelle, che si veggono nel mesenterio, & nella tela di dentro della reticella, Et è tutta piena di certi vacui, eccetto il luogo, che occupano alcune vene, & arterie, che sono sparte per essa; e quali ne anche son tutti d'vna grandezza, ne mantengono il medesimo ordine, o numero; ma in tutti si ritroua vna humidità acquosa, la quale (spremendo con le mani i testicoli) salta con grand'impeto, come quando si rompe vna vescica. Questi testicoli sono inuolti in vna sol tela neruosa, che gli cuopre intorno intorno da ogni parte, & è attaccata alla sustanza loro in tal guisa, che con difficoltà si può distaccare, & è alquanto simile alla sustanza loro; la quale è assai piu tenera, & morbida, che la terza tunica de testicoli de gli huomini, alla quale è simile in offitio. Et niuna altra tela hanno e testicoli della donna, fuori che questa, eccetto que processi del peritoneo, che habbiam detto legarsi a lati della matrice, & sembrare ali di Pipistrello, i quali gli cuoprono di sopra. In questi testicoli s'inseriscono i condotti del seme, come a suo luogo mostraremo.

Il sito de testicoli della Donna.

La grandezza, & figura.

La sustanza.

La tela.

Della Creatura, & delle Secondine.

Cap. 16.

HABBIAMO detto, come del seme dell'huomo & della dōna s'ingenera la creatura nel ventre, pigliando corpo dall'vno, & figura & essere dall'altro, come fa il pollo; o mescolandosi amendue. Sia, come si voglia, subito, che la matrice ha concepito, si chiude & raccoglie, abbracciando tutto intorno la sperma, la quale col caldo comincia a gonfiarsi, come fa qual si voglia altro seme. Et si come tutte l'altre semenze gettano subito le sue radici, medianti le quali pigliano dalla terra il nutrimento necessario; così il seme dell'huomo dapoi, che si è gonfiato, fa vna pelle di fuori, come vna tela di cipolla, o come la tela di dentro dell'uouo, & quell'aere o spirito, che è di dentro, fa nel mezzo di esso vn ^a riuo, che chiamiamo il bellico (che risponde alle radici dell'altre semenze)

Historia del Seme.

Come si fa il Bellico, & di quanti vasi.

Q 3

composto

a fig. xxv. xxvj. xxvij. N. r. f.

a fig. xxliij. T

Lib. terzo delle Membra

composto di due vene, & due arterie. Le quali, anchor che dal bellico alla matrice vadano insieme, non fanno così dentro del corpo; anzi le vene si conuertono in vna, ^b che va tra'l peritoneo, & la reticella, infino all'inferirsi in quella ^c intaccatura, che habbiã detto farsi nella parte dinanzi del fegato, & entrando per lui, cammina infino al congiungersi col principio della vena, che habbiã detto chiamarsi porta. ^d L'arterie vanno separandosi l'vna dall'altra, a poco a poco, & passando per dentro le tele del peritoneo, & per gli lati della vescica, vanno ad inserirsi, ognuna dal suo lato, vn poco piu giù dell'osso grãde, nel ramo d'vna arteria grossa, che, quando sarà tempo, diremo passar per questa parte. Et pigliando per le vene nutrimento, & per l'arterie spirito viue la creatura, & si mantiene il tempo, che sta nel ventre, apprendendosi tutti questi vasi insieme, come certe radici, nella parte di dietro del corpo della matrice, doue si congiungono alle vene, & arterie sue. Ma tornando al seme, fatto che si è di lui l'ombilico, comincia tosto a pigliar a poco a poco figura d'huomo; il che fa, se è maschio, in trenta giorni, se è femmina, in quaranta, che tanti sono, quãti dura la purgation della donna dopo el parto. Dopo questo se gli infunde l'anima; perche in prima nõ hauea piu vita, che habbiano l'herbe, & altre piãte. Ma, anchor che habbia anima, essendo tanto picciola & tenera la creatura, nõ può muouerfi, infino che ha preso piu forza; che è nel maschio ai tre mesi, nella femmina ai quattro. Dopo questo si sta sempre nella matrice, fin che comincia a esserle stretta la casa, pigliãdo (come habbiã detto) nutrimento per lo bellico. Il quale sta situato a punto nel mezzo del corpo (misurando da quello infino alle punte de piedi, & delle mani, stando il corpo disteso in croce, & come esce del corpo, ^e monta in sù appoggiato al ventre infino all'omero manco, & volteggiando dietro al collo, cammina infino all'omero destro; scontro al quale s'inferisce nelle spalle del corpo della matrice. Perche la creatura sta situata ^f dietro del corpo, con la testa in sù, & con la faccia voltata verso le spalle della matrice, per star piu sicura, & mettendo e gomiti nell'anguinaie, si raccoglie tanto, che quasi tocca con le ginocchia gl'occhi, & con le calcagna le natiche, restando tutta fatta vn gomito. Ma, perche al principio non ha bisogno la creatura di tanto nutrimento, di quel, che auanza, si fanno le secondine in questa forma. Fassi intorno intorno di doue l'ombilico s'inferisce, vna ^g massa di sangue, & carnaccia tonda come vn pane, & spugnosa, & tanẽ oscura, & molto interteffuta di vene (quasi del tutto simile alla sustãza della milza), la qual fu da Latini chiamata Secũdina, credo perche si fa dopo la creatura. La cui figura, & sito, tutti que, che infino ad hora ho letto, hãno pẽsato, alcuni che fusse simile ad vna fascia, & che cingesse tutto il ventre intorno intorno; altri che non cingesse tutto il ventre, ma solo la pancia secondo il lungo suo; ingannati i primi per quel, che si vede ne cani, & i secondi per quel, che si vede nelle vacche, & per ciõ la contauano tra le tuniche, che fasciano la creatura, il che non fo io. Di questa massa così fatta nasce la tela ^h di fuori delle due, che fasciano le creature, chiamata da Greci Allantoides, che vuol dir simile ad vn sanguinaccio, ingannati nelle vacche, nelle quali questa secõda tunica pare naturalmẽte vn grosso intestino, o sanguinaccio, ma ne fanciulli è d'assai diuersa figura; perche è simile ad vnave scica così in figura, come in sustãza. Et la parte sua di dietro, per di fuori è fortissimamente attaccata alla parte dinanzi della detta massa, intorno al bellico, pigliando da quella molti ramuscelli di vene, & arterie, & per quella di dentro tutta ella è molto liscia, & lubrica, & fascia la secõda tela tutta senza attaccarsi a essa in parte alcuna, eccetto appresso il bellico. ⁱ Questa seconda tela è della medesima figura, che la prima, & seminata nel medesimo modo di vene, & arterie, che nascono de vasi del bellico; le quali se bene son molto sottili, non resta però che non si veggino chiaramente, per esser questa tunica assai piu sottile, & molle, che la prima, & morbida, come pelle di capretto; per la qual cosa fu chiamata da Greci Amnios. Noi altri la chiamiamo il Manto. Questa tunica per la parte di fuori è liscia, & humida, & ne anche tocca in parte alcuna la prima, eccetto appresso il bellico; perche tra l'vna & l'altra sta raccolta l'orina, che fa la creatura, tutto'l tẽpo, che sta nel ventre. Per la parte di dentro è così anchora liscia, & humida, & è attaccata col la creatura mediante il bellico. Tra lei & la creatura, è vna gran quantità di sudore, che esce del bambino il tempo, che stã nel corpo della madre, & sono quell'acque, che dicono le donne romperfi, quando vogliono partorire. Perche essendo la prima tunica attaccata alla massa, & la massa alla matrice, quãdo la creatura si riuolta (come fa, quãdo vuole

*Come il Bellico
sta nel mezzo
del corpo.*

*Il sito della creatura
nel corpo.*

*Di che si fanno
le Secondine.*

*La prima tela,
che fascia la creatura.*

La seconda.

*L'acque, che si
ropono nel parto.*

b f. ij F
c la me. G
fra le due
H H
d la me. K L.
li. vj. t. v. fig.
vij. viij. u u.
fi. x. ll

e fig. xxxliij.

f la med.

g f. xxxj. EE
fi. xxxij. II

h f. xxxij. xx

i fig. xxxij.
oo

k fig. x
xxxij

le vscire)ordinariamente rompe le tele,innāzi, che si distacchi, & così esce tutta l'orina, e'l sudore,che è in esse,& mollificando la bocca,& il collo della matrice, fa che le donne piu facilmente possono partorire. Ma se tal volta intrauiene che si rompa la prima tela, & si distacchi la seconda, esce la creatura inuolta nel Manto, senza percio essere ella piu auuēturosa, o hauere la pergamena (che si fa di questa tela) più virtù, che le altre; anchor che piu le lodino le fattucchiere o streghe. Accade anche delle volte vscir la creatura, & restare vna gamba o vn braccio riuolto in questa tela, o perche nō si distacca del tutto, o per colpa della leuatrice. Dentro di questa tela o manto sta la creatura, la quale ha attaccata alla pelle vna materia gialla, & spessa come fango, che è vna superfluità della quarta digestione, che si fa nelle membra. La detta massa, & queste due tuniche chiamano le donne le Secondine; delle quali la secondina serue a tener la creatura attaccata alla madre; l'altre due fasciano insieme la creatura, & particolarmente la seconda raccoglie il sudore, la prima l'orina. Nella qual cosa vsò il nostro Signore non minor artificio, che'n molte altre parti del nostro corpo; perche essendo l'orina falsa, & mordace, & la creatura molto tenera, se fusse stata appresso le carni, facilmente l'haurebbe scorticata; alla qual cosa prouedendo, fece che la creatura non orinasse per lo membro, ma che tornando in dietro l'orina per vn ^k canale, che nasce del fondo della vescica, n'andasse a vscire per lo bellico (fra le due arterie, che subito diremo entrar per quello) faccendo fine tra la prima, & secola tela. Questo è tutto quel, che tocca alle membra della Digestione, & Generatione.

L'offitio delle
Secondine.

La creatura nō
orina per lo mē
bro.

k fig. xxxij.
xxxij.*

Di che si mantiene la Creatura nel corpo. Cap. 17.

QVANTVNQVE, scriuendo sol la composition dell'huomo, non dourei occuparmi in altra cosa; pure, perche questa materia è congiunta all'historia, & molto distiata da tutti, ho voluto dir sopra di quella quattro parole. Si tien tanto per fermo tra i Medici & Filosofi, che del sangue menstrual della donna si mantiene la creatura nel corpo, & che per questo effetto solo le fu dato dalla natura, che parrebbe presuntione il voler dir il cōtrario. Nondimeno il vedere, che quasi niuno altro animale patisce simil purgatione, senza lasciar per cio alcuno, che non sia bastardo, di concipere, & creare, ne piu ne meno, che la donna, & anche assai piu fertilmente, & che molte donne, che mai non hebbero simil costume o purgatione, concipeno, & creano i lor figliuoli senza rognā & altre malattie, le quali sogliono hauere ordinariamente i bambini; insieme col vedere, che'l sangue, che ogni mese si purga, esce tanto corrotto, che basterebbe ad ammazzare qual si voglia animal bruto, che ne gustasse, non che vna creatura tanto delicata, & tenera, mi ha dato ardire di dir liberamente il mio parere. Per la qual cosa è da sapere che le donne, così per sua natural complessione, come per l'otiosa vita, che fanno, son piu humide, che niuno altro animale de perfetti, & che la Luna, secondo la comune opinion di tutti, & secondo che ogni di vedemo per esperienza, è commune madre delle humidità, faccēdole crescere, & scemare, secondo ch'ella ogni mese piu cresce o scema. Saputo questo di co che nella donna crescono gli humori ogni mese tanto, che non potendo capir nelle vene, si riuoltano per tutto il corpo, conturbando il sangue, fin che la natura lo scaccia fuor per la via, che per questo ritruoua piu apparecchiata, che sono le vene, che vāno alla matrice, & al suo collo. Ma se tal volta queste vene son turate (come molte volte intrauiene) in tal modo, che'l sangue non possa vscire, si corrompe dentro del corpo, e causa molte & varie infermità. Tal cosa è così stando le donne sane, & libere da ogni accidente; ma, se a caso, o per esser state lungo tempo inferme, o per hauer loro bisogno di nutrimento (come fanno, quando son fanciulle o grauide; o come quando allieuanō, o fanno qualche grande esercizio) consumano le humidità, che soprauanzano in loro, se bene crescono gli humori ogni mese con la Luna, come hanno, in che si stendere, non si riuoltano o conturbano; anzi senza far danno o impedimento alcuno tornano a posarsi. Si che i mesi nelle donne, piu tosto nascono dalla complessione humida accompagnata dall'otiosa vita, che fanno, che da necessità, che di essa habbiano per alleuare i suoi figliuoli. Ne vale punto la ragione, sulla quale si fondano alcuni, dicendo che, perche, quando sono le donne pregne, o allieuanō figliuoli, non hanno i suoi mesi, per cio la creatura si mantiene di quello; anzi, perche la creatura si mantiene del sangue della dōna, & la lascia tato priua d'humidità,

Le Donne sono
naturalmente hu
mide.

La Luna è ma
dre delle humi
dità.

Perche hanno le
dōne i suoi mesi.

Per qual cagio
ne manca nelle
Donne la solita
purgatione.

Lib. terzo delle Membra

*Perche le Donne
al principio della
pregnanza
hanno i suoi me-
si.*

*A quai Donne
non fa danno il
mancar loro i
suoi mesi.*

d'humidità, non possono gli humori crescere, come soleano. Et per tal ragione al principio della gravidanza, che la creatura è molto picciola, & piglia pochissimo nutrimento, molte donne hanno i suoi mesi, & queste tali stanno molto sane, & senza niuno de' gli accidenti, che l'altre, che sono pregne, sogliono patire e primi mesi, & patiriano assai più gli ultimi, se si ritenesse il sangue menstruale nel corpo, come alcuni pensano. La qual cosa, col vedere insieme, che a molte donne, che hanno hauuto lunghe infermità, non torna no loro i suoi mesi, fin che non siano grasse, come di prima, & che quelle, che danno il latte, quasi tutto 'l tempo, che allieuanò, non patiscono tal purgatione, senza per ciò hauere nel vne, ne l'altre detrimento alcuno, mi fan tener per fermo, che 'l sangue menstruale non è di sua natura tristo; se non che nella conturbatione, che ho detto ogni mese fare gli humori secondo il mouimento della Luna, si corrompe alcuna loro parte, la qual la natura, come dannosa, scaccia via, tornandosi il resto a posare, come di prima. Presuppuesto questo così, resta prouato che la creatura si mantiene del più perfetto, & delicato sangue, che sia nella donna (come essendo tanto delicata & tenera era di bisogno fare, acciò potesse viuere), & che non patiscono le donne il mestruo per necessità, che haueffero di quello, per alleuar i suoi figliuoli, ma sol per l'humida complessione, che hanno. Ma serà bene trattar delle Poppe, o Mammelle, & con questo dar fine a questo libro.

Delle Poppe o Mammelle.

Cap. 18.

*Perche furono
fatte le mam-
melle.*

*Il sito delle mam-
melle.*

La figura.

La sustanza.

*Perche le mam-
melle stiano vi-
ue in quelle, che
hanno partorito
assai volte.*

PER CHE vscita la creatura del ventre (doue staua auuezza a nutrirsi di sangue senza hauer hauuto bisogno d'altro nutrimento per la bocca) farebbe stato quasi impossibile ritrouarle cibo tanto a proposito, che almeno con sua durezza, & nouità nò le fusse stato dannoso, & niun'altro mangiare le era più salutifero, che quel, che vlaua dentro il corpo di sua madre, ordinò molto bene il nostro Creatore nelle donne vn membro, al quale diuertisse il sangue, che prima giua alla matrice, conuertendosi in vno nutrimento al bambino molto conueniente, el quale, dapoi che fusse nato, vlassse, infino che incominciassse ad auuezzarsi ad altri mangiari. La qual cosa come si faccia, & per qual camino si diuerta, quando tratteremo delle vene, si dirà più lungamente; hora solamente tratterò delle Mammelle. Hora pose Iddio nelle donne nel mezzo del petto due ^a mammelle, da ogni lato vna, sopra ^b il secondo musculo, che muoue il braccio, fra la tela carnosa, & la pelle. La figura delle quali dinanzi è come mezza palla, & nel mezzo hanno vna punta, detta capezzolo; di dietro son piane, & tanto incauate, quanto è il petto rileuato. Et sono fatte d'alcune glandole, & insieme di molto grasso, & interteffute d'alcune vene, arterie, & nerui, benche pochi, e quali tengono sempre vn'istessa grandezza, secondo la proportion delle mammelle, quello che non fanno le glandole. Le quali nelle donzelle & negli huomini sono assai poche, & picciole, & quasi secche; nelle donne sono assai, & molto gonfie, & humide; nelle donzelle dure & massiccie senza niuno humore dentro. In quelle che stanno per partorire, o hanno partorito, sono molto gonfie, & piene di latte; non dimeno in quelle, che hanno partorito assai volte, son molto vizze, & mucide. La ragion di ciò è, perche, come il sangue si conturba, & riscalda tutto col dolor del parto; & le vene, che stanno attaccate alle secondine, si rompono, si purga per loro tutto quello humor delle membra, che col gran dolore si espresse lasciandole tanto mucide, & vizze, che non possono più risarsi.

*a fig. xxv.
xxvj.
b lib. ij. t. j. ij.
Δ*

DICHIA-

Tauola Prima, Figura Prima.



Ichiaratione delle Lettere delle Figure del Terzo libro, & prima, nella Tauo la prima, nella quale si mostrano quattro figure; la prima delle quali rappresenta scoperta la tela, che cuopre gl'intestini, chiamata il Peritoneo.

- AB* *CD*. Queste lettere mostrano quasi tutto il peritoneo.
EE Vna riga, che va dalla forcella dello stomaco fin all'osso del pettignone.
F Il bellico, il quale non tagliamo per saluare i vasi, che nascono di lui.
G I condotti del seme, couerti con le tele del peritoneo.
H La vena, & arteria, che montano a muscoli diritti del ventre.
I La vena, & arteria, che scendono per di sotto l'osso del petto, & vāno a muscoli diritti del ventre.
K Alcuni ramuscelli di vene, che vanno a lati del peritoneo; & nascono alcune volte della vena sola, alcuni altre del trōco della vena grande appresso e lombi.
L Vna parte del musculo attraversato, che sta riuolto verso dietro.
M La punta del gallone scuverta, alla qual s'attaccano i muscoli attraversati del vēte.
N La forcella dello stomaco.

Figura II.

In questa Figura è tagliato il Peritoneo in croce, senza far danno in niente a vasi, che nascono dal bellico; & è doppiato in fuore. Si veggono anche il Bellico, & i vasi, che nascono di lui, la reticella, lo stomaco, & vna parte del fegato; non dimeno la reticella è distesa, quanto può essere, tirandola con le mani all'ingiu.

- AB* *CD*. Quattro parti del peritoneo tagliate, & riuolte verso dietro.
E Il bellico distaccato dal peritoneo.
F La vena, che va dal bellico al fegato.
B Doue questa vena entra nel fegato.
HH La parte del fegato, che si vede.
I La principal legatura, che lega il fegato col-

KL

la diaframa.

Le due arterie, che nascono del bellico, & s'inseriscono nell'arteria grande.

M

Il condotto, per doue la creatura orina nel corpo.

N

La vescica.

O

Doue si lega la vescica al peritoneo.

P

La parte di nanzi dello stomaco, le qual non è couerta ne dalla reticella, ne dal fegato; il quale in questo corpo staua alquanto gonfio.

Q Q

La reticella.

R

La vena, & arteria, che vanno al lato diritto del fondo dello stomaco.

S

Le vene, & arterie, che vanno al lato māco.

T

In questa parte si congiungono le vene del lato manco a quelle del diritto; & la RST notano la riga, doue piglia principio la Reticella.

XX

Le vene, & arterie, che si distribuiscono per la tela di fuori della reticella le quali stanno accerchiate di grasso.

Figura III.

Questa Figura mostra il sito de gl'intestini, & la reticella spiegata, & volta verso dietro, & tirata co denti. Et percio lo stomaco sta vn poco piu alto, che non dourebbe; il che habbiamo fatto, perche si possa veder la tela di dentro della reticella.

KL M

NO Queste lettere notano il medesimo in questa figura, che notauano nella secōda; & per cio non è in loro, che dichiarare.

a a

La parte di dentro della reticella.

b b

Questo poco, che qui si vede rileuato, è per lo stomaco, che sta di sotto.

c c

La tela di sotto della reticella; & la parte rileuata, che notano le due cc piu alte, è l'intestino colon.

d

Qui di sotto sta la milza.

e

Il tronco della vena caua.

Figura IIII.

Questa Figura mostra la Reticella libera da tutti e vasi, & parti, delle quali nasce, insieme con le vene glandole, grasso, & arterie, che si distribuiscono per essa; & la figura sua è molto simile a quella d'vn carniere.

e e

Il nascimento della reticella.

fff

La parte di nanzi della tela di fuori della reticella.

Dichiar. delle Fig. del Lib. III.

reticella.		Tauola II. Figura V.	
gg	La parte di nanzi della tela di dentro, che sta sotto lo stomaco; perche il suo resto è co- uerto con quella di sopra.	VI. VII.	
b, i, k	Queste tre lettere mostrano la sustanza della reticella, cio è la b la tela, la i le vene, la k il grasso,	Questa quinta Figura si continua alla terza; & in amendue si mostra il medesimo; eccetto che in questa leuammo via la reticella; & perche il fegato, & lo stomaco si potessero meglio vedere, rompemmo alcune delle coste mendose. Nella sesta si dimostra no tutti gl'intestini sottili insieme col cieco; & vna parte dell'intestino colon; il che fu fatto, perche piu chiaramente si videsse, doue si congiungono gli vni a gli altri. La settima dimostra tutti gl'intestini grossi; e quali circondano tutti e sottili. Et, perche queste tre figure hāno quasi le medesime lettere, sarà bē dichiararle tutte insieme, notando la lettera particular d'ogn'vna di loro, col numero d'la figura	
l	Il tronco della vena porta, quando esce del fegato; il quale passa per la tela di sotto della reticella.	A 5	La forcella dello stomaco.
m	L'arteria, che va al concauo del fegato, & alla vescica del fiele, accompagnata da vn ramo del sesto paio di nervi della testa	BB 5	Il peritoneo, & le coste rotte. (diagrama.
n	Il principio di vna vena, che va alla parte di dietro del fondo dello stomaco, accompagnata con vna arteria.	C 5	La prima legatura, che lega il fegato alla
o o	Vna vena, vn neruo, & vn'arteria, che vanno al lato diritto del fondo dello stomaco, per sopra il principio della tela di fuori della reticella.	DD 5	Vna gran parte della gobba del fegato.
pp	Alcuni ramuscelli della detta vena, che vanno al corpo dello stomaco.	E 5	Vna parte della vena del bellico, che s'inserisce nel fegato.
qq	Altri, che vanno alla tela di fuori della reticella.	FF 5	La parte di nanzi dello stomaco.
r	Vna vena, vn neruo, & vna arteria, che vanno, all'intestino duodeno, & al principio del digiuno.	G 5	Il lato manco della milza, o la parte sua di verso nanzi.
s	La diuisione della vena porta in due trōchi.	H. 6	Vna parte dello stomaco, che fa il suo fondo, o vero il principio de gl'intestini; il quale è qui legato con vn corda.
t	Il tronco destro o il maggiore, che è quel, che va a gli intestini & al mesenterio.	IK. 6	L'intestino, che sta fra queste due lettere, è il duodeno.
v	La vena, che va alla parte di dietro dello stomaco, senza esser accōpnata da arteria.	L 6	Il principio dell'intestino digiuno.
x	Vna vena, vn neruo, & vna arteria, che vanno al lato diritto della tela piu sotto della reticella, & in questa parte toccano l'intestino colon.	M.	6. 7. Il fine dell'intestino sottile.
y	La vena, & arteria, che abbracciano la bocca dello stomaco.	N 5	6. 7. Il principio de gl'intestini grossi.
a	L'arteria del mesenterio.	OO. 5.	6. 7. Il cieco; & la O piu bassa nota la sua giūta, la qual sola alcuni chiamano il cieco
β	Il tronco dell'arteria, che va alla tela di sotto del mesenterio.	NP	QRS T. 5. 7. L'intestino grosso. Nō dimeno dalla N alla P si dinota la parte sua dal rognone diritto, insino al concauo del fegato; dalla P alla Q la parte, ch'è attaccata alla parte piu bassa dello stomaco, dal concauo del fegato fin alla milza; dalla Q alla R si nota la parte sua dalla milza insino all'osso del pettignone; dalla R alla S (quel, che solo si vede nella settima) nota il processo di questo intestino verso il bellico; dalla S alla T si nota il suo scendere insino all'intestino retto.
γ	Vna vena, vn neruo, & vn'arteria; che vanno pel mezzo della tela di sotto della reticella.		
δ	La vena senza arteria, che va al lato manco della tela di dentro della reticella.		
ε	La distribuzione delle vene, & arterie, & nervi, che vanno alla milza.		
ζ	Vna vena, & vn'arteria, et vn neruo, che vanno al lato manco del fondo dello stomaco.		
η η	Le glandole, che si veggono nella tela di sotto della reticella.		
	Parte delle glandole, che stanno attaccate all'intestino duodeno.		

FIG. I



II



TABVLA I

LIBRI III

III



IIII



Dichiar. delle Fig. del Lib. III.

VV	5.7. La parte piana di questo intestino.		
XX	5.7. Le girauolte, che fa questo intestino.		
Y. 5.7	Il principio dell'intestino retto; il qual tutto cammina insino al fondamento.	LL	congiungendogli co i corpi de nodi della schiena.
Z. 6	Il condotto del fiele.		Vn corpo come di glandole, che sta al principio della distribuzione delle uene del mesenterio.
a. 7	Il musculo, che abbraccia il fine dell'intestino retto.	MM	Le glandole, che stanno tra le diuisioni delle uene.
bc. 7	I due muscoli, che mettono il fondamento in dentro.		Figura X.
d. 7	In questa parte s'attacca il fondamento al collo della matrice nelle donne; & ne gli huomini al collo della uescica, & al membro, mediante certa carne di natura di musculo.		IN questa Figura si vede il mesenterio da per se, libero da tutte l'altre parti, eccetto vna parte della tela di sotto della reticella, mediante la quale l'intestino colon si lega alla schiena, per tutto lo spatio, che s'attacca allo stomaco. Et e da notare che la K LL, & due M notano l'istesso in questa figura, che nella nona.
ef. 5	Le due arterie, che seruono alla creatura nel uentre.		
q	La uescica, & il condotto, per doue orinano e bambini ne l uentre.	NO	La parte del mesenterio, che lega gl'intestini sottili alla schiena.
	Figura VIII.	PQ	Dalla P alla Q si nota la parte del mesenterio, che lega l'intestino colon colla schiena dal rognone destro al concauo del fegato.
	IN questa Figura si mostra l'intestino retto, insieme colla parte dell'intestino colon, al quale s'attacca; & le tele, delle quali si compongono amendue.	RR	La parte della tela di sotto della reticella, che lega l'intestino colon alla schiena, seruendole per mesenterio per tutto lo spatio, che e attaccato allo stomaco.
b	La prima tela, che e quella di piu in dentro, & i suoi fili intrauersati.	S	Dalla R alla S si nota la parte del mesenterio, che serue all'intestino colon dalla milza all'intestino retto.
ii	La seconda, & i suoi fili diritti, & intrauersati.	T	Dalla S alla T si nota la parte, che lega l'intestino retto alla schiena.
kk	Vna parte del mesenterio, che lega questo intestino coll'osso grande faccendo la terza sua tela, che e notata con la l.	V	In questa parte procuramo di mostrare la stanza del mesenterio, mostrando le due tele, di che si fa; delle quali l'una mostra la X; & l'altra la Y; & nel mezzo di loro due si ueggono le uene, che uano per quello, & l'ammelle.
l		XY	
	Figura IX.		
	Questa Figura mostra il mesenterio; per la qual cosa fu necessario tirare in cerchio tutti gl'intestini sottili per poter vedere il suo centro; & il modo, nel quale uano per lui le uene a gl'intestini; & come lega gl'intestini alla schiena.		
ABC	D La parte della tela, che cuopre gl'intestini, che e tagliata in croce.		
EEE	Gl'intestini sottili.		
F	Il cieco.		
GGG	L'intestino colon.		
H	Il principio dell'intestino retto.		
I	La uescica, alla quale in questa parte si congiunge la tela, che cuopre gl'intestini, da dole un'altra tela.		
K	Il centro del mesenterio; & la parte della schiena, donde egli piglia principio dalle tele del peritoneo, che abbracciano il tronco della uena grande, & quel dell'arteria,		

Tauola III. Fig. XI. XII.

IN questa Figura manca il peritoneo, & la reticella; & si mostra scoperto il cõcauo del fegato, la uescichetta del fiele, lo stomaco, & gl'intestini cadenti a basso, perche si vegga, come la collera va dal fiele a loro; si vede anche vna parte del mesenterio. Nella duodecima si vede la uescica del fiele da per se, insieme con i cõdoti suoi, & col pezzo dell'intestino, nel qual s'inferiscono. Et e da notare, che

nel

TABVLA · II · LIBRI · III ·








Dichiar. delle Fig. del Lib. III.

	nel concauo del fegato son di molte lettere, che son le medesime, cō quelle dell'vndecima figura; per tanto quelle, che saranno particolari all'vn decima, si segneranno cō vno 11; quelle, che alla duodecima, con vn 12.		uiso, perche si vegga, come entra in esso la collera.
		e	12. L'arteria, che s'inferisce nel concauo del fegato, & nella vescica del fiele.
		f	12. Il neruo commune al fegato, & alla vescica del fiele; il qual nasce del sesto paio de nerui della testa, & scende per le radici delle coste.
		g	12. Alcuni rami della vena porta, che uanno alla vescica del fiele.
		h	11. Il tronco della uena porta.
		ii	11. Quella glandola, che sta attaccata all'intestino duodeno.
		kIm	11. Il mesenterio; però la k dimostra la distributione del tronco diritto della uena porta per quello; la l le glandole; la m la parte del mesenterio, che s'attacca all'intestino colon dal rognone destro insino al fegato. Perche in questa figura l'intestino colon è distaccato da lui, perche meglio si possa uedere il Centro del mesenterio.
		n	11. La uena, che scende sotto della parte di dietro dell'intestino retto, & s'inferisce in esso.
		o	11. La vescica.
		p	11. Il rognone destro coperto con la tela grossa.
		q	11. Il condotto diritto dell'orina.
		r	11. La uena, & arteria del seme dal lato destro.
		s	11. Il uaso, che manda il seme del testicolo destro al canal del membro.
			Figura XIII. & XIII.
			I N queste Figure si mostra, nell'Prima la parte di nanzi dello stomaco, insieme col la canna della gola; nella Seconda quella di dietro.
		A	1.2. Quella parte della canna della gola, che risponde alla bocca; & dalla A alla B si nota il cammino, che fa a canto de nodi del collo insino al quarto delle spalle.
		B	
		C	1. Dalla B alla C si nota lo spatium, nel qual si separa alquanto dalla schiena a man destra; & dalla C alla D si nota lo spatium, che storce verso man manca, passando sopra l'arteria grande, forando la diaframa, insino all'ariuare alla vena dello stomaco, che segnaremo con la G.
		D	
		EE	1. Le nuuolette.
		FF	1.2. Vna glandola, che si vede attaccata alla canna della gola, appresso il quinto nodo delle spalle.
HH	11. Vna parte del peritoneo, & alcune cose che stanno riuolte in fuori.		
IK	11. Il concauo del fegato.		
L	11. Vna parte della gobba del fegato.		
M	11. La fessura del fegato, doue s'inferisce la vena del bellico.		
N	11. Alcune fessure, & impressioni, & tubercoli, che si fanno nel concauo del fegato, appresso il nascimento della vena porta. Et la N piu alta nota, doue la vena del bellico entra nella vena porta; & dalla N alla M si nota il condotto della vena del bellico.		
O	11. Vna legatura, che lega il lato manco del fegato (che finisce come in vna punta) alla diaframa.		
Φ	11. Vn seno, che si fa in questa parte nel fegato, per dar luogo allo stomaco.		
PQ	11. Lo stomaco.		
R	11. La vena dello stomaco, insieme con le vene, & arterie, & nerui, che l'abbracciano.		
S	11. 12. La bocca piu bassa dello stomaco, o il principio dell'intestino duodeno; il quale nella duodecima figura sta alquanto tirato in dentro, perche si vegga il condotto del fiele, che s'inferisce in lui; il quale poi noteremo con la e.		
T	11. Vn neruo, che nasce di que, che abbracciano la bocca dello stomaco, il qual va al concauo del fegato.		
V	11. 12. La vescica del fiele.		
XX	12. Il condotto, che va alla vescica del fiele per la sustanza del fegato, tra e rami della vena porta, & la grande.		
Y	12. I rami della vena porta, che si distribuiscono per lo fegato.		
Z	12. I rami della vena grande, che si distribuiscono per lo fegato.		
a	12. Doue si congiungono i condotti del fiele, che si distribuiscono per lo fegato.		
b	12. Il collo del fiele, nel qual s'inferisce il tronco de rami, che vengono dal fegato.		
c	11. 12. Doue il fiele entra nell'intestino duodeno; & dalla S alla d, nella duodecima si nota l'intestino duodeno, il quale sta di-		
d			

La bocca

TABV LA III LIBRI III

XI



Dichiar. delle Fig. del Lib. III.

G	1. 2. La bocca dello stomaco.
H	1. 2. Il fondo dello stomaco,
I	1. 2. La parte piu alta dello stomaco.
KK	1. 2. La piu bassa.
LL	1. La parte di nanzi dello stomaco.
MNO	2. La parte di dietro, imperò la O, mostra l'impressione, che fanno nella schiena; la N la parte piu alta del lato manco; la M la piu alta del diritto.
P	1. 2. L'intestino duodeno, il quale è qui tagliato al principio del digiuno.
Q	2. Il condotto del fiele, che va al fine dell'intestino duodeno.
R	2. Doue questo condotto entra nell'intestino.
S	2. La glandola, che in questa parte si congiunge all'intestino duodeno.
T	1. 2. Vn ramo del neruo diritto del sesto paio di nervi della testa, che viene allo stomaco diuidendosi in molti ramuscelli, che vanno alla sua bocca.
V	1. 2. Vn altro ramo del sinistro.
X	2. Vn ramo del neruo manco, che va per la parte piu alta dello stomacho; et in questa figura è notata con la Y, quando arriva appresso il fegato.
Y	2. La prima vena dello stomaco accompagnata da vn'arteria.
a	2. La seconda, la qual non ha arteria.
b	1. 2. La terza vena insieme con l'arteria, et col neruo, la qual si distende per lo lato diritto della parte piu bassa dello stomacho.
c	1. 2. La quarta vena accompagnata da vna arteria, le quali abbracciano la bocca dello stomaco.
d	1. I rami di questa vena, & arteria, che uanno per la parte piu alta dello stomacho, insino al fondo.
e	1. 2. La quinta vena insieme coll'arteria, et col neruo, che vanno pel lato manco del fondo del stomacho.
f	1. 2. Altre vene, & arterie, che nascono di quelle, che vanno alla milza.
gg	

Figura. XV.

Q Vesta Figura mostra lo Stomaco solo da per se, riuolto quel di dietro in fuore; nella quale la h mostra vna grossezza, che si fa nella sua bocca; & la i, l'altra, che circonda la bocca dello stomaco.

Figura. XVI.

IN questa figura si mostrano le Telle dello stomaco.
La terza tela dello stomaco, che nasce del peritoneo; la quale in questa figura è quasi del tutto distaccata dallo stomaco.
La seconda tela, la quale è meno distaccata, che la prima.
La prima tela & di dentro, dello stomaco, la quale è distaccata dall'altre di fuori.

Figura XVII.

Q Vesta Figura mostra la gobba del Fegato, & la parte di dietro insieme col tronco della vena grande, che nasce di lui
La parte piu alta della gobba del fegato.
La parte piu bassa.
Il luogo, doue la vena grande pertugia la diaframa mandandole alcuni rami.
Fra queste due lettere nasce del fegato la vena grande.
La maggior parte della legatura, che lega il fegato alla diaframa.
La legatura, che lega la parte manca del fegato alla diaframa.
Vna parte della vena porta.
Il seno, che si fa nel fegato, appresso la parte manca dello stomaco.

Figura. XVIII.

Q Vesta Figura mostra la Milza da ogni parte. In prima la dimostra per la parte di nanzi insieme con vn pezzo della reticella; & la A mostra il lato manco; perche il destro & quel di mezzo è coperto colla reticella; la cui tela di sotto dinotano le tre B, insieme con le vene, & arterie, che vāno per lei alla milza; le due C mostrano la tela di fuori della reticella, per la qual passano i vasi, che vāno allo stomaco, la qual nasce di que vasi, che vanno a inserirsi nella milza. Di poi si mostra per lo suo concauo, ma sola senza reticella, & altra cosa; & la D segna la parte piu alta, & la E la piu bassa; la F la sinistra, la G la destra; la H mostra vna riga, che si vede nel suo concauo, alla qual s'attaccano e vasi, che s'isefiscono i lei. Dipoi

si mostra

fi mostra per di dietro; & si veggono in essa certe impressioni, che fanno le coste. Ultimamente si mostra, ne piu ne meno, che si facesse la seconda volta, eccetto che ha due tagli, per li quali si mostrala sua sustanza, come nota la I & la K.

Tauola. IIII. Fig. XIX.

Questa Figura si conforma per ordine coll' vndecima, perche in questa mancano tutti gli intestini.

- AA** Vna parte della diaframa, che sta inuolta col peritoneo; la quale insieme con alcune coste è ripiegata in fuore.
- BB** Il concauo del fegato.
- C** La legatura del fegato, mediante la quale si lega al lato manco della diaframa.
- D** Vna parte della vena del bellico; & insieme la fessura del fegato, nella qual s'inserisce.
- E** In questa parte ha il fegato vna impressione, che fa nel lato manco dello stomaco.
- F** La bocca dello stomaco, & vna parte dello istesso.
- GG** Certe righe, o impressioni, che si fanno nel concauo del fegato, inui, doue la vena porta entra in lui.
- H** Il fiele.
- I** Il tronco della vena porta tagliato in questa parte; & due venette, che vanno al fiele.
- K** Il neruo, che va al fegato; & nasce di quegli, che abbracciano la bocca dello stomaco.
- L** L'arteria, commune al fegato & al fiele.
- M** Vn ramo del sesto paio di nerui della testa, che scende per le radici delle coste & va al fegato, & al fiele.
- N** Il condotto del fiele, che va a gli intestini.
- OO** La parte di nanzi, & la curua, della milza.
- P** La riga della milza, nella quale s'inseriscono le sue vene, & arterie.
- Q** La vena grande.
- R** L'arteria grande.
- S** Il tronco dell'arteria, che va allo stomaco, al fegato, alla milza, alla reticella, al mesenterio, & a gli intestini.
- TV** I rognoni coperti, ognuno con la sua tela.
- X** La vena, che va alla tela grassa del rognone manco.

- r** Quella, che va alla medesima tela del diritto.
- ab** Le vene, & arterie, che vanno a rognoni, chiamate emulgenti, o succiatrici.
- cc** Il condotto dell'orina del lato destro.
- d** Quello del manco.
- e** Il condotto del seme, che va al testicolo manco.
- f** Quel del lato destro.
- gg** Alcuni ramuscelli, che nascono di questi condotti del seme, inui, doue si congiungono al peritoneo, & si distribuiscono per l'istesso verso e testicoli.
- hi** L'arterie, che vanno a gli testicoli.
- k** Il tronco dell'arteria, che va all'intestino colon & al retto, per la parte piu bassa della reticella.
- l** In questa parte l'arteria grande incaualca la vena grande; & l'vna, & l'altra si diuidono in due tronchi.
- mm** Le principali vene di quelle, che nascono della grande per tutti i lombi, & vanno al peritoneo, & all'altre parti, che lor son vicine.
- n** I rami dell'arteria grande, che entrano pe buchi dell'osso grande.
- o** L'intestino retto, legato in questa parte, & tagliato.
- p** La vescica.
- q** Vna parte del canale, che porta il seme dal testicolo al membro.
- r** La pelle, che copriua il membro.
- s** La pelle, che copriua i testicoli.
- t** Vna parte della tela carnososa, che anche infasciava e testicoli.
- u** La prima delle tele particolari de testicoli.
- x** Il membro scorticato.


Figura. XX.

In questa Figura si mostrano i Roognoni in tre viste; la prima mostra il rognone diuiso pel lungo, infino all'arriuare al secondo suo feno, o concauità.

- a** La parte di nanzi del rognone diritto.
- β** Quella di dietro.
- γγ** Le bocche de rami del primo seno de rognoni, o del medesimo corpo come tela, che è inui, doue questi rami si congiungono.
- δδ** Il corpo, o tela del primo seno, nel qual finisce la vena & arteria del rognone.
- ε** Per questo spiraglio esce l'orina.
- λ** Parte del condotto dell'orina.

Dichiar. delle Fig. del Lib. III.

ζη αβγλ θ ι κ	E da notare, che sopra il corpo, che sta noto con le δδ, sta il secondo seno de rognoni, di cui non si vede se non la parte sua di dentro, che risponde al detto corpo. Perche quella di fuori, che risponde alla sostanza de rognoni, non si vede se non mettendo vna tasta appresso a doue sta la ζ & la η, in obliquo verso il lungo del rognone, & alzando vn poco in su. La Seconda Figura mostra il medesimo, che la prima, eccetto che in questa tagliamo tutta la sostanza del rognone, che faceva quel tramezzo, & insieme il tramezzo, perche si potesse ben vedere il secondo seno. Hora dinotano in questa figura la αβγλ, il medesimo, che nella prima; & il cerchio, che si vede tra la α & la β, nota il secondo seno; la θ la parte di nanzi del primo seno, o della tela, che si diuide in molti rami; la ι mostra la parte di dietro; & amendue insieme mostrano tutta la tela, o il primo seno del rognone; & la κ mostra il pertugio dell'urina. La Terza mostra tutti i rami del primo seno o tela; perche la sostanza de rognoni, che nasce alle sponde di questa tela, è tutta tolta via, ilche tutto si vede senza bisogno di lettere.	ni; che è legata, & tagliata. g Il tronco della vena grande. h Il tronco dell'arteria grande. i Il principio della vena, che va alla tela grossa del rognone destro. k Le radici dell'arterie, che vanno a gl'intestini, & mandano rami allo stomaco, fegato, fiele, milza, & reticella. l Il principio della vena, che va alla tela grossa del rognone manco. mn Le vene, & arterie, che vanno a rognoni. oopp La tela grossa de rognoni in tal modo raccolta, che lascia coperto il rognone. qq I condotti dell'urina. r Il condotto diritto del seme. u Il principio di questo condotto, il quale è alquanto rilciato. x Il condotto sinistro del seme. y Vn'altra venetta, che nasce del tronco della vena grande, & si congiunge al condotto sinistro; la quale in alcuni suole non ritornarsi. α Il principio dell'arterie del seme. β Alcuni ramuscelli, che nascono de condotti del seme, & vanno al peritoneo, sopra il quale passano. γ In questa parte scendono i condotti del seme per l'ossa del pettignone, infino al testicolo, donde rimontano. δ Doue si congiunge la vena del seme coll'arteria, & fanno come vna varice. ε In questa parte s'inserisce questo corpo, come varice, nel testicolo. ζ Il testicolo coperto coll'ultima tela. η Il principio del condotto del seme dal testicolo al membro. ι Doue questo condotto si ritorce in su discostandosi dal testicolo. κ In questa parte si vede il canale libero, & tondo. ν Il membro. ξ Vn corpo, come di glandole, che si vede al principio del collo della vescica, nel quale s'inseriscano i condotti del seme. ρ Il musculo tondo del collo della vescica. στ I due corpi, che fanno il membro; de quali il destro è attaccato anchora al suo principio; il sinistro è disciolto; & il membro insieme con la vescica fanno la figura d'vna f. υ Le vene, & arterie, che vanno al membro. φχ La prima tela de testicoli; la qual comincia inui, doue si vede la φ, & si congiunge al testicolo, inui doue è la χ.
αα bb cc d e f	Figura. XXI. Questa Figura si continua in ordine alla xix, eccetto che in questa son distaccate l'ossa del pettignone, perche si possa ben vedere la vescica, & i condotti dell'urina, & que del seme; & i rognoni stanno in questa scoperti. Vna parte del peritoneo, & della diaframa, insieme con alcune coste rotte riuolto in fuori. Il gobbo del fegato. Vna parte del concauo del fegato. La principal legatura del fegato, che l'lega alla diaframa; la qual in questa figura è alquanto stirpata dal fegato. La legatura, che liga la parte sinistra del fegato alla diaframa. Vna parte della vena porta, insieme coll'arteria, & nerui, che vanno al fegato, & col condotto del fiele, che va a gli intesti	il mu-



Dichiar. delle Fig. del Lib. III.

- ↓ Il muscolo del testicolo, che nasce della tela detta.
 ω Il settimo muscolo, che muoue la coscia.
 * Vna parte dell'intestino retto.

Figura. XXII. XXIII.

IN queste Figure non è piu differēza di questa, che l'vna mostra la parte di nanzi, & l'altra quella di dietro; perche amendue mostrano gli instrumenti del seme, & della orina.

- 1 La parte di nanzi del rognone.
 2 Quella di dietro.
 3 La parte piu alta.
 4 La piu bassa.
 5 Il gobbo del rognone.
 6 Il lato di dentro del rognone; nel quale il 6 & 8 mostrano il seno suo; & particolarmente il 6 mostra il tubercolo; & il 7 & 8 i seni.
 g Il tronco della vena grande, che è tagliato, poi che ha passato il fegato scendendo all'ingiu.
 h L'arteria grande, tagliata, passata la diaframma all'ingiu.
 k Le radici delle arterie, che vanno al mesenterio, & alla tela di sotto della reticella.
 l Il principio della vena, che va alla tela grossa del rognone diritto.
 mn Le vene, & arterie, che vanno a rognoni.
 o Il principio della vena, che va alla tela grossa del rognone manco.
 qq I condotti dell'orina.
 r Doue questi condotti entrano nella vescica.
 t Il condotto destro del seme.
 u Il principio di questo condotto, il quale è alquanto rileuato.
 x Il condotto manco del seme.
 α Il principio dell'arterie del seme.
 β Il principio de ramuscelli de condotti del seme, che habbiam detto gire al peritoneo.
 δ Doue si congiungono la vena, & arteria del seme, & fanno vn corpo come varice.
 ε Il fin di questo corpo, che si attacca al testicolo.
 Il testicolo, coperto con la tela di dentro.
 η Il principio del condotto per doue va il seme dal testicolo al membro.
 θ Qui scende questo condotto per la parte di dietro del testicolo.
 ι Qui comincia a montare.
 κ Qui si fa tondo, come vn neruo, & si di-

scosta dal testicolo.

- λ In questa parte si ritorce verso la parte di dietro de condotti del seme, & rientra per lo peritoneo.
 μ Doue si congiunge il condotto sinistro al destro.
 ν La vescica, la quale nella figura 2 2 è diuisa per mezzo, perche si veggia di dentro.
 ξ Quel corpo, come spugna, nel quale s'inseriscono e condotti del seme; il quale nella figura xxij è diuiso insino al canale dell'orina.
 ο Quel corpo, come glandola, del collo della vescica nel quale s'inseriscono i condotti del seme.
 ρ Gli due corpi, che fanno il membro.
 σ L'arteria, che passa per lo membro.
 φ Il luogo piu largo del canale del membro.

Figura XIII.

IN questa Figura si mostrano particolarmente i Testicoli in diuerse viste.

- AB La parte di nanzi del testicolo destro. Impero nella prima figura i condotti del seme sono attaccati; nella seconda no, perche meglio si possino vedere.
 C I condotti del seme, che sono tagliati appresso doue escono del peritoneo; & si cominciano a cōgiungere, & fanno come varice.
 D Il luogo, doue questi vasi s'inseriscono nel testicolo.
 E Il principio del vaso del seme, che va dal testicolo al membro.
 F Il luogo, doue questo vaso riuolta in sù.
 G Il luogo, doue comincia a sormontare questo vaso.
 H Questa figura mostra la parte del condotto del seme, che era attaccata alla tela di dentro del testicolo; & i buchi, & asprezze, che l'erano attaccate.
 I Questa Figura mostra l'istesso, che la passata; non dimeno in questa si vede la parte gobba, & non s'attacca alla tela del testicolo.
 K Il testicolo insieme col corpo, come varice, & tolto il vaso del seme, che va al membro.
 M Questa figura mostra il medesimo, che la passata, impero per la parte di dietro; & le due lettere seguenti son comuni ad amendue.
 N Il principio, doue si congiungono la vena, &

arteria

arteria del seme.
O Il fine del corpo, come varice.
P Il testicolo, inuolto nell'ultima tela, & libero dal corpo, come varice; et si vede per la parte di nanzi, nella quale il detto corpo s'inserisce.
Q Il testicolo, tolta via la tela, & riuolta a dietro, iui, doue si vede la R, pche si ueggono e rami che nascono di quella, & si distribuiscono per la sostanza sua.
R
S Vn'altra parte di questa tela, che cuopre il testicolo; la quale è attaccata a lui.
T Questa figura dimostra il testicolo diuiso per mezzo, perche si uegga la sua sostanza; & i vasi, che si distribuiscono per lui, notati con le **VV**.

Tauola V. Fig. XXV.

Q Vesta Figura è la prima della donna; nella quale son tolti via gli intestini tutti, & alzati in sù la reticella. Et si vede in essa il mesenterio, & alcune sue tele, che fa di bisogno rompere; & principalmēte si vede il sito della matrice & della vescica, nella forma, che si vede in qual si voglia donna, che non sia molto magra.

A B C.D. La parte di dentro della tela di nanzi della reticella.
EE La parte del mesenterio, che congiunge gli intestini sottili alla sciena.
FF Vna parte della tela del mesenterio, distaccata dall'altra; che è notata cō le due **GG**; & tutte insieme mostrano l'ordine de vasi, che vanno per lui, & le glandole.
G
HH A questa parte del mesenterio si congiunge la parte dell'intestino colon, che era appresso quella dell'intestino retto.
I A questa parte di mesenterio s'attacca il principio dell'intestino retto.
K L'intestino retto tagliato al principio del colon, che è al principio dell'osso grande.
L La parte di nanzi del corpo della matrice, a cui sono attaccate alcune tele.
MN I testicoli della donna, de quali il diritto non si vede bene, per esser coperto dalla tela, che cuopre i vasi del seme; il manco si vede molto meglio, perche l'ha tolta via.
OO Vna tela, che nasce dalla parte del lato diritto del peritoneo, & cuopre i condotti del se

me del medesimo lato, & le vene, che vanno alla parte più alta della matrice, faccodo insieme cō la sua compagna dall'altro lato la seconda tela della matrice.
P In questa parte si ueggono alcune fibre di carne nella detta tela, che fanno il muscolo del lato destro della matrice.
Q Q La tela del lato manco, che risponde a quella del lato destro, che notamo co le **oo**.
R S La parte di nanzi del collo della matrice, che sta fra la R & la S, & coperta cō la tela, che nasce dalle parti del peritoneo, per le quali passano le vene, che vanno al detto collo; & lo spatio tra la R, & la S, nota il largo del collo; & le crespe, che qui si ueggono, son quell'istesse, che si fanno nel detto collo, quando è raccolto.
T La parte di dietro della vescica.
V Vna parte del bellico, insieme con le due arterie, che nascono di lui; & il condotto, per doue la creatura orina nel ventre; i quali qui pendono in giù.
X Vna parte della vena, che va dal bellico al fegato.
Y Il condotto, per doue orina la creatura nel ventre della madre.
Z & L'arterie, che nascono del bellico.

Figura. XXVI.

D Ichiaratione delle lettere della Ventesima sesta Figura. Nella quale è tolto via tutto'l mesenterio, lo stomaco, & gli intestini; & si vede la matrice, la vescica, & gli instrumenti, che appartengono alla generatione, & la poppa o mammella scorticata.

AA Alcune vene, che vanno alle poppe o mammelle, di quelle, che vanno alla pelle, che cuopre la punta dell'omero.
B Altre vene, che nascono della vena grande, quando vuole entrar nel braccio.
C La poppa, o mammella.
DD La sostanza della mammella.
EF G.H. La parte di dentro del peritoneo.
IK La vena, & arteria, che scendono per di sotto l'osso del petto.
L Il gobbo del fegato.
M Vna parte del concauo del fegato.

Vna

Dichiar. delle Fig. del Lib. III.

N	Vna parte della vena, che va dal bellico al fegato.
O	Il tronco della vena porta, il quale in questa parte è tagliato, insieme co' rami, che nascono di lui.
P	La vena grande.
Q	L'arteria grande.
R	Le radici dell'arterie, che vanno al fegato, alla milza, alla reticella, & a g' l'intestini.
S	Il principio della vena, che va alla tela grassa del rognone manco.
TV	Le vene, & arterie, che uano a rognoni, chiamate emulgenti, o succiatrici.
X	Il principio della vena, che va alla tela grassa del rognone diritto.
YZ	I rognoni.
aa	Il condotto diritto dell'orina, il quale è tagliato appresso a la piu bassa; & l'altra parte sua, che è attaccata alla vescica, dimostra la b.
b	Il condotto manco.
cc	La vena diritta del seme.
dd	La sinistra.
e	Il nascimento dell'arterie del seme.
f	L'arteria destra.
g	L'arteria sinistra.
h	La matrice, il cui collo comincia appresso la l.
ikl	L'intestino retto, che è tagliato, & legato.
m	Alcuni rami delle vene, & arterie del seme, che vanno alla parte dinanzi della matrice.
n	Le vene, & arterie, che uanno a testicoli; le quali si congiungono, & fanno vn corpo, il qual si fa alquanto piu largo di sotto, in, doue è la p.
o	Alcuni ramuscelli, che nascono della congiunzione di queste vene, & arterie, & si distribuiscono per le tele, che congiungono il testicolo al peritoneo.
p	La parte dinanzi del testicolo.
q	Il principio del condotto, che porta il seme dal testicolo alla matrice.
r	Le riuolte del condotto del seme, lequali fa da lati del testicolo.
s	La parte del condotto del seme, che va alla matrice.
tt	Il collo della matrice.
xx	Le vene, che uanno alla parte piu bassa della matrice, & al suo collo.
y	Vna vena, che nasce di queste sopra dette. Mostra anche questa lettera, doue il condotto dell'orina entra nella vescica.
z	

β	La parte di dietro del fondo della vescica.
γ	Il musculo del collo della vescica.
δ	In questa parte s'inferisce il collo della uescica a quel della matrice,
ε	Le labbra della natura.
ζ	La radice dell'arteria, che uan alla piu bassa parte del mesenterio.
η	Alcuni rami della uena, & arteria, che uanno alla gamba; e quali montano uerso il bellico per gli muscoli diritti del ventre.

Figura. XXVII.

IN questa Figura si vede la Matrice insieme con le tele, che la legano al peritoneo. Et è tanto increspato & raccolto il collo suo, & radoppiato in sù, che si vede la bocca della matrice; & è la vescica & il suo collo aperto, & posto sopra il testicolo diritto, perche si vegga il voto di lei.


A	La parte di nanzi della matrice coperta anchora delle sue tele.
B	Il collo della matrice.
C	Vna parte del fondo della matrice, la quale è rileuata, come una ghianda nella parte piu alta del collo della matrice.
D	La bocca della matrice.
EE	La tela, che lega la matrice col peritoneo, & contiene i vasi del seme.
F	Il testicolo manco.
G	La vena, & arteria del seme.
H	Vna parte di questa uena; & l'arteria, che va alla parte piu alta della matrice.
I	Vn altro ramo delle medesime, che uan al testicolo,
K	Il condotto, che porta il seme dal testicolo alla matrice.
L	Il concauo della uescica.
M	Doue s'inferiscono e condotti dell'orina.
N	Alcuni pezzi de condotti dell'orina, che pè dono dalla uescica.

Figura. XXVIII.

IN questa Figura si vede la Matrice & i suoi Testicoli.

Alcuni ramuscelli, che nascono de condotti del seme, che uano alle tele, che si congiungono al pe-

TA BV LA V XXVIII LIB XXVII III



Dichiar. delle Fig. del Lib. III.

- al peritoneo.
- i* Vn altro ramuscello de medesimi condotti, che va alla parte di nanzi della matrice.
- x* La mescolanza, che fanno la vena, & arteria del seme simile ad vna varice.
- λ* Il testicolo manco.
- μ* Il vaso, che porta il seme dal testicolo alla matrice.
- ν* Il cano, che si fa nel corpo della matrice, nel qual s'inferisce il condotto del seme.
- ξ* In questa parte comincia il collo della matrice; & qui di sotto è la sua bocca.
- ο* Il collo della matrice.
- ρ* In questa parte si congiunge il collo della vescica a quel della matrice.
- ς* Alcune vene, che si distribuiscono per la parte di dietro del corpo della matrice, & pel suo collo.
- τ* Le labbra della natura.
- υ* I condotti, per li quali l'orina va da i rognoni alla vescica.

Figura. XXIX.

Questa Figura rappresenta la Matrice insieme col collo suo, in quella grandezza, in che si fuol ordinariamente ritrouare in vna donna, che non sia grauida. Et è da notare che'l corpo della matrice è diuiso d'alto a basso, perche si possa meglio vedere il suo voto.

- AA* B. Il voto del corpo della matrice.
- CD* Vna costicciuola, che si fa d'alto a basso per mezzo del voto della matrice.
- EE* Il grosso della tela di dentro della matrice.
- FF* La parte del corpo della matrice, che entra a dentro facendo vna costicciuola fra e suoi due canti.
- GG* La bocca della matrice.
- HH* La tela di fuori della matrice, che nasce del peritoneo.
- III* Parte delle tele, che nascono del peritoneo, & legano la matrice.
- K* La sustanza del collo della matrice.
- L* Parte del collo della vescica, che si congiunge al collo della matrice.
- Il resto di questa figura senza lettere, ognuno da per se lo potrà facilmente intendere.

Tauola VI. Figura XXX.

Questa Figura rappresenta vna Donna grauida, che ha aperto il ventre in croce, & tolta via la reticella, perche si vegga il sito dello stomaco, de gl'intestini, & della matrice, & la figura sua nelle grauide.

- AB* CD. La parte di dentro della tela, che fascia gli intestini, chiamata il peritoneo, la quale è attaccata a muscoli del ventre.
- EE* La parte del gobbo del fegato, che appare senza romper costa alcuna.
- FF* Lo stomaco.
- GH* La parte dell'intestino colon, che è attaccata allo stomaco.
- IK* Le tele, che legano la matrice all'ossa del pettignone.
- L* Il corpo della matrice, il quale in questa arriva infino al bellico.
- OO* OO. Le tele, che nascono del peritoneo, & abbracciano e testicoli, & i condotti del seme, & la parte di nanzi della matrice, facendo la tunica di fuori della matrice.
- Q* La parte di nanzi del collo della matrice.
- R* La vescica.


Figura XXXI.

In questa Figura si vede la Matrice, cauata del corpo per la parte di dietro, & aperta in croce, perche si vegga quella massa di vene, che è attaccata alla parte di nanzi delle spalle sue, chiamata la Secondina.

- AB* CD. La parte di dietro del corpo della matrice tagliata in croce, & rinolta in fuori; et particolarmente dimostra certi soßetti, in che s'inferiscono i capi delle vene della secondina, chiamate Cotiledones.
- EEE* La parte di dietro della secondina, la quale fatta d'vna massa di vene, medianti le quali succia la creatura il sangue per l'ombilico.
- FF* Vna parte della tela, o tunica di fuori della creatura, chiamata Allantoides.
- G* Parte del collo della matrice.
- H* Vna vena, & vna arteria, che nascono della vena, & arteria grande, tosto da poi, che son diuise sopra l'osso grande, & si distribuiscono per la matrice.

Figura

FIG. XXX



Dichiar. delle Fig. del Lib. III.

Figura XXXII.

LA presente Figura mostra le Se-
condine cauate tutte della matri-
ce; nelle quali anchora stà inuolta la
creatura per la parte di dietro.

III La secundina.

KK La tela, o tunica di fuori della cratura, alla
cui vltima parte è attaccata la secondi-
na; & particolarmente queste lettere mo-
strano le vene, che si distribuiscono per
essa.

Figura XXXIII.

Questa Figura ha aperta la tuni-
ca della creatura, tra la quale &
quella di dentro si conserua tut-
ta l'orina, che fa la creatura stando
nel ventre.

LLL La tela di fuori, ch' en fascia la creatura; alla
cui parte di dietro, che è notata con le
due LL, si vede attaccata la secundina.

M La parte di dentro di questa tela.

N I vasi, che nascono della massa chiamata se-
condina, & fanno l'ombilico della crea-
tura.

* Il fin del condotto, che viene dal bellico del-
la creatura (insieme cō gli altri suoi vasi)
insino all'entrare tra le due tuniche, per
lo quale la creatura orina il tempo, che
sta nel ventre. La parte di questo condot-
to, che va dalla vescica al bellico, no-
tammo nella figura xxv con la Y.

OO La tunica di dentro, che fascia la creatura,

chiamata Amnios, simile ad vna carta
pecora, eccetto che si veggono per essa
sparte alcune vene; & è tanto sottile, &
trasparente, che si comincia a raffigurare
la creatura, & il sudor suo, che si con-
tengono dentro di quella.

Figura XXXIIII.

IN questa vltima Figura stāno aper-
te amendue le tuniche, & cauata
fuori la creatura, la quale ritiene an-
chora la figura, come staua dentro di
loro.

P Q

La tela di fuori, che fascia la cratura; & in
particolar la P nota la parte sua di fuo-
ri; la Q quella di dentro, la quale è anche
notata con le S S.

Parte della secundina attaccata alla parte
di fuori della detta tela.

S S T

Nella parte di fuori della tela di fuori del-
la creatura si vede il modo, nel quale le
vene nascono della secundina; & in par-
ticolare le S S mostrano le vene, & la T,
dove si raccolgono tutte facendo il bel-
lico.

V V

La parte di fuori della tela chiamata
Amnios.

X X

La parte di dentro di questa medesima tela.

Y Y

La distribution de vasi del bellico, e quali
vengono dalla parte di dentro di dietro
dell' Amnios, insino al bellico della crea-
tura.

Fine del Terzo libro.

LIBRO QVARTO

dell'Historia dell'Anatomia

COMPOSTA PER GIOVANNI
VALVERDE MEDICO,NEL QUALE SI TRATTA
delle Membra necessarie alla Vita.*In quali parti del corpo s'ingenerino gli Spiriti
della Vita. Cap. 1.*

O L E N D O il Sommo Creatore darci vna Vita piu perfetta di quella, che hanno le piante, & le altre herbe, fu di bisogno crear nel nostro corpo vn particular membro, nel quale (come in vna fucina) si formasse tal virtù. Et cosi ne prouidde del Cuore, tanto necessario alla vita, che non è animale alcuno, per picciolo che egli sia, il quale non habbia questo membro, o cosa, che lo somigli. In questo Cuore s'ingenerano gli spiriti della vita, chiamati per ciò Vitali; la materia de quali è il vapor del sangue, insieme con vna parte dell'aere, che di continuo per la bocca, & pel naso risfataro pigliamo. Et perche nel libro passato trattammo delle membra necessarie alla generatione del Sangue; in questo sarà bene trattar di quelle, che son necessarie alla generatione degli Spiriti. Già credo che sappia ognuno, che se vogliamo che l'aere entri al cuore, è di bisogno che risfatiamo; & tirando l'aere in dentro il facciam

*Perche cagiona
fu fatto il Cuore.*

*Tutti gli Ani-
mali è forza
che habbiano
Cuore.*

*Come entra l'a-
re al Cuore.*

- a lib. j. ta. vij.
fi. j. ij.
b fi. vij. viij.
c li. vij. ta. iij.
fi. iij.
d la mede.
fi. iij.
e fi. ix. x.

mo passare pel ^a gargarozzo, & di poi per la canna de polmoni; doue distribuendosi per la sustanza loro si mescola col sangue, che diremo scendere dal ^b ventricolo diritto del cuore per la vena ^c arteriale alla medesima sustanza de polmoni; & amendue insieme passano per la ^d arteria venale, dalla quale entrano nel ventricolo ^e manco del cuore. Hora hauendo l'aere da passare (innanzi che arriui al cuore) per tutte queste parti, sarà ben trattare in prima di loro; il che farò, quando haurò trattato della tela, che rinuolge le coste (chiamata per ciò Pleura); la quale fascia tutte queste membra insieme, come il peritoneo quelle della Digestione.

*Della Tela, che fascia le Coste, chiamata per ciò
Pleura. Cap. 2.*

Q V E S T A Pleura è vna tela, che è attaccata alle coste per la parte di dentro, & a tutte le parti del concauo del petto. La qual nasce delle legature de corpi de nodi delle spalle, cominciando per la parte di dietro, dal primo nodo delle spalle infino all'vndecimo, iui, doue ^a l'arteria grande passa tra la schiena, & la diaframa; per la parte dinanzi, dal nodo della gola infino al fine dell'osso del petto, al quale è attaccata la diaframa; da lati, dalla prima costa infino alla parte di sopra della diaframa, che risponde al concauo del petto, coprendola tutta, ne piu ne meno, che tutta l'altra concauità del petto, alla quale risponde in figura. Perche è stretta di sopra, come il petto, & appuntata, & alquanto piu larga di sotto, principalmente da lati; dinanzi è corta; di dietro tanto piu lunga, quanto piu è basso l'ultimo nodo delle spalle, che l'osso del petto. In cōclusionemantienne l'istessa figura, che l'concauo del petto, al quale è attaccata. Et per la parte di dietro, che

*Il nome, & sito
della Tela, che
fascia le Coste.*

- a lib. ij. t. vij.
4. 4. 9.

Libro Quarto

A quai parti
s'attacca la te-
la, che fascia le
coste.

La sostanza di
questa tela.

La tela, che fa-
scia particolar-
mente le coste.

Li vasi, che pas-
sano per la te-
la, che fascia le
coste.

risponde al voto del petto, è liscia, & humida, eccetto nelle parti, doue ha alcune punte, o processi neruosi, de quali nascono altre tele, alle quali si lega alcun corpo; come quelle, che si veggono principalmete per tutta la parte di dietro appresso i nodi delle spalle, iui, doue nascono di lei ^b le tele, che fendono il petto. Et a questa tela s'appoggiano la ^c canna della gola, ^d la vena grãde, ^e l'arteria grande, & la vena ^f sola, alla qual tutti questi vasi si congiungono, mediante alcune legature, che nascono di lei, & si conuertono in certe tuniche, che n'fasciano tutti questi vasi, & secondo il lungo dell'osso del petto, & secòdo quel della diaframa, dal petto alle spalle, doue loro si congiungono anche le tele, che tramezzano il petto, chiamate per ciò il Mediastino, che vuol dir Tramezzo; delle quali nel capitolo seguente faremo particolar mentione. Questa tela si fa di due molto sottili tuniche, & è d'una sostanza dura, neruosa, & biachetta, disuguale, & alquanto piu rossa, che'l peritoneo, alla quale è simile in offitio. Perche, si come egli infascia tutte le membra della digestione, così infascia questa tela tutte quelle, che seruono alla respiratione, & a gli spiriti della vita; & si come in quella si vede qualche poco di grasso, così in questa delle volte (benche poche) si vede attaccato alla parte sua di dentro qualche grasso, principalmete appresso e nodi della schiena, & doue passano le piu grosse vene di questa tela. Escono anche di questa tela, quando da vn lato, quando dall'altro, principalmente dal sinistro, alcuni fili neruosi, medianti e quali il polmone di quel lato se gli ^g congiunge, & nella parte, che è attaccata alla diaframa, se gli congiungono anche ^h le tele del cuore per vn grã spatio, anzi pare verissimamente, che nascono di lei. Et per la parte di fuori, che è attaccata alle parti, che le stanno appresso, è alquanto aspra, & disuguale, come fanno le tele, che sono attaccate fra se stesse; & non ha attaccato grasso alcuno notabile. Nondimeno non è attaccata vguualmente da ogni parte; perche assai piu forte s'attacca alle coste, mediante vn'altra tela, che fascia particolarmente ogn'una di loro, chiamata Periofstio, che non fa a muscoli, detti Intercoftales, & ne piu ne meno s'attacca assai piu fortemente alla parte neruosa della diaframa, che alla carnosa. Si veggono anche in questa tela, per la parte, che si congiunge alla diaframa, due ⁱ buchi, simili a que, che habbia detto vederfi nel peritoneo, vno per la canna della gola, l'altro per la vena grande, & vna ^k fessura per l'arteria grande, & per la vena sola. Appresso il nodo della gola non ha buco alcuno grãde, ma ha molti piccioli spiragli, per i quali passano molte vene, che si spargono per questa tela attaccandosi a loro, & pigliando di loro vn'altra tela, oltre la propria, che hanno. Hora passano in questa parte per lei i rami ^l della vena grãde, & que dell'arteria grande; ^m la canna della gola, & la ⁿ canna del polmone, i ^o nerui del sesto paio della testa, & que, pche vāno alla diaframa, & i rami delle vene, che vāno tra le coste. L'offitio di questa tela chiamata Pleura (oltre al fasciar tutte le mēbra dette) è fortificar la diaframa, faccendola piu grossa.

Del Tramezzo del Petto, chiamato il Mediastino. (Cap. 3.)

Il sito di queste
Tele.

La figura.

Che cosa è tra
le tele del Me-
diastino.

LE Tele, che diuidono il Petto pel mezzo dal nodo della gola, infino alla diaframa, son ^a due; & nascono della tela, che fascia le coste, secondo tutto il lungo dell'osso del petto, & quel della diaframa, & tutti e nodi delle spalle, faccendo da vn lato, & dall'altro, come due triangoli, i lati de quai son disuguali. Il primo & minore comincia dalla strozza, & cammina secondo il lungo dell'osso del petto, infino al suo fine, doue gli si congiunge la diaframa. Il secondo è maggior di questo, & comincia pur dalla strozza; & cammina a canto de nodi della schiena infino all'vn decimo delle spalle, doue si congiunge anche alla diaframa. Il terzo (che è mezzano tra e due) piglia dal fin del primo, diuidendo per mezzo la diaframa. Queste due tele son molto differenti nel congiungersi, l'vna all'altra. Perche dal secondo lato si congiungono sempre l'vna all'altra. Dal primo stanno separate, quanto è largo l'osso del petto, & tra l'una, & l'altra tela tutto quello spatio è pieno ^b d'alcuni fili neruosi, & intertefluti; & si fa tanto piu largo, o stretto, quanto piu largo, o stretto è l'osso del petto. Dal terzo lato stanno tanto separate, quanto è il largo della parte neruosa della diaframa, & nello spatio si veggono molto meno fili, che nel sopra detto, & per ciò appare assai piu chiaramente di quello. Questa concauità ne gli huomini non abbraccia piu, che le tele del cuore, & il cuore medesimo, & la parte della vena grande, che passa per la diaframa. Fassi anche tra queste tele vn'altra

b fi. j. H. K. L.
O. fig. ij. G.
G. H. I. K.
c li. iij. fi. xij.
xiiij. A. B. C.
d lib. vj. ta. ij.
E E
e li. vj. t. iij. i.
f lib. vj. ta. ij.
F F

g fig. j. si con-
giunge la I
alla V
h fi. iij. dalla
G alla H

i lib. ij. t. vij.
r, f.
k la mede. q.
l lib. vj. ta. ij.
iij. V
m li. ij. ta. vij.
E
n la med. F.
o fi. vj. a. d
p fi. iij. I I
q lib. vj. fi. ij.
b b

a fi. ij. la dirit-
ta GG, la fi-
nitra II K
fi. j. L L M

b Per qste co-
se mira le
figure. j. ij.
iij. iij.

Delle Membra della vita. 103

vn'altra concauità nel mezzo della tela destra, & della m̃aca, nella qual stan situate le tele del cuore, & il cuore medesimo, & la vena grande, secondo che habbiamo detto. Per la parte di dentro, nella quale, oue son cōgiunte, son molto aspre, doue son separate, son lisce; senza esserui nel mezzo dell'vna parte, o dell'altra, se non per miracolo, grasso alcuno; anchor che nella parte di fuori, che mira il concauo del petto (la quale è molto liscia, & humida, & in alcune parti è attaccata al polmone) se ne vede ordinariamente tanto, che alle volte paiono queste tele piu grosse, che la reticella. Si veggono anchora, (oltre di questo grasso) nella parte piu alta di queste tele alcune glandole, che sono iui, doue si fa la distributione della vena gr̃ade; dalla quale riceuono elleno anchora molti rami di vene, come al suo luogo diremo. Queste tele son assai piu sottili, che quelle, che fasciano le coste, & suo officio principale è rinuolgere le tele del cuore, & il cuore medesimo, & sostenerle, che non possano cadere ne in giù, ne a dietro. Aiutano similmente a questo, che i vasi, che passano per questa parte, cāminino piu sicuri appoggiati a loro, & anche à diuider il petto in due. Perche, se per disgratia fusse ferito da vn lato, potesse il polmone dall'altro muouerfi; il che non potrebbe in guisa alcuna fare (come da poi piu lungamente diremo) se mancasse questo tramezzo.

L'officio di queste tele.

Della Canna del Polmone.

Cap. 4.

a lib.i.ta.vii.
b cap. vltimo.

FASSI il^a Gargarozzo (il cui principio, o bocca, secondo che nel^b primo libro dicemo, è il primo buco di que due, che si veggono nelle fauci) di tre cartilagini, che col tempo si conuertono in natura d'ossa. Al fine di questo gargarozzo è attaccata la canna del polmone, la quale alcuni Antichi chiamarono semplicemente Arteria, perche contiene dentro solamente aere; ma, da poi che furono chiamate di questo nome le vene tutte, che battono, fu chiamata questa, Arteria aspra, per esser fatta d'una sustanza dura, & disuguale, a differenza dell'altre, che non sono così; & il medesimo nome ha man tenuto sempre tra Latini. Noi altri la chiamiamo la Canna del polmone. Questa canna è vna sola, & cammina (come ognuno in se stesso può facilmente toccar col dito) dirittamente dal principio della noce, appoggiata p la parte di dietro alla cāna della^c gola, infino al fin del collo, & indi nascōdendosi cāmina infino al quarto nodo delle spalle; doue entrādo ne polmoni si diuide in due^d tronchi, vno, che va a polmoni del lato manco, vn'altro, che va a que del destro. Et ognun di loro si diuide in molti & diuersi rami, che si distribuiscano per tutta la parte del suo lato, faccendo due rami, & ognuno di quelli altri due, & così di mano in mano ogni ramo si diuide subito in due, che si fanno sempre piu sottili, infino che a questo modo si spargono per tutta la sustanza de polmoni, faccendo naturalmente la figura d'un albero volto al riuerso, il cui tronco si diuidesse in due, & ogni tronco in molti rami. Il principal tronco è molto differente in figura; perche la parte piu alta del principio suo detta il gorgozzuolo è t̃ato piu acura, o foda, secondo che piu o meno è la couertura del gargarozzo, & la parte di nāzi, & da lati (che è la noce) mostrano q̃lla figura di scudo antiquo. Et si come la parte piu alta di q̃sto scudo è piu larga, & q̃lla di sotto piu stretta, così anchora la parte piu alta di nāzi del gargarozzo è piu larga, q̃lla di sotto piu stretta; anzi la parte piu sbassa del gargarozzo, che habbiā detto farsi di q̃lla cartilagine, si mile all'Anello, che ṽsano gli Arcieri i Tracia, è quasi t̃ato stretta, come la cāna del polmone.^h La parte di dietro del gargarozzo è quasi piana, p cagione de processi, che la prima cartilagine simile al scudo getta verso dietro; pche altrimente q̃sta parte farebbe quasi tonda p rispetto della secōda, & terza cartilagine, come è la parte di dietro della terza, doue nō aggiūgono l'ali della prima. Mutasi anchora la figura del gargarozzo, secōdo che la terza cartilagine piu si raccoglie verso il voto del gargarozzo, o esce piu in fuori, pche tanto piu le punte della prima si nascondono, o escono in fuori. Il resto della canna del polmone è quasi sempre d'vna figura, i cioè per la parte di nāzi, & da lati è tonda, & fatta di certe cartilagini come vna C a nodi, legate con alcune rele, le quali, quando risatiamo, si rileuano piu, che le cartilagini, & quando non risatiamo, sono piu rimesse. Questa canna per la parte di nāzi è molto simile a corpi de nodi delle spalle; & le cartilagini sue, anchor che nella cāna paiono tōde, pur ognuna da per se è quadra, piu lunga, che larga, & molto sottile, benchè non tanto nel mezzo, quāto da lati, verso i quali si va, a poco a poco, assottigliando;

La sustanza della canna del Polmone. Il sito.

La distributione sua per gli Polmoni.

La historia, & figura del gargarozzo.



La figura della canna del Polmone.

Per la parte di nāzi.

c lib.ii.ta.xvi.
fi.ii.iii.v. H

d lib.i.ta.vii.
fi.i.ii.

e li.ii.ta.xvi.
fi.ii.iii.iiii.

f la med. fig.
iiii.v.g

g la med. fig.
iiii.v.x.i.

h lib.i.ta.vii.
fig.ii.

i la med. fig.
i.ii.xiii.xv.

Libro Quarto

tagliando, & conuertendo in tele; le quali faccendosi carnose si congiungono alla parte dinanzi della canna della gola, & fanno, che questa canna non tenga particolar figura. Anzi, quando rinfiammo, si fa questa parte di dietro tonda, come quella dinanzi, & alcune volte piu; quando inghiottimo, si fa al contrario, perche si mette verso il voto della canna; quando non inghiottimo, ne rinfiamo, sta piana, & alquanto ritirata verso il suo voto. Di queste cartilagini poste tutte per vn medesimo ordine è fatto tutto il gargarozzo; le quali, quando questa canna s'allarga, o gonfia, stāno tanto separate l'vna dall'altra, quanto è il largo d'ognuna di loro, & quando si raccoglie, si congiungono quasi l'vna all'altra, medianti quelle tele, con le quali habbiamo detto esser legate. Delle quali la prima è come vna couerta d'ognuna di queste cartilagini, ne piu ne meno, che sia il peristio dell'altre ossa; benché questa tela non sol cuopre queste cartilagini per la parte, che si congiungono l'vna all'altra, ma anche da lati, & di dietro, doue si congiungono alla canna della gola. La seconda tunica, o tela, cuopre d'intorno tutta la canna dalla banda di fuori, attaccandosi fortemente alla prima tela, & è molto sottile, & quasi simile alle tele del peritoneo, & a quelle, che nascono della tela, che abbraccia le coste; mediante questa tunica la canna della gola si congiunge alle parti, che le son vicine, & i nerui della voce si congiungono a lei. La terza tunica fascia tutta la parte di dentro di questa canna, attaccandosi gagliardamente alle tele delle cartilagini sue; & è commune alla lingua, labbra, palato, canna della gola, & alla parte di dentro del gargarozzo, & è assai piu grossa, che la seconda, se ben anche è sottile, & forte. Et la grossezza non è vguale da ogni parte; perche dentro del gargarozzo è assai piu grossa, & è attaccato alcuno grasso fra lei, & le cartilagini del gargarozzo; ma, come arriua alla fessura delle fauci, si fa da lati dura, come callo, & è assai piu bianca, & dentro del polmone è assai piu morbida, & rossa; nella canna del polmone è tra dura, & tenera; & così in queste parti, come in quelle è intertestuta d'alcuni fili diritti. Tutta la canna del polmone, che si fa di queste parti dette, per la parte di fuori è aspra, come sono l'altre tele, che si congiungono ad alcun'altra; perche per la parte di dietro si attacca alla canna della gola, medianti alcuni fili neruosi; per quella di sopra verso il gargarozzo è attaccata molto forte alla canna della gola mediante la tunica commune ad amendue; da lati, & di dietro di questo gargarozzo è attaccata anche alla canna della gola molto fortemente medianti e muscoli, che abbracciano la canna della gola, & si inseriscono nella prima cartilagine del gargarozzo; per la parte dinanzi s'attacca a^k muscoli, che le passano sopra, & principalmente a^l nerui della voce. Et anche i rami di questa canna non son molto lisci, perche s'attaccano alla sustanza del polmone. Per la parte di dentro, se ben non è molto vguale per causa delle cartilagini, che sono rileuate, nondimeno è liscia, & humida senza vederli in lei asprezza alcuna. Et ne piu ne meno è il gargarozzo per di^m dentro; benché nō è da ogni parte d'vna figura, perche nella parte piu bassa sempre è tondo, & coperto ad vn medesimo modo, per cagion della seconda cartilagine, che habbiamo detto esser forata. Imperò nel mezzo, quando si chiude, fa vna fessura, come di flauto, dinanzi a dietro, tanto che'l gargarozzo resta tondo di dentro. Stando questa fessura chiusa si vede da ogni lato vn fosso, che monta alquanto piu, che la fessura, & fanno che in questa parte si veggano come due cornicciuole. Ne piu ne meno, che è la parte di sotto di questa fessura differente, secondo che'l gargarozzo si chiude od apre, così anche è la parte di sopra; benché non mai è del tutto tonda, se non che, secondo che piu o meno s'apre, così ella piu o meno s'apre da dietro innanzi. Questa canna fu fatta, perche per lei uscisse o entrasse l'aere a polmoni; il quale entrando recrea gli spiriti della vita, & uscendo caua seco (secondo che Galeno dice) la fuligine del cuore, & insieme è la materia della voce; perche uscendo l'aere con impeto, & ferendo in quella linguuccia del gargarozzo, suona, come farebbe vn flauto, facendo diuerso suono, secondo che piu o meno le diamo aere, & secondo che maggior o minor forza vi mettiamo, & insieme, secondo che piu o meno apriamo, o ferriamo la detta linguuccia.

Delle Glandole della Gola, dette da Chirurghi le Tonsille. Cap. 5.

Q VANT V N Q V E trattar in questa parte delle Tonsille, paia alquanto fuor di proposito; pure, perche in niuno altro luogo poteano meglio inserirsi, per seruir loro in certo

Le tele, che cuoprono il Gargarozzo.

La terza Tunica del gargarozzo.

La parte di fuori della Canna del Polmone.

A che parti si congiunge la Canna del Polmone.

La fattura del Gargarozzo per di dentro.

Per di fuori.

L'offitio della Canna del Polmone.

Queste tele son tanto sottili, che non si possono mostrar nelle figure.

k lib. ij. t. iij. S. t. v. yj. P l lib. vij. ta. j. fi. iij. QQ. S S

m li. ij. t. xvj. fig. xj. xij. xij.

Delle Membra della Vita. 104

in certo modo alla voce, mantenendo humida la lingua, il gargarozzo, & la canna della gola; ho voluto qui trattar di loro. Per la qual cosa in prima è da sapere, che ciò, che noi al tri chiamiamo le Fauci, comunalmēte chiamarono li Latini Fauces, che vuol dir inghiot titori; perche p loro inghiottiamo così l'aere, come il mangiare. Altri le chiamarono Isth mon, che vuol dir Stretto, per esser questa parte la piu stretta del corpo, & quella, per la qual passano piu rami, o instrumenti; perche a lei rispondono li buchi del naso, il garga rozzo, la cāna della gola, la radice della lingua, l'osso hyoide, & molti muscoli, vene, & ar terie, & nerui, che passano per questa parte. In queste fauci sono tre sorti di glandole.

Le Fauci quan ti nomi hanno

a li.ij. t.vj. L
b la med. F

^a Le prime stanno nel fine del gargarozzo da lati della canna del polmone. ^b Le seconde si veggano appresso la bocca tra i buchi, che vanno al naso, & le fauci, da ogni lato vna assai grande, che paiono propriamente ghiande; & sono dell'istessa sustanza, che l' resto, benche alquanto piu spugnose, & seruono a raccogliere la salua, mediante la quale si mol lifica la bocca, la lingua, le fauci, & il gargarozzo. Queste son quelle che i Chirurgici chia mano Tonfille; le quali gonfiandosi causano quel male, che volgarmente chiamiamo gli Strangoglion; & le lor piaghe, principalmente se procedono da mal francese, son tanto difficultose a sanare, che se non le cauterizzano con olio di solfo, o di vitriuolo, mai nō fi niscono di guarire. ^c La terza sorte si vede dietro l'orecchie sotto delle mascelle. Queste chiamiamo communalmente Glandole o gangole; le quali alle volte si gonfiano ne gio uani, & generano il mal delle scrofule; l'altre gonfiandosi fanno le Gangole, che dicono.

Quante sorti vi sono di Glandole.

c li.ij. t.ij. H

Della Campanella o Vgola. Cap. 6.

a li.ij. t.vj. E.
t.vij. A

HA V E A la ^a Campanella o Vgola anticamente molti nomi. Perche alcuni la chia mauano Tintinnabulum, che vuol dir campanella, perche ferēdo in lei l'aere (co me in vna campana) si forma la voce. Altri la chiamano per l'istessa ragione Gargar, Gur gوليو, o Gargareon. Alcu' altri la chiamarono Vuula, per la simiglianza, che ha con ella. Altri la chiamarono Columella, che vuol dir colonna picciola, per esser simile a quella; altri la chiamano per diuerfi altri nomi, secondo le diuerse cose, alle quali simiglia. Noi altri la chiamiamo communalmente la Campanella o vgola; la cui figura, grandezza, & sito non bisogna dire, poi che in qual si voglia si può facilmente vedere, faccendogli aprir ben la bocca. L'offitio suo è far risonar la voce; il che si vede chiaramente in quelli, a chi o manca, o l'hāno troppo grossa, o di souerchio lunga, perche son tanto fiochi, che, quā do parlano, a pena gli vdiamo; aiuta anchora a cio, che nō entri tanto facilmente nel pol mone alcuna poluere coll'aerē, quando rifiatiamo.

I nomi della Campanella.

La figura, & sito. L'offitio.

De Polmoni. Cap. 7.

a fi. j. R STV
fig. ij. NO
PQ

b fig. j. HH

I^a Polmoni si diuidono in due parti. Et stanno situati in quelle due concauità, che hab biam detto farsi nel petto, ogn' uno dal suo lato; & son separati, mediante quel tra mezzo, che habbiam detto fendere il petto per mezzo; & si congiunge l'vno, ^b all'altro per la parte di dietro medianti i due rami, ne quali habbiam detto diuiderfi la canna del polmone, quando entra in loro. Ogn' uno di questi due polmoni stando pieno d'aere, gonfia di tal sorte la sua parte del petto, che non lascia cosa alcuna vota, faccendo la figu ra, che le concauità loro danno, nelle quali sono, & per ciò si fanno gobbi ^c per di fuori, che corrispondono al voto delle coste, & son scarnati per di dentro per rispetto del cuo re, che diremo esser nel mezzo d'amendue. Per la parte di dietro, oue si congiungono, tra l'vno & l'altro si fa ^d vn canale d'alto a basso, alquāto incauato, che fanno e corpi de nodi delle spalle; il qual si storce alquanto verso innanzi, secōdo che la schiena anche si storce. Dalla parte dinanzi stanno ^e alquāto piu appartati, il destro dal sinistro, per esser gli tra mezzi del petto piu separati l'vno dall'altro appresso l'osso del petto, che verio le spalle. Et per questa parte sono assai piu corti i polmoni, secōdo che anche è il petto per lo sito intrauersato, che habbiam detto hauere ^f la diaframa La riga, che diuide questi polmoni per la parte, oue rispōdono alla diaframa, si vede assai piu chiaramente d'alto a basso, che nel mezzo; di modo che la parte di sotto de polmoni è del tutto simile ad vn'unghia di bue;

Il sito de Polmoni.

La figura.

c fig. xij.

d la med. F

e fig. xij.

f li.ij. t.vij. Δ

Libro Quarto

La diuisione .

Ne gli huomini
non si ritroua il
quinto pezzo del
Polmone.

Que, che hanno
i polmoni attac-
cati alle Coste .

La sustanza de
Polmoni.

La Tela .

L'offitio de Pol-
moni .

bue ; & quella di dietro, a quella dinanzi, & quella dinanzi, a quella di dietro, & tutti e polmoni insieme paiono vn'unghia di bue. Hanno di piu questi polmoni nella parte lor di dentro (doue si congiungono a tramezzi) altre impressioni o seni che abbracciano in mezzo le tele del cuore, & il cuore istesso. Questa è l'historia de polmoni considerandogli pieni d'aere dentro del petto ; ma quando stano molli, & senza aere alcuno, è diuiso ogn'un di loro in due parti, vna alta, vn'altra bassa (chiamata da gli antichi Lobus) mediante vna riga torta, che comincia scontro al quarto nodo delle spalle, & cammina verso la forcella dello stomaco, & diuide ogn'un di loro in due parti, delle quali quella di sotto è maggior, che quella di sopra. Questa diuisione non si vede tanto chiaramente ne gli huomini, come ne gli altri animali, per esser attaccati a certi fili neruosi. Come ne anche si veggono l'altre, se accade alcuna volta, che si diuidano in piu lobi. Benche in niuno infino ad hora ho visto quel pezzo di polmone, che ne gli animali bruti fa come vn cofsinetto o guancialetto alla vena grande, chiamato da Galeno il quinto lobo. Tutto il polmone per la parte di fuori è liscio, & come vnto d'un humore lubrico; se ben in alcune persone (nelle quali i polmoni s'attaccano alla tela, che cuopre le coste) intrauiene esser aspro, ne piu ne meno, che le tele, che si attaccano l'vna all'altra. Et in questi tali i polmoni sono alquanto piu neri, & scoloriti; quello che ne gli altri non intrauiene, ne quali i polmoni non sono attaccati alle spalle, se non al principio loro, mediante le tele della canna del polmone, & al cuore, mediante l'arteria venale, & la vena arteriale. Ma gli huomini, che hanno attaccati i polmoni alle coste, anchor che riceuino alcuna pugnata nel petto, non per cio lasciano di rifiatare, perche i polmoni non si possono ristignere, & in questi tali, simili ferite saldano piu presto, benche tocchino i polmoni. La sustanza del polmone nell'huomo è spugnosa & biancheggiante, come in qual si voglia altro animale, & piena di tre sorti di vasi, come al suo luogo diremo. Et per di fuori è rinuolto (ne piu ne meno, che l'fegato) da vna molto sottil tela, che nasce al principio de polmoni delle tele, che (nascendo del tramezzo, o della tela, che cuopre le coste) fasciano tutti i tre vasi detti, che si distribuiscano per li polmoni, & si distende per tutti loro, cosi per la parte di dietro, come per quella dinanzi. Questa tela è sottile & morbida, perche possa meglio raccogliersi. L'offitio principal de polmoni è riceuer l'aere, & disporlo, che di lui si facciano gli spirti della vita (se pur si fanno), & insieme rinfrescare lo soperchio caldo, che è nel cuore, col nuouo aere freddo, che di continuo piglia. Per la qual cosa si muoue non mediante musculo alcuno, o per sua volontà, se non che allargandosi il petto col mezzo de muscoli, che habbiam detto muouerlo, resta alcun luogo vacuo tra le coste & il polmone; la qual cosa non comportando la natura, fa che i polmoni s'alzano, & occupano quel voto; & per conseguente, perche ne polmoni allargandosi loro si fanno alcuni voti, rimediauisi subito con tirar essi l'aere per la canna, ne piu ne meno, che veggiamo ne soffioni o manticetti accendendo il fuoco; perche quando gli apriamo, se è la canna appresso la fiamma, subito vi si caccia dentro, per occupar quel voto.

g fi. xij. EFG
H. fig. xij.
B C D E

Delle Tele del Cuore .

Cap. 8.

La figura, & sito delle Tele del cuore.

I buchi di queste Tele .

Il nascimeto di queste Tele .

LE tele, che fasciano il cuore, stanno come habbiam detto, nel mezzo de tramezzi del petto. Et sono come vna vescica, simile in figura ad vna pigna; & cominciano tra'l quarto & quinto nodo delle spalle, & l'osso del petto, a punto nel mezzo del voto, secondo che per lo cuore fu di mestieri. Questa vescica per lo meno ha cinque buchi; per lo primo entra la vena grande (come diremo); per lo secondo esce; per lo terzo passa la vena, chiamata arteriale; per lo quarto passa l'arteria grãde; per lo quinto passa la vena arteriale, il quale sta in certo modo diuiso per diuidersi questa vena in due, innãzi, che esca di queste tele; il che intrauiene anchora delle volte nell'arteria venale. A tutti questi vasi s'attaccano queste tele molto gagliardamente vn poco piu in su del cuore, pigliando alquãto principio da loro; perche la tela di fuori di questi vasi, di doue cominciano a nascere queste tele, infino al cuore, si separa da loro, & allargandosi si conuertte in questa vescica; la quale non tocca piu la parte piu alta del cuore, che la piu bassa, o che quella de lati, ma l'ha nel mezzo a punto. Il resto di questa vescica non ha buco alcuno, &

a fig. iij.
b fig. j. HH.
fi. ij. L L

c fi. iij. FGH
I. fi. iij. A

d. fi. iij. F.

e. lib. ij. t. vij.
A, k, l, m, n.

& è vguale, & simile da ogni bàda, così in sustanza (perche è tutta come vna tela neruosa) come in esser tutta quata d'un colore, come di carta pecora; benché non in figura, perche (come habbiam detto) si fa alquanto piu stretta di sotto, faccendo fine in^d vna punta piana, & tonda, la qual storce verso il lato manco spingendosi tanto innàzi, che tocca il lato manco dell'osso del petto, & le cartilagini, che s'incassano in esso. Questa tela non ha forte alcuna di fili; anzi è come vna semplice tunica, alquanto grossa, & dura, & tato capace, che facilmente il cuore, che sta dentro di lei, si può strignere, & allargare. Et per la parte di dentro è tutta liscia, & humida, & non ha grasso alcuno, ne di dentro, ne di fuore; perche quello, che si vede, doue si congiunge alle tele del tramezzo del petto, piu è di quelle, che di questa vescica; laqual per la parte di fuori è aspra per esser attaccata a gli tramezzi nella guisa detta nel capitolo del Mediastino. Nondimeno la punta di questa vescica, & vna buona parte della parte sua dinanzi, sono attaccate al lato manco della tela, e che si fa nel mezzo della diaframa per vn buono spatio, & la parte dinanzi è attaccata alla tela, che fascia le coste al lato suo manco, iui, doue le cartilagini della sesta & settima costa si congiungono al petto medianti alcuni fili neruosi. L'offitio di questa vescica o tela è fasciare il cuore, & cōseruare vna acqua, che ordinariamēte in tutti gli huomini si ritroua, anchor che piu ne fanciulli, che ne giouani, & piu nelle dōne; & nel medesimo modo assai piu in que, che son morti d'alcun giorno, che in que, che son morti di nuouo. Questa acqua al mio giuditio serue a raffrenare, o temperare il gran caldo, & siccità del cuore.

L'offitio della
vescica del Cuore.

Del Cuore.

Cap. 9.

a. fig. ij. MM.
fi. iij. C. D.
E, F, G. lib.
vj. t. v. fi. x.
z.

b. fi. iij. LL

c. lib. vi. ta. 7.
fi. x. Y

d. fig. iij. IK.
fi. v. B. fi. vj.
F. fi. vij. viij.
C. fi. ix. x. A

T IENE il Cuore il medesimo a sito, & figura, che la Vescica, nella qual è rinchiuso; la quale habbiam detto esser molto simile ad vna Pigna o Pina, imperò piana di dietro, & dinanzi; & alquanto più larga in punta. Questo cuore per la parte di fuori è liscio tutto, se bene i rami delle^b vene, & arterie, che (come al suo luogo diremo) passano per quello, & alcun grasso, che hà, il fanno parere aspro. La parte sua piu alta è anche alquanto disuguale per cagion delle vene, & arterie, che al suo luogo diremo hauere in questa parte. Questo cuore è appoggiato al corpo del quarto & quinto nodo delle spalle, senza storcere piu a man destra, che a man sinistra, ne piu a dietro, ch'innanzi secondo il lungo. Et il nascimento suo sta a punto situato nel mezzo del petto; intendendo per lo petto non tutto il vacuo, che occupano le coste, ma solamēte la parte sua dinanzi, dal nodo della gola infino alla forcella dello stomaco. Il cō resto suo cammina verso il lato manco, faccendosi, a poco a poco, piu stretto infino al finire in vna pūta soda; la quale appoggiansi vn poco alla parte dinanzi del petto finisce tra le cartilagini della sesta, & settima costa del lato manco. Perche il cuore è maggiore, o minore, secondo che'l petto è piu, o meno largo, & è fatto d'una sustanza di carne, alquanto meno rossa, & piu dura, che quella de muscoli, & interteffuta d'alcuni tanto spessi, & sottili fili, che quasi nō appaiono; il che si fa, perche gli spiriti, che stanno dentro di lui, non potessero così facilmente risoluersi. Tutto il cuore è couerto per la parte di fuori, con vna tela sottile, come quella, che cuopre il fegato; alla quale in questa parte di sopra (chiamo parte di sopra la piu larga parte, dal mezzo della quale è attaccato) è attaccata vna gran quantità di seuo duro, del quale in alcune persone scendono come certi raggi del medesimo seuo, che vanno attaccati alle vene, che diremo distribuirsi p lo cuore. Si veggono di piu nella sua piu alta parte due Ali o fian orecchie, vna al lato manco, vn'altra al diritto; le quali son dell'istessa sustanza del cuore, anchor che alquanto piu neruose, & tenere, & simili a quelle de cuori di qual si voglia altro animale; per la qual cosa non mi è parso di mestieri prender troppo trauaglio in descriuer la figura loro. Basti sapere il sito, & offitio; il quale è, aprendosi, & chiudendosi, come due Ali, dar luogo, che quando il cuore sta come annoiato, & volendo sfogarsi, possa allargandosi pigliar piu spirito & sangue di quello, che hauea; quello che difficilmēte potea fare, non hauendo queste due ali, che come due vescichette s'allargano o stringono, secondo che'l cuore s'allarga o stringe battendo. Et per cio la destra fu fatta piu lenta, che la manca; perche (come subito diremo) nel lato destro del cuore è piu sangue, & nel sinistro piu spiriti, & lo spirito passa piu facilmete, anchor che non s'allarghi l'Ala manca, al lato manco, che'l sangue, che è piu grosso, & non corre tanto, al diritto. Questa è l'istoria del cuore per la parte di fuori. Per la parte di dentro sono

Il sito del Cuore, & la figura.

La Tunica del cuore.

Nel cuore è del grasso.

L'ali del cuore.

L'offitio di queste Ali.

Libro Quarto

I ventricoli del Cuore.

sono in lui due ventricoli, ^e vno dextro, ^f vn'altro sinistro, diuisi mediante vn grosso tramezzo della medesima sustanza del cuore, & differenti cosi in grãdezza, come in figura. Perche il diritto è assai maggiore; & scende piu verso la punta del cuore, faccendo vna concauità simile ad vna Luna nuoua; perche dal lato dextro, & dinanzi, & di dietro, è incauato, & risponde al gobbo, che per la parte di fuori fa il cuore; dal lato manco sta inarcato per ragion del tramezzo, che si fa tra questo ventricolo, & il manco, il qual per la parte, che risponde a questo ventricolo diritto, è rileuato in arco; & questa figura medesima tiene tutto il ventricolo, d'alto a basso. Il sinistro è parimente largo di sopra, & si va ristriugnendo verso la punta del cuore, faccendo vna figura di piramide, o d'vna V grande; perche il tramezzo per la parte, che risponde a questo ventricolo, non è gobbo, come per quella, che risponde al diritto, anzi è incauato o gombo. Questo ventricolo sinistro stà quasi nel mezzo del cuore, secondo la grossezza sua; anzi par verissimamente che per lui solo sia fatto il cuore, & che il dextro ^h sia come vn borsetto attaccato per di fuori, come veggiamo essere in molte borse. Perche cosi il tramezzo, come il resto della sustanza del cuore, che fa il manco, è dura, grossa, & massiccia, come habbiamo detto essere il cuore, eccetto al principio, doue per rispetto de vasi, che iui nascono, fu forzato a non esser tanto duro; & quella, che fa il dextro, è piu tenera, & sottile. Ma il tramezzo ⁱ d'amendue i ventricoli è alquanto disuguale, per ragione d'alcuni riuoli o solchi, che si fanno nella sustanza del cuore, e quali sono assai piu manifesti nel manco, che nel dextro; ma niuno passa da l'vn ventricolo all'altro, come dicono, quanti che infino ad hora ne hanno scritto. Si veggono anche in questi ventricoli certi ^k fili neruosi, ton di, & sottili, medianti e quali diremo attaccarsi al cuore le tele, che diremo esser in loro. L'offitio di questi ventricoli è, del diritto disporre il sangue, che di quello si possano ingenerare gli spiriti della vita (come fa lo stomaco il mangiare); del sinistro è riceuer questo sangue gia disposto, & conuertir vna sua parte negli spiriti, che danno la vita, & mandare il resto per l'arterie insieme con questi spiriti, come al suo luogo diremo. Per la qual cosa furono fatte in ogn'uno di questi due ventricoli, due bocche, o pertugi. Il primo di loro, che si vede nel ventricolo diritto, è attaccato al lato diritto della parte piu alta del cuore, nella parte sua piu bassa, appresso la ^m orecchia destra; al qual risponde (come a suo tempo diremo) la maggior ⁿ vena del corpo, attaccandosi parte alla sustanza del cuore, parte alla detta orecchia; la qual cosa fa parere il buco assai maggiore di quello, che è. Il ^o secondo buco è assai minor del primo, & si vede nella parte piu alta del lato piu largo di questo ventricolo al lato dextro del tramezzo detto, attaccato al tronco ^p dell'arteria grande; & di quello nasce vna ^q vena chiamata Arteriale, che si distribuisce per gli polmoni (come al suo luogo diremo); per la qual esce il sangue, che entrò pel primo buco, come nel sesto libro piu lungamente si vedrà. Nel ventricolo manco sono nel medesimo modo altri due buchi; vno, per doue entrano il sangue & gli spiriti; vn'altro, per doue escono. ^r Il primo di loro (che è per doue entrano) è molto grande, & tondo; & si vede nella parte piu bassa del lato piu largo del ventricolo manco, appresso l'orecchia manca, & subito nel nascere si diuide in ^s due; la qual cosa ha fatto pensare ad alcuni che anche dentro del cuore durasse questa diuisione. Di questo buco nasce ^t vna arteria chiamata Venale, che si distribuisce anchora (come a suo luogo diremo) per la sustanza de polmoni. ^u L'altro buco (che è maggior di tutti, eccetto il primo) si vede nel mezzo della parte piu alta del cuore, appoggiato al buco della vena chiamata Arteriale, & per lui esce il tronco dell'arteria ^x maggiore, che si distribuisce per tutto il corpo, diuidendosi subito in ^y due rami; per la qual si distribuiscono (come diremo) gli spiriti della vita, & il sangue, che entrarono per quella, che habbiamo detto chiamarsi ^z l'Arteria Venale. Di questi buchi detti i tre primi hanno alla bocca per la parte di dentro, ognuno tre telucchie, & l'ultimo ne ha sol due. Primieramente alla bocca del ^a primo buco, a cui si congiunge la vena grande, è vna tela sottile, che abbraccia il buco tutt'intorno; laqual camminando alquanto verso la concauità del ventricolo, si diuide subito in ^b tre tele, ognuna delle quali finisce, come in vna punta di triangolo, vn poco piu in sù della metà del lungo del ventricolo; & d'ognuna di queste punte nascono alcuni fili ^c neruosi, che si vanno ad inserire ne lati del ventricolo verso il suo

^e fig. vij. viij.
^f fi. ix. x.

^g fi. xj. H H
^h la med.
G, G

ⁱ fig. vij. H
fi. ix. E

^k la me. H F.

^l fi. v. B C. fi.
vij. appressato la C
^m lib. vj. ta. v.
fi. x. a
ⁿ la mede. b.
fi. v. B C. li.
vj. t. ij. E
^o fig. vii. D.
tra la G. e
la H

^p fig. vii. viii.
ix. x. B
^q la med. A
^r la med. tra
le due G G
^s fig. vi. K L
^t la med. I
^u fig. ix. x. B.
B. & rispon
de a la D
^x lib. vi. ta. v.
fi. x. f. t. iij.
A
^y lib. vi. t. iij.
C

^z lib. vi. t. iij.
fig. iij.

^a fig. iij. B

^b fi. vij. E F G

^c fi. vij. H H

L'offitio de ventricoli del Cuore.

Il primo buco del ventricolo diritto.

Il secondo.

I buchi del sinistro.

Le tele de buchi, che sono nel cuore.

Quelle del primo del ventricolo dextro.

il suo fine; & ne le tele, ne i fili s'attaccano alla sostanza del cuore eccetto al nascere, & all'inferirsi. Questi fili fecero pensare alcuni il cuore essere principio de' nerui. Questa tela fatta in questo modo contano gli Anatomisti per tre, per ragion delle diuisioni, che sono in quella. Et suo officio è (come manifestamente mostra il suo sito & nascimento) chiuder questo primo buco, perche il sangue, che entra per la vena grande nel ventricolo dritto, non possa riuscire. La qual cosa fanno elleno, quando il cuore si ritira; perche, quando s'allarga, all'hora consentendo loro danno luogo, che'l sangue possa entrare dalla vena grande in questo ventricolo. Quasi nel medesimo modo, che è posta questa tela al principio di questo buco, ne sta vn'altra al principio del primo buco del ventricolo manco, del quale habbiamo detto nascere^d l'arteria venale, eccetto che non si diuide in tre parti, come quella, ma solo in ^e due, tanto simili in figura a quelle del primo, quanto dissimili in grandezza, & fortezza; perche sono molto larghe di sopra, & finiscono in vna punta soda, che scende alquanto piu, che le punte delle tele del ventricolo destro. Di queste due parti l'vna occupa il lato manco, l'altra il destro di questo ventricolo (perche per la parte di nanzi, & per quella di dietro non vi è tela alcuna,) di modo ch'amen due insieme fanno naturalmente vna mitra da Vesouo. Ha ognun di questi due processi certi fili^f neruosi, che nascendo di loro vanno ad inferirsi al fine del ventricolo nella sostanza del cuore; nella qual si veggono alcuni ^g solchi, alquanto maggiori, che quelli, che habbiamo detto farsi nel manco. Questa tela partirono gli Antiqui in due, per le due punte, che fa. Et e l'offitio suo quasi il medesimo, che quel di quella, che e al primo buco del lato destro; perche, si come allargandosi quella, & consentendo, s'attaccaua al cuore, & daua luogo, che'l sangue entrasse nel ventricolo dritto dalla vena grande; & ristagnendosi, o ritirandosi facea, che'l sangue non potesse ritornare alla vena grande; cosi ne piu ne meno aprendosi questa in verso dentro, da luogo, che'l sangue, & gli spiriti possano entrare dalla arteria chiamata Venale al ventricolo manco. La ^h tela, che sta al secondo buco del lato dritto, al qual s'attacca la vena arteriale, e differente dalle sopra dette, cosi in figura & sito, come in fortezza; perche, si come hanno l'altre i processi verso la punta del ventricolo, cosi questa gli ha verso il tronco della vena chiamata arteriale, che nasce di questo buco. Et non e fatta d'vna semplice tela; anzi e diuisa in ⁱ tre molto distinte, ogn'vna delle quali comincia, come in vn mezzo cerchio, dal tronco della vena arteriale, rileuandosi alquanto al principio; & di poi facendosi alquanto piu grossa, s'allarga la fuori del cuore; & facendosi piu grossa, fa alcuni tubercolotti, che si stampano nella parte piu alta del cuore; & con questi tubercoli fanno, come tre processi, o punte, che toccandosi l'vna l'altra (come in vn punto) fanno di sotto, & di sopra alcuni cantoncelli. Di questi tubercoli nascono tre ^k tele, ogn'vna, come in vna mezza Luna, senza attaccarsi alla parte piu alta del cuore, o in altra parte alcuna. La parte piu larga di queste tele (che si separa piu dal cuore, che niun'altra parte loro; & e quel lor lato, che non si attacca alla parte piu alta del cuore) non si vede tanto dirittamente, come farebbe, se ogni tela facesse perfettamente vn mezzo cerchio; anzi si mette vn poco verso dentro, senza uscire tanto in fuori, quanto i capi suoi, che si congiungono dall'vna parte, & dall'altra, alla parte alta del cuore. Et per esser questa parte piu alta, & piu larga di queste tele della figura detta, & il nascimento loro iui, doue si congiungono, far come vn mezzo cerchio, furono queste tele chiamate da Greci Sygmoides, che vuol dire simile alla lettera chiamata Sygma C. L'offitio di queste tele è, aprendosi lasciar uscire il sangue, che uscendo della maggior vena del corpo, entrò per lo primo buco di questo ventricolo; & chiudendosi sturbare, che non esca, fin che'l cuore l'habbia disposto, che di lui piu facilmente si facciano gli spiriti della vita. A queste tre tele ne rispondono altre tre, che sono poste alla bocca del secondo buco del lato manco, al qual diremo esser attaccata l'arteria grande; le quali sono del tutto simili a quelle, che habbiamo detto, eccetto che sono molto maggiori, & piu forti, come è anche maggiore l'arteria grande, che la vena arteriale. Come questo sangue passe dal ventricolo destro al manco, & per quali vie, lo lascerò di dire infino al suo luogo, che sarà, quando tratterò de' condotti, che nascono del cuore. Et con questo daremo fine a questo libro; & cominceremo a trattare del terzo membro principale del nostro corpo.

Quelle del primo del ventricolo manco

Quelle del secondo buco del ventricolo dritto.

L'offitio delle tele, che sono abuchi, che si fanno nel Cuore.

Dichiar. delle Fig. del Lib. IIII.



Dichiaratione delle Lettere delle Figure del quarto libro; & prima della prima. La quale mostra il petto aperto dal lato manco, tra le coste, & le cartilagini del medesimo lato; & ha rotte le coste in fuori, & ripiegate verso il lato diritto le cartilagini sue, perche meglio si possa vedere il tramezzo del petto.

- AA** Le cartilagini del lato manco, ripiegate verso il diritto.
- BB** I muscoli, che stanno tra le cartilagini.
- CC** Le coste del lato manco.
- DD** I muscoli, che stanno tra le coste.
- E** La clauicola, che anche ritiene il suo sito.
- F** Le vene, & arterie, che vanno al braccio.
- G** La vena giugulare esteriore.
- HH** La tela sinistra, che diuide il petto; la qual si vede dal lato manco.
- II** Il lato sinistro di dentro della diaframa.
- K** Il luogo, doue la tela sinistra, che tramezza il petto, si congiunge alla diaframa.
- L** Questa parte è così rileuata per cagion del cuore, che si mostra di sotto; il quale sta tra le due tele, che fanno il tramezzo del petto, & cammina con la punta verso il lato manco.
- M** La vena, che va per sotto l'osso del petto.
- N** L'arteria dell'istesso lato.
- OO** Alcuni ramuscelli di questa vena, & arteria.
- PP** Il nerno del lato destro della diaframa, il qual nel scendere, s'attacca alla tela del medesimo lato del tramezzo.
- Q** Vna vena, che scende insieme con questo nerno, & nel cammino manda alcuni rami alle tele del tramezzo.
- RS** **TV**. Il polmone dalla parte sinistra; il cui lato di fuori mostrano la R & la S; quel di dentro mostrano la T & la V; mostrano anche particolarmente la R & la T, la parte piu alta; la S & la V, la piu bassa.

Figura. II.

In questa seconda Figura si vede tagliato l'osso del petto, insieme con le cartilagini, & riuolto in su, perche si possa vedere per la parte di dentro; & le coste son rotte in fuori, perche si possa meglio vedere il petto.

- AA** La parte di dentro dell'osso del petto, & del le cartilagini, che gli sono attaccate.
- BC** Le due vene, che scendono per sotto l'osso del petto, & vanno al ventre.
- DE** Due arterie, che accompagnano le sopradette vene.
- F** Alcune glandole, che stanno appresso il nodo della gola.
- GG** Parte della tela diritta di quelle, che diuidono il petto; la quale è attaccata al lato diritto dell'osso del petto.
- H** La parte di questa tela, che risponde al polmone.
- II** La parte della tela sinistra del tramezzo, la quale in prima staua attaccata al lato manco dell'osso del petto.
- K** La parte di questa tela, che risponde al polmone.
- LL** Lo spatio tra le due tele del tramezzo dell'osso del petto.
- MM** In questo sospeso sta il cuore fra le due tele del tramezzo.
- NO** **PQ**. La parte del polmone verso le coste; & la N & la O mostrano le due parti del lato diritto; la P & la Q quelle del manco.
- R** La parte della diaframa, che è distaccata dalla punta dell'osso del petto, & dalle coste mendose.
- S** La forcella dello stomaco.
- TV** La pelle, che cuopre il petto, volta all'ingiu.

Figura. III.

In questa terza Figura si vede il cuore coperto con le sue tele; & la parte del polmone, al quale quelle sono attaccate. Et l'habbiamo dipinta da per se senza corpo per non occupar tanto luogo; & anche perche nella Tauola delle vene & arterie si mostra piu chiaramente.

- A** In questa parte si vede tagliato il tronco della vena grande, & quel dell'arteria maggiore, che montauano in su, lasciando solo, quanto le tele del cuore cuoprono, o, per dir meglio, donde nascono; che è dalla B alla C.
- BC**
- D** La parte di nanzi della tela del cuore, la qual rappresenta la figura d'vna pina; la cui parte piu larga mostra la D & la E; & la sua punta la F.
- EF**
- G** Dalla F alla G, si nota la pte della tele, che è attaccata

attaccata alla diaframa; & le vene, che qui si veggono, si distribuiscono per le tele del cuore.

- H Vna parte della diaframa.
 II I nervi della diaframa.
 LMN I polmoni; & ogni lettera nota vna parte, o lobo.

Figura IIII.

Questa Figura mostra il Cuore scoperto; ma per ciò senza esser stato mosso dal suo luogo.

- A Il luogo, doue nasce la vescica, o tela del cuore.
 BB La vescica del cuore aperta, & ripiegata in fuori.
 CDE La parte di nanzi del cuore; la C & la D mostrano la parte sua piu larga; & la E la punta.
 F La vena grande.
 G La vena arteriale.
 H L'arteria grande.
 I L'ala diritta del cuore.
 K La sinistra.
 LL Le vene, & arterie, che nascono di quelle, che cingono il largo del cuore, & camminan dalla parte di dietro, & dal lato suo manco verso nanzi.
 MNO I polmoni, & le lor parti in particolare.
 P Vna parte della diaframa.

Figura V.

Questa Figura mostra i Polmoni, & il cuore tolte via le tele sue; & il cuore è riuolto verso il lato manco, perche si possa vedere, doue si congiunge colla vena grande.

- A il lato destro del cuore, & vna buona parte sua di dietro.
 B L'ala diritta del cuore.
 C La vena grande doue si congiunge col cuore.
 D La parte della vena grande, che passa per la diaframa.
 E Parte della diaframa.
 F Vna parte della vena grande, che va alla strozza.
 G il principio della vena sola.
 H il tronco dell'arteria grande, che scende.
 K Vna parte del neruo manco del sesto paio di nervi, dal quale (come si vedrà nella figura seguente) nasce la tela, che cuopre il cuore.
 LM NO. I lobi, o parti del polmone.
 P il modo, nel quale i vasi si distribuiscono per lo polmone.

Figura VI.

In questa Figura si mostra il cuore riuolto verso il lato destro; perche si possa vedere il nascimento dell'arteria venale, & l'ala manca del cuore, & il neruo del cuore. Per intendimento del che lasciammo in questa figura alcuni rami dell'arteria grande, & parte della canna del polmone, & de nervi del sesto par della testa.

- ABC Il lato manco del cuore.
 D La vena, & arteria, che abbracciano il largo del cuore.
 E I ramuscelli della vena, & arteria detta, che scendono verso la punta del cuore.
 F L'ala sinistra del cuore.
 G L'arteria venale.
 HH I rami di questa arteria, che si distribuiscono per lo polmone del lato manco.
 I il principio della vena arteriale.
 K La parte di questa vena arteriale, che va al polmone manco.
 L La parte dell'istessa, che va al diritto.
 M La parte dell'ala diritta del cuore.
 NN La vena grande.
 O La midolla dell'arteria grande.
 P La parte di questa arteria, che cala per la schiena.
 Q il ramo dell'arteria grande, che va al braccio manco.
 R La parte dell'arteria grande, che va alla strozza.
 S il ramo diritto della parte, che va alla strozza, del qual nasce l'arteria, che va al braccio destro, che è notata con la T.
 T L'arterie del sonno.
 VX il tronco della canna del polmone.
 Y il neruo diritto del sesto paio de nervi della testa.
 a Alcuni ramuscelli, che nascono del sopra detto, & fanno i nervi della voce.
 c il neruo recorrente, o reuersiuo diritto.
 d il neruo manco del sesto paio de nervi della testa.
 e Vno ramuscello, che va al polmone dal suo lato.
 f Altri ramuscelli del medesimo, che fanno il neruo recorrente del lato manco.
 gg il neruo recorrente manco.
 h Vn picciol neruo, che ua a canto della uena arteriale, al mezzo della parte piu alta del cuore.
 iklm I lobi, o parti del polmone.
 no La diaframa.

Dichiar. delle Fig. del Lib. IIII.

Figura VII.

IN questa Figura si mostra il cuore libero dal polmone, & dalla diaframa; & ha aperto il ventricolo diritto dalla bocca della vena grande infino alla sua punta, perche si possano veder le tele, che stanno alla sua bocca. Et è da notare, che in questa Figura, & nelle tre, che seguono, non mi son seruito di quelle del Vesalio, perche non mi pare, che rappresentino bene, quello che vogliono dimostrare.

- A* La vena arteriale.
- B* L'arteria venale.
- CC* L'orecchia diritta del cuore, la quale, per esser il cuore aperto, sta dal lato manco.
- D* A questo luogo risponde la vena arteriale.
- EEFG* Le tre tele, che stanno al principio del primo buco.
- HH* I fili di queste tele, che scendono verso la punta del cuore.
- I* Il tramezzo del cuore.

Figura VIII.

IN questa Figura si mostra il medesimo, che nella passata, eccetto che in questa è diuisa la vena arteriale, perche si vegga meglio.

- A* La bocca della vena arteriale diuisa, & aperta.
- B* L'arteria venale.
- C* L'orecchia diritta.
- D* Doue risponde il buco della vena arteriale.
- EE* Le tele, che sono al principio di questo buco.
- HH* Le tele, che nascono delle sopra dette.

Figura IX.

Questa Figura mostra il cuore, & aperto il ventricolo manco.

- A* L'orecchia manca.
- B* L'arteria grande.
- CC* Le due tele, che sono alla bocca dell'arteria venale.
- D* Sotto di questa lettera risponde il buco dell'arteria grande.
- E* Fibre, o solchi, che si veggono per la sostanza del cuore, & il tramezzo de ventricoli.
- FF* Il principio delle tele, che notano le due CC.
- GG* La bocca dell'arteria venale.

Figura X.

IN questa Figura si mostra il medesimo, che nella passata, eccetto che habbiamo fesso dalla D alla B, per di-

mostrar le tele della bocca dell'arteria grande.

- A* L'orecchia manca.
- B* L'arteria grande.
- CC* Le tele, che sono al principio di questa arteria.
- D* Qui risponde il buco dell'arteria grande.
- E* Il tramezzo de ventricoli.

Figura XI.

Questa Figura dimostra il cuore tagliato in trauerfo.

- A* Parte della vena grande.
- B* L'orecchia diritta del cuore.
- D* L'arteria grande.
- E* La vena arteriale.
- L'orecchia manca, alla quale è attaccata vna parte dell'arteria venale; & tutte queste lettere insieme notano la parte più alta del cuore.
- FF* La punta del cuore.
- GG* Il ventricolo diritto del cuore.
- HH* Il manco.
- II* Il tramezzo tra i ventricoli.

Figura XII.

IN questa Figura si mostrano i polmoni per la parte di nāzi, tolto via il cuore; e quali rappresentano quasi vna vna di buco.

- AA* La canna della gola.
- B* La canna del polmone.
- C* La vena arteriale.
- D* L'arteria venale.
- EE* GH. Quattro parti, nelle quali si diuidono e polmoni; & particolarmente la G & la H mostrano la parte loro, che risponde alla diaframa.
- I* La diaframa.


Figura XIII.

IN questa Figura si mostrano e polmoni per la parte di dietro, che risponde alle coste.

- A* Vna parte della canna del polmone.
- BC* DE. Le quattro parti, nelle quali si diuide il polmone.
- FF* Il canale, che si fa tra'l polmone destro, & sinistro.

Fine del quarto libro.





a lib.
f. j.
im.
b. lam.
j. D.
c. lib.
fig.
d. fig.
B

e. lib.
M

LIBRO QVINTO

dell'Historia dell'Anatomia del
corpohumano.

COMPOSTA PER GIOVANNI

VALVERDE MEDICO,

NEL QUALE SI TRATTA

delle Membra necessarie al Mouimento,

& Sentire.

Delle Tele, che fasciano queste Membra.

Cap. I.



ABBIAMO trattat ne due passati libri delle membra, che ser-
uono al nutrimento, & vita dell'huomo. Ma perche con questi
due principij (non potendosi muouere a parte alcuna, ne ve-
der le diuerse cose, che in questo mondo sono create; senza no-
titia delle quali gli farebbe stato impossibile poter venire in co-
noscimento del Creator loro, solo fine di tutti gli huomini)
restaua imperfetta la fabbrica, non volle il Fattor nostro esser
meno, berale in questo con gli huomini, che in tutto il resto.

Quello, che si è
trattato ne due
passati libri.

Anz'etred in loro vn terzo principio; nel quale, come in vna
fornace, si formano gli spiriti; medianti e quali vedemo, vdimmo, gustiamo, tocchiamo,
& ci mouemo; chiamati per tal ragione da Latini Animali; e quali s'ingenerano degli
spiriti della vita, che habbiam detto farsi nel cuore. Questo terzo principio chiamiamo
noi le Ceruella; delle quali il seggio è nella piu alta parte del corpo; non perche per lo-
ro tal seggio fusse piu sicuro o migliore, ma perche stessero appresso gli occhi, i quali
non poteano per niua via stare in altra parte, hauendo da essere (come sono) la senti-
nella della fortezza del nostro corpo. Imperò soppli molto bene il Fattor nostro al di-
fetto, che era nel sto, coprendole di capelli, et pelle, & d'vn molto duro, & gagliardo Cra-
neo, il quale, come vna celata o elmo, guarda, che si facilmente non sian ferite, & di poi di
due tele, vna piu grossa, chiamata Dura madre, vn'altra piu sottile, chiamata la Pia madre,
le quali fasci- no le ceruella, & e processi loro, & tutti e nerui, ne piu ne meno, che fasci il
peritoneo le membra della digestion; & la tela, che cuopre le coste, fasci le membra, che
stano dentro del petto. Et perche ho detto, & e processi, è da sapere, che le ceruella han-

Perche le Cer-
uella stano nella
testa.

I processi delle
Ceruella.

La prima tela
delle Ceruella.

a lib.vii. ta.j.
fi.j.ij. E.fi.
iii.

b'la med. fig.
j. D

c lib.j. t.iii.
fig.vj. z

d fig.j. AAA
B

e li.j.t.v. fi.j.
M

no vn^a processo come coda, (che communalmente chiamiamo la midolla spinale) la qual
nasce alla parte piu bassa di dietro delle ceruella; & vscendo per lo buco maggiore,
che si fa nell'osso della collottola, scende per la schiena infino al fine dell'osso grande, fac-
cendo i sempre alquanto piu sottile. ^d La dura madre è vna parte spermatica del nostro
corpo, ne piu ne meno, che la pia, ingenerata insieme coll'altre parti del nostro corpo, &
cuopre le ceruella, & è continuata da ogni parte, fuor che alcuni buchi, che si fanno in lei,
come vene. Et la figura, & grandezza sua è vguale alla cōcavità dell'ossa, nelle quali si cō-
tergono le ceruella, & la midolla spinale, & è simigliante a lei in figura, perche sempre
sta attaccata all'osso (eccetto sopra il leggio dell'osso cuneale); benchè piu strettamen-
te in alcune parti, che in alcun'altra. Et così per questo, come per e fili, medianti e quali
s'attacca questa tunica al craneo, è per la parte di fuori molto aspra, & disuguale, secodo
che sono anchora l'ossa, & principalmente appresso a buchi, & processi dell'ossa, dalle qua-
li pare, che in certo modo nasca, & molto piu appresso le commessure, alle quali è attac-
cata, mediante vna molto sottil tela, che nasce del pelicraneo, & entrando per le cōmes-
sure, s'inserisce in questa tela. Fannosi anche molt'altre disugualità nella dura madre, le

T 3

quali

Libro Quinto delle Membra

quali non mi auerò hora di cõtare, perche da quelle, che si fanno nell'ossa, si possono facilmente comprendere. Mettesi oltre di cio questa dura madre tra le ceruella, & il celabro, & cuopre tutta la parte di sopra del celabro diuidendola dalle ceruella. Nasce anche di mezzo della dura madre (secondo tutto il lungo della testa) dalla fronte alla collottola, vn processo, che scendendo all'ingiu, entra tra la parte manca, & la diritta delle ceruella,

*La figura del
tramezzo tra
la parte sinistra
delle ceruella, et
la destra.*

*I seni di questo
Tramezzo.*

*La parte di den
tro.*

*I buchi, & pro-
cessi della dura
madre.*

La Pia madre.

faccendo la 8 figura d'vna falce; la punta della quale è appresso il processo dell'ottauo osso della testa, che diuide i seggi dell'odorare, il fine appresso il celabro, il taglio appresso il corpo calloso, la schiena a canto del craneo. Questi processi son'amendue della medesima grossezza, che'l resto della dura madre, eccetto iui, doue ella cuopre il celabro; nella qual parte è tre volte piu grossa, che in alcun'altra. Fannosi di piu in questa tunica tre seni (come piu lungamente nel sesto libro diremo); vno, che piglia dalla commessura coronale fino a quella della collottola; & due, che nascono del fin di questa, & camminano, ogn'uno dal suo lato, tra le ceruella, & il celabro. Il primo di questi seni fa piu grosso il processo simile alla falce, alla quale è attaccato; & anchor che apre questo seni, paia la dura madre in questa parte doppia, subito si vede esser semplice. La parte di dietro di questa tela è molto liscia, & lucida, senza grasso alcuno, & bagnata di vn humor acquoso; & è attaccata alla pia madre, mediante certi ramuscelli di vene, & arterie, che si comunicano da l'vna all'altra; il che fa tanto lentamente, che non impedisce, che le ceruella non possano battere, come fanno. Anzi, come la vescica del cuore fu fatta alquanto larga, perche il cuore potesse distendersi a suo piacere, cosi fu fatta questa dura madre alquanto piu larga, che le ceruella, perche si potesse distendere, & raccogliere; come facilmente si vede in coloro, ne quali per alcuna ferita, il craneo si rompe. Restarebbe hora a contare de buchi, o condotti, che si fanno in questa dura madre; ma perche farebbe vn raccõtare quel, che habbiamo detto nel primo libro, bñ si sapere che questa tela esce per tutti e buchi, di donde escono i nerui, fasciandogli tutti, & è bucata in tutte le parti, oue entra alcuna vena, & arteria; & che fascia la midolla spinale, & tutti e nerui, che nascono di quella. L'offitio della dura madre è riceuer le vene, & arterie, che nutriscono le ceruella. Di sotto a questa dura madre segue subito la Pia madre, che è vna tela assai piu sottile, & morbida, che non ella; & uguale da ogni parte, & continuata; la quale è attaccata alle ceruella, & le cuopre per di fuori, attaccandosi a loro; & entrando tra le pieghe, che quelle fanno, non lascia parte alcuna, che non si cuopra, eccetto il corpo calloso, il quale o la non cuopre, o tanto gli è attaccata, che la non si conosce. Questa tela per la parte di fuori è molto liscia, & coperta d'vn humor acquoso; per quella di dentro è alquanto aspra, & per essa si spargono molti ramuscelli di vene, & arterie, che vanno a nutrir le ceruella.

f. vij. ooo

g fig. iij.
DDD
h la mede. N
i la med. L L
k fig. j. C C.
fi. ij. AA. fi.
iij. E E.
l fig. viij. VV
m la me. R R
n fig. ij. tra le
due A A
o fig. vij. PP
Q Q
p fig. ij. HH
q la med. FF

r cap. viij.

f fig. ij. E E

t la mede.
CCDD

Delle Ceruella, & Celabro.

Cap. 2.

*Divisione della
Ceruella.*

*Il sito, & figura,
delle Ceruel-
la, & in prima
del Celabro.*

*La figura del
Celabro.*

DIUIDONO gli Anatomisti le Ceruella in due parti; vna dinanzi (che chiamiamo communalmente le ceruella) vn'altra di dietro, che chiamano il celabro. Et la parte dinanzi diuidono anche in c diritta, & d manca. Ma tutte queste parti son continue per la parte di sotto, appresso il fondamento del capo (fondamento chiamato il fondo del craneo, sopra il quale si posano le ceruella); cioè, la parte sinistra si continua alla destra, mediante vn corpo come callo, che nasce del lato piu basso dell'vna, & s'attacca col piu basso dell'altra; & mediante vn altro corpo, che diremo esser sotto di questo che fa come vna volta; & mediante il tramezzo, che si fa sopra il terzo ventricolo. Et vltimamente si congiungono mediante la medesima sostanza delle ceruella, principalmete iui, doue nasce la nuca; nella qual parte anche lor si congiunge il cerebro in due parti. Tutte le ceruella, insieme col celabro empiono tutto'l voto del craneo; al quale rispondono non meno in grandezza, che in figura; se ben il celabro è dieci volte minore, che le ceruella, & occupa la parte di dietro, & la piu bassa del capo, che chiamiamo la collottola, empiedo que dua fossi, o seni, che habbiamo detto farsi nella parte piu bassa di questo osso, & certi fossi, che si fanno nell'ossa delle tempie, appresso i processi, come mammelle, senza montar piu in su di quanto montano i detti seni (che è alla metà dell'osso della collottola) ne passar piu innanzi, che la parte dell'ossa delle tempie, nella qual sta l'orecchio. Et per ciò il celabro è piu largo, che lungo, o grosso; & per la parte di sopra è alquanto

a fig. ij. iij.
b fig. vij. ooo
fi. viij. RR
c fig. j. B B
d la me. A A

e fi. iij. L L

f fig. v. xx

g fig. xij. L N
h lib. j. t. iij.
fig. j. k

i fi. ix. C. fig.
xj. CD
k fi. ix. Q
l fig. x. KI

m lib. j. ta. v.
fi. j. H

n fig. ij.

quanto piano; per quella di sotto tondo, come vna larga palla, & nel mezzo, d'alto a basso, ha vna picciola ⁱ impressione, che fa quella ^k costicciuola, che habbiam detto hauere l'osso della collottola per la parte di dentro, alla qual la dura madre s'attacca assai gagliardamente; & per la parte dinanzi, che risponde ^l alla parte delle ceruella, che diremo esser simile alle natiche, è alquanto acuto. Tutto'l resto del voto della testa occupano le ceruella, al quale rispondono in figura, così di sotto, & di sopra, come da lati, & dinanzi; anchor che quel di dietro, che si congiunge al celabro, più risponda a lui in figura, che al craneo. Et per ciò per la parte di sopra, & da lati, & dinanzi son tonde; per quella di sotto alquanto piane, & disuguali, secondo che è il fondamento del craneo, per ragion de seni, che si fanno nelle due maggior ^m ali dell'osso cuneale, & que, che si fanno nell'osso della fronte. In conclusione rappresenta scolpita la figura dell'ossa del capo, per la parte più bassa, delle ceruella. Queste ceruella (come habbiam detto) si diuidono mediante vna tela, che si mette fra la parte manca, & la destra, cominciando dal processo dell'ottauo osso del capo, & camminando per mezzo del capo infino all'osso della collottola. Ma così l'vna parte, come l'altra, ha per la parte di fuori certe molto cupe impressioni, le quali faccèdo alcuni intorti giri, son cagione, che le ceruella rappresentino la figura ⁿ de gli intestini. Queste impressioni credo che furon fatte ad effetto, che meglio si potessero nutrire le ceruella; per questa medesima ragione penso esser stata fatta quella luga impressione, che le diuide pel mezzo, senza la quale non potrebbe vna sì gran massa esser nutrita. Et per ciò nel celabro, che è assai minore, le impressioni son meno profonde, & fanno manco giri; anzi così la parte destra, come la sinistra, hanno queste impressioni diritte secondo il largo del celabro; le quali caminando all'ingiu finiscono come in vn punto appresso la nuca, quelle della parte destra nel lato destro, quelle della sinistra nel sinistro. La sustanza delle ceruella, & celabro è morbida, & tenera; il che in qual si voglia animale si può così considerare, come nell'huomo. Questa sustanza, se ben alcuni dicono esser la midolla dell'osso del capo, nò dimeno è differente dalla midolla dell'altre ossa; perche non si distrugge al fuoco, ne si còsuma, anchor che l'huomo patisca gran fame, come fanno l'altre midolle. Queste ceruella non son tutte d'vn colore, perche la parte loro, che è appresso l'impressioni dette, così la parte lor più bassa, come la più alta, & assai più per la parte di fuori, che è coperta (come diremo) dalla pia madre, sono alquanto più oscure, & quasi di color di cenere; in modo, che e par che questo colore facci anche nelle ceruella certe sorti di giri, simili a quei, che l'impressioni faceano. Il resto delle ceruella è bianchissimo; ne si vede passar per loro vena alcuna manifesta, se ben ordinariamente, non meno negli huomini sani, che ne gli farnetichi, si veggono alcune punte di sangue; il che esser non potrebbe, se per loro non si distribuisse vena alcuna.

La figura delle
Ceruella.

A che seruino
l'impressioni del
le Ceruella.

La sustanza del
le Ceruella.

Il co'or delle cer
uella.

Le vene delle
Ceruella.

*Del Corpo chiamato Calloso, & del Tramezzo
de ventricoli. Cap. 3.*

a fig. iij. LL

b la me. MM

c fig. v. RRR
d la med. YY

CIA habbiamo detto, come le Ceruella si diuideano in parte destra, & parte sinistra, & che si congiungeano col mezzo d'vn corpo duro, & bianco, come callo. ^a Questo Corpo è situato nel mezzo delle ceruella (se ben la parte sua vltima è alquanto più vicina alla parte di dietro delle ceruella, che quella dinanzi a quella dinanzi); & è quel corpo bianco, & stretto, che si vede separando vn poco colle mani la parte destra dalla sinistra; il quale è vn poco più rileuato nel mezzo, che di dietro o dinanzi, quasi come fa la coronella più, che la fronte, o la collottola. Questo corpo non nasce della parte di fuori delle ceruella, nella qual sono l'impressioni dette, ma della parte di dentro, che è più dura, & bianca; & perciò è egli anche duro, & bianco. Appresso la parte di sopra di questo corpo da i suoi lati (secondo il lungo) sono due ^b riuoli, che si fanno nella sustanza delle ceruella; li quali (come anche fa il corpo calloso) si veggono tanto più chiaramente, quanto più forte tiriamo le ceruella in sù in obliquo verso e lati. Et l'offitio loro è guidar le flemme, che cadono dal capo, per sopra il corpo calloso verso il palato, & naso. La ^c faccia di sotto, o di dentro di questo corpo è alquato inarcata in sù; & ha due ^d canaletti, come vn quarto di cerchio, li quali camminando secondo il lungo di questo corpo, fanno nel mezzo vna riga rileuata, larga di dietro, & che si va a poco a poco ristringendo

Il sito del corpo
Calloso.

La faccia di so-
pra del corpo
Calloso.
Due riuoli di
questa parte.

La faccia di so-
to.

Libro Quinto delle Membra

gnendo innanzi, infino che le due quarte paiono, che si vadano a cōgiungere in vn punto. Questa riga scende affottigliandosi a poco a poco, & di poi torna ad ingrossarsi, & inserirsi nel corpo, che diremo esser simile ad vna volta, faccendo vn framezzo nel mezzo d'vna concauità, che diremo farfi sotto di questo corpo calloso, & il corpo calloso, insieme con la volta fanno la figura d'vna Testuggine. Questo tramezzo, se ben è della medesima sustanza delle ceruella, nondimeno per la parte di mezzo, d'alto a basso, è tanto sottile, che assai facilmente traluce, & pare vn'hostia bagnata. L'offitio di questo corpo (come habbiamo detto) è congiungere la parte destra delle ceruella con la sinistra; & l'offitio del tramezzo è spartir la concauità detta in due, & insieme sostenere il corpo calloso, che non s'abbassi o cada sopra i ventricoli; il che non potrebbe intrauenire, senza vna repentina morte.

De Ventricoli della testa. Cap. 4.

Il numero de ventricoli della Testa.

Il primo, & secondo.

Ne ventricoli della Ceruella ordinariamente è dell'acqua.

MOLTE & assai diuerse opinioni sono state tra i Theologi, & Philosophi de Ventricoli della testa, & tutte tanto fuori di ragione, che in esse danno ben ad intendere, quanto piu habbiano voluto rompersi i capi in dispute, & sriegliarsi in imaginationi, che pigliar vn' hora o due di fatica in guardare le ceruella di qual si voglia animal bruto almeno, se quelle d'huomo non poteuano, o non voleuano. Hor posti da banda tutti i sogni, che molti hanno detto di questo, Dico che nelle ceruella sono solo tre ventricoli, cioè vn destro, vn'altro sinistro, che si fanno di quella concauità, che habbiamo detto esser sotto el corpo calloso, diuisa mediante vn tramezzo; & vn'altro, che sta nel mezzo di questi due vn poco piu in giù. Il ^a destro (a cui risponde in figura, in sito, & in tutto il resto il ^b sinistro) è nella parte destra delle ceruella secondo il lungo loro, separato dalla fronte & dalla collottola, tanto, quanto il lato di fuori di questo ventricolo è separato dalle tempie. Ma dal lato di dietro tra l'vn ventricolo, & l'altro, per tutto lo spatio, che dura il corpo calloso, non son piu separati l'vno dall'altro, di quanto è la ^c grossizza del tramezzo detto. E come arriua a quella parte delle ceruella, che si diuide del tutto (come quella, che si appoggia sopra il celabro, & quella, che empie l'osso della fronte) si separa molto piu dal manco; perche oltre le tele delle ceruella, che le diuidono, gli separa anche vna buona quantità di ceruella. Et per ciò il ventricolo diritto esce piu verso il lato diritto al principio, & al fine, che nel mezzo; & nel medesimo modo il sinistro verso il lato sinistro. Et considerandogli amendue insieme, son piu separati da capi, & nel mezzo piu congiunti; & ognun di loro per la parte di dietro è tondo, & scende per la sustanza delle ceruella ritorcendosi alquanto innanzi; & faccendosi piu stretto finisce in, doue diremo nascer gli organi dell'odorare, & i nerui della vista, che è sopra quella parte dell'osso cuneale, che habbiamo detto esser simile ad vna sedia, sotto la metà del lungo di questo ventricolo dalla fronte al celabro. Et in questa parte distendendosi per le ceruella (come vna pūta di corno) & calando in giù, finisce nella parte piu bassa delle ceruella in vna doppiezza loro. Amendue questi ventricoli son lisci, & coperti d'vn humor acquoso, anzi ordinariamente si veggono pieni d'acqua, principalmente in que, che son morti di fresco. Per la qual cosa mi foglio io rider molto d'alcuni, che volendo veder la cagione di alcuna morte subitanea, aprono la testa, & vedendoui dentro questa acqua pensano che quella sia stata la cagione, non risguardando questa esser cosa naturale, come facilmente ce'l dimostra la facilità, che habbiamo nel piagnere, insieme cō la gran copia d'acqua, che in vn momento veggiamo uscìr per gli occhi. Perche pensare che s'ingeneri in quel punto, quando esce, è cosa da ridere. Si che questi ventricoli ordinariamente hanno molt'acqua; & la parte lor di sopra, si come quella da lati, è liscia, & vguale da ogni parte; anchor che, doue si torcono in fuori, pare che habbiano alcuni tubercolotti. La parte di sotto è aspra per cagion del seno (che nasce del lato di fuori, della parte di dietro di questi ventricoli, & cammina infino alla concauità commune a tutti due loro, che è il terzo ventricolo) per lo qual piu facilmente si purga la stemma. Aiuta anche a questa alprezza il ritorcimento de' ventricoli da dietro innanzi, faccendo amendue, che nella parte dinanzi, & in quella di dietro della piu bassa parte del ventricolo si vegga vna costicciuola, che cammina da man destra (scendēdo) a man sinistra verso la concauità commune a gli ventricoli;

e fi.v. S, T, V
f la med. XX

a fig. iij. v.
MM NN.
fi vj. E
b la med. LL

e fig. iij. III

d la med. tra
la L. & la M

e fig. xij. L L
f la me. N O
g la med. di
sotto della
M
h fi. iij. L M,
N N.

i fi. vj. RS

k fi.vi. sotto
la H. & sotto
la I. fig.
vii. viii. H
l fi.xvi. xviii.
A
m fig. vii. K
fig. viii. k, L
fig. x. B, C
n fi. vii. MN.
fig. viii. NO
PQ. fi. x. EF
GH
o lib. vii. t. i.
fi. i. D

p fig. vii. L.
fi. x. D
q fi. viii. K

r fi. ix. I. fi. x.
LMNO

s lib. vi. t. iii.
fi. ii. Q
t fig. iii. v.
OO. fig. vi.
MN

a fi. iii. L. M
fi. v. ST. fig.
vi. B C
b fig. iii. LL
c fi. v. la S fi
continua co
la T. & nel
la. vi. BA, co
l'AC
d fi. v. V
e fi. vi. appref
so la P
f fig. v. dalla
T, alla S
g la med. dal
la T, alla V.
& dalla S, al
la V
h la me. o. o.
fig. iii. o. o.
fi. vi. M, N

coli; perche la parte piu bassa de due primi ventricoli (che e continuata, quato dura il tra mezzo) fa nel mezzo, doue manca questo tramezzo, vna concauità commune ad amēdue i ventricoli. Questa ^k concauità chiamiamo il terzo ventricolo; del quale nascono due riuoli. L'vno dalla parte sua piu bassa, doue e incauato, come vna valle, secondo tutto il lungo del ventricolo, & scende dirittamente verso il seggio dell'osso cuneale, nel qual di remo esser vna glandola, che riceue la flemma del capo. ^m L'altro (che fa vna buona parte di questo ventricolo,) scende per dietro i ⁿ testicoli, & le natiche delle ceruella, & per sopra il principio della nuca, infino al finire in ^o vna molto picciola concauità (che diremo farsi tra la midolla, & il celabro) la quale alcuni chiamano il quarto ventricolo; & passando piu in nanzi per sopra la parte di dietro della nuca, cammina per lei infino che vuole uscire del craneo, faccendo la figura d'un canale, o d'vna penna da scriuere. Perche il fine del canale del terzo ventricolo, che e tra le natiche, & par propriamente l'occhio del fondamento, fa il voto della penna; & il suo taglio, & punte si veggono nella piu bassa parte del canale, che passado dalla cōcauità, che si fa appresso la nuca, comincia a passar per lei; & i lati son del tutto simili a gli pizzici, o punte della penna, che sono dal taglio, con che si scriue. Questo condotto non e del tutto tondo, anzi e triangolare, perche mantiene la medesima figura di valle nella parte di sotto, oue incominciò; & nella parte piu alta (che e appresso la ^p glandola, o animella, sopra laqual diremo diuidersi le vene, & arterie, che vanno a questo terzo ventricolo) e vn'altra riga, che si congiunge a i due lati del cōdotto detto, faccendo ella con loro altri due lati. ^q Suole anche delle volte nascere vn'altro riuolo del piu basso canto di questo condotto, subito come comincia a camminare intra i testicoli, il qual penetrando per le sustanze delle ceruella va a finire nel colatoio della flemma. Senza questi tre ventricoli ve ne e anche ^r vn'altro, che e quella picciola concauità, che si fa tra la nuca, & il celabro (alla qual habbiamo detto rispondere il terzo) chiamata da tutti il quarto ventricolo; benché non so, con quanta ragione, poi che non e abbracciata da ogni parte dalle ceruella, come esser dourebbe, a esser ventricolo. Ma poco importa chiamarlo ventricolo, o no, basti sapere che'l cie e, & che niuna altra cosa contiene in se, che acqua. Ma il primo, & secondo (oltre l'humor acquoso) hanno anche dentro vna rete fatta di molte, & sottilissime arterie, chiamata per cio in trecciamento; della quale a suo luogo faremo piu lunga mentione; & il terzo riceue quella ^s vena, di che si fa l'in trecciamento. ^t Oltre di cio questi tre ventricoli sono di dentro coperti d'una molto sottil tela (come molto ben notò Galeno, anchor che il Vesalio dica il contrario) la qual penso di certo esser parte della pia madre. Il quarto ventricolo non ha tela, che lo cuopra, & per cio non merita nome di ventricolo. L'offitio di questi ventricoli e (secondo, che'l piu de Medici, & Philosophi hāno detto) ingenerare gli spiriti della vita; la qual cosa credo anche io. Ma in che modo s'ingenerino, & in qual di loro facciano piu vna operatio, ch'vn'altra, parmi sciochezza pensare di poterlo determinare.

Il terzo Ventri
colo.
I riuoli di que
sto Ventricolo.

Il quarto ventri
colo.

Che cosa e nel
primo, & secon
do Ventricolo.

L'offitio de ven
tricoli delle Cer
uella.

Del Corpo delle Ceruella simile ad vna Volta.

Cap. 5.

Sotto el tramezzo de' due primi ventricoli nel mezzo delle ceruella e posto vn ^a Corpo sottile, & inarcato, come volta, della medesima sustanza, grandezza, & offitio del corpo ^b calloso. Questo corpo nasce della parte di dietro de i due primi ventricoli, iui, doue voltano in nanzi; & la parte sua, che nasce del ventricolo destro, si va a congiungere con quella, che nasce del ventricolo manco, faccendosi d'amēdue vn ^c corpo largo; che subito, che e nato, si separa dalla sustanza de i ventricoli, & cosi cammina verso nanzi faccendosi sempre piu stretto, infino al finire in vna ^d punta, appresso la parte di nanzi del ^e terzo ventricolo; nella qual parte si cōgiunge con questa punta alla sustanza delle ceruella, faccendo suolo a i due ventricoli, & tetto al terzo. La figura di questo corpo e come d'un triangolo, i cui lati non sono vguale; perche il ^f primo, & minore, piglia dalla parte di dietro del ventricolo destro, infino alla medesima parte del manco; il secondo, & terzo fanno i lati, l'uno del ventricolo destro, l'altro del sinistro. Et appresso loro di remo passare quello ^h intrecciamento d'arterie, che habbiamo detto vederfi ne due primi ventricoli. Tutti e canti di questi tre lati si congingono alla sustanza delle ceruella solo per la parte di sotto (perche da lati in niuna guisa si cōgiungono;) & per la parte di sopra

Il sito di questo
Corpo.

La figura.

congiunge

Lib. quinto delle Membra

L'offitio. si congiunge a loro solo vn cantone acuto, che risponde verso nanzi. Per la parte di sotto questo corpo ha sola vna faccia rileuata in arco, che sta sopra il terzo ventricolo, dalla quale il corpo prese nome di volta. Per la parte di fuori (che è gobba) ha nel mezzo secódo il lungo, vna riga rileuata, alla quale habbiam detto appoggiarsi il tramezzo, che diuide i due primi ventricoli. Questo corpo è coperto d'vna molto sottil tela, ne piu ne meno, che quello, che è simile al callo; & fu fatto per coprire il terzo ventricolo, & insieme sostener le ceruella, che non caschassino sopra di lui.

Della Glandola delle Ceruella simile alla pina.

Cap. 6.

Il sito di questa Glandola.

Appresso la parte di dietro di questo ^a corpo (come volta) stà vna ^b Glandola ò Animella, molto simile ad vna pina, chiamata dagli Antiqui Conarion. La qual nasce della sustanza della parte piu bassa delle ceruella, iui, doue si vede il ^c buco che va dal terzo ventricolo al quarto; & ha la punta rileuata in sù; & è appoggiata alla parte piu alta di nanzi de' ^d testicoli delle ceruella; & molte volte nel cauar le ceruella si suole restar attaccata con vna vena, che per questa parte diremo passare, alla quale questa glandola serue per sostegno, nel diuidersi in varii rami.

a fi.v. STV.
fig. vi. AAA
b fi.vii. L. fi.
viii. M. fi. x.
D
c fig. vii. K
fi. x. B
d la me. NN
fi. x. FG

L'offitio.

De Testicoli, et Natiche delle Ceruella.

Cap. 7.

Il sito di questo Corpo.

Si vede anche nelle ceruella (tra la parte di nanzi del ^a celabro, & quella ^b di dietro delle ceruella; & il principio della midolla spinale, & la parte di sopra delle ceruella, che stà sopra il celabro) vn'altro ^c corpo, la cui parte piu bassa è simile a due natiche congiunte insieme, & la piu alta ha due testicoli, dal che fu chiamata quella Glution, che vuol dir picciola natica, questa Didymion, che vuol dir picciol testicolo. Questo corpo per la parte di nanzi, & piu bassa, si congiunge alle ceruella; anzi mediante quello si congiunge la parte sinistra alla destra; ma da lati, di sopra & di dietro non si congiunge a parte alcuna, anzi è coperto dalla pia madre, come diremo esser anche tutte le ceruella, & per cio è della medesima sustanza, & colore, che sono l'altre parte di fuori delle ceruella. Et suo offitio è guardare, che le ceruella nō cadano sopra il canale, che va dal terzo ventricolo, al quarto, & l'acciechino,

a fi.vii. x. x
b la me. BC
c fi.vii. MN.
tra la HK
XX

La figura.

De Processi del Celabro simile a i Tarli.

Cap. 8.

Il sito, et figura di questi processi.

Ha il Celabro nella parte di nanzi, & piu bassa, vn processo, che cāmina verso dietro faccendo certi giri, come tarlo o verme di legno; dal quale escono due punte, ^a l'vna risponde alla parte di nanzi del quarto ventricolo, l'altra ^b a quella di dietro, ritenendo amendue vn'istessa figura, per la qual cosa furono chiamate da Greci Scolicoides, che vuol dir di figura di vermine. L'offitio di queste punte, si come per me è incerto, così e certissimo da sapere, che niuna di loro serue per turare il ^c buco del ^d condotto, che va dal terzo ventricolo al quarto. Perche ne quelle hanno mouimento voluntario da poterlo fare, ne meno è necessario che stia chiuso il condotto, se per quello hanno da passare gli spiriti del sentire alla Nuca, come tutti credono.

a fi.xi. CDH
b la me. cd I

L'offitio.

c fig. x. c.
d fig. viii. K

Dell Imbuto, et Glandola, per i quali si purga la flemma del Capo.

Cap. 9.

La figura dell' Imbuto.

Gia habbiamo detto, come nelle ceruella erano due canali, per gli quali si purgaua la flemma. Il ^a primo di loro, (che e quel, che piu comunamente si vede) comincia dal terzo ventricolo, & finisce sopra il ^b leggio dell'osso cuneale. ^c L'altro si vede assai di rado, & e assai piu stretto; & nasce del ^d condotto, che va dal terzo ventricolo al quarto, iui, doue passa sotto le natiche delle ceruella; & va a poco a poco scendēdo verso nanzi, infino all'arriuare al fine del primo doue d'amendue si fa vn buco. Da lati di questo ^e buco nasce della pia madre (che cuopre la parte piu bassa del celabro) vna ^f punta, o processo, simile in sustanza al resto di lei, eccetto che le vene, che si spargono per questa, son

a fi.vii.viii. I
b lib. i. ta. v.
fi. i. M
c fig. viii. ap-
presso la K
d fi.vii.viii. K
fi. x. B, C
e fig. xiii. D
f fi. xliij. CC
fig. xv. E. fi.
xvi. B

son piu fortili, & spesso. Il principio di questo processo fa la natural figura d'vna bocca d'imbuto; perche di mano in mano si va ristignendo, come fa l'imbuto, infino al finire in vn cannone stretto, il qual passando per vn buco della dura madre, finisce sopra la glandola, che sta sopra il seggio dell'osso cuneale, & per la parte di sotto è tonda, per quella di sopra fa nel mezzo vn fosso, nel qual riceue la flemma. Per questo imbuto, (come per vn colatoio) si cola tutta la flemma del capo. Et la glandola, che la riceue (come habbiam detto) e di sotto tonda, & di sopra incauata alquanto, da lati tonda, & che tira al quadro. Et è d'vna sustanza alquanto piu dura, che quella dell'altre glandole, & da ogni parte inuolta in vna sottil tela, che nasce della tela, di che habbiam detto farsi l'imbuto, o di quella, che cuopre in questa parte l'osso, faccendo che la dura madre non tocchi il craneo, & insieme tiene legata questa glandola. Alla quale sono appoggiati (come diremo) due rami dell'arteria ^h del sonno, e quali niuna marauigliosa rete fanno, come alcuni Anatomisti hanno pensato. Da lati di questa glandola scedono da ogni lato i due canali, che purgano la flemma. vno verso nanzi, che finisce ^k nel buco, per lo qual diremo uscire il 1 secodo paio de nerui della testa; l'altro scende piu in dietro, & passa per sopra quell'aspra, & disugual fessura, commune all'osso cuneale, & a quel delle tempie, & a quel della collottola, che e appresso il terzo buco dell'osso cuneale, per lo qual entra il piu grosso ramo dell'arteria del sonno. Tutti questi condotti aiutano a purgare la flemma della testa, cioe i due riuoli, che habbiam detto farsi nella sustanza delle ceruella sopra l'osso cuneale, purgano l'humidità de ventricoli, & la portano a l'imbuto. Et questo imbuto e largo di sopra, si per rispetto de' condotti, che finiscono in lui, come per riceuer i capi del ventricolo diritto, & manco, che finiscono in questa parte. Fu fatto anche questo imbuto tanto capace per ragione, che se alcuna flemma o humidita si raccogliessi sopra il 3^o corpo calloso, o ne ⁿ feni, che stanno sopra lui, facilmente potesse cadere nell'imbuto, aiutato dalla pia madre; perche o scenda questo humore dalla parte di dietro del corpo calloso, o da quella di nanzi, sempre va a cadere nella pia madre, che fascia la parte piu bassa delle ceruella, & indi nel colatoio. Il qual faccendosi (quanto piu va in giù) piu stretto, raccoglie tutta la flemma; & gettandola per vn buco picciolo, che si fa nella dura madre, va a cadere nel mezzo della glandola detta. Dalla quale camminando per quei seni o riuoli, che habbiam detto incominciare appresso al seggio dell'osso cuneale, esce parte per li buchi, che rispondono al palato; parte per quegli, che rispondono agli occhi; parte per gli altri del craneo, per doue escono i nerui, & entrano le vene, & arterie, senza hauere altro particular buco, per doue si purghi. Ne ha condotto alcuno, che la porti al naso, attento che non fuorle la flemma purgarsi naturalmente per esso, te non per superchia materia, come fa nel infreddamento. Et con questo habbiam finito tutto quel, che tocca all'historia delle ceruella, perche de gli intrecciamenti de gli Antiqui, simili, l'vno alla rete, l'altro alle secon dine, nel sexto libro ne faremo particular mentione.

La figura della glandola.

I canali, che purgano la flemma.

L'offitio di questo imbuto.

La flemma naturalmente non si purga pel naso.

De Sensi esteriori.

Cap. 10.

Composto, & fabbricato tutto il nostro corpo, & posto in lui tre principali membri, da i quali risultano tutte le sue operationi, restarebbe hora a trattare delle perfectioni, che ha. Perche oltre al nutrirsi, viuere, & sentire, gli furono anche necessarij alcuni sensi esteriori, medianti i quali potessimo meglio venire in conoscenza di tutte le cose create, & per conseguente del creator loro. Hora pose Iddio, cosi nell'huomo, come in qual si voglia animal bruto, in prima il senso del toccare, accompagnato col senso del gusto, medianti e quali distingue il dannoso dal salutarifero. Secondariamente pose l'udire, instrumento, per lo quale vdiamo cosi le dottrine, & scienze, che ci fanno esser piu perfetti, come anche le differenze delle voci, & l'harmonia della musica; per la quale veniamo in certa guisa in conoscenza della celeste melodia, & della compositione di nostra anima. Dopo a questo ci diede Iddio il senso dell'odorare. Et in vltimo la vista, sol principio del conoscimento di tutte le cose; senza la quale tutto quel, che del mondo si disputa, & intende, gia mai non si farebbe saputo. Perche se non hauemmo in prima veduto il Cielo, il Sole, la Luna, le Stelle, & il mouimento loro, la Notte, il Giorno, dalle quai cose tutte nasce il disio di conoscere le cagioni naturali, & il Motor loro, saremmo senza dubbio

La vista è senso principal de gli esteriori.

Lib. quinto delle Membra

dubbio alcuno priuati del maggior dono, di quanti in questa vita ci poteano esser dati. Et perche del senso dell'vdiare trattai nel primo libro; & dell'instrumento dell'odorare, gustare, & toccare tratterò insieme co nerui; qui solamente tratterò de gli occhi.

De gli occhi.

Cap. II.

La figura dell'occhio.

L'humor vitreo

La prima tunica dell'occhio.

La seconda.

La terza.

La quarta.

La cornea è la medesima con la dura.

Dissi nel primo libro, come tra l'osso della fronte, & il primo, & quarto della mascella superiore, si facea da ogni lato vna concauità tonda, che finisce, entrando in dentro, come in vna punta di triangolo (che comunalmente chiamiamo la cōca dell'occhio) dentro della quale sta l'occhio; & nel secondo libro trattāmo de muscoli, che l'moueano. Hora sarà bene trattar di sua particolar compositione. E adunque da sapere, che l'occhio dell'huomo è perfettamente tondo, & fatto di tre humori, quasi di natura d'acqua: per la qual cosa egli tutto è dell'istessa natura. Il primo ^b di questi humori è simile al vetro liquefatto, perche è trasparente, & tanto liquido, che cauato dell'occhio subito perde sua natural figura. Questo humore chiamarono i Greci Hyaloides; i Latini Vitreo; il qual occupa più delle sei parti del voto dell'occhio. Et per la parte di dietro è tondo; da quella di nanzi piano; & nel mezzo fa vn fosso picciolo, nel qual s'incassa vn'altro humore assai più duro, & trasparente, come cristallo, chiamato per cio humor Cristallino, la cui figura è quasi del tutto simile ad vna lenticchia; per la qual cosa alcuni il chiamano Phacoides. Questo humore per la parte di fuori è molto liscio, & lubrico; & è coperto d'vna molto sottil tela, simile a quella delli aragni o ragnateli, chiamata perciò aranea; per la parte di dietro nō è coperto di tela, perche è incastrato (come habbiamo detto) nell'humor vitreo. Il qual per la parte di dietro, & per quella di nanzi è inuolto in vna sottilissima ^d tela, la quale al mio giuditio è parte della ^e tela chiamata aranea. Oltre a questa tela ha di più questo humore vn'altra tela, che cuopre solamente la parte sua di dietro, la qual nasce della sustanza del ^f neruo della vista, che habbiamo detto inserirsi appunto nel mezzo della parte di dietro dell'occhio, scontro alla pupilla. Hora arriuato a questa parte questo neruo, fassi subito la sustanza sua alquanto più tenera, & allargasi tanto, che fa vna tela, che cuopre tutta la parte di dietro dell'humor vitreo, & per essa si veggono spartiti ^g alcuni ramuscelli di vene, & arterie, come diremo. Questa tela molti nō l'hanno conata nel numero dell'altre, per non esser dura, come soglion esser l'altre tele, anzi tenera, come mocci, & stando piegata è molto simile alla sustanza delle ceruella liquefatte in acqua; stādo distesa, pare vna reticella; & per cio fu chiamata Amphiblestroides, o ver retina. ^h La terza tunica dell'occhio (che è sopra la seconda, senza esser legata a lei in parte alcuna) nasce della ⁱ pia madre, che fascia il ^k neruo della vista; & rinuolge tutto l'occhio, così per di nanzi, come per di dietro, faccendo vna figura tonda; eccetto che nella parte di nanzi, come arriua al negro dell'occhio, ^l s'incava alquanto in dentro, & nel mezzo di questa parte incauata si vede vn picciol buco, che fa la pupilla dell'occhio. Questa tela è molto simile alla pelle dell'vua toltone via la sua punta, & incauandola vn poco in dentro; & per cio fu chiamata da Greci rhagoides, o rhaga, da Latini vnea; la chiamano anchora alcuni choroides, perche nasce della pia madre, o perche per lei son semminate le vene, che nutriscono l'occhio, come per la pia madre quelle, che nutriscono le ceruella. Sopra questa tunica ne sta ^m vn'altra, che cuopre tutto l'occhio; & nasce della dura madre, che inuolge il neruo della vista, la qual subito, che arriua alla parte di dietro dell'occhio, s'allarga, & faccendosi più dura, & grossa, cuopre l'occhio tutt'intorno, così per la parte di nanzi, come per quella di dietro. Non dimeno la ⁿ parte sua di dietro, che piglia dal neruo della vista in fino al nero dell'occhio, è assai più dura, & bianca, & non transpare, come ne anche la dura madre; per la qual cosa fu chiamata sclerotes, che vuol dir dura. Il ^o resto suo (che è, quanto piglia il negro dell'occhio) è simile ad vn corno di lanterna, perche è composto di due scaglie lisce, & trasparenti, & dure come corno, principalmente ne vecchi, ne quali viene ad esser tanto dura, che non gli lascia vedere, & è di mestieri radersela. Questa parte di questa tela chiamarono gli Antiqui ceratoides, o cornea, per la simiglianza, che ha col corno. Et la diuersità delle parti di questa tunica, così in sustanza, come nel nome ha fatto pensar ad alcuni che fusse più d'vna; ma la cōtinuatione sua manifestamente dimostra non esser più d'vna, la quale per la parte di dentro infino all'arriuare

a ta.iii. fig.i.
xix.lib.ii. t.
xv.fi.xx.xxi.
xxii. xxiii.
b t.iii.fi.i. C.
fig.iii.v. vi.
viii.a
c fi.i. A. fi.ii.
iii.fi.v. T. fi.
vi. V. fig. vii.
X

d fig.xi.xii.
e fi.i.B.fi.x.d
fi.xii.i
f fig.i. D. fig.
xiii.k. fi. xv.
n.fi.xvii.a

g fig.xviii.

h fi.i. G. fig.
xiii.xv.
i fi.i. F. fi. xv.
o. fi. xvii. β
k fig.i. D. fi.
xv.n. fi. xvii.
l fig.i. H. fi.
xiii. m. fig.
xv. γ

m fi. i. M. fi.
xvi. fi. xvii. γ

n fi. xvii. dal
neruo al cer
chio nero.
o t.iii.fi.i. N
fi.vi. xvii.x.
y. fi. xix. θ, n

p la med. fig. xv. u. u
q la med. tt. fi xv. pp
r la med. fi. i. tra la N. & & la l
s fi. xv. tra le due q, q
t la med. fi. vii. y. fi. viii. b
u fi. xviii. per tutto il cerchio di suo ri.
x fi. i. o fi. xix. Q. al terzo cercho.
y fi. i. o fi. vii. y. fi. viii. b
z fi. i. A. fi. ii. iii. R. fi. iii. S. fig. vi. u
a fi. vii. x. fi. i. C. fig. iii. v. fi. vi. fi. viii. a

all'ariuare al negro dell'occhio, abbraccia la P vnea, senza esser cosa alcuna tra l'vna, & l'altra; anzi stāno attaccate col mezzo di certi ramuscelli di 9 vene, & arterie, che si comunicano da questa dura all'vnea, ne piu ne meno, che que della dura madre alla pia, & principalmente intorno al negro dell'occhio, doue sono fortissimamente attaccate; ma dal negro in nanzi tutta quella parte (che si chiama cornea) e^r separata da lei; perche (come dicemmo) la vnea in questa parte e^s compressa in dentro. Lo spatio tra queste due tele e pieno d'vn^t humore chiamato Hydatoides, che vuol dir acquoso, per esser simile all'acqua; altri il chiamarono Albugineo, per esser simile al chiaro dell'vouo. Il quale non e tanta quantita, quanta si pensò il Vesalio; perche aprendo l'occhio (anchor che sia finito di morir l'huomo) non escono piu di lei o sette gocciole d'acqua. Questo humore e assai piu liquido, che'l vitreo; & se tal volta si fa grosso, (come tela di cipolla) conuertendosi in cataratta, non ci lascia vedere insino, che mettendo vn' sottilissimo ago per la tela chiamata cornea, non abbassano con esso la tela, o cataratta, che staua in nanzi della pupilla. Accade anche delle volte, che o risoluendosi q^{sto} humore, o saltādo fuori per alcuna disgratia, si perde subito la vista senza parer nell'occhio alcun difetto. Come intrauēne a mio padre, sendo di età di quarāta anni, che si diede con vna punta di coltello nell'occhio, & ponendoui su presto la mano lo spremette alquanto, & uscì fuori questo humore, & subito perde la vista di quell'occhio, senza conoscersi in lui alcun difetto, piu che nell'altro. Ma tornando a questa tunica, per la parte di fuori (quanto dura la cornea) e liscia; il suo resto e aspro, ne piu ne meno, che son l'altre tele, che s'attaccano ad alcun'altra. Sopra questa tunica e la ^u quinta, che si fa de i capi de muscoli, che muouono l'occhio; & cuopre tutta la parte di nanzi dell'occhio insino al nero, aiutando à tenere piu forte l'occhio nel craneo. Vltimamente vi e la ^x sesta chiamata aderente, o biāca, la qual cuopre anchora per di fuori la parte di nanzi dell'occhio, insino al nero; & e tātto attaccata colla quinta, che cō grā difficultà si separa; questa tela e molto sottile, & e continuata con la tela di dentro delle palpebre. Hora raccogliendo quel, che habbiamo detto, nell'occhio sono tre humori; in prima (cominciando dalla parte di nāzi) vi e l'humore ^y acquoso, di poi il ^z cristallino, vltimamente ^a il vitreo; Et sei tele, la prima (cominciando di dentro) e l'aranea, o arachnoides; la seconda e la retina, o amphiblestroides; la terza la vnea, o rhagoides, o rhaga, o choroides; la quarta e la dura, chiamata Sclerotica; la quinta e quella, che si fa de fini de muscoli, la quale non ha nome, per non esser stata conosciuta da gli antiqui; la sesta e la bianca. Solo ci restarebbe a dire di quella tela, o per dir meglio, cerchio, che si vede tra l'humor cristallino, & il vitreo, per la parte di fuori, il quale molti han contato per vnā tela distinta; ma io penso di certo esser parte dell'aranea; & le punte nere, che si veggono in quello, penso esser parte dell'vnea, che le lascia nel distaccarsi. O sia tela da per se, o nò, basti sapere, che e vna sottilissima tela, che sta tra l'humor cristallino, & il vitreo. Et con questo darò fine a questo libro; perche trattar dell'offitio delle parti dell'occhio mi par tanto difficultoso (oltre all'esser in parte fuori del mio intento) che piu tosto voglio lasciarlo pensare ad ognuno da per se, che mettermi a dir cosa, in che si poco honore posso guadagnare.

L'humor acquoso.

La quinta tunica dell'occhio. La bianca, o Adherente.

Compendio di tutte le parti dell'occhio.

Dichiar. delle Fig. del Lib. V.

Tauola prima, Figura Prima.



Dichiaratione delle lettere delle Figure del quinto libro, & prima della prima. La qual dimostra la testa, segato il craneo tutto intorno sopra le punte dell'orecchia & le ciglia, secódo che facea mestieri per veder tutte le ceruella; & tolto via, perche si potesse veder la dura madre, & le sue vene.

- AA* La dura madre, che fascia il lato destro delle ceruella.
- B* Quella, che cuopre il manco.
- CC* Il terzo seno della dura madre, che va secondo il lungo della testa.
- E* Due condotti, come vene, che si distribuiscono per lo lato destro della dura madre.
- FFF* Queste lettere mostrano alcuni ramuscelli di vene, che passano pel craneo al pelicraneo; delle quali le piu principali si veggono appresso la *F*, che piu è coperta.
- GGG* Parte delle venuzze, che escono fuori del craneo per la commessura coronale, & vanno al pelicraneo.
- HH* Parte di quelle, che escono per la sagittale.
- II* Parte delle venuzze, che escono fuori per la commessura lambdoide.
- K* Vn tubercolo di que, che entrano ne fossi del craneo, appresso doue la commessura coronale si congiunge colla sagittale.
- L* Quella concanità, che si vede nell'osso della fronte.
- MN* La *M* nota il craneo, la *N* la pelle.

Figura. II.

In questa Figura la dura madre è tagliata in croce; & pède a basso, perche si vegga la pia madre.

- AAA* La parte piu alta della dura madre.
- BB* Il terzo vetricolo della dura madre aperto.
- CC* Le vene, & principij, che vanno dal terzo seno della dura madre alla pia. Et in questa figura si veggono le bocche de vasi, che vanno al lato manco della pia madre.
- DDD* I principij de vasi, che vanno alla pia madre.

- EE* La pia madre.
- FFF* Il processo delle vene per la pia madre, & per li suoi seni.
- GGG* Alcuni rami di quelli, che vanno per la dura madre.
- HH* La dura madre.

Figura III.

In questa Figura si mostrano le ceruella scoperte dalla dura, & pia madre; & aperte verso i lati; perche si vegga la parte della dura madre fimi le ad vna falce, che diuide il lato destro dal sinistro; & il corpo chiamato calloso.

- AAA* La parte destra delle ceruella.
- BBB* La sinistra.
- CC* I seni, & circoli, delle ceruella.
- EEE* I principij delle vene, che nella figura passata habbiam detto andare dalla dura madre alla pia, le quali in questa figura son rotte.
- F* Vn condotto, come vena, che va alla parte piu bassa del corpo della dura madre, simile alla falce; & nasce del la parte di nanzi del quarto seno della dura madre.
- G* Alcuni ramuscelli di questo condotto, che montano, spargendosi per lo corpo detto.
- HHH* Alcuni ramuscelli, che nascono della parte piu bassa del terzo seno della dura madre, & scendono per lo corpo simile alla falce.
- LL* Il corpo calloso.
- MM* Alcuni seni, che si fanno dall'vna parte, & dall'altra del corpo calloso; i quali in questa parte non si puotero mostrar piu chiaro.
- N* La parte del corpo, come falce, che s'attaccava al processo dell'ottauo osso del capo.
- OO* Vna parte della pia madre, distaccata dalle ceruella.
- PP* Vna parte della dura madre.

Figura IIII.


In questa Figura son tagliate tutte le ceruella, a canto doue è segato il craneo, & a canto del corpo calloso, perche si possino vedere i due vetricoli. Et il pezzo delle ceruella, che tagliammo dal lato destro, è quello, che ponemmo appresso questa quarta figura notata col medesimo numero.

La parte

TABVLA I. LIBRI V.

FIGVRA I.

II



IIII



VI



Dichiar. delle Fig. del Lib. V.

AAA	La parte destra delle cernella, che son resta- te nel capo.
BBB	La sinistra.
CCC	La parte destra delle cernella, che tagliam- mo, volta in sù.
DDD	Queste righe mostrano le girauolte, che fan- no le cernella, & insieme il lor diuerso co- lore; perche dalle righe in fuori è alquan- to piu oscuro, & di color di cenere; quel di dentro è piu bianco. Et perche meglio ci intendiamo, la E & la F mostrano il
EF	Ceneritio, & la G & la H il bianco; nel
GH	quale si veggono certe punte rosse, che son delle vene che passano per loro.
III	il corpo calloso, il quale è distaccato per gli lati dalle cernella.
KK	Vna parte del corpo calloso, che restò attac- cata alla parte della destra delle cernel- la, che è volta all' in sù.
LM	Il ventricolo destro, & il manco.
NN	La parte piu alta del ventricolo diritto.
OO	Quella rete piegata, che si vede ne due ven- tricoli.
PP	Alcune vene sottili, come capelli, che so- no attaccate in questa parte alla sustan- za de ventricoli, & nascono della detta rete.
Q	Alcune vene, che nascono della medesima rete, & vanno per di sotto la parte di nanzi del corpo come callo, insino alla pia madre, senza tenere in ciò ordine alcuno.

Figura. V.

Questa Figura è differente dalla
passata solamente in questo, che
in qsta il corpo calloso è distaccato di
nanzi, e ripiegato verso dietro. Per la
qual cosa fu dibisogno tagliare il tra-
mezzo de due ventricoli, & cosi il cor-
po calloso mostra la parte di sotto, &
si vede il corpo simile alla Volta.

AQ	Dalla A alla Q, tutte le lettere mostrano il medesimo, che nella passata.
RRR	La parte di sotto del corpo calloso, che è ri- uolta in dietro.
STV	La parte superiore del corpo simile alla volta, che va dalla S alla T, & dalla r alla V, & dalla V alla S.
XX	La parte piu bassa del tramezzo de due ventricoli, che è attaccata alla volta.
YY	La parte piu alta pure di questo tramezzo,

la quale congiungendosi con la bassa fa-
rà tutto il tramezzo intero colla ima-
ginatione, poi che non puote il Pittore
esprimerlo col pennello.

Figura. VI.

Questa Figura è differente dalla
quinta solo in questo, che l
corpo simile alla volta è di-
staccato dalle cernella dalla banda di
nanzi; & riuolto verso dietro, perche
si vegga anche per di sotto, & si scuopra
la vena, che nasce del quarto seno
della dura madre, & va per sotto la
volta a fare vna gran parte della rete.

AAA	La parte di sotto della Volta.
B	Vna parte della volta, che nasce del lato manco delle cernella.
C	Vn'altra, che nasce del diritto.
DD	Il ventricolo manco.
EE	Il destro.
F	L'arteria, che passa per la parte piu bassa, & di dietro del ventricolo manco; & na- sce del ramo manco dell'arteria del son- no, che pertugia la dura madre, & va al ventricolo manco.
G	L'arteria, che va al ventricolo diritto.
H	Vna vena, che nasce del quarto seno della du- ra madre, & va al terzo ventricolo del- le cernella, che sta sotto la volta.
I	La diuisione di queste vene in due.
K	La parte di questa diuisione, che va al ven- tricolo manco.
L	Quella, che va al diritto.
M	La rete del ventricolo manco.
N	La rete, che va al ventricolo diritto.
OO	Alcuni ramuscelli, che nascono della detta rete, & si attaccano alla sustanza delle cernella.
P	Alcuni ramuscelli, che nascono de sopra det- ti, & vanno fuori de ventricoli delle cer- nella alla pia madre.
Q	Vn condotto, che nasce del terzo ventricolo, & va verso l'imbuto delle cernella, o al riuolo, per lo qual la flemma della testa si purga.
RS	Certi riuoli, che si fanno ne ventricoli, per gli quali passa l'humidità del capo al det- to condotto.

Tauola II. Figura VII.

In questa Figura son tolte via tutte le Ceruella dalla metà in dietro, p- che si possa vedere il celabro; & dalla parte di nanzi tagliammo, quanto en- tra uano i ventricoli. Et la Vena, che nasce del quarto seno della dura ma- dre, & va a gli ventricoli delle ceruel- la, è qui tagliata, & ripiegata in die- tro, perche si veggia il terzo ventrico- lo, & li suoi condotti.

- AA BB. La sostanza delle ceruella, che son re-
state nel craneo.
CC I circoli, che fanno le ceruella per la parte
di sotto.
DD La parte delle ceruella ceneritia dalle righe
in fuori.
EE La parte bianca.
F Vna parte dell'arteria del sonno, che entra
nel ventricolo manco.
G Vna parte dell'arteria del sonno, che entra
nel ventricolo diritto.
H La parte piu bassa del terzo ventricolo; la
quale è alquanto piu slargata, perche si
possa vedere.
I Un condotto, che nasce del terzo ventrico-
lo, & va insino alla glandola, nella qual
si riduce la flemma.
k Vn altro condotto, che nasce del terzo vètri-
colo, & va fra i testicoli delle ceruella et
le natiche, alla concanità, d' voto, cōmun-
ne al celabro, & alla Nuca.
L Vna Glādola, come pina, che sostiene i vasi,
che nascono del quarto seno dlla dura madre.
MN Questi sono e testicoli delle ceruella, et le nati-
che; che anche sono copti cō la pia madre.
OO OO. La dura madre; che cuopre il celabro,
& il separa dalle ceruella; et le vene, che
si veggono in quella, parte nascono del se-
condo seno, parte del quarto.
PP Il secōdo seno, o il sinistro della dura madre.
QQ Il primo.
R Doue questi due seni si congiungono; la qual
parte chiamarono il Torcolo.
S Il principio del terzo seno della dura madre.
T Il quarto seno; & così questo, come gli al-
tri, sono aperti.
V La pēa, che nasce del quarto seno della dura
madre, et va a uentricoli delle ceruella; la
quale i questa figura è rinolta verso dietro.

XX

r

Il celabro scoperto in questa parte.

Alcuni ramuscelli di vene, che nascono del
quarto seno della dura madre, & vanno
alla pia, che fascia il celabro, et i testicoli.

Z

La parte della dura madre, che si attacca al
l'osso de gli orecchi, i quali in questa par-
te sono gia scoperti.

Figura. VIII.

In qsta Figura son tagliate le Cer-
uella piu in giù, & il celabro è scop-
to della dura madre. Et spartimmo i
testicoli, secondo il lungo, perche si
potesse vedere il condotto, che va dal
terzo ventricolo al quarto. Et è da no-
tare che dalla A alla H, tutte le lette-
re mostrano il medesimo, che nella
settima figura; nondimeno l'arterie,
che sono notate con la E & con la G,
stanno tanto piu in nanzi in questa
figura, che nella settima, quanto le
ceruella son tagliate piu in giù in que-
sta ottaua.

I

il condotto, che va all'in giù, per lo qual ua
la flemma allo sciacquatore.

k

il condotto, per doue si purga la flēma; che
nasce alle volte del canale, che ua dal ter-
zo ventricolo al quarto fra i testicoli del-
le ceruella.

L

il nero, che si vede tra la K, & la L, dinota il
condotto, che va dal terzo ventricolo al
quarto.

M

La glādola, come pina, che habbiamo detto so-
stentar gli rami, che nascono del quarto
seno della dura madre.

NO

P Q. Queste quattro lettere notano i testico-
li i quali nella settima figura erano cōgiū-
ti, et i qsta sō diuisi. Et la N & la O nota-
no i testicoli; la P & la Q le natiche.

R

il celabro coperto colla pia madre.

SS

Le vene, che vanno per la pia madre.

TT

I rami delle vene, che uāno p la pia madre; e
quali mōtano p gli lati della parte di die-
tro de due primi vètricoli delle ceruella,
insino a fare quel viluppo, che si fa i loro

VV

La parte della dura madre, che diuide il ce-
labro dalle ceruella.

XX

Le uene, che nascono de rami, che si distribui-
scono per la parte della dura madre, che
cuopre il celabro, & vanno alla pia ma-
dre, che cuopre il celabro.

ZZ

Queste lettere notano l'istesso osso delle orec-
chie, che notauano nella settima.

Dichiar. delle Fig. del Lib. V.

Figura. IX.

Q Vesta Figura sta quasi volta all'i giù, & ha tagliata la parte della dura madre, che separa il celabro dalle ceruella; & ha il celabro rileuato, & volto verso innāzi, pche si possa vederela parte sua piu bassa, & il nascimēto della Nuca, o midolla Spinale.

AA Vna parte delle ceruella, che anche sta nel suo luogo.

BCD Queste tre lettere notano la parte piu bassa del celabro copta cō la pia madre, et attaccata alla nuca. Et particolarmente la **B** mostra la pte sua sinistra, che s'icassa nel fosso dell'osso della collottola, notato colla **p**; et la **O** nota la parte destra, che s'icasse nel seno, che notamo colla **R**; la **C** mostra la parte di mezzo del celabro, che pare vn verme.

E La parte piu bassa della metà del celabro, la quale serà anche la piu bassa de processi, come uermi.

FGH La Larte della Nuca, in nanzi, che esca del craneo. La **F**. & la **G** mostrano il principio suo, che si congiunge al celabro; la **H** la parte sua, che esce del craneo.

I Il seno della Nuca simile alle pūte della Piuma, il qual fa la metà del quarto uētricolo.

KK Alcuni ramuscelli di vene, che nascono di quelle, che vanno al primo & secōdo seno della dura madre; et, si come questi rami son molti, cosi non tengono sempre vn istesso numero.

L Altri rami, che vanno alla pia madre, che fascia il celabro, & nascono di que, che i qsta parte si distribuiscono p la dura ma

M Il quinto paio di nerui della testa. (dre.

N Il sesto.

O Il settimo. Et qui si può vedere, come il sesto & settimo paio non nascono del celabro, ma sol della Nuca.

PQR I seni dell'osso della collottola, ne quali s'incassa il celabro.

SSS Il sinistro, o secondo seno della dura madre aperto.

TTT Il destro.

Figura X.

Q Vesta Figura mostra il principio della Midolla spinale; & parte de l celabro & insieme i testicoli, & natiche, & glandole, come pine delle

ceruella; & vltimamente quella iprefione della nuca, che insieme cō quella del celabro fa il quarto ventricolo delle ceruella.

AA La parte delle ceruella, della qual nasce la midolla spinale.

B Vn canale, che va dal terzo ventricolo, al quarto, p di sotto e testicoli, & finisce nel quarto uētricolo, in, doue si uede la **C**.

C La glandola simile ad vna pina.

D G H. Queste lettere mostrano i testicoli, & natiche delle ceruella, i quali si diuidono mediante la riga, che si fa tra la **E**, & la **G**, & la **F**, & la **H**.

IK In queste due parti si congiunge la nuca al celabro.

LM **N O**. Il seno della nuca, che fa la parte del quarto vētricolo, simile al taglio della pēna da scriuere; pche la **L** pare quel di dietro del taglio; la **M** & la **N** le punte da i lati; la **O** le punte vltime. (neo.

P La nuca è tagliata vicino doue esce del cra

Figura. XI.

Q Vesta Figura rappresenta il celabro fuori del craneo, & libero dalla pia madre, & riuersato in sù, perche si vegga, come si congiunge alla nuca.

A La parte sinistra del celabro. **B** La destra.

Cc La parte di mezzo; & la **C** mostra il lato di nanzi, la **c** quel di dietro.

Dd I fini di qsta parte di mezzo, de quali la **D** mostra quella di nāzi, la **d** quella di dietro.

E Il seno del celabro, che fa vna parte del quarto ventricolo delle ceruella.

GG In questa parte si cōgiunge la nuca al celabro.


HI Queste due cosette, che stāno da p se, dinotano, qlla della **H** la parte di nāzi della parte di mezzo del celabro; quella della **I** qlla di dietro; et amēdue sono distaccate dal suo luogo, pche meglio si possino vedere.

Figura. XII.

I N questa Figura si mostra la Testa per lato, toltone via il celabro, & solo con quella parte di ceruella, che si veggono nell'ottaua, & nona Figura. Ma in questa Figura non ri-

tengono

TA^{VII} BVLA > II > LIBRI^{VIII} V >




IX




IXII



XI



XVI



XIII


XIII



XV



XVII



XIX



Dichiar. delle Fig. del Lib. V.

tengono il suo sito naturale; anzi stāno alquanto riuolte in dietro, perche si possino vedere gl'instrumenti dell'odorare; de quali il dextro sta riuolto verso dietro insieme colle ceruella; il sinistro sta al suo luogo, & coperto con la dura madre,

- AA La parte sinistra delle ceruella.
- BB La destra; & amendue son coperte colla pia madre.
- C L'instrumento dell'odorato del lato manco.
- D Quel del diritto.
- E Il seno, al qual s'appoggia l'organo diritto dell'odorato, insieme coll'ottauo osso del capo.
- F La sesta vena, che va alla testa, & manda al cuni ramuscelli alla dura madre.
- G Il tramezzo, che diuide i seggi dell'odorato.
- H Vna pte della dura madre, che diuide la parte sinistra delle ceruella dalla destra.
- I La parte di sotto delle ceruella, che rispode in figura al craneo.
- k La quinta vena, che entra nella testa. per lo buco del secondo paio de nerui della ceruella.
- L Il seno dell'osso della collottola, nel qual s'incassa il celabro dal suo lato.
- M La collina, che si fa nel mezzo della parte di dentro dell'osso della collottola.
- N Il seno del medesimo osso, nel qual s'incassa il celabro dal suo lato.
- O Il seno sinistro della dura madre, o il secodo,
- P Il terzo.
- Q Il primo.

Figura XXIII.

IN questa Figura sono le Ceruella del tutto volte in dietro, perche si veggino gli organi dell'odorato, & doue si congiungono i nerui della vista, & i maggior rami dell'arteria del sonno.

- AA Le ceruella della parte manca, coperte con la pia madre.
- BB Quelle del lato diritto.
- CC I processi delle ceruella, simili alle tette.
- DD I seggi dell'instrumento dell'odorato.
- E Il tramezzo, che diuide questi seggi.
- EF I seni, ne quali si posano i processi delle ceruella, simili alle mammelle.

- GG La sesta vena, che entra nel capo.
- H La quinta.
- I Vna vena, che va alla pia madre, & nasce delle vene della dura.
- K Il principio della vena, che va per la dura madre; la quale si vede piu chiaramete nella prima figura notata con la D.
- LL Gli organi dell'odorato, riuolti verso dietro insieme colle ceruella.
- M Doue si congiungono i nerui della vista.
- NO I nerui della vista, chiamati Optici, accompagnati da una venetta, che in questa parte nasce dalla pia madre.
- P Vn ramo dell'arteria del sonno, che pertugia la dura madre, dal lato della glandola, che riceue la flemma della testa.
- Q Vn ramuscello di questo ramo, che va al uentricolo manco delle ceruella.
- R Vn altro ramuscello del medesimo, che manda alla pia madre alcuni ramuscelli.
- S Vna parte del condotto, che riceue la flemma della testa.

Figura. XIII.

IN questa Figura è restata sola vna parte delle Ceruella; perche si possa vedere il nascimento de nerui.

- AA Vna parte delle ceruella insieme col principio della nuca.
- BB Li nerui della vista, il principio de quali insieme col luogo, doue si congiungono, è tolto via, perche si possa uedere il condotto.
- CC Il condotto, che riceue la flemma della testa.
- D Qui risponde il riuolo, che viene dal terzo ventricolo delle ceruella (per lo qual si purga la flemma) che è notato con la I nella settima, & ottaua figura.
- E Il ramo sinistro dell'arteria del sonno, il qual rompe la dura madre al lato la glandola, che riceue la flemma.
- F Il ramo diritto.
- G Il secondo paio de nerui delle ceruella.
- H La radice piu sottile del terzo paio.
- I La piu grossa.
- K Il quarto paio di nerui, che sta appresso alla piu grossa radice del terzo paio.
- L La minor radice del quinto paio.
- M Il principio del sesto paio.
- N I principij del settimo paio. Il restate di questa

figura

figura si conosce senza lettere da per se, per quello, che nell'altre habbiamo detto.

Figura XV.

Questa Figura mostra il foggio dell'osso Cuneale da per se, & coperto dalla dura madre, perche sopra lei si vegga l'imbuto; & canale, per doue si purga la flemma.

AB
C

Parte de nerui della vista.

L'arteria del lato diritto, il qual forando in questa parte la dura madre si distribuisce parte per la pia madre, parte per lo primo ventricolo delle ceruella.

D

L'arteria del lato manco.

E

Qui sta l'imbuto, & condotto, che raccoglie la flemma, raccolto, & buttato in dietro.

F

Il buco di questo imbuto, che risponde alla glandola, che riceue la flemma.

GG

Parte del secondo paio di nerui.

Figura. XVI.

In questa Figura si dipinge la Glandola che riceue la flemma, & l'imbuto, o condotto, & l'arterie del sonno, le quali son qui differenti, come il piu delle volte si ruouano.

A

La glandola, che riceue la flemma.

B

L'imbuto, o condotto, che ricoglie la flemma, cascato in giù.

CC

Parte dell'arterie del sonno, le quali son torse, secondo che vāno per l'osso della testa.

D

Vn ramo dell'arteria diritta, che si distribuisce per la dura madre dal suo lato.

E

Vn altro ramo della medesima, che va al voto del naso.

FF

In questa parte è differente l'arteria dell'vn lato, da quella dell'altro, perche l'vna si diuide in due rami, l'altra nò.

GG

Alcuni ramuscelli di queste arterie, che van no alla dura madre, & si distribuiscono, parte per gli ventricoli delle ceruella, parte per la pia madre, che cuopre il fondo delle ceruella.

H

Vn ramo d'arteria, che esce per lo buco del secondo paio di nerui, & va col neruo della vista all'occhio.

Figura. XVII.

In questa Figura si mostra quella rete, tanto marauigliosa, come dice Galeno; la quale, ne in huomo, ne in alcun'altro animale insino ad hora ho potuto vedere. La A & la

B notano l'arterie, che subito, come entrano nel craneo, si conuertono in la rete; la C & la D, i rami, ne quali la detta rete si raccoglie, che sono simili a i rami dell'arterie, che dinotano la A, & la B. La E nota vna glandola, che riceue la flemma.

Figura XVIII.

In questa Figura si mostrano l'arterie, che entrano nella testa p gli lati della glandola, che riceue la flemma; secondo che si veggonò nelle pecore; perche si conosca, che differenza è tra queste, & quelle dell'huomo.

A
BC

La Glandola detta.

L'arterie.

Figura XIX.

In questa Figura si vede l'imbuto, o condotto, che raccoglie la flemma, rileuato; & quattro canali, che portano la flemma dalla glandola a i buchi (per doue si purga) che rispondono al palato.

A
B

La glandola.

CD

L'ombuto.

E F. I quattro canali.

Tauola III. Figura I.

Dichiaratione delle lettere delle Figure de gli occhi, & prima della prima. Nella quale si mostra l'occhio insieme col neruo della vista diuisi per mezzo (dal lagrimale al cāto di fuori) come chi fendesse vna cipolletta insieme col torso, o tallo. Et è da notare, che nel piu di qste figure mi è stato forza di partirmi dal Vesalio.

A
B

L'humor cristallino.

La tela, che cuopre la parte di nanzi dell'humor cristallino, sottil come tela di ragno o ragnatelo; & per ciò chiamata Aranea.

C

L'humor vitreo.

D

La sustanza del neruo della vista.

E

La tela chiamata retina, che si fa della sustanza del neruo della vista.

F

Vna parte della pia madre, che fascia il neruo della vista.

G

La tela, che si chiama la vnea, la qual si fa della pia madre.

H

In questa parte si ripiega inuerso dentro la vnea, & fa vn voto tra se stessa, & la cornea.

Il buco

Dichiar. delle Fig. del Lib. V.

I	Il buco dell'vnea, che fa la pupilla dell'occhio.		
K	La tela, che nasce dell'vnea, & è simile alle ciglia; benché questa, & quella, che notammo con la B, credo che sia tutt'vna.	ab	L'ottava figura mostra tutti gli tre humori insieme. La a nota il Vitreo: la b l'Acquoso; la c la diuision di questi due, mediante la tela aranea; & il cāpo ouato, che si fa nel mezzo, nota il cristallino, che nō si vede per esser nel mezzo d'amendue.
L	Vna parte della dura madre, che fascia il neruo della vista.	c	
M	La tela dura, o bianca dell'occhio, che nasce della dura madre, che fascia il neruo della vista.		I X.
N	La parte di nanzi della tela dura o bianca, che transpare, come corno, chiamata per ciò la cornea.		La nona figura nota la Tela, che cuopre la parte di nanzi dell'humor cristallino; la quale è molto chiara, & in questa figura si vede per lato.
OO	L'humor acquoso; & la O piu bassa dinota il luogo, doue si fanno le cataratte.		X.
PP	I muscoli, che muouono l'occhio.		La decima figura mostra l'humor cristallino per lato, coperto con la medesima tela, che mostrò la nona figura; nella quale la d & la e notano la parte di dietro dell'humore, che non è coperta con questa tela.
Q	La tela bianca, che nasce del fin de muscoli.	de	X I.
R	In questa parte non è muscolo alcuno (come dice il Vesalio) ma grasso.		L'vndecima figura mostra la Tela, che nasce dell'vnea, che pare i peli dell'occhi; & il nascimēto suo notano le due g; & il fine, che si congiunge cō la tela, che cuopre l'humor cristallino, notano le due f.
	Il resto delle figure, che seguono, tutte mostrano le parti dell'Occhio. Le prime gli humori, l'altre le tele, & tutte insieme si referiscono alla prima, perche se guono il medesimo ordine, cominciando dall'humor cristallino & seguitando in fuore.	gg	X I I.
	I I.	ff	La duodecima figura mostra la medesima tela, che l'vndecima, eccetto che in questa s'attacca all'humor cristallino; & le due h notano la tela, & la i l'humor cristallino.
	La secōda Figura mostra solo l'humor Cristallino, considerato dalla banda di nanzi.	hh	X I I I.
	I I I.	i	La decimaterza figura mostra la tela chiamata Retina da lato per la parte di fuori, insieme col neruo della vista, del qual nasce; il qual dinota la k.
R	La terza mostra il medesimo humore da lato; & la R mostra l'asprezza, doue si attacca la tela simile a gli peli dell'occhio, la qual si vedrà nell'vndecima, & duodecima figura.	k	X I I I I.
	I I I I.		La decimaquarta figura mostra la tela Vuca per la parte di dentro; perche è rouesciata, secondo che si fa, quando si mostra. Et la l nota la parte sua, che nasce della pia madre, la m quella, che si riulta in dentro.
S	La quarta mostra l'humor Vitreo per la parte di nan zi, toltone via l'humor cristallino, che staua nel fosso, che nota la S.	l	X V.
	V.	m	La quintadecima figura nota questa medesima tela per la parte di fuori, insieme col neruo della vista, & la pia madre, che l'cuopre. Et in questa figura la n nota la sustanza del neruo; la o, la pia madre; le due pp notano alcuni ramuscelli di vene, che nascono della tela dura dell'occhio, & si distribuiscono per questa; & le due qq notano, doue la vnea comincia a doppiarsi in dentro; la, r il buco della pupilla.
T	La quinta figura mostra il medesimo, che la quarta, eccetto che l'humor cristallino sta nel suo luogo, notato colla T.	n	
	V I.	o	
V	La sesta nota l'humor Vitreo da vn lato, insieme con l'humor cristallino, che è incassato in lui, & notato con la V.	pp	
	V I I.	qq	
x Y	La settima nota l'humor Acquoso, come sta nell'occhio, & cuopre la parte di nanzi dell'humor cristallino, che è notato con la X; & la Y nota la parte di questo humore, che si contiene tra la vnea, & la cornea.		



Dichiar. delle Fig. del Lib. V.

XVI.

s La figura decimasesta mostra la tela dura per lato, & datole vn taglio i trauerfo, perche si veggino le vene, che vanno da lei alla vnea. Et in questa figura la **s** nota il principio del neruo della vista, insieme con le due tele, che l'asciano, & con le **tt** ne, & arterie, che l'accopagnano; le due **tt** le vene, & arterie, che vano per la tela dura; le due **uu** la tela vnea, che si vede per lo **x** taglio, che demmo nell'vnea; la **x** nota la parte della tela dura, che e liscia come cor- **y** no; la **y** il buco della pupilla. XVII.

La Figura decimasettima mostra la tela dura per la parte di fuori, insieme con vna grã parte del neruo della vista, il qual nota la **a**; & la **β** la pia madre, che la fascia; la **γ** la dura; la **δ** le vene, & arterie, che accompagnano il neruo della vista; la **x** & la **y** notano il medesimo, che nella passata.

XVIII.

La Figura decimaottaua mostra per vn lato l'occhio senza palpebre, cauato del craneo, con li suoi muscoli. Nella quale la **e** nota la sustanza del neruo della vista; le due **ζζ** i due muscoli; le **λλλ**, il grasso, che abbraccia tutto il neruo della vista d'intorno; le due **nn** la tela bianca dell'occhio; la **θ** il negro dell'occhio, doue finisce la tela bianca, & s'attacca fortemen- **te** alla cornea; la **κ** la pupilla.

XIX.

La Figura decimanona mostra la parte dinanzi dell'occhio, toltone via le palpebre. Nella quale la **λ** dinota la glandola del lagrimale; le due **η** & la **θ** notano il medesimo, che nella passata. Queste son tutte le parti dell'occhio cominciando di dentro; & s'alcuno volesse cominciar di fuori, cominci a contare dalla decimanona, & vada infino alla prima.

XX.

In questa ventesima Figura si mostrano i feramenti necessari a far la Anatomia, posti sopra vna tauola, come quelle, che vñano gli Anatomisti, quando vogliono aprir alcun animal viuio; & la tauola e posta sopra vna panca.

AA

La panca.

BB

La tauola.

CC

Diuersi buchi, che si fanno nella tauola, ne quali si pongono alcune corde, secondo che sono di mestieri per legar le gambe, & le braccia del l'animal, che vogliono anatomizare.

DD

Questi Arpioni seruono per legar mani, & piedi.

E

A questo Arpione si lega la mascella superiore, lasciando sciolta l'inferiore, perche non possa dimenare il capo, & perche possa risfiatate, abbaiare, grugnire, o stridere.

FF

Diuersi sorti di rasoi, sopra i quali e vna spugna, molto necessaria, per nettare il sangue.

G

Coltelli, come da scriuanie.

H

Vn coltello ordinario.

I

Vn altro molto maggiore.

K

Due coltelli di busso, che seruono a separar l'vna tela dall'altra; benchè a questo molto meglio serue il dito.

L

Alcuni rampini, per tenere, quando tagliano alcuna cosa.

M

Alcune tente, insieme con vna Argalia, o siringa, per cauar l'orina.

N

Alcuni aghi col suo filo, storti, per cucir la pelle sopra la carne, dopo l'hauere apparecchiato quel, che si ha da mostrare a gli studenti.

n

Alcun'altri aghi piccioli per cucir ferite.

O

Vna sega, per segare il craneo.

P

Vn paio di forbice.

Q

Vna mazza per aiutare a tagliare alcuna cosa al coltellone.

R

Certe cannucce per gonfiare i polmoni per la canna loro.

S

Filo di rame per legar l'ossa, quando si fa lo Scheleto.

T

Vna lesina per forar l'ossa per legarle.

V

Diuersi ferri di lesine.

T

Vn paio di tanaglie per torcer il filo di rame, con che si legano l'ossa.

X

Vn altro paio per tagliar il filo da poi, che e torto.

Figura XXI.

DImostra questa Figura vna Scrofa, o porca preña, legata sopra la tauola; sopra la quale sono i feramenti, secondo che ha da star legata per aprirla via. Et nel medesimo modo si può fare in qualunque altro animale; vero è, che la scrofa e molto a proposito per gli nerui della voce, perche grugne, o stride forte.

Il fine del Quinto libro.

LIBRO SESTO

dell'Historia della Compositione
del corpo humano.

SCRITTA PER GIOVANNI

VALVERDE MEDICO,

NEL QUALE SI TRATTA

delle Vene, & Arterie.

Che cosa sia Vena. Cap. I.



ABBIAMO armata, & coperta questa nostra Fabbrica, & posto in lei tre appartamenti, il ventre, il petto, & la testa (che sono le parti, in che ordinariamente si diuide il corpo), & detto come in queste tre staze habitano tre membri principali, ne quali (come in vna fornace) le cose necessarie al nutrimento, vita, & moto si formano. Hora è da sapere, che di questi tre principij nascono tre sorti di canali, per gli quali, come per acquedotti, comunicano la sua virtù a tutte le parti del corpo. Dico nascono, nõ perche io pensi che si facciano prima il fegato, il cuore, & le ceruella, che le vene, & arterie, & nerui; sendo così, che tutte le membra spermatiche del nostro corpo sono nella creatione loro vguualmente formate del seme, senza esser di bisogno, che l'vno nasca dall'altro; ma perche son fatti, come se nascessero di detti principij. Pure poco importa, o nascano di loro, o s'inferiscano; bastici sapere, che da essi ne già nati, come da fonte, prendono vigore, & sostegno, & mouimento mediat̃i questi canali tutte le membra, & che quelli, che nascono dalle ceruella, chiamiamo nerui; quelli che nascono dal cuore, arterie; quelli, che nascono dal fegato, vene. Delle quali incomincerò prima a trattare, per nascer dal primo, & piu imperfetto principio. Et insieme tratterò dell' Arterie, perche s'accompagnano insieme ordinariamente con le vene. Adunque son le Vene vna parte spermatica del nostro corpo, dissimile, & vota di dentro, per la quale (come per vn condotto) va il sangue a nutrir tutte l'altre parti; fatte d'vna particolar tunica, o tela, simile in figura, grossezza, & colore, all'altre tele, che sono nel corpo, anchor che assai differente nel resto. Perche la tunica delle vene è composta di tre sorti di fili; gli vni diritti, che vanno secondo il lungo della tunica; gli altri obliqui, che vanno in obliquo intorno intorno della tunica; gli altri circolari, o intrauersati. Ma gli obliqui, & intrauersati amendue camminano intorno, & si vengono ad incauallare, faccendo certi quadrelli nel mezzo; come facilmente, chi si voglia, potrà vedere, (se gli serà graue di cercare d'vna vena) in qual si voglia intestino, o vescica. Questa differenza di fili fa, che le vene sono parte dissimile. Perche l'altre tele cõmunalmente hanno vna sola sorte di fili, & per ciò son chiamate corpi simili. Questi fili, che hanno le vene, se ben son simili in figura, colore, & sustanza, a i fili de muscoli, nõdimeno son molto differenti nell'operare; perche quelli sono accompagnati da carne, & seruono al mouimẽto, che dipende dalla nostra volontà; questi non hanno carne alcuna, & seruono a fare vn mouimento naturale, che in niun modo dipende dalla nostra volontà, mediante il quale attraggono, ritengono, cacciano il sangue, o qual si voglia altro humore, che sia in loro, seruẽdo ciascuna sorte di fili ad vn particolar mouimento, cioè i diritti ad attrahere il nutrimento; gli obliqui a ritenerlo, & abbracciarlo in tal forma, che nol lasciano andar piu insù, ne piu in giù, di quel, che pel nutrimento del corpo è di bisogno; gli intrauersati lo

*Quel, che si è
trattato ne pas-
sati libri.*

*Che cosa sia
Vena.*

*La tunica delle
Vene in che co-
sa è differente
dall'altre tele.*

*I fili della tuni-
ca delle Vene, in
che cosa son dif-
ferenti da fili de
muscoli.*

Libro Sesto

discacciano. Di queste tre sorti di fili si fa vna tela bianca & neruosa, che è la prima delle vene; la qual facilmente s'allarga, o strigne, secondo che più o meno è piena di sangue.

Vn'altra tunica delle Vene.

Oltre a questa particolar tunica, ne hanno anche le vene vn'altra, commune a loro, & a molt'altre parti del nostro corpo, che le fascia, quando non sono coperte con alcun muscolo, o con alcun'altra parte dell'interiori (come non sono quelle, che comunamente veggiamo fra pelle, & carne); & principalmete se queste tali vene passano appresso ad alcun osso, o membro duro; o se passano senza attaccarsi a parte alcuna. Perche in tal caso subito nasce vna sottil tunica delle tele più vicine, & rinuolgedo la vena, serue a farla più forte, & legarla alle parti, per doue passa; come ce'l dimostra, il vedere che, quando passano per mezzo d'alcun corpo, che le guarda, non l'hanno; si perche essendo ben guardate non ne han di bisogno, come perche assai più disturberia, che'l sangue nō potesse così facilmente vscir di loro (il che fa risudando quello per queste tuniche), & perche le membra più difficilmente potrebbero alterarlo dentro delle vene, sendo le tele tanto grosse.

Come va il sangue dalle vene alle Membra.

L'offitio delle Vene.

Et per questa ragione niuna vena nella persona ha più sottili le tele, che quelle, che sono dentro del fegato; si perche conuertono il mangiare in sangue, come perche il nettano quasi da tutte le superfluità. L'offitio principal delle vene è (come habbiamo detto) portare il nutrimento alle membra; anchor che alcuni rami (come son que della vena detta porta) che passano per lo mesenterio, portino il mangiare dallo stomaco al fegato; & alcuni altre portano (come son quelle de rognoni) le superfluità alla vescica.

Che cosa sia Arteria, et che offitio, et sustanza habbia. Cap. 2.

Che cosa sia Arteria.

Che si contiene nell'Arterie.

ARTERIE chiamiamo hora a que vasi tondi, fatti d'un corpo sottil come tela, bianco, & voto di dentro, ne più ne meno, che le vene; per le quali passan gli spiriti, che danno la vita a tutto'l corpo, ricreando, & rinfrescando il calor d'esso, insieme col più sottil sangue del corpo, che lor serue per soggetto, & guida. Se bene nel tēpo d'Hippocrate, di Platone, & d'Aristotile, solamente chiamauano Arteria la canna del polmone, & quelle, che noi altri hora chiamiamo arterie, non le distinguean dalle vene, eccetto che in queste si sentia il polso, nell'altre nō, & queste haueano più caldo il sangue, che l'altre. Ma senza queste differenze, che facean essi, ce ne è anche dell'altre. Perche l'arterie hanno due particolari tele, o tuniche, che le cuoprono; delle quali quella di fuori è simile a quella delle vene, così in grossezza, come in fortezza; quella di dentro è quasi cinque volte più grossa, & tanto dura, che alcuni l'han chiamata Cartilaginosa, & gli Arabi la chiamarono Neruo compnso. Queste tuniche (ne più ne meno, che quelle delle vene) son composte d'alcuni fili; quella di dentro ha solamente gli intrauerfati; quella di fuori gli diritti, & alcuni, che vanno alquanto in obliquo, non dimeno non ne ha de gli intrauerfati. Il che non fu fatto senza gran mistero; perche hauendo l'arterie per offitio di contener gli spiriti (come habbiamo detto) & rinfrescar il calor naturale mandando gli spiriti del cuore a tutte l'altre parti del corpo, fu di bisogno hauere più fili intrauerfati, medianti e quali manda o scaccia gli spiriti, che non obliqui, medianti i quali gli ritiene. Quella di dentro ha vna pelle, simile a quella, che ha lo stomaco & gl'intestini per la parte di dentro, o alla tela de ragni; la qual ne rami più grossi si vede tato manifestamente, che alcuni l'hanno posta per terza tunica. Oltre a queste tuniche ne hanno vn'altra in alcune parti, come quelle, che habbiamo detto hauer le vene. Sono le tele dell'arterie più gagliarde, che quelle delle vene, per rispetto del continuo mouimento, per el quale facilmente si potrebbero rompere non essendo gagliarde; & più massiccie, perche gli spiriti non si risoluano così facilmente.

a t. iij.

b lib. j. t. vij. fi. j. ij.

Che differenza è tra le Vene, et Arterie.

La sustanza, et tuniche dell'Arterie.

c t. iij. fig. ij. A, B, B

Del numero delle Vene, & Arterie.

Cap. 3.

Division delle Vene.

SI come voler contare tutti gli rami delle vene, che sono nel corpo, grandi & piccioli, è cosa non meno impossibile, che superflua; così contare i principali, che hanno diuersi principij, & processo, è tanto facile, quanto necessario. Hora sono le vene ne gli huomini tre. La prima nasce del lato di dentro del fegato, & si distribuisce per la vescica del fiele, p lo stomaco, milza, reticella, mesenterio, & intestini. Questa vena si chiama la Porta,

a t. iij. fi. j.

b ta. ii.

c ta. iij. fi. iij.

d t. iij. fi. v. t.
v. fi. vij. vij.
fi. iij. fi. ij.

G

c t. iij. t. v.

f t. iij. fi. iij.

g ta. v. fi. vij.
vii. u. u. lib.
iij. fi. ij. KL

la Porta, perche per lei, come per vna porta, entra il nutrimento dello stomaco & degli primi intestini, al fegato. La ^b seconda nasce della parte di fuori del fegato, & si distribuisce per tutte l'altre parti del corpo (eccetto che per lo polmone) con infiniti rami, & ramuscelli; & chiamasi la Vena Grande o caua, perche in lei, come in vna Caua, si conserua tutto il sangue. La ^c terza nasce del ventricolo del lato diritto del cuore, & si sparge per tutto il polmone; & si chiama la Vena Arteriale, pche ha la tela dura, come l'arterie. Oltre a queste vene ne è vn^d altra, che va dal bellico infino al fegato, & iui s'inferisce nella vena porta; & serue a nutrire la creatura nel corpo della madre; la quale io hora nō coterò per vena da per se, perche non serue a niēte ne gli huomini, & perche pare ramo della vena porta. L'Arterie nō son piu di due. La ^e prima delle quali nasce del seno, che è nel lato sinistro del cuore, & si distribuisce per tutte le parti del corpo, eccetto, che per lo polmone, & si chiama l'Arteria Grande. La ^f seconda nasce del medesimo seno, & si sparge per lo polmone, & si chiama Arteria Venale, per ragion della tunica, che ha, simile a quella delle vene. ^g Ci sono anche altri due rami d'Arterie, che vanno dall'ombilico per gli lati della vescica, & s'inferiscono, ognuno dal suo lato, nel tronco dell'arteria grande, appresso l'osso grande; le quali non piu si hanno da contare per arterie da per se, che la vena che va dal bellico al fegato.

Divisione dell'Arterie.

*Delle Glandole, che sono iui, doue le Vene, o l'Arterie
si spartono in rami. Cap. 4.*

A che seruono queste Glandole

In che parti sono piu Gládole o meno.

La sustanza delle Glandole.

Le Gládole, che ricenono le superfluità.

Quelle, che seruono a mollificare il luogo, doue sono.

a lib. iij. fi. iij.
c. fi. xj. h
b t. v. fi. x. dal
u alle due
PP
c li. iij. fig. i.
II

d li. iij. fi. xi. l

e la med. fig. iij. iij. HH

f lib. iij. fi. x. MM

g li. v. fi. vii. L. fi. viii. M. fi. x. D

h li. v. fi. xvi. A. fi. xvii. E. fi. xix. A

i li. ii. t. vi. F. li. iij. fi. xiii. EE

k li. iij. t. xvi. fi. xvi. R

HANNO le vene, & arterie in ogni parte, oue si diuidono in rami, certe Glandole intorno, simili a i nodi, che si veggono ne gli alberi; le quali seruono parte a fare, che in queste parti le vene, & arterie sian piu gagliarde, & non si possano fendere o aprire nell'entrar per loro gli spiriti, & il sangue; parte a far lor suolo, quando passano sopra alcuna parte dura. Ma è da notare, che non sono vguualmente in tutti e rami queste glandole; anzi, come dicemmo esser le tele in quelle parti delle vene & arterie, doue sono scoperte, o passano sopra alcun'osso; così anche queste glandole si vegono piu, & piu grosse, quando le vene o l'arterie fanno rami, che pendono da alcune tele, o passano sopra qualche congiuntura, od osso acuto; come si vede nella vena chiamata ^a Porta, la qual tutta si distribuisce allo stomaco, milza, & intestini, senza attaccarsi ad altra parte, che ad alcune sottili tele. Et nel medesimo modo si veggono ^b nelle vene, che vanno per le ^c tele, che abbracciano il voto del petto; & per la tunica, che abbraccia le ceruella, principalmente per quella, che cuopre quella parte loro simile a i testicoli. Si veggono anche queste glandole sotto la piu alta parte dell'osso del petto, sotto l'orecchie appresso il gargarozzo, sotto le Diteila, nella sanguinella del braccio, nelle Anguinaie, nel chino del ginocchio, & in molti altre parti, come particolarmente noteremo a suoi luoghi. Queste Glandole son fatte d'vna carne spugnosa, piu apparecchiata a riceuer superfluità, & humori, che niuna altra parte del nostro corpo; benché non lascia d'esserui alcuna differenza tra loro, in sustanza, colore, figura, nome, & durezza. Perche alcune son piu tenere, & rosse, & molto differenti dalla figura della Ghiada; come è ^d quella, che è al principio de i più sottili intestini, poco piu in giù del fondo dello stomaco; & ^e quella, che è nella piu alta parte della piu bassa tela della reticella, sotto lo stomaco, la qual per esser tato rossa, & simile alla carne, & morbida vguualmente da ogni parte, fu chiamata da Greci Pácreas, che vuol dir tutta di carne, E anche molto simile a questa, quella, che è sotto l'osso del petto, nella cana della gola. Altre se ne veggono in alcune parti del nostro corpo simili ad vna Ghiada, le quali hanno diuersi nomi secondo il luogo, doue sono; come son ^f quelle, che sono nel mesenterio, che comunalmente chiamiamo le Animelle; & quella, ^g che è nelle ceruella simile ad vn pignuolo o pinocchio. Ci sono anche altre sorti di Glandole nel corpo, le quali nō seruono, come le sopra dette, per fortificare il mébro, nel qual sono, anzi per riceuer le superfluità, che si creano i lui; come quella, ^h che è sopra l'osso cuneale, che riceue la flemma della testa, & la purga per la bocca, & naso; & ⁱ quelle, che sono nella radice della lingua; & quelle, che stanno sotto le ascelle, & nell'anguinaie, & dietro l'orecchie; & quelle, ^k che stāno nel collo della vescica de gli huomini, nelle quali (come diremo) s'inferiscono i cōdotti o canali del seme. Alcuni altre seruono a mollificare il luogo, doue

Libro Sesto

doue sono; come quelle, che sono nell'intestino, che è attaccato al fondo dello stomaco, chiamato il Duodeno; & quelle, che stanno nel mesenterio. Altre à empier i luoghi, doue si truouano, come quelle, che hanno le donne da lati della noce, & sotto l'orecchie. Quelle delle poppe, oltre che seruono ad ingenerare il latte, fanno le poppe piu dure. Altre hanno piu altri diuersi offitij, come a suoi luoghi particolarmente diremo.

Del Nascimento, & distributione della Vena, chiamata Porta. Cap. 5.

DICEMMO che la vena chiamata Porta nasce dalla parte di dentro del fegato, che è gobba; & si distribuisce allo stomaco, alla milza, alla reticella, a gl'intestini, & al mesenterio. Segue hora che diciamo il modo, nel qual nasce, & si distribuisce. Hora è da sapere, che nascono certe molto sottili vene di tutto intorno del fegato, le quali vanno per la parte di dentro del fegato, verso il suo mezzo, congiungendosi di mano in mano, l'una all'altra & facendo piu grossi rami, infino che ultimamente si vengono a congiungere tutte ordinariamente in cinque rami, & alcune volte in meno. Et tutte insieme si conuertono nella medesima parte di dentro del fegato, alquanto piu in dentro. & verso dietro, appresso la schiena, in vn grande, & grosso tronco, il qual (come habbiamo detto) si chiama la vena porta. Fatta che è questa vena nella forma detta, scende subito alquanto in obliquo verso il lato manco, gettando alcuni piccioli rami, cio è di mezzo della parte sua di nanzi appresso il fegato due molto sottili rami, i quali si vanno ad inferire nel collo della vescica del fiele, abbracciandola in torno, & diuidendosi dipoi in molti piccioli rami (come que, che veggiam nella tela bianca dell'occhio) che si spargono per tutta la sua tela, o tunica di fuori. Et della medesima parte di nanzi, alquanto piu in giù, verso il lato diritto, ne nasce vn altro, piu grosso, che i primi, il qual va ad inserirsi nella bocca del fondo dello stomaco, mandando alcuni ramuscelli alla parte sua di dietro, appresso alla schiena. Gettati questi ramuscelli scende alquanto più in giù, & si sparte in due tronchi, vno minore, che va al lato manco, & vn altro maggiore, che va al diritto. Il manco getta subito due ramuscelli; vno a man destra, il qual va alla parte destra della tela di sotto della reticella, & alla parte dell'intestino chiamato Colò, che passa per questo luogo; vn altro a man manca, che si parte in alcuni ramuscelli, che vāno alla parte destra dello stomaco, che è verso le spalle. Passando vn poco piu in nanzi getta dal lato diritto alcuni ramuscelli, che si distribuiscono per le Glandole, che habbiamo detto esser nella tela di dentro della reticella. Dopo a questo fa vn altro ramuscello, che è il maggiore di quanti ne vanno allo stomaco, & si distribuisce anche per la tela di sotto della reticella. Questo ramo monta in obliquo verso il lato manco, per di sotto la parte dello stomaco, che risponde alle spalle, alla qual manda due piccioli rami, vno per bada, che si diuidono in molti altri ramuscelli. Et quindi monta per la medesima parte di dietro dello stomaco al lato diritto della bocca sua, alquanto verso nanzi; & abbreviando tutta la parte di nanzi della detta bocca ritorna di dietro circondandola tutta, come vna corona, & gettando sempre alcuni ramuscelli, che scendono per lo stomaco; & altri, che montano per la parte della canna della gola, che si congiunge allo stomaco. Et tra gli altri rami ne fa particolarmente vno, che nasce della parte destra della vena; & scende per lo lato di dietro della bocca dello stomaco verso nanzi infino al suo fondo, abbracciando la bocca sua piu bassa con alcune venuzze, & gettando alcuni piccioli raggi ad ogni parte intorno intorno. A questa vena (che habbiamo detto montare allo stomaco con tanti rami) ne risponde vn'altra, che nasce della parte di sotto del medesimo tronco, & s'inserisce nella tela, o tunica di sotto della reticella; la quale poco da poi, che è nata, si sparte in due rami, molto separati l'uno dall'altro, e quali subito si diuidono in molti piccioli ramuscelli, che scendono spargendosi per quella parte dell'intestino grosso, che si congiunge alla schiena mediante la tela di sotto della reticella, come se fusse vna parte del mesenterio, & anche per l'istessa tela della reticella. Dapoi, che questo ramo ha gettati questi ramuscelli, subito si diuide in due rami, & questi in due altri, & cosi di mano in mano, infino che con vn gran numero di ramuscelli si sparge dirittamente per tutta la milza, aiutati sempre dalla tela di sotto della reticella. Non dimeno dal ramo, che va alla parte piu bassa

Come nasce la vena Porta del fegato.

Cinque rami di questa Vena. Il tronco. I rami, che vanno al Fiele.

Quel che va al fondo dello Stomaco.

Divisione della vena Porta in due tronchi.

La vena, che va al lato diritto dello Stomaco.

La vena, che abbraccia la bocca dello Stomaco. Vn altro ramo.

La vena, che va alla tunica piu bassa della Reticella.

Quella, che va alla Milza. Quella, che va alla tela di sotto della Reticella.

a t. iii. fig. i. AAAA.

b la me. 1. 2. 3. 4. 5.

c la med. B.

d la me. CC

e lib. v. ta. iii. fi. xviii. xix

f t. iii. fi. i. D. li. iii. fi. xiii. xiii. e

g t. iii. fi. i. E h G

i L

k a. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

l M m N

n O O

o t. iii. fi. i. P. li. iii. fi. xiii. d

p t. iii. fi. i. R. t. v. fi. iii. g

q t. iii. fi. i. s. t. v. fi. iii. h r la med.

f la me. TT t aaaa

u V

x x x. Y

y z

z G

a b, b, b

b c, c

c li. iij. fig. x.

R, S, T

d la med. fig.

v. vij. dal

Q al T

e ta iij. fig. j.

d, d, d

f la med. c, e

g lib. iij. fig.

viii. M, M

h la me fi. x.

M, M

i t. iij. fi. j. C

k la med. TT

bassa della milza, innanzi che si diuida in tanti ramuscelli, nasce vna vena sottile, la qual si distribuisce con due rami per la tela di sotto della reticella, principalmente quando il primo ramo della maggior vena, che appartiene a questa sopra detta tela, è tanto picciolo, che non si sparge per tutta la reticella. Et del ramo, che sta appresso il più alto ramo di que, che vanno alla milza, nasce vna ^x vena, vn poco innanzi, che arriue alla milza, la qual monta pel lato manco dello stomaco, infino appresso alla bocca sua. La qual cosa si vidde chiaramente qui in Roma, nella sede vacante di Papa Paolo terzo, nel Cardinale Cibò, il qual morse d'vn vomito di sangue, & fu aperto. Et per veder doue procedea, sprememmo lo stomaco, & subito si vedea manifestamente gonfiare la milza; & al contrario premendo la milza si vedea manifestamente empier lo stomaco di sangue per questa vena; che era notabilmente grossa, & montaua quasi alla bocca dello stomaco. Nell'istessa forma nasce y vn'altra vena del ramo, che va alla parte più bassa della milza, alquarto più larga; la quale storce à man dritta, ne più ne meno, che la passata, & s'inferisce nel lato manco del fondo dello stomaco, rispondendo alla vena, che habbiamo detto calare alla bocca medesima per lo lato destro. Perche amendue le vene finiscono nel suo mezzo, in certi piccioli rami, che si cōfondono gli vni co' gli altri; & la sinistra getta alcuni ramuscelli al lato sinistro del fondo dello stomaco, così verso la parte di dietro, come verso quella dinanzi, ne più ne meno, che la destra; & insieme mandano alla tela dinanzi della reticella molti rami. Accade anche molte volte, che d'ognuna delle due vene, che s'inferiscono nel cōcauo della milza, vn poco innanzi, che arriuiuo a quella, ne nascono altre due picciole vene, che si vanno ad inferire nello stomaco, appresso doue habbiamo detto esser l'altra; anzi non sono differenti in niente dall'altre vene, che si veggono nello stomaco ne in colore, ne nel modo dell'inferirsi. Questi sono i rami che getta il tronco sinistro. ^z Il destro (che va a nutrir gli intestini) tosto che arriua alla reticella, si diuida in ^a tre principali rami, e quali si spartono in infiniti ramuscelli, che sono sparti tra le tele del mesenterio, & abbracciano la parte di dietro de' gli intestini, che è attaccata al medesimo mesenterio, faccendo fine nell'intestino chiamato il Digiuno, & nel Sortile, & nel Cieco, & nel lato destro dell'intestino grasso, iui, doue s'attacca a i rognoni & al fegato. Quanti sian questi rami, è molto difficil cosa da sapere, si per non esser in tutti il medesimo cōto, come perche ne anche tengono tutti vn ordine, anchor che (come habbiamo detto) tutti vadano a' gli intestini. Ma dal terzo ramo (che si comparte principalmente per lo lato manco della parte di mezzo del mesenterio) nasce ^b vna notabil vena, che s'inferisce nella parte del ^c mesenterio, che congiunge l'intestino ^d grosso alla schiena, dalla milza infino all'intestino retto; & di poi fa altri rami, che s'inferiscono nella parte dell'intestino colon, che piglia dal lato manco dello stomaco infino all'intestino retto. Vi è anche ^e vn'altro ramo molto grande tra quei, che vanno alla parte di dentro del lato manco del mesenterio, il qual passa fra le due sue tele, ne più ne meno, che gli altri rami, p di sotto l'intestino grosso in fino al principio dell'intestino detto retto; & seminando per la parte sua di sotto molti rami, arriua al fondamento, doue non solo occupa la parte sua di dietro, ma mada molti rami per tutte le parti, che abbracciano intorno intorno esso fondamento. Et è da notare, che se ben questi tre rami detti gettano infiniti ramuscelli a tutti gli intestini, nondimeno assai più ^s ne mandano a' gli intestini sottili, che a' gli grossi, come ognuno potrà facilmente vedere in qual si voglia corpo; perche con più sono gli intestini appresso el fondo dello stomaco, tanto più hanno vene, attento che di queste piglia il fegato più nutrimento, che delle più basse. Et come habbiamo detto che in alcuni rami della vena porta vi erano al principio certe glandole, che abbracciavano le vene, così anche sono nel ^h mesenterio, iui, doue gettano alcuni rami; le quali son tanto maggiori o minori, quanto è maggiore, o minore il ramo, che fanno. Questa è tutta la distribuzione della vena porta; il cui principal officio è portare il nutrimento dallo stomaco al fegato. Serue oltre di ciò a nutrire lo stomaco, gli intestini, la milza, & tutte l'altre membra della digestione, per le quali si distribuisce, & a purgare alcune superfluità del sangue. Quelle, ⁱ che vanno al fiele, seruono a nutrire la prima sua tunica, o camicia. Ne più ne meno quelle, ^k che vāno alla milza, seruono a nutrir la milza, & per consequente a nettare il fegato dal sangue grosso. Quella, che va dalla milza allo stomaco, serue, che per essa si purghe quell'humor grosso, che la milza lascia come superfluo, o vada alla bocca dello stomaco, o al fondo,

Quella, che va
allo Stomaco.

Quella, che va
al fondo dello
Stomaco.

Altre vene, che
sogliono gire al-
lo Stomaco.

Il tronco destro
della vena Por-
ta.

Le vene, che sup-
no le Morene.

L'officio della
vena Porta.

Libro Sesto

Nella qual cosa è vna gran differenza tra i Medici; perche de Greci solo Paolo Eginetta (che io habbia veduto) dice, che monta alla bocca. Il vero è, che ordinariamente viene al mezzo dello stomaco, & da indi in giù, ma in alcuni corpi va alla sua bocca; come già ho detto del Cardinale Cibò; & in altri particolarmente io l'ho veduto. Gli altri rami della vena porta, che si distribuiscono allo stomaco & intestini, alcuni vanno a nutrir queste membra, alcun'altri pigliano il nutrimento dallo stomaco, & da gl'intestini, & lo mandano al fegato per vn^l condotto grosso, fatto di tutte queste vene (come per vna porta) dal che fu la vena chiamata Porta. Il ramo di questa vena (che habbiamo detto passar sotto l'intestino retto, & per lo mesenterio) getta alcuni rami, che vanno insino al fondamento, & fanno i capi di quelle vene, che chiamiamo le Morene, o vero Morice; le quali s'aprono ogni volta, che la milza non riceue il sangue grosso, che'l fegato le manda; o, quando anche il riceua, non lo manda allo stomaco; perche allhora si gonfiano queste vene, & scoppiano per le dette morene. Et in questa cosa è da notare, che volendo trar sangue ad alcuno per rispetto del fegato, della milza, dello stomaco, intestini, reticella, & mesenterio, per niuna altra parte il potiamo fare, che per le morene; & per queste da niuna parte del nostro corpo, eccetto appresso il fondamento.

A che parte del corpo gioua piu cauar sangue p le Morene.

l t. iij. fig. j. B
li. iij. fi. xj.
h

Della Vena grande, & prima doue si congiunge nel fegato co i rami della Vena Porta. Cap. 6.

Che vene nascono del Fegato.

Come si distribuiscono le vene per lo Fegato.

Come si comunica il sangue della vena Porta alla grande.

ANCHOR che sia assai gran difficoltà tra i Medici, & Philosophi, se la vena Grande piglia principio dal fegato, o dal cuore; pure (perche non è dubbio, che secondo l'ordine del nostro corpo, il mangiar va dalla bocca allo stomaco; & indi per alcuni rami della vena porta al fegato, doue manifestamente si conuerte nel sangue, che dipoi si distribuisce per tutto il corpo) io direi, che questa vena nasce piu tosto dal fegato, che da niuna altra parte. Hora è da sapere, che si come dal concauo del fegato di tutto intorno habbiamo detto nascer^a di molte vene picciole, le quali camminando verso il mezzo del fegato alquanto verso in dietro, si congiungeano l'una all'altra, conuertendosi di mano in mano in altre grosse radici, insino che di tutte insieme si faccia vno tronco grosso; cosi, ne piu ne meno, nascono dalla parte curua del fegato di tutto intorno infinite vene. Anzi la sustanza del fegato non è altra cosa (come nel terzo libro habbiamo detto) se non molte vene congiunte, coperte di sangue gelato; le quali camminando verso il mezzo (come dicemmo) & congiungendosi l'una all'altra, si fanno di mano in mano maggiori, insino che tutte si vengono a congiungere^b nella parte piu alta del fegato, che risponde al lato destro de nodi della schiena; doue si couertono in vn grosso tronco, che passa per tutta la parte di dietro del fegato, faccendo vna picciola impressione per tutto lo spatio, doue passa, in tal modo, che chi mette vna bacchetta per lo tronco, facilmente passa senza entrar nel fegato. Questo tronco mada rami a tutto il corpo (come piu in giù diremo), & chiamasi la vena Caua, o Grande. A questa vena si comunica il sangue della Porta, o congiungendosi i capi delle radici dell'una a i capi delle radici dell'altra, o risudando il sangue alla sustanza del fegato, & indi alle radici della vena grande. Le quali riceuono il sangue, che la vena porta ha fatto, & purgato dalla collera & maninconia, & lo mandano per tutte le parti del corpo, cosi a quelle di sotto, come a quelle di sopra.

a t. ij. AA. ta. iij. fi. j. AA. A. camminando verso l'1. 2. 3. 4. 5.

b lib. iij. fig. xvij. A. A. BB. ta. iij. fig. j. B

La distributione della Vena Grande dal fegato in sù. Cap. 7.

EDa notare che non si sparte (come molti han pensato) la vena Grande, nell'uscir del fegato, in due tronchi, come fa^a l'arteria grande uscendo del cuore. Ne anche è vero che questa vena sia piu larga dal fegato insino a lombi, che insino al cuore; anzi è tutta vn tronco diritto; la parte piu alta dell'quale monta pertugiando il lato diritto^b della diaframa, & subito poi, senza esserui nel mezzo parte di polmone ne alcun'altra cosa, passa per sopra le tele del cuore, le quali si congiungono in alcune parti largamente alla diaframa, & principalmente alla parte, per doue passa questa vena. La quale in questa parte getta^c due rami, che si distendono (faccendo molti ramuscelli) per tutta la diaframa, & in parte per le tele del cuore, in quella parte, che si congiungono alla diaframa. Passato che ha la

Le vene, che vanno alla Diaframa.

a t. iij.

b li. ij. t. vij. f.

c t. ij. C


m. iij. H

d li. iij. f. v. ha la vena, ^d questa tela storce alquanto verso il lato destro, & di poi volta alquanto verso il lato m^aco, & appresso alla parte piu alta del lato destro del ^e cuore si fa vna gr^a bocca nel lato ^f suo manco, che risponde al ventricolo diritto del cuore. Et in questo luogo l'Ala diritta del cuore si congiunge alla parte dinanzi di questa vena. Et della parte sua di dietro, che si congiunge al cuore, nasce & vna notabil vena, che cammina verso la parte di dietro del cuore, & verso la sinistra, faccendo come vna corona intorno alla parte sua piu alta. Et della parte piu bassa di questa vena nascono alcuni ^h ramuscelli, che scendono per tutto il cuore infino alla sua punta; i quali tanto piu son grossi, quanto la parte della sopra detta vena, della qual nascono, è piu grossa; & per ciò ordinariamente i rami del lato manco son piu grossi, & que, che si veggono nel tramezzo tra l'vn ventricolo, & l'altro. Questa vena ha tal volta vna sua compagna (benche minore) che nasce della parte dinanzi della vena grande, & si sparge per la banda dinanzi del cuore. Passato il cuore la vena grande si fa alquanto piu sottile; & rompendo le tele del cuore passa per sopra l'arteria grande, n^o a canto della schiena (come alcuni pensano), perche tra la schiena & lei son in prima la canna della gola, & dipoi il gargarozzo, & dipoi l'arteria grande. Hora non potendo questa vena arriuare alla schiena, si per le parti dette, che sono in mezzo, si anche per gli polmoni, & la diaframa, fu di bisogno m^adar vna vena, che nutrisse tutte le coste. La qual ^k nasce dal lato suo diritto, subito, come passa le tele del cuore, & la parte, doue i polmoni del lato manco si congiungono con que del diritto, mediante le vene, & arterie de i polmoni (che è appresso il terzo nodo delle spalle); & scede subito per l'istesso lato diritto, a canto e corpi de nodi di tutte le spalle, infino all'arriuare ad alcuni nodi de lombi. Questa vena si chiama la vena Sola, o senza compagna, perche non le risponde dal lato manco vena alcuna; anzi dalla parte di dietro di questa vena, che risponde a nodi della schiena, nascono alcuni ramuscelli, che v^ano, tra ogni due coste vno, a nutrir le noue coste piu basse. Queste vene, o ramuscelli tra le coste intere si veggono infino alla cartilagine; tra le mendose passano innanzi verso il ventre, piu di quello, doue aggiungono le cartilagini, inferendosi ne i suoi muscoli. Et, quando passano tra le coste, vanno gettando ramuscelli a muscoli, che lor son piu vicini. Nascono di piu di questa vena senza compagna altri ^l ramuscelli piccioli, che nutriscono i corpi de nodi della schiena, appresso la qual passano; & la midolla spinale, & i muscoli, che toccano q^{ste} parti; & altri ramuscelli, che s'inferiscono nelle tele, che attrauerfano, o tramezzano il petto, iui, doue s'attaccano alla schiena. E anche da notare, che questa vena alle volte getta tosto, che è nata, vn ramo picciolo, che si diuide in altri piu piccioli ramuscelli, e quai non vanno diritti, come quei, che nutriscono le coste piu basse. Anzi senza tenere ordine alcuno si spargono per gli tramezzi delle tre coste prime, delle quali nascono molti, & assai sottili ramuscelli, che si distribuiscono per tutta la tela, che abbraccia le coste. Vedesi anche alle volte che, come questa vena senza compagna arriua al nono nodo delle spalle, si diuide in due tr^{ochi}, ognuno de quali scende appresso le radici delle coste dal suo lato, mandando loro alcuni ramuscelli. Alcun'altre volte nasce del lato m^aco di questa vena in questo medesimo luogo detto vn ramo grande, qu^{to} il maggior di que, che habbiamo detto nascer della vena porta; & inferirsi nella tela di sotto della reticella; il quale, come attrauerfa dirittamente il corpo del nodo della schiena, p^o doue passa, subito si sparte in due rami, de quali l'uno monta, l'altro scende a canto le teste, o radici delle coste, gettando vn ramuscello tra ogni due coste nel passare; anchor che questo accada assai di rado, & infino ad hora non l'hò veduto, che due volte. Questa è tutta l'historia della vena Sola; la quale è molto degna di consideratione, per rispetto del cauar sangue nella puntura. Et veramente, se vogliamo mirare il nascimento, & processo suo, piu pare, che ci inclini a douer cauar sangue dal lato destro, stia il dolore in qual si voglia lato; o almeno dimostra esserui molto poca differenza; perche di qual si voglia braccio, che si caui, sempre è necessario che il sangue esca prima della vena grande, & di poi della sopra detta. Ma tornando alla mia historia, la vena grande dopo a l'hauer gettato questa vena, monta diritta infino alla strozza, aiutata dalle tele, che tramezzano il petto, & da molte glandole, od animelle, che in questa parte sono intorno a lei; le quali facc^{do} tutte vn corpo seruuono per suolo a molti rami, che nascono in questa parte della vena grande. Perche in questa parte si diuide in prima in due grossi ^m rami, de quali nascono tutte le vene, che nutriscono

Come si c^ogiunge la vena grande al Cuore.

La vena, che nutrisce il Cuore.

Il nascim^{to}, & progresso della vena sola.



Di che lato è meglio cauar sangue nella puntura.

La diuisione della vena grande nella gola.

Libro Sesto

*La vena, che va
sotto l'osso del
petto, fin presso
al bellico.*

*Il processo de ra
mi della vena
grande appresso
la strozza.*

*I ramuscelli, che
fanno questi ra
mi, innanzi che
arriuinio al brac
cio.*

*La vena Giugu
lare interiore.*

trifcono le braccia, & la testa, & alcuni muscoli, che sono dal bellico in sù. D'ognun di questi due rami, tosto che son diuisi, nasce tra gli altri ramuscelli alle volte vn molto picciolo, che scende appresso alle radici delle coste, infino alla terza, gettando alcuni ramuscelli, quando a voti delle due coste, & quando a quegli delle tre. Questo ramuscello alle volte non nasce di questa vena, ma della grande, innanzi che si diuida ne sopra detti due rami; benché ordinariamente manca, perche i voti delle coste si nutriscono de rami della vena sola. Vn poco piu in sù nasce della parte dinanzi della vena grande (quado si vuol diuidere) da ogni lato, vna vena, che cammina verso la parte piu alta dell'osso del petto; & scende, ognuna dal suo lato, di sotto a quello, a canto le cartilagini delle coste, gettando molti & diuersi ramuscelli, & tra gli altri alcuni alle tele, che ttamezzano il petto, le quali si nutriscono di queste vene, & d'altre, che nascono della vena grande, & scendono per loro; altri a gli voti, che sono tra le cartilagini delle sette prime coste, & a muscoli, che cuoprono il petto, & in parte alle mammelle. Et di poi escono, vna ognuna dal suo lato, appresso alla forcella dello stomaco; & distendendosi per gli muscoli diritti del ventre infino alla metà loro, gettano sempre alcuni ramuscelli a luoghi vicini; de quali il principale esce infino alla pelle del ventre, & scede d'appresso a i fini delle cartilagini delle coste diuidendosi in certe vene sottili come capelli, che quasi non si veggono. Queste due vene se ben ordinariamente nascono (come habbiamo detto) della parte dinanzi de i due rami grandi, iui, doue si spartono, nondimeno alle volte nascono anche delle radici del tronco della vena grande innanzi, che si diuida. Et delle volte nasce l'vna, principalmente la sinistra, del ramo, che va al braccio manco; & l'altra di mezzo della diuisione, che fa la vena grande. Alcu'altre volte ne nasce vna sola della vena grande, iui, doue si diuide in due, & nell'arriuare all'osso del petto si diuide in due rami; benché questo mâco volte accade. Ognuno de i due rami grossi della vena grande, va verso il braccio dal suo lato, per sotto la clauicola a canto della prima costa, infino all'ascella, nella qual parte si diuide in altri due rami (& non innanzi, come nella sua historia disse il Vesalio,) che si distribuiscono per lo braccio, come dapoi diremo. Nondimeno dalla parte piu alta d'ognuno de gli due primi rami, innanzi che escano del petto, nasce vna ragioneuol vena, che monta in obliquo verso dietro, infino a processi de lati de nodi del collo. Il resto di questa vena cammina verso dietro del craneo; & accompagnata da vna arteria entra per vn spiraglio, che habbiamo detto essere appresso la parte di dietro della testicciuola dell'osso della collottola; & come entra dentro l'osso della testa, si sparge largamente questa per lo secondo seno, che è il sinistro della dura madre, & la sua compagna per lo diritto. Oltre a questa vena ne nasce vn'altra del medesimo ramo detto, innanzi che esca del petto, dalla parte sua di dietro; la quale si distribuisce per gli muscoli piu bassi del collo, & per gli piu alti del petto, che sono attaccati a nodi delle spalle, & per que della testa. Dopo a questo esce nella forma detta del voto del petto fra la prima costa, & la clauicola, pertugiando il secondo muscolo di que, che muouono la schiena; & quindi passa innanzi verso l'ascella, calado infino appresso le glandole, che sono in questa parte, doue getta i seguetti rami. In prima due; vno de quali nasce della parte dinanzi, & si distribuisce per gli muscoli, che pigliano dall'osso del petto & le coste, infino al braccio & le palette delle spalle; & nelle done alle mammelle, & alla pelle loro. Et l'altro nasce dalla parte di dietro, & si comparte per gli muscoli, che occupano il voto della paletta della spalla, & per que, che sono iui vicini, con assai molti ramuscelli. Ma il ramo, che va al petto, alcune volte getta vna mezzana vena, che scende in obliquo per lo lato del petto, & si distribuisce per quel muscolo, che abbassa il braccio verso dietro. Et quando questo ramo non getta questa vena, nasce dalla medesima vena del fegato, vn poco piu in giù appresso l'ascella. Nascono oltre di cio in questa parte alcuni ramuscelli piccioli, che si distribuiscono per le glandole, & tele, che sono di sotto l'ascella; & quindi poi si van distribuendo per la parte di dentro del braccio, come nel seguente capitolo dirò. Hora sarà ben tornare all'altre vene, che nascono della parte piu alta di questo ramo, tra la strozza, & l'omero. In prima ne nasce vna appresso la diuisione detta, all'uscir del voto del petto; la qual monta attaccata ad vn lato della canna del polmone, gettando sempre alcuni riuoli, che si distribuiscono per lei, & per alcune tele, che iui sono. Questa vena chiamarono i Latini la vena Giugulare interiore; la qual monta insieme coll'arteria del sonno infino alle ceruella, gettando

n t.ij. K

o t.ij. L. lib.
ij. t. vj. a. li.
iii. fi. j. K
p lib. iij. t. ij.
B C

q li. ij. t. vj. a.
li. iij. fi. j. K
r la med. AA
f li. ij. t. vj. f
t t. ij. M

u t.ij. H

x t.ij. N N

y t. iij. F
z lib. j. t. iij.
fi. vj. l
a t. iij. fig. ij.
N. lib. v. fi.
ix. sss
b t. ij. o

c lib. ij. ra. v.
vj. Q

d t. ij. P

e la med. Q

f R

g s. t. v. d

h la med.

i t.iii.ii.ii. A
k la med. O
l lib.i. t. v.
fi. i. c

m t.iii. fi. ii.
F
n la med. R
o lib. v. t. ii.
fi. xiii. IK
p t.iii. fi. ii. n

q t. ii. T
r t.ii. b.

Le tre figure,
che sono in mar-
gine arincōtro,
mostrano le tre
ultime sorti, nel-
le quali si diuide
la vena giugula-
re esteriore; per-
che la prima nel-
la seconda tauo
la si vede.

f X
t V
u Y
x li.ii. t. vi. F
y li.ii. t. vi. L

z questo si ve-
de sotto la
lingua appf
so il filello
a t.iii. fi. ii. E
b li. i. t. v. fi. i.
g
c la med. G
d lib. v. fig.
xiii. G
e li. i. t. v. fig.
i. I
f t. ii. Y

gettando pel cammino alcuni ramuscelli alla parte piu alta de muscoli, che occupano la parte di nanzi de nodi del collo, & sotto la canna della gola; & alle tele, che legano il se-
sto, & settimo paio di nerui per lo collo. Ma, come arriua ⁱ alla testa, subito si sparte in
due rami. Il ^k maggior de quali cammina verso dietro a canto del craneo, fin'all'entrar
dentro nel voto della testa, per lo ^l buco, per doue diremo uscire il sesto paio di nerui del
le ceruella, ma non accōpagnato da vn ramo dell'arteria del sonno, come dice il Vesalio.
Entrato che è questo ramo dentro della testa, subito si distribuisce, come piu lungamēte
dirò nel suo particular capitolo. Adesso basti seguir l'historia loro fin doue entrano nel
voto della testa. L'altro ^m ramo minore della vena giugulare interiore, lascia l'arteria del
sonno, & camina insino all'entrare nel voto della testa per vn ⁿ buco, che per lei si fa ap-
presso al buco del terzo, & quarto paio di nerui. Ma in nāzi, che questa vena si distribui-
ca per la dura madre, getta ^p vn ramuscello, che passando per vn spiraglio intrauerfato,
che è nell'ossa delle tēpie, commune a questa vena, & ad vn ramuscello del quinto paio
di nerui delle ceruella, va al buco dell'orecchio. Ma tornādo vn'altra volta alla diuisione
che habbiām detto farsi nella fontanella della gola, subito dopo el nascimēto della vena
giugulare interiore, camminādo verso l'omero, nasce ^q vn'altra vena, la quale appresso
il suo nascimēto getta ^r vn ramo, che si distribuisce per la pelle, che è attaccata alla parte
di dietro del collo, & ad alcuni muscoli, che in qsto luogo stanno sotto la pelle, diuiden-
dosi i molti ramuscelli. Gettato questo ramo mōta fra la pelle, & il muscolo largo, & sot-
tile, che muoue le guance da lati della gola insino alle fauci, faccēdo quella vena, che chia-
miamo la vena giugulare esteriore. La quale, come si vede manifestamente in molte vec-
chie, & in chi si voglia, quādo grida forte, o ritiene il fiato, si diuide in vna di quattro for-
ti differenti. La prima delle quali è, quando monta fra pelle & carne vn ramo diritto, che
getta certe picciole vene a muscoli, che gli son vicini, & anche alla pelle. La seconda forte
è, quando questa vena si diuide in due, alla metà del collo; & l'una parte monta verso la
banda di dietro, & l'altra verso quella di nanzi. La terza, (quella, che piu di rado si vede)
è quella, quando questa vena giugulare esteriore si diuide in due rami, che montano di-
ritti, l'uno al par dell'altro. Ne quali alcune volte il maggior ramo di questi due nō si ve-
de tra pelle & carne, perche si nasconde sotto quel muscolo, il qual nascendo della pūta
dell'osso del petto, & della clauicola, si va ad inferire nel processo simile alla mammella; la
qual cosa ha fatto pēlare ad alcuni, che questo ramo fusse la vena giugulare interiore, in-
gannati dalla grossezza sua. La quarta forte si fa, quando questi due rami, che montano
nella forma detta, s'attaccano appresso le fauci faccendosi di due vno: & tosto poi ritor-
nano a farsi due, che si spartono in due rami, come subito dirò. Queste differenze di vene
si veggono nel collo; ma diuidansi in qual si voglia modo, sempre gettano alcuni ramu-
scelli nel passare colli alla pelle, come a muscoli, che lor son vicini. Et come arriuanò alle
fauci sotto la mascella, appresso l'orecchie, parte ^s di loro va a gli muscoli di dentro della
bocca, & alla dura madre, il resto si distribuisce per la ^t pelle, & muscoli della faccia, & le
tempie, & ^u dietro l'orecchie, & per tutta la pelle della testa. La parte, ch'entra dentro la
bocca, si diuide iui, doue ^x sono le Tonsille, mandando loro alcuni ramuscelli, & altri ra-
mi poi piu grandicelli al gargarozzo, & alle ^y glādoie, che gli sono appresso, & a muscoli
dell'osso hyoide, & alla lingua, & a tutte le parti della canna del polmone, & delle fauci;
de quali il ^z maggiore va per sotto la lingua, secondo il lungo suo diuidendosi senza or-
dine alcuno in molti & diuersi rami. Getta oltre di cio questa parte, che entra nella boc-
ca, ^a vna vena, la quale entra dētro la testa per quel ^b buco, che è appresso alla parte di die-
tro del processo dell'osso delle tempie simile alla mammella; & alcuni rami, che si distri-
buiscono per la tela, che cuopre il palato, & il voto del nato. De quali nascono poi certe
venuzze, che similmente entrano dentro la testa, cio è, vna per ^c lo buco, per doue entra
il ^d secondo paio di nerui delle ceruella, che si distribuitce per la dura madre; vn'altra per
lo ^e maggior buco di que, che si fanno nell'ottano osso della testa, la quale anche si distri-
buisce per la dura madre. Et questi rami (quando entrano dētro la testa) mādano ancho
ra alcuni ramuscelli a gli occhi, e quali si distendono insino alla pelle della fronte. Il ^f re-
sto di questa vena (che habbiām detto distribuirsi per la pelle, & muscoli della faccia, &
per tutta la testa) si diuide nella forma seguente. In prima come questa vena arriua dietro
all'orecchie, iui, doue la mascella inferiore si congiunge colla superiore, ritroua certe
glandole,

La distribuzione
della vena Giu-
gulare esteriore.



La vena, che si
distribuisce per
la faccia.

Libro Sesto

glandole, che in quel luogo sono deputate per la distributione di questa vena; & nel mezzo loro si diuide in due rami; ^h vno de quali va alle guàce, & alla pelle, che cuopre le cartilagini del naso, & alla ⁱ fronte, senza offeruare ordine alcuno nel camminare, o diuidersi; & l'altro si diuide in altri due rami, ^k vno, che si sparge per la tempia del suo lato, ^l vn'altro, che cammina per dietro l'orecchie distendendosi per la pelle della collottola. Ma è da notare che i rami, che nascono della vena giugulare esteriore, & si distribuiscono per la faccia, & per la testa, si congiungono, que dell'un lato a quelli dell'altro, faccendosi d'amendue vno, principalmente nella fronte, doue ^m la vena, che si vede, è fatta delli rami di queste due vene giugulari, che passano per li lagrimali, & si vengono a congiungere nel mezzo di essa. E anche da sapere, che di questi medesimi ramuscelli nascono certe vene sottili, come capelli, che passano alle ceruella per alcuni ⁿ buchi, che si fanno nel craneo tanto piccioli, che quasi non appaiono. Et ne piu ne meno escono altre di dentro fuori della testa alla sua pelle, come al suo luogo diremo.

Della Distributione della vena del Fegato, & di quella della Testa per lo braccio. Cap. 8.

Come si distribuisca la vena della testa per lo braccio.

Dicemmo nel passato capitolo, come appresso l'ascella si diuidea il ramo, che cammina dalla strozza verso il braccio, in due, che si distribuiuano per lo braccio. ^a Il piu alto di questi rami chiamano comunamente la Vena della testa, ingannati, pensando che nasca della vena giugulare esteriore; ^b l'altra chiamano quella del Fegato. Quella della testa, come arriua alla punta dell'omero, in nanzi che si nasconda nel muscolo, che alza il braccio, mada alcuni ramuscelli, alla pelle, de quali ^c i principali si distribuiscono per la pelle, che cuopre il muscolo detto. Et in alcune donne si distende infino alle mammelle, passando per sopra la clauicola; & fanno parte di quelle vene liuide, che in alcune di loro si veggono. Gettati questi rami si nasconde nel ^d muscolo, che alza il braccio, & cammina tra il lato di dietro di questo muscolo, & la corda sua, ^e che accosta il braccio al petto; appresso e fini de quali torna a vscir fuori. Et dipoi scende sempre tra pelle & carne, coperta d'una tela carnosa; & cammina verso il lato di fuori del braccio (come in se stesso chi si voglia, che non habbia le vene troppo sottili, o sia oltre modo grasso, può vedere) passando a canto el lato di fuori del ^f primo muscolo, che piega il gomito, & gettando alcuni bronchi alla pelle, & al lato di nanzi del muscolo detto; i quali scendono, quali diritti, quali intrauerati, tanto, che delle volte pare, che si vadano a congiungere nella parte di dentro del braccio, co rami ^h della vena del fegato. Ma, come questa vena della testa arriua al gomito, ⁱ si diuide ordinariamente in due rami, & alle volte in tre; & questi rami alcune volte sono vuali, alcune volte son piu grossi, l'uno che l'altro. Il ^k primo, che manca spessissime volte, scende verso la parte di dentro del braccio scontro al gomito; & finisce compartendosi in alcuni ramuscelli, sotto e principij de muscoli, che piegano i secondi, & terzi articoli delle dita. Il ^m secondo, & maggiore, comincia dal luogo detto, & scende tra pelle & carne in obliquo in verso dietro infino alla sanguinella del braccio, scontro alla congiuntura del gomito; & camminando quindi vn poco per mezzo del braccio, si congiunge alquanto piu in nanzi della congiuntura del gomito, co vn'altro ⁿ ramo, che diremo nascer della vena del fegato; & d'amendue si fa vna vena, ^o chiamata per cio la Comune. Il ^p terzo ramo monta per sopra il ^q secodo muscolo, che muoue il minor fusello; & scendendo a poco a poco in obliquo, a canto el maggior fusello infino alla sua metà, dipoi si storce verso il maggior fusello; & nell'ariuare a quello getta alcune vene ^r picciole per sopra il muscolo detto, alla pelle, sotto la qual passa; tra le quali la ^s maggior è quella, che getta appresso il principio, doue habbiamo detto diuidersi in tre rami. Ma è da sapere, che scendendo questo ramo in obliquo verso la giunta del maggior fusello appresso il bracciale, ^t si mescola con ^u vn'altro ramo della vena del fegato; & d'amendue si fa vno piu grosso, il qual passa per sopra il bracciale; & diuidendosi in alcuni rami (senza tenere ordine alcuno) arriua fin presso al dito picciolo, & all'annulare; doue fa quella vena, che chiamiamo la Saluatella, o della milza: la qual sogliono alcuni Medici far pungere nell'infermità della milza, piu co autorità d'alcuni, che l'han detto, che perche in cio sia ragione alcuna, come piu chiaramente si vedrà, quando diremo, di doue nasce

La vena comune.

x t.ij.m

y li.ij. t.ij. t.

t.ij. T

z la me. t.ij.

L. t.ij. Δ

a la mede.

t.vij. r

b t.ij. n

c lib.ij. t.xj.

e f

d t.ij. fra l'P.

e l'R

e la med. o

f la med. p

g lib.ij. t.ix.

S, T

h la me. Y, Z,

e, A

i lib. vij. t.ij.

ij. Δ

k li.ij. t.ij. Δ

l t.ij. q, r

m t.ij. N

n li. vij. t.ij. r

o lib.ij. t.vj.

tra l'Θ, e l'γ

p t.v. f

q la med. g

r li. ij. t.vi. Δ,

μ. t.vij. 1, 2,

3. t.xj. f

f t. ij. r

t lib. j. t. vj. fi.

vj. s

u la med.

x t.ij. t. u

y la med. Δ

z la med. h

a la med. g

b la med. x, x

c la med. l

d la med. y

e ta. j. ij. al z

piu basso

f la med. u

g al z, piu al

to.

h la med. t

scela vena del fegato. Di questi rami alcuni si distribuiscono al dito picciolo, & all'annulare, & cosi finisce questa vena detta della testa. Quella * del fegato (tosto che ha passata l'ascella, & entra nel braccio) si nasconde tra muscoli, che abbracciano l'osso dell'omero; & principalmente tra la parte dinanzi del v primo muscolo, che distende il gomito, & la parte di dietro della corda z di quello, che appressa il braccio al petto; & dipoi tra la parte di dietro de a muscoli, che piegano il gomito, gettando nel cammino alcuni rami. In prima ne manda b vno a i principij de c muscoli, che distendono il gomito; il quale è scotro a quelle d venuzze, che habbiam detto nutrir le glandole. Dopo a questi rami alquanto piu in giù nasce della parte di dietro di questa e vena vn grosso ramo, del qual escono alcune picciole vene, che si distribuiscono per la pelle, che cuopre la parte di fuori del braccio. Esce di piu dalla parte di fuori di questa vena vn altro notabil f ramo, il qual scede in obliquo per la parte di dietro del braccio, tra l'osso & s i muscoli, che distendono il gomito, infino al tubercolo di fuori dell'osso dell'omero; doue anche entra sotto e principij de h muscoli, che nascono di questo tubercolo, o testa, alli quai manda alcuni piccioli ramuscelli; & di poi scende per la parte di fuori del maggior fusello, insieme col i quarto neruo di que, che diremo venire al braccio. Questi sono e rami, che fa la vena del fegato, innanzi che si scuopra, che è infino al fine del k muscolo, che congiunge il braccio al petto; & iui si diuide in l due tronchi quasi vguali. De quali l vno va sempre coperto, & accompagnato m dall'arteria, & dal n terzo neruo, che va alla mano, & scende tra gli due o muscoli, che piegano il gomito verso la sanguinella del braccio, mandando alcuni ramuscelli, cosi a questi muscoli, come alle tele, che cuoprono i nerui. Passato il gomito subito, come comincia a nascondersi tra muscoli, che muouono le dita, si diuide p in due rami, e quali si discostano molto poco l vno dall'altro, & mandano alcuni ramuscelli a muscoli, appresso de quali passano, & quindi vanno appoggiadosi, l vno al maggior fusello, l'altro al minore, infino alla palma della mano, insieme colle corde di questi muscoli, passando anche essi per sotto la legatura intrauersata del bracciale, & come arriuanò alla palma, si diuidono in altri rami, che vanno sotto la tela della palma della mano, compartendosi per la parte di dentro delle dita nella forma seguente. Il ramo, che si appoggia al minor fusello, mada al pollice due ramuscelli, & all'indice altri due, & a quel di mezzo vno. Quel, che s'appoggia al maggiore, mada due ramuscelli al picciolo, & altri due all'annulare, & vno a quel di mezzo. Et di questo ramo nasce vna picciola vena, che va a nutrire i muscoli, che occupano il riuerso della mano; dell'altro nasce vn ramuscello, che nutrice i r muscoli, che s'inseriscono nel primo osso del pollice. Et cosi va tutto questo tronco della vena del fegato nascofo, senza dimostrarli in parte alcuna. s. L'altro tronco va tra pelle & carne verso il t tubercolo di dentro dell'osso dell'omero, doue si vede vn poco innanzi della congiuntura del gomito, ne piu ne meno, che quella della testa. Ma nell'arriuare alla parte piu alta del u tubercolo di dentro dell'osso dell'omero vn poco innanzi della sanguinella, si diuide x in due rami; de quali quel dinanzi (che scende, cosi egli, come tutti e rami, che nascono di lui, tra pelle & carne) va infino al mezzo della sanguinella, doue y si congiunge col z ramo della vena della testa, quando vn poco piu in su, quando vn poco piu in giù, & d'amenduni fatti quella vena, che chiamiamo la Comune o quella di mezzo: a Il ramo di dietro (che si fa iui, doue il tróco della vena del fegato si diuide appresso il tubercolo di dentro dell'omero) getta molti ramuscelli, che scendono per la parte di sotto del braccio tra pelle & carne, aggiungendo in parte a i lati di dietro, & di fuori; tra quali b vno de piu grossi scede per la parte piu bassa del maggior fusello alquanto in fuori fino al bracciale, & getta alcuni rami, che si c congiungono con que della vena della testa; & quando mancano que della testa, questa vena supplisce al lor difetto. Oltre di cio, nasce anche di questo ramo di dietro d vn altro, il qual passa per la parte di dietro del gomito, & scende alquanto dalla parte di fuori del maggior fusello parimente tra pelle & carne. Nascono anche altri e rami di questa vltima vena, f che si spargono per la parte di dentro del braccio, mescolandosi gli vni con gli altri senza ordine alcuno, & mescolandosi anchora con alcuni ramuscelli della vena, che si distéde per la parte piu bassa del maggior fusello. A questi rami si congiunge s vn'altra notabil vena, che nasce di mezzo del ramo della h vena del fegato, che fa la comune dalla parte sua piu bassa. Questa vena cammina alle volte dirittamente infino al bracciale, & alcun'altra cò alcuni circoli

La vena del Fegato.

La vena, che va al braccio tra pelle & carne.

Il ramo della vena del Fegato, che va tra pelle, & carne. La vena Comune.

Libro Sesto

ni circoli, mescolandosi con gli altri rami di questa medesima vena, i quali son tanto fortissimi, che facilmente si fanno varici. Questi rami non si fermano nel bracciale; anzi parte diritti, parte intraversati, in obliquo, quando congiungendosi, quando separandosi, si distribuiscano per la pelle della parte di dentro della mano, cōgiungendosi alle volte alla pelle, & alle volte camminando tra essa, & la tela carnosa. Et di questi rami que, che vanno alla radice del pollice, si congiungono con altri ramuscelli, che nascono della vena commune, & si distēdono per la parte di fuori del pollice. Perche la vena commune tosto, che è fatta, scende in obliquo verso la parte piu alta del braccio, infino che (passando sopra il minor fusello, poco piu innanzi della metà sua, & gettando alcuni ramuscelli senza tenere ordine alcuno; & altre volte cōgiungendosi a rami, che passano per sopra la tauola del braccio) va alla parte di fuori del braccio, per doue cammina sempre tra pelle & carne, fin presso alla metà della giunta del maggior fusello, doue si diuide in due rami, che fanno la figura della lettera γ, o della Λ. Il ramo piu alto di questa diuisione manda vn ramuscello alla parte di dentro del bracciale, appresso alla radice del dito pollice; il qual si mescola co ramuscelli, che poco fa dicemmo arriuare a questa parte, & di poi cammina per la parte di fuori tra'l pollice, & l'indice, diuidendosi in molti rami, che si congiungono alle volte gli vni con gli altri, & facendo quella vena, che molti Medici (non sò, con qual ragione) fanno pungere nell'infermità del fegato. Il ramo piu basso di questi due va al dito indice, & a quel di mezzo, & in parte al picciolo, compartendosi anche in molti ramuscelli. Questa è la forma, nella quale le vene si distribuiscano per lo braccio. Nella qual cosa si deue notare, che la diuisione (che habbiamo detto farsi nella mano) è tanto varia, che di mille huomini non si troueranno due, che l'habbiano in vn medesimo modo. Per la qual cosa, & anche, perche si veggono facilmente queste vene in qual si voglia huomo sano, non mi affaticherò piu in dimostrarle. Solo vna cosa non voglio lasciar di dire, per parermi molto necessaria, che que, che cauano sangue di quella vena, che si vede tra il pollice, & l'indice, per quella della testa, errano grandemente; & non meno errano quelli, che fanno cauar sangue di quella, che è tra'l dito picciolo, & l'annulare, o tra l'annulare, & quel di mezzo, volendo cauar sangue da quella del fegato, attento che amendue sono rami della commune. Et non solo sono differenti le vene delle mani in diuersi huomini, ma anche quelle della parte di dentro del braccio; perche alle volte la commune si fa piu a basso, altre volte piu in sù; & alcun'altre volte si perde la vena della testa, come arriua a congiungerfi colla vena del fegato, & delle volte sola questa si vede; altre volte al contrario, facendo queste, & altre differenze, come in se stesso può ognuno fare esperienza.

Le vene della mano son molto diuerse.

Della Distributione della Vena Grande dal fegato

in giù.

Cap. 9.

HABBIAMO detto, in che modo la Vena Grande si comparte dal fegato in sù; restaci hora a dire del modo, in che si comparte dal fegato in giù. Hora è da sapere che subito, che la vena grāde, nascendo della parte di dietro del fegato si separa da lui, si sforce verso il lato diritto della schiena; & getta vn ramuscello al lato manco, che si distribuisce principalmente per vna tela grossa, che nasce del peritoneo, & cuopre il rognone; alla qual ne risponde tal volta vn'altra dal lato diritto. Se ben ordinariamente la vena, che cuopre il rognone diritto, non nasce del tronco della vena grande, ma della vena, che porta l'orina a i rognoni; & alle volte accade al contrario, che la vena, che si comparte per la detta tela del rognone manco, nasce della vena, che porta l'orina al medesimo rognone; & quella, che si distribuisce per la tela del rognone diritto, nasce del lato diritto della vena grande. Giunta che è questa vena giustamente al mezzo della schiena, appresso al primo nodo de lombi, fa due molto grossi rami, da ogni lato vno, che vanno dirittamente a rognoni, chiamati vene Emulgenti, che vuol dir Succiatrici; perche per loro succiano i rognoni il sangue acquoso. Et si come alle volte sta il rognone destro piu alto, alle volte il sinistro, così ne piu ne meno accade essere il ramo destro alle volte piu alto, & alle volte il sinistro; & tal volta sta il rognone piu alto, & il ramo piu basso; ma non mai si trouano l'uno scontro dell'altro, perche meglio possano i rognoni succiare l'acquosità

La vena, che va alla tela di fuori del rognone sinistro. Quella, che va al destro.

Quelle, che vanno a rognoni.

l'acquosità del sangue, come al suo luogo piu chiaramente habbiamo detto. Hora arri-
uando ognuno di questi due rami al rognone del suo lato, si diuide subito in due, che si
compartono per la sustanza de rognoni con marauiglioso artificio, come al suo luogo
habbiain detto. Ma dalla parte di sotto del ramo manco circa al suo mezzo ^h nasce ne
gli huomini vna vena, che va attaccata alla parte del peritoneo, che cuopre i muscoli de
lombi, & mādandole alcuni ramuscelli, scende in obliquo verso il lato sinistro per sopra
il condotto dell'orina dal suo lato, fin circa l'osso grande, & indi monta all'osso del per
tignone appresso l'anguinaia, & circondando la tela del peritoneo, & il primo, secondo,
& quarto musculo del ventre ^k passa per sopra l'osso del pettignone per vn segnale, che
per questo effetto si fa in esso. Et di poi scende ^l facendo alcuni giri, come varici (per la
qual cosa fu chiamata Cirsoides Parastates, che vuol dir cosa ritorta, che stia appresso a
testicoli,) insino all'inserirsi nella piu alta parte del testicolo; doue getta alcuni piccioli
rami, che si spargono per la tela di dentro, che l'infascia, & altri molti, che si spargono
per la medesima sustanza del testicolo. A questa vena, che arriua al testicolo manco, si
congiunge alle volte (benche rade) vn'altra, che ⁿ nasce dal lato sinistro dalla vena gran-
de, vn poco piu in giù della vena emulgente o succiatrice, & d'amendue insieme se ne fa
vna, per la quale il seme va al testicolo manco. Nòdimeno la ^o vena, che va al testicolo di
ritto, non nasce dalla succiatrice, se non ^p dalla parte dinanzi del tronco della vena gran-
de, vn poco piu in giù della emulgente alquanto verso il lato diritto, cò vn principio al-
quanto rileuato, & tondo. A questa vena dice il Vesalio hauer veduto sol vna volta con-
giungerfi l'altra, che nasce dalla vena succiatrice del medesimo lato; io insino adesso nò
l'ho veduto. Queste due vene, che dispongono la materia del seme, accio che piu facil-
mente i testicoli la facciano bianca, anchor che nel nascer sian differenti, nel processo fan
no l'istesso cammino, tenèdo in tutti gli huomini vn medesimo ordine. A queste due ve-
ne, che vanno a testicoli, si congiunge da ogni lato ^q vn'arteria, che diremo nascer ^r dal
tronco dell'arteria grande alquanto piu in giù, che la vena, & mescolandosi cò lei fanno
amèdue certi viluppi, entrando & uscendo l'vna nell'altra, insino che degli spiriti dell'ar-
teria, & del sangue della vena si fa vn corpo d'vna medesima natura (questa mescolanza
chiamarono i Greci Anastomosis, che vuol dir apertura di vene), & così arriua alla parte
piu alta del testicolo. Appresso alla parte di fuori del fine di questo condotto ne ^s nasce
vn'altro, che si continua con esso, & è alquanto piu biāco, & duro; il quale per la parte di
fuori è alquanto tondo; per quella, che si congiunge alla tela di dentro del testicolo, è al-
quanto incauato nel mezzo, come canale. Et così scende attraccato alla sopra detta tela,
dalla parte di dietro del corpo simile alle varizze insino alla parte di dietro del medesimo
corpo, & tenèdosi sempre alquanto in dentro, cammina appoggiato alla parte di dietro
del testicolo fin alla ^t parte sua piu bassa. Et di poi ^u monta vn'altra volta, appoggiato al-
la medesima tela senza attaccarsi a essa, & facendo certe ritorte, come biscia o vermine,
monta insino alla parte piu alta del testicolo; nel qual luogo faccendosi piu ^x sottile, &
tondo, monta dirittamente senza far girauolte appoggiato alla parte dinanzi del ^y con-
dotto, che habbiain detto portare il seme al testicolo, insino alla parte piu alta dell'osso
del pettignone, appresso all'anguinaia. Et entrando per lo medesimo ^z buco, per doue
uscì il primo condotto, scende appoggiato alla parte di dietro dell'osso del pettignone,
& attaccandosi alla tela del peritoneo, va ad inserirsi passando sopra il ^a condotto dell'o-
rina dal suo lato, nella ^b parte di dietro del collo della vescica, in quella glandola, che per
questo effetto habbiain detto farsi. Questo è così nell'huomo. Nella dōna fin circa l'osso
grande fan questi condotti il medesimo cammino, che nell'huomo, ma vanno sostenuti
da alcune grosse ^c tele, & innanzi, che arriuino al testicolo, si diuidono, ognuno in due
parti. ^d Vna delle quali si distribuisce per alcune tele grosse, & per glicanti della matrice
alquanto verso il suo fondo. ^e L'altra congiungesi subito all'arteria del seme (come hab-
biain detto farsi nell'huomo), & senza uscìr fuori del ventre, s'inferisce nel ^f testicolo del
suo lato, che sta situato (come dicèmo) dal lato del corpo della matrice, & ritornando ver-
so la parte piu ^g alta del testicolo, cammina ^h senza montar piu in sù, facendo alcuni cir-
coli o ritorte, come biscia, insino all'inserirsi nel cantone del corpo della matrice dal suo
lato. Questi condotti, se ben nell'huomo, & nella donna son differenti, que, che vāno in-
sino a testicoli, da que, che vanno da indi innanzi, così in sustanza, come anchora che ciò

Il condotto sini-
stro del Seme.

Il diritto.

Come si cogiun-
ge la vena del se-
me all'arteria.

Il condotto, che
porta il seme
dal testicolo al
membro.

Il cōdotto del se-
me nella donna.

La differen-za
tra i primi vasi
del seme, & se-
condi.

Y che

g lib. iij. fig.
xix. xxj. xxij
xxv.

h ra. ij. m. lib.

ij. fig. xix. c

fi. xxj. x

i lib. iij. figu.

xxij. q

k li. iij. fi. j. H

l la med. fig.

xxij. da la s,

al. fi. xxiiij.

dal N. al O

m fi. xxiiij. D

n fig. xxj. y

o fi. xxj. t

p fi. xxj. u

q lib. iij. fig.

xxij. s

r li. iij. fi. xix.

h. fi. xxj. xxij

u

f la med. fig.

xxij. x

t la med. fig.

xxiiij. F. fig.

xxj. i

u la med. G

x la med. B.

fi. xxj. u

y la med. fig.

xxj. y

z li. iij. fig. j.

G, H

a lib. iij. fig.

xxj. xxij. q

b fi. xxij. r

c fig. xxiiij.

o, o.

d fi. xxvj. n

e fi. xxvj. o

f la med. r

g la med. f

h la med. u

Libro Sesto

Perche gli Eunu-
chi non possono
ingenerare.
Le vene, che van-
no a Lombi.

La figura della
diuisione della ve-
na grãde, appres-
so all'osso gran-
de.

Le donzelle, &
le pregne p quai
vene purgano il
suo fiore.

che si contiene ne primi, è di color di sangue, & ne secondi il seme è già fatto, & perfer-
tionato; pure, perche si continuan dal principio al fine, gli chiamarono i Latini amēdue
Vasa spermatica, che vuol dire vasi del seme. Et è da notare, che ne secondi vasi sta ordina-
riamente tanta quantità di seme conseruata, quanto basterebbe (poco piu o meno) a po-
ter ingenerare vna o due volte, & per tal ragione si è veduto de buoi castrati di poco, in-
generare. Et perche ho detto che'l seme vien di piu sù de testicoli, è da sapere che'l seme
non piglia nuouo essere ne testicoli, piu di quel, che danno le mammelle al sangue, che è
la bianchezza; & gli Eunuchi non lasciano d'ingenerare, perche lor mächì seme, ma per
che sono tagliati i condotti, per doue hauea da passare. Ma lasciato questo da parte, & tor-
nando alla mia historia, dico che oltre a queste due vene, per doue va il seme a testicoli,
getta la vena grande per la parte di dietro, che mira i corpi de nodi de lombi (a quali s'at-
tacca) molti piccioli ramuscelli, come rampolli, ch'entrano per gli buchi di questi nodi
(per doue diremo vscire e nerui) & vanno a nutrire la midolla spinale, & insieme getta al-
cuni rami, che vanno a nutrire e muscoli, che sono attaccati a questi nodi, de quali nasco-
no altri, che si distendono in arco infino a i fianchi, nutrendo i muscoli del vêtre, la doue
passano. Ma come la vena grande ^k arriua all'osso ^l grande, si mette sotto l'arteria grande
faccendole come vn fuolo, perche l'osso grande non l'offenda, & subito si sparte poi in
due rami vguale, che vanno, l'vno alla gāba sinistra, & l'altro alla destra. Dal lato di fuori
d'ognuno di questi due tronchi, subito dopo la diuisione detta, o nella medesima diuisione,
& anche alle volte vn poco piu innāzi, nasce ^m vna vena maggiore, che niuna di quel-
le, che habbiam detto gire a nodi de lombi, o a i muscoli del ventre, o a quelli, che sono
attaccati a nodi de lombi; la qual cammina al trauerfo per sopra i lombi gettando alcuni
rami cosi a loro, come a muscoli del ventre, & al peritoneo. Gettata questa vena, scende
ogni tronco in obliquo verso la banda di fuori, faccendo l'vno coll'altro la figura della
A greca, & mandando nel cammino alcuni ⁿ solchi a buchi piu alti dell'osso grande. Do-
po a questo camminando innanzi si diuide in due rami disuguali; de quali ^o quel di den-
tro, & piu sottile, si sparte subito in altri due rami; de quali ^p quel di piu in fuori cammina
verso la parte di fuori, attrauerfando fra l'osso del gallone, & il grãde, insieme col piu gros-
so ^q neruo della gāba, gettādo pur assai rami alli muscoli, che nascono della parte di fuo-
ri della pūta dell'anca, & muouono la coscia, & anche a i muscoli, che nascono della par-
te piu bassa de l'osso del gallone. Di modo, che la parte di dietro della cōgiuntura dell'an-
ca, & la pelle dell'anguinaie si nutrice di molti rami di questa vena. Il ramo di dētro man-
da dalla banda di dentro ^r alcuni rami piccioli a buchi dell'osso grande, & altri maggiori
a muscoli del fondamento, & alla pelle, che gli sta intorno intorno, de quali si fanno al-
cune delle morene. Passando vn poco piu innanzi ^t nasce vn'altra vena di questo ramo di
dentro, la qual ne gli huomini va al lato della vescica dalla sua banda, & diuidendosi in
molti rami, si distende per lo collo della vescica, & per lo membro; ^u nelle donne cam-
mina coperta d'vna grossa tela, & manda alcuni rami alla vescica, & assai piu al lato del fon-
do della matrice, alcuni de quali arriuan al suo collo, faccēdosi piu grossi, & per questo
le donzelle, & donne pregne purgano il suo fiore. Ma non perciò voglio dire, che nell'al-
tre donne lasci di purgarli il sangue per questa parte, anchor che si purghi principalmen-
te per dentro della matrice. Il restante del ^x ramo sinistro della diuisione, che si fece so-
pra l'osso grande, va all'osso del pettignone, & congiungendosi al ^y ramo, che nel medesi-
mo modo va per l'altro lato, fanno amēdue vna ^z vena, che buca in prima il peritoneo,
& di poi il decimo ^a musculo, che muoue la coscia, & passando per lo ^b buco dell'osso del
pettignone per vna incauatura, che cosi per lei, come per l'arteria, & il neruo, si fa nella
parte sua piu alta, & attrauerfando per la ^c tela, che cuopre questo buco, & per lo nono
musculo, che muoue la coscia, si nasconde nella coscia gettando alcuni rami al principio
del secōdo musculo, che muoue la gamba, & a quello del quinto, & ottauo, che muouo-
no la coscia; de quali nascono altri ramuscelli, che camminano infino alla pelle, appresso
l'anguinaie. Oltre a questi rami ve ne è ^d vn'altro particolare, che va al fosso, che si fa nel
gallone, entrando per vn seno, che per questo efferto particolarmente si fa in quello.
Questo ramo si diuide nella forma detta, & rade volte passa mezza la coscia. Nondimeno
la principal sua vena, che habbiam detto distribuirsi per lo quintò musculo, che muoue
la coscia, si mescola cō vn'altro ^e ramo della ^f vena maestra, che va per la gamba. Il ^g ramo
di

i t.ij. & li.ij.
fi. xxvj. &

k t.ij. o
l li.ij. fi. xix.
xxj. xxij.

m t.ij. r. r

n o
o p
p c

q lib. ij. t. x. &
li. vij. t. ij. 71

r v
f v
t x

u lib. iij. fig.
xxvj. 2. &

x t.ij. p
y del e nasce
l'os

z e
a lib. ij. t. xv.
fi. xvj. F, G,

H
b lib. j. t. j. ij.
ij. r

c li. ij. t. xiiij.
b, b

d t. ij. preffo
al e

e preffo al x
f 2

g s

di fuori del tronco della vena grande, scende in obliquo verso la gamba, & innanzi, che buchi il peritoneo, getta dalla parte piu alta vna mezzana vena, la qual montando in su per lo peritoneo, verso la parte di nanzi del ventre, & gettando alcuni rami al peritoneo, passa infino all'arriua al musculo diritto del ventre del suo lato; doue^h circondando il peritoneo, & il musculo intrauerfato del ventre, s'inferisce nella parte di dentro del musculo suo diritto dal suo lato, & montando dirittamente, getta alcuni rami a trauerso a gli altri muscoli del vêtre. Ma, come arriua vn poco piu in su del bellico, si diuide in molti ramuscelli, che toccano le punte delle vene, che habbiam detto scendere dalla strozza per sotto l'osso del petto. Per ragion di queste vene dicono molti esser comunicanza tra la matrice, & le mammelle; attento che quella, che scende, nel passare per le māmelle si cōgiunge alle vene di quelle, & quella, che mōta, nasce appresso il ramo, che habbiam detto gire alla matrice. Questo quanto sia vero, non lo tratterò adesso, perche farebbe al largarmi piu di quello, che al principio promessi di fare, che è contar breuemente (quanto è possibile) l'historia. Basti sapere che le punte della vena, che scende, rarissime volte si congiunge alle punte di quella, che monta.

La vena, che si congiunge con quella, che scende di sotto l'osso del Petto.

La comunicanza, che è tra le Poppe, & la Matrice.

Della Distributione della Vena Grande per la gamba. Cap. 10.

OL TRE ai rami, che habbiam detto mandar la Vena Grande alla parte di dietro dell'anca, che scendono alla coscia, manda particolarmente due vene; ^a vna minore, che passa (come habbiam detto) per lo buco dell'osso del pettignone, & cammina infino al suo mezzo, dando nutrimento a muscoli, appresso de quai passa; vn'altra maggiore, che è come tronco di tutte l'altre vene, che vanno alla gamba. ^b Questa vena comincia dal ramo di fuori di vn de tronchi della vena grande, dopol'esserli diuiso sopra l'osso grande, & tosto, che passa il peritoneo, cammina verso l'anguinaie, per la parte piu alta di dentro dell'osso del gallone, per doue scendono il ^c sesto, & settimo musculo, che muouono la coscia; & camminando per la parte di nanzi della coscia, alquāto in dentro, passa senza esser coperta da alcun musculo, per lo seno, che fanno nell'anguinaia il ^d primo musculo, che muoue la gamba, & ^e l'ottauo, che muoue la coscia; & in questo luogo si diuide in molti rami. Per la qual cosa furono poste in q̄sta parte molte ^f glandole, come anche habbiā detto esser di sotto le dittella, & in tutte l'altre parti, doue le vene fanno alcuni rami. ^g Il primo ramo di questa vena, che va alla gamba, è molto grāde; & nasce della parte sua di dentro, & cammina tra pelle & carne per la parte di dentro della coscia, & del ginocchio, & della gamba, infino al ^h tallone di dentro; doue calando per sopra il pettine del piè, si distribuisce a diuerse parti, mescolandosi co rami d'altre vene, che (come di remo) vengono a questa parte. Questa vena ordinariamente mātene in tutti e corpi vna maniera di procedere infino al tallone, il che nō fa da indi in nanzi; perche, se bene ordinariamente passa per sopra il tallone, alle volte passa di sotto. E anche questa vena assai diuerfa nel modo di compartirsi per lo pettine, & dita del piede; perche alle volte si mescola a certi rami, & va al dito picciolo, & a quel, che gli sta appresso; altre volte al pollice & a quel, che gli è piu appresso. In cōclusione quasi in niuno huomo tiene la medesima forma del distribuirsi; anzi rade volte si comparte nell'un piede, come nell'altro. Et anche i rami, che nascono di questa vena, nel scendere per la gamba, nō mai quasi tengono vn medesimo ordine; se ben in vna cosa sola conuengono tutti, che vanno tra pelle, & carne. Et ordinariamente nella parte piu alta di dentro della coscia getta questa vena due rami; Vno ⁱ minore, che cammina verso la bāda di dentro tra l'fondamento, & i testicoli, per l'anguinaia, & per la tauola della coscia; ^k L'altro verso la bāda di fuori, & maggiore, che cammina per la parte di fuori & di nanzi della coscia, tra pelle & carne, diuidendosi in molti rami, ne piu ne meno, che quel di dentro. Getta anche questa vena, quādo arriua al mezzo della coscia: alcune notabil vene, tra le quali ne mādā^l vna particolarmente al ^m primo musculo, che muoue la gamba. Di questa medesima vena, ne nascono altre ⁿ due (iui, doue questa si storce verso il chino del ginocchio) picciole, & vguali, delle quali vna si distende verso il ginocchio, l'altra verso il chino; benche quella del chino alle volte manca, & altre volte è tanto sottile, che quasi non si vede; che è all'hora, quando la ^o vena, che va al ginocchio, è maggior del solito. Et cono anche di questa vena (quando

Quāte vene principali vāno alla Gamba.

La maggior vena, che va alla Gamba.

Il primo ramo di questa Vena.

La diuersità di questo ramo per lo Piede.

Libro Sesto

cammina per la gamba) alcuni tralci, che vanno verso dietro, & verso nanzi, abbracciando la gamba, & congiungendosi in alcune parti, che lor son vicine. Scórro a questa vena detta ne nasce P vn'altra della medesima vena grande, la quale montando verso la banda di fuori si distribuisce per la pelle, che cuopre la parte di nāzi dell'osso del gallone, & per gli muscoli, che sono situati in questo luogo. Gettato che ha la vena grande queste due vene, subito si nasconde tra muscoli, che abbracciano l'osso della coscia, mandando vna notabil vena al ^r settimo, & nono muscolo, che muouono la gamba, della qual nascono certi ramuscelli, che vengono alla pelle. Piu in nanzi ne getta vn'altra ^s maggiore, che si distribuisce per lo ^t quinto muscolo, che muoue la coscia, gettando alcuni ramuscelli all'ottauo, che muoue la gamba. Nel medesimo modo getta molt'altre vene, che vanno a nutrir quasi tutti e muscoli, che abbracciano la coscia; tra le quali la ^x maggiore si congiunge al fine di quella vena, y che habbiamo detto passare per lo buco dell'osso del pettignone, & scendere infino a mezza la coscia, faccendola quasi tātō lunga, che arriua al ginocchio. Dopo di questo la vena grande scende storcendosi all'osso della coscia, alquāto verso dietro, & gettando alcuni ramuscelli molto sottili, che si vāno a distribuire per le tele, che cuoprono i principali nerui della gamba. Et di poi getta vn'altra ^z vena, la quale camminando verso la parte sua di dietro, manda alcuni ramuscelli, che montando in sù si cōpartono per la pelle. A questa vena si cōgiunge vn ramuscello ^a di quella, che habbiamo detto distribuirsi per lo quinto muscolo, che muoue la coscia, faccendo d'amendue vna mezzana vena, che (come habbiamo detto) va alla pelle; bēche molte volte accade ^b nascer due rami della vena grāde, vno piu alto, che l'altro, i quali congiungēdosi nel cammino, fanno q̄sta vena, che va alla pelle. La quale dopo l'hauer gettati ^c alcuni rami verso la parte piu alta di dietro della coscia, scēde dirittamente per mezzo del chino ^d del ginocchio alla polpa della gāba, & mādā per quella molti ^e ramuscelli, senza tenere ordine alcuno; anzi alcuni vāno diritti, alcun'altri in obliquo, & alcun'altri in trauerso, alcun'altri si congiungono al suo compagno faccendo di due vno. Questa moltitudine di vene è cagione, che in questa parte si facciano le varici. Gettati che ha questa vena questi ramuscelli, scende in alcuni infino al ^f tallone, & iui finisce; in altri si mescola con alcuni ramuscelli, che vengono per la parte di nanzi della gamba, & arriua fin doue ella passa; & distendendosi poi d'appgesso el ^g tallone di fuori va alla parte di sopra del pie tra pelle & carne. Im però la vena grande scende nella forma detta a canto dell'osso della coscia; & in tal modo si storce a quello, che, quando arriua al ginocchio, ^h passa tra le ⁱ teste di dietro della parte sua piu bassa; nella qual parte si diuide in due rami disuguali. ^k Quel di dentro (che è molto piu sottile) manda alcuni rami a muscoli della polpa della gāba, & principalmente alla patte di nanzi del ^l primo, & secondo, che muouono il piede, & insieme mādā alcuni ^m rami al corpo della parte di dentro della gamba. Ma, come ⁿ arriua questo ramo alla giunta piu hāsa del maggior fusello, & ha gettato alcuni rami alla pelle, si storce per sotto el tallone, & va per la banda di dētro del piede infino al dito pollice, doue si perde ordinariamente nella pelle; & alle volte va questo ramo tra l'osso del calcagno, & il maggior fusello, insieme colle corde, che per questa parte passano alla pianta del piè, ad inserirsi nelle dita. ^o Il ramo di verso fuori della diuisione, che si fa nel chino del ginocchio, è assai piu grosso, & si diuide in due vene, delle quali la ^p maggiore, & di piu in dentro, si distende tutta tra gli ^q muscoli, che occupano la polpa della gamba, scendendo dirittamente in prima tra'l principio del primo, & secondo di que, che muouono il piè; & tra'l quarto & quinto, che muouono vn medesimo piè; & di poi tra i muscoli, che piegano le dita, & nascono della gāba, toccando alle volte la ^r legatura, che congiunge gli due stinchi, secondo il lungo. In questo cammino sempre va gettando rami a muscoli, per doue passa; ma niuno di quelli, o molto pochi, arriua alla pelle. Questa vena, come arriua circa la metà della gāba dal ginocchio in giù, subito si diuide in altri due ^s rami; de quali quel di dentro getta vn ^t ramo alla congiuntura dell'osso del tallone, & del maggior stinco, & scende poi insieme con le corde de muscoli, & si storce dalla parte di dietro della gamba uerso la pianta del piede, tra'l calcagno & il maggior stinco, per sotto el ^u muscolo, che piega i secondi articoli delle dita; & mandando due ramuscelli al pollice, & altri due a quel, che sta al paro di lui, & vno a quel di mezzo, si finisce. Benche molte volte il ^x ramo di dētro si comparte per tutte le dita, senza passar ramo alcuno tra'l calcagno, & il maggior stinco.

Perche si fanno
facilmente le Va
rici nelle gā
be.

p a

q t. ii. 1
r li. ii. ta. iiii.
f f
f t. ii. 2.
t li. ii. t. viii.
oc. ta. xii. z
Σ π
u li. ii. t. viii.
Σ
x t. ii. x
y e
z 3.

a 2.

b 3. 4.

c 5.

d 6.

e 7.

f 8.

g li. i. t. iiii. z

h t. ii. 9.

i lib. i. ta. iiii.

16. 16.

k ta. ii. 10.

l lib. ii. t. xli.

φ ψ

m 11.

n 12.

o 13.

p 14.

q li. ii. t. xii.

xiii. xiiii. xv

r li. ii. t. xv. T

f 17.

t presso al 8.

u li. ii. t. xlii.

o

x ta. ii. 16.

stanco. Ma l'altro ramo, che è quel di fuori di questa vltima diuisione, si distende a canto del minor stinco; & come arriua vicino al fine della legatura, che congiunge gli due stinchi, getta vn ramo, che buca la legatura, & va al piede insieme con le corde de muscoli, che vanno a lui, per la parte dinanzi della gamba, mādando alcuni ramuscelli a muscoli, che storcono le dita del piè in fuori, & altri alla pelle, che cuopre il pettine del piede.

y 18. Il resto di questo ramo va alla pianta del piede insieme con le corde del settimo, & ottauo musculo, che muouono il piede, distribuendosi per lo dito picciolo, quando il ramo di dentro, che passa tra'l calcagno, & il maggior fusello, non manda rami a tutte le dita, & cosi si finisce di distribuire la vena grande per lo piè. Ben è vero che questa diuisione di vene non meno è varia nel piede, che nella mano; perche molte volte accade, che la ^b vena di dentro (che dissi nascondersi tra i muscoli della polpa della gamba) getta vn ^c ramo alla tela, che congiunge gli due stinchi; il quale scende a canto lei per la parte dinanzi della gamba, infino al pettine del piede, & in questo caso ^d la vena, che habbiamo detto spartirsi in due nella polpa, nō si sparte, anzi scende intera per la pianta del piede, & getta rami a tutte le dita. Alcuni'altra volta si nasconde vna ^e vena tra i muscoli, che occupano la parte dinanzi della gamba; la qual nasce del ^f ramo di fuori della diuision principale, che habbiamo detto farsi nel chino, & cammina verso la giunta di sopra del maggior stinco. Et subito getta vn ramuscello tra'l sesto & settimo musculo di que, che muouono il piè, del qual escono molti tralci, che vanno a nutrir gli muscoli, che sono nella parte dinanzi della gamba. Et alle volte getta molti ramuscelli alla pelle della parte di fuori della gamba, & il principal de quali va storcendosi hora in dietro, hora innanzi, infino che appresso il tallone di dentro si storce verso il pettine del piè, mescolandosi con altre vene, che passano per questa parte tra pelle & carne. Di modo, che essendo tanto differente il compartimento di queste vene, che vanno per la gamba & il piede, tra pelle & carne, & essendo tanto facile il poterle vedere in qual si voglia huomo viuio, legandole, come quando ne voglion trar sangue, non accade che io m'affatichi in voler metter ordine, oue non è.

z li. ij. t. vj. n Principalmente veggendo, che queste vene nascono tutte d'vn medesimo ^h tronco, che scende per l'anguinaie, & che appresso il ginocchio nella parte di dentro, si vede manifestamente nel piu delle persone, quel ramo ⁱ di dentro del tronco della vena grande, del qual solo molti de Greci commandauano che si trahesse sangue. Et per cio nō posso fare di non marauigliarmi de Medici, che dicono esser nel pettine del piè quattro vene differenti per cauare sangue; vna appresso il tallone di dentro, che chiamano la Saffena, quella della matrice, o la virginale; vn'altra appresso il tallone di fuori, la quale chiamano la Cea tica; vn'altra, che va al pollice, chiamata la Popletica; la quarta quella, che è appresso il dito picciolo, che chiamano delle Reni. Et con questo habbiamo finito la distribuzione della vena grande. Restarebbe hora a dire della vena Vmbilicale; ma, perche questa vena non serue a nulla nel corpo dell'huomo; & perche nel terzo libro feci particolar mentione di quella, qui solamente dirò, che quando entra nel fegato, non si sparte in molti rami, come il Vesalio dice, anzi senza spartirsi in ramo alcuno si cōgiunge alla vena Porta. Della quarta vena chiamata Arteriale diremo dopo l'hauer parlato dell'Arteria grande; perche ha alcuna concordanza con essa, come il nome dimostra.

Le vene del piè
nō osservano re-
gola nel distri-
buirsi.

In che modo si
hanno da consi-
derare le Vene
del Piede.

La vena Ombi-
licale.

*Del Nascimento dell' Arteria Grande, et della Distributione
sua dal Cuore in sù.*

Cap. II.

T VTTI gli antiqui Philosophi & Medici conuengono, che'l Cuore è principio, & origine dell'arterie; il che manifestamente dimostra l'esser la grande arteria in questa parte maggiore, che in niun'altra. Hora nasce l'Arteria grande della parte piu alta del ventricolo manco del cuore, con vn principio tondo, & duro, quasi come cartilagine. Et tosto, che è nata, passate le ^b tre tele, che (come nel quarto libro dicemo) vietano, che non ritornino gli spiriti et il sangue dall'arteria grāde al vetricolo māco del cuore, getta due molto piccioli rami; vno d'appresso le spalle della tela del lato diritto, & l'altro dalla parte di dietro del buco, che chiudono le dette tele; perche della sinistra nō ne nasce niuno. Questi rami cingono intorno intorno (come vna corona) la piu alta parte del cuore, insieme cō la vena Chiamata Coronale, & di loro nascono certi piccioli ramuscelli, che scē-

Il nascimēto del
l'Arteria gran-
de.

Libro Sesto

Divisione della
Arteria grande
in due parti.

Historia dell'ar-
teria dal Cuore
in sù.

L'arteria, che
va a gli muscoli
diritti del ven-
tre.

L'arteria, che
va alle mam-
melle.

Quella, che va
al braccio.

dono per lo cuore; de quali il piu grosso si vede nella parte, che è il piu grosso & il piu lar-
go del cuore, che è doue nasce il tramezzo tra e due suoi ventricoli. Di q̄sti due rami (an-
chor che siano quasi vguali) quel, che nasce dal lato diritto dalla bocca della grande arte-
ria, è ordinariamente piu grosso, & piu lungo. Gettati questi due ramuscelli monta l'ar-
teria grande dal mezzo della parte piu alta del cuore per sotto el ^d tronco della vena arte-
riale, & bucando le ^e tele del cuore, subito si sparte in due parti; delle quali ^f quella, che è
piu grossa, scende all'ingiù, l'altra va all'insù, montando tra la ^g canna del polmone, & la
^h vena grāde, & tra le tele, che fendono pel mezzo il petto. Et subito getta vn ramo ⁱ al
lato manco, che monta in obliquo verso la prima costa del medesimo lato; il quale tãto,
quanto è appoggiato al polmone, & legato alla tela da man māca, che fende il petto per
mezzo, non mai getta ramo alcuno, ma nell'arriuare alla prima costa, nascono di lui due
rami. ^k Vno dalla parte piu bassa, il qual passando p le radici delle coste, getta vn ramet-
to, ad ogni tramezzo delle quattro prime, d'ognuno de quali ne nascono altri due, che vā
no alla midolla spinale, & a muscoli, che in questa parte le sono sopra, & sopra le spalle.
^l L'altro dalla parte piu alta, assai maggiore che l' sopra detto; il qual montado in obliquo
allato el settimo nodo del collo, passa per gli buchi, che si fanno nel processo del lato ^m di
questo nodo, & di tutti gli altri del collo, gettando alcuni ramuscelli, che entrano alla mi-
dolla spinale per gli buchi, per doue escono i nerui, & altri a muscoli, che sono nella parte
di dietro del collo. Il resto di questa arteria monta (secondo che dice il Vesalio) insieme
con vna vena insino alla collottola, & amendue insieme entrano per vn spiraglio, che si
vede nella parte di dietro delle testicciuole dell'osso della collottola, & si spargono per
lo seno della dura madre dal suo lato; ma nō è così; come trattando delle vene & arterie
della testa diremo. Oltre di q̄sto ramo, che va a nodi del collo, nasce di piu ⁿ dell'arteria,
che dicēmo montar in obliquo verso la prima costa, ^o vn'altra arteria; la quale monta pa-
rimente, benchè piu in obliquo, & verso innanzi, che quella, & arriuado al piu alto del-
l'osso del petto, & attaccandosi alla tela del suo canto, che fende il petto, scende in obli-
quo per lo lato del detto osso, appresso doue s'attaccano le cartilagini delle coste. Questa
Arteria fa il medesimo cammino, & si diuide ne medesimi rami, che la ^p vena, che habbiā
detto scendere per sotto l'osso del petto, & vscire d'appresso alla forcella dello stomaco,
& distendersi per lo muscolo diritto del ventre dal suo lato. Et si come a questa vena ne
risponde vn' ^q altra dalla parte di sotto, ne piu ne meno fa l'arteria, che passa per questa
parte, eccetto che di questa arteria non va alcuno ramo alla pelle; &, se ne vanno alcuni
alle mammelle, son molto piccioli. Gettati questi rami cammina ^r l'arteria grande innan-
zi, storcendosi verso il braccio, & innanzi, che esca del voto del petto, quando vuole bu-
care il ^s secōdo muscolo, che muoue la schiena, getta vn' altro molto notabil ^s ramo, che
formontando insino alla collottola si distribuisce per gli muscoli, che occupano la parte
di dietro del collo, senza gettar ramo alcuno alla pelle. Dopo a questo, esce l'arteria del
voto del petto, & passa la prima costa, storcendosi insino all'arriuare vicino alla ascella, &
iui getta dalla parte di dietro vn mediocre ^t ramo, che si distribuisce per gli muscoli, che
occupano la parte di dentro della paletta della spalla. Et di poi ne getta vn' altro dalla par-
te di sopra, alquanto minore; il quale va alla congiuntura dell'osso dell'omero cō la pa-
letta della spalla, & appresso la punta dell'omero si diuide in molti ramuscelli, ^u vno de
quali s'accompagna con la ^x vena dell'omero, innāzi che esca fuor de muscoli. Dopo a
questo ramo, ne nasce vn' altro alquāto piu giu dell'arteria, che va all'ascella; il quale si
diuide in molti, che si distribuiscono per gli muscoli, che occupano il petto. Piu innanzi
nascono altri ^z ramuscelli, che vanno alle glandole, che stanno nell'ascelle. Et di poi ne na-
sce ^a vn' altro, che scēde per gli lati del petto, & s'inferisce principalmēte nel ^b muscolo,
che tira il braccio in giu. ^c Il resto di questa arteria insieme con la ^d vena del fegato, si di-
stende per lo braccio, nascondendosi tra i muscoli, che muouono l'omero, & mādando
alcuni ^e ramuscelli alla parte di dētro de muscoli che abbracciano l'omero; & alle tele,
che abbracciano e nerui, che passano per questa parte. Et di poi scēde a poco a poco con-
giungendosi al ^f ramo di dentro della vena grande, & gettando vn ^g ramo, che scende per
la parte di dietro dell'osso dell'omero, appresso doue s'attaccano i muscoli, che disten-
dono il gomito, & cammina insino al ^h tubercolo di fuori dell'omero, & qui si perde
tra le corde de muscoli, accompagnata dalla ⁱ vena, che dicēmo passar per questo luogo.

Fatto

d lib. iij. fig.
vj. l' o passa
sotto l l
e la med. fig.
iij. la H p
la A
f t. iij. j. lib.
iij. fi. vj. R
g fi. vj. Y
h la med. N.
t. v. a
i t. iij. D
k la med E
l la med F
m lib. j. e. v. fi.
vj. o o

n t. iij. D
o G. lib. iij.
fi. ij. D

p t. ij. L. li. ij.
t. vj. a. li. iij.
fi. j. K

q li. iij. fi. j. I

r t. iij. D

s li. ij. t. viij.
C
f t. iij. H

t la med. I

u la med. K

x t. ij. a a

y t. iij. L

z fra' l L & la

M

a la med. M

b li. ij. fi. x. o

c t. iij. N

d t. ij. m

e appresso

al N

f t. ij. q q

g t. iij. O

h li. j. t. vj. fi.

vj. dal Y al

p

i t. ij. p

k lib.ij. ta.vj. Fatto questo, subito si nasconde l'arteria tra ^k i muscoli, che piegano il gomito, mandan-
 do loro alcuni rami, & dipoi si storce verso la sanguinella, & manda due^l ramuscelli, vno
 per lato, alla congiuntura del gomito, passando appresso al fine del ^m secondo muscolo,
 che piega il gomito, tanto scoperta, che si sente manifestamente battere. Dopo a questo
 scende, nascondendosi tra l' muscolo, che piega i secondi articoli, & quel, che muoue gli
 terzi delle quattro dita, spartendosi ⁿ in due rami, che vanno l'vno a canto del minor fu-
 sello, l'altro a canto del maggiore. Quel del minore (che è quel, nel quale ogni dì piglia-
 mo il polso) getta vn ^o ramuscello innāzi al fine del bracciale, il qual va per sotto le ^p cor-
 de de muscoli, che distēdono il pollice, alla parte di fuori della mano, et si distribuisce per
 gli ^q muscoli, che sono tra l' primo osso del pollice, & l'osso della palma, che sostiene l'in-
 dice. Gettato q̄sto ramo passa l'arteria per sotto la ^r legatura intrauerfata, che è nella par-
 te di dētro del bracciale, & per sotto la tela ^s della mano, diuidendosi in tre ^t rami, ne piu
 ne meno, che si facciano il neruo & la vena in questa parte. Di questi rami il primo &
 secondo si spartono, ognuno in due, che si distēdono, il primo per gli lati della par-
 te di dentro del pollice, il secondo per gli medesimi lati dell'indice, il terzo senza diui-
 derli va al lato di dentro della parte di dentro del dito di mezzo. ^u Il ramo, che va a can-
 to del maggior fusello, cammina anche infino all'arriuare alla palma della mano, tan-
 to nascosto tra i muscoli, che non si sente battere, se non in alcuni molto magri, & pas-
 sando così per sotto la legatura intrauerfata del bracciale, & la tela della mano manda ^v
 due rami al dito picciolo, & altri due all'annulare, & vno allato di fuori di q̄l di mezzo.
 Questo ramo se ben ordinariamente non manda vena alcuna al riuerso della mano, alle
 volte getta ^x vn ramuscello a muscoli, che occupano il lato di fuori dell'osso della pal-
 ma, che sostiene il dito picciolo, & così si finisce la distributione del primo ramo dell'ar-
 teria per lo braccio sinistro, il qual dicemmo nascer del lato sinistro di quella, dopo l'es-
 sere uscita del cuore. Gettato che ha il tronco dell'arteria grande questo ramo monta
 vn poco piu in sù dirittamente, a canto della ^z canna del polmone, infino all'arriuare al-
 le ^a glandole, che sono nella strozza, che le fan fuolo in questa parte, ne piu ne meno, che
 habbiam detto fare alle vene, faccendola anche piu gagliarda. Hora arriuando a questa
 parte, innanzi, che esca del voto del petto, si diuide in due rami disuguali, ^b vno sinistro,
 & minore, e l'altro diritto, & maggiore, chiamate Arterie Soporali. Il minor si storce vn
 poco a man manca, & monta accompagnato dalla vena ^d giugulare interiore, a canto el
 lato manco della canna del polmone infino alla gola; doue si sparte in ^e due rami, de qua-
 li il minore, & di piu in fuori manda vn ramuscello alle guance, & dipoi si sparte in due,
 che vanno, l'vno alla tempia sinistra, l'altro dietro l'orecchia, tanto in fuori, che si sento-
 no battere. Il maggiore, & di piu in dentro, passa sotto le fauci, mandando alcuni ramu-
 scelli a muscoli, che sono attaccati al gargarozzo, & alla ^f lingua, & dapoi va al fondo del
 la testa. Ma innanzi, che entri dentro del craneo si diuide anche in due rami, vno ^h mag-
 giore, che entra per vn ⁱ buco, che si fa nell'osso cuneale sopra ^k quella parte sua, che è si-
 mile ad vna sella, nella qual habbiam detto esser quella glādola, che riceue la flemma del
 capo. Il quale tosto, che entra nella testa, si diuide anche in due rami; ^l vno, che va al voto
 del naso per ^m vn buco fatto particolarmente per lui, & si perde tra le cartilagini & le ali
 del naso, accōpagnato da gli fini d'alcune picciole arterie, che, come diremo, vanno alla
 faccia; ⁿ l'altro, che si distēde per tutta la ^o dura madre, diuidendosi in molti ramuscelli.
 Ma il corpo dell'arteria subito dopo l'hauer gettati questi rami si diuide ^p in altri due, &
 appoggiandosi al fondo della testa cammina così diuiso alquanto innanzi, & dipoi si ri-
 congiunge, gettando vn ^r notabil ramo, che passa per lo ^s buco del secondo paio di nerui
 all'occhio, & alla parte di dentro ^t del muscolo delle tempie. Il ^u resto dell'arteria buca la
 dura madre, & monta, parte alla ^v pia madre, & ^z parte al ventricolo manco delle cer-
 uella, faccendo in tutto il cammino vn viluppo, come fascia. ^a L'altro ramo della parte
 dell'arteria, (che ho detto montare al craneo) va accompagnato da vna ^b vena verso la par-
 te di dietro del fondo della testa, mandando ^c vn ramo a ^d muscoli, che occupano la parte
 dinanzi de nodi del collo, tra l' primo nodo, & il secondo; & dipoi entra nella testa, accō-
 pagnato da vna vena, per lo ^e buco, oue diremo entrare il sesto paio de ^f nerui della testa,
 & si perde nel seno manco della dura madre. ^g Il ramo diritto, & maggiore, dell'arteria
 grande monta parimente diritto in sù; & come arriua alla prima coita, getta dal lato de-
 stro

L'arteria, oue
pigliamo il pol-
so.

Historia del trō-
co dell'arteria,
che monta ver-
so la Testa.

L'arteria, che
va al braccio di-
ritto.

Libro Sesto

stro vn grosso ramo, che si distribuisce per li tramezzi delle prime coste, per li processi de lati de nodi del collo, per l'osso del petto, per gli muscoli, che sono nella parte di dietro del collo, per lo braccio destro, & in cōclusione per tutte l'altre parti, allequali habbiam detto distribuirsi il ramo, che va al braccio sinistro. Gettato questo ramo resta ^h questa arteria ⁱ vguale a quella, che habbiam detto montar dal lato manco, a canto la canna del polmone, faccendo il medesimo cammino, & chiamandosi amendue d'vn medesimo nome, cioè Carotides, o Soporales, che vuol dir Sonnolente, o che danno sonno; perche oppilandosi, o uer chiudendosi in qual si voglia modo, subito ci addormentiamo. La qual esperienza vidi io fare a Realdo Colombo l'anno del 1544. in Pisa in vn giouane, dinanzi a molti gentilhuomini, con non meno spauento loro, che riso nostro, dando loro ad intendere che tal cosa si facea per via d'incanto. E anche da notare, che del ^k ramo di fuori della diuisione dell'arteria sinistra (innanzi che entri nella testa) nasce vna picciola arteria, che va alle guance, & di poi si sparte in due parti, vna delle quali va alle tempie, & è quell'arteria, che in quelle sentiamo battere, & l'altra va dietro l'orecchia sinistra, & anche ha manifesto polso.

Perche l'arterie del sonno furono chiamate così.

Della Distributione dell' Arteria Grande dal Cuore in giù.

Cap. 12.

GIA dicemmo, che tosto, che l'Arteria Grande uscì del cuore, si diuidea in due rami, vno che montaua, vn' altro, che scendea. Habbiamo detto di quel, che monta, restane a dire di quel, che scende. ^a Il quale cala attaccato a nodi della schiena sotto la vena grande, & tosto, che nasce, getta dalla parte di dietro, (che è attaccata a nodi) da ogni lato vn ^b ramuscello a tutti gli tramezzi delle noue coste piu basse; i quali vanno, ne piu ne meno, che ^c gli rami della vena sola, nelle coste intiere insino alle cartilagini, nelle medese piu innanzi. Di questi rami escono alcuni ramuscelli, che vanno alla midolla spina le per gli ^d buchi de nerui, & di poi a muscoli, che sono attaccati a nodi della schiena, ne piu ne meno, che habbiam detto far gli rami della vena senza compagna. Ma il tronco dell'arteria scende dirittamēte appoggiato al lato manco de corpi de nodi della schiena; & passando tra ^f la diaframa & l'vndecimo nodo delle spalle manda ^g vn ramo da ogni lato alla diaframa, il quale si sparte in molti, che si perdono per essa, principalmēte per la parte piu bassa appresso a nodi della schiena, mandando alcuni ramuscelli alla parte ^h sua piu alta, & a quella parte ⁱ delle tele del cuore, che si attacca a essa. Dopo questo nasce dell'arteria grande vn tronco, del qual nascono alcuni ^k rami, che vanno allo stomaco, al fegato, al fiele, alla milza, alla reticella, all'intestino duodeno, & alla parte dell'intestino grasso, che si attacca allo stomaco in questa forma. In prima passa questo ^l tronco per sopra la parte piu alta della tela di dietro della reticella, & si diuide in ^m due rami quasi vguale, il maggior de quali va a ⁿ sinistra, & il minore a man destra. Il ramo destro si cōgiunge alla vena chiamata Porta, in quelle ^o glandole, che si veggono sotto la parte di dietro dello stomaco; nella qual parte si lega alle tele della reticella, & monta al concauo del fegato, & nella merà del camino getta dalla parte piu bassa vn ramuscello, che va alla tela di sotto della reticella, & alla parte dell'intestino grasso, che le è appresso. Dopo q̄sto manda dalla parte piu alta vn' altro ^p ramo allo stomaco, il qual si distribuisce nell'ultima sua parte, che risponde alla schiena, diuidendosi in alcuni ramuscelli. Dalla piu bassa manda vn' altro ramo, il qual camminando verso il concauo del fegato si sparte in due arterie; ^q vna delle quali va all'intestino, che è attaccato col fondo dello stomaco, dal suo mezzo insino al principio dell'intestin digiuno; l'altra ^r (che è alquāto maggiore) si storce verso il lato destro del fondo dello stomaco, & attaccandosi alla tela di fuori della reticella, getta dalla parte piu alta alcuni rami, che vāno ad inserirsi nella parte dināzi & di dietro del fondo dello stomaco. Et nel medesimo modo ne getta de gli altri dalla parte piu bassa, che vanno alla tela di fuori della reticella, & così finisce ^s questa arteria al mezzo del fondo dello stomaco, accompagnata da vn ramo della vena porta. ^t Il resto, che auanza, del ramo diritto di questa arteria grande, dopo l'hauer gettati dalla parte piu alta due piccioli rami alla vescica del fiele, ^u subito si sparte i molti rami, che si vāno ad inserire nel cōcauo del fegato, senza penetrare molto a dietro ^p la sustāza sua. ^x Il ramo sinistro (che habbia detto

L'arterie, che vanno a muscoli, che sono fra le coste.

L'arterie, che vāno alle membrane della digestione.

h la med. z
i la med. x

k la med. b

a t.iii. I

b la mede.

k k k. fig.

ii. A

c ta. ij. G G.

escano dal

F F

d lib. j. ta. vj.

fi. j. Q Q

e l. ij. t. vij. q

f la med. Δ

g t. iij. l

h lib. i. t. vij.

fi. ij. m

i li. iij. fi. iij.

C D E F G

k t. ii. j. fig. ij.

m

l lib. iij. fig.

iiij. β

m t. iij. fi. ij.

u u. ta. v. fi.

ii. f

n lib. iij. fig.

iiij. m

o t. iij. fig. ij.

o. t. v. fi. iij. c

p la med. p h

q la med. q

r la med. r

s lib. iij. fi. ij.

dal R al T.

fi. xij. xiiij.

c

t. iij. fi. ij. f

u la med. t

x la med. u

detto nascer del tronco dell'arteria, & diceuamo essere alquanto piu grosso che'l destro) si attacca alla tela di dentro della reticella, & all'animelle, che si veggono in lei, congiungendosi ad vn ramo della vena porta, & diuidendosi ne medesimi rami, che lui: cio è, vno y la med. x che nasce della parte sua piu alta, & si va a inferire nello stomaco, per la parte, oue è appoggiato alle spalle (anchor che di qsto ramo nasce da ogni lato vn^o ramuscello, che va alla metà di questa medesima parte dello stomaco, che è appoggiata alle spalle); di poi a la med. z montando in su^a cinge tutto intorno la bocca dello stomaco, ne piu ne meno, che habbiam detto fare il ramo della vena porta; & getta alcuni^b rami allo stomaco, & molte assai sottili & picciole arterie, al fine della canna della gola; vna delle quali scende per la parte di nanzi dello stomaco alquanto verso man diritta infino al fondo suo, gettando pel camino alcuni tralci, cosi à man destra, come a man sinistra. c Il ramo sinistro di questa arteria getta ordinariamente (quando arriua alla milza dalla parte piu bassa) vn^d ramo d la med. β alla tela di dentro della reticella; il quale poco dapoi, che è nato, si sparte in due, molto se parati l'uno dall'altro, de quali nascono molte arterie, che scédono tutte per la tela detta della reticella, & per l'intestino grosso. Dopo questo passa in nanzi questo ramo sinistro dell'arteria piu a man manca diuidendosi in due arterie (ne piu ne meno, che la vena, cō la quale è accompagnato), & queste in altre, & cosi di mano in mano, infino che diuidendosi in moltissimi^e rami, s'inferisce dirittamēte nella concauità della milza. Ma in nāzi, ch'entre i lei, nasce dalla piu bassa parte della piu bassa arzeria, che va alla milza, vn^f ramuscello, che va alla tela di dentro della reticella, & da quella, che segue i su, nasce nell'istesso modo vn'altra^g arteria, che appoggiata alla tela di fuori della reticella camina a man destra infino al fondo dello stomaco, & passando per tutto il lato sinistro di questo fondo, getta alcuni ramuscelli intorno intorno alla parte di nanzi & di dietro dello stomaco, & altri alla tela di fuori della reticella. h Nascono anchora d'altri rami, che vanno alla milza, alcuni ramuscelli, che vanno al lato manco, & alla bocca dello stomaco (ne piu ne meno, che habbiā detto far le vene, che andauano dalla milza allo stomaco); & a questo modo si finisce la distributione di questo ramo. i Vn poco piu in giù del quale ne nasce k vn'altro del tronco dell'arteria grande, & si distribuisce per la parte piu alta del mesenterio, diuidendosi in molti ramuscelli (nell'istessa guisa, che habbiam detto far la vena porta), che vāno all'intestino digiuno, & al sottile, & a quella parte del grosso, che piglia dal concauo del fegato infino al rognone manco. Dopo a questo nasce da ogni lato dall'arteria grande l vn grosso ramo, non l'uno scontro all'altro, anzi alle volte il diritto è piu alto, alle volte il manco, senza guardare in cio ordine alcuno; ben che le piu volte si ritroua il diritto piu alto, & amendue nascono della parte di nanzi dell'arteria, & attrauerfano dirittamente, ognuno infino al rognone dal suo lato, ne piu ne meno, che le vene emulgenti o succiatrici; benche di queste ordinariamente non nasce ramuscello alcuno, che vada alla tela grossa, che cuopre i rognoni, come fa delle vene. Ne anche nasce dell'arteria sinistra condotto alcuno del seme, come habbiam detto nascer della vena succiatrice sinistra; perche questo condotto nasce sempre del tronco dell'arteria grande scontro al diritto (che è ordinariamente appresso doue nasce la vena d condotto diritto del seme, & alle volte piu in giù) & amenduni poco poi, che son nati, m s'attaccano al cōdotto, che nasce della vena del medesimo lato; ma il destro n attrauerfa prima sopra il tronco della vena grande, & cosi cammina faccendo il cammino, che nel capitolo nono habbiā detto, Vn poco piu in giù nasce del tronco dell'arteria grade dalla parte dinanzi o vn ramuscello, che si distribuisce per la parte piu bassa del mesenterio, & per l'intestino grasso dalla milza infino all'intestino retto, & per esso intestino anchora. Dalla parte di dietro del tronco dell'arteria grāde, nascono per tutto il lungo suo (che passa sopra e muscoli de no di de lombi) cerri p ramuscelli da amendue i lati, che vanno all'ossa de lōbi, & alla midolla loro, & a muscoli, che lor son vicini. Tutti questi ramuscelli sono, vguale, eccetto q due, che nascono, vno per lato, appresso l'osso grande, i quai nō solo si distribuiscono per l'ossafa, midolle, & muscoli, che lor son vicini, ma anche attrauerfano per lo peritoneo, & per gli muscoli del vētre infino a i fianchi. r Et è da notare che infino a qui l'arteria è sempre scesa sotto della vena grande; ma, come arriua all'osso grande, formonta la vena, faccendola vna all'arteria come fuolo, perche l'osso grande non la offenda. s Et in questa parte si diuide in due rami (come anche habbiam detto far la vena), i quali in nanzi, che arti

La principal arteria, che va al mesenterio.

Quelle de Ro-gnoni.

L'Arteria del Seme.

Quelli, che vanno a Lōbi.

La diuisione dell'arteria, appresso l'osso grande.

uino

Libro Sesto

nino alla coscia, tornano ad entrare sotto le vene, & i rami, che nascono dell'arteria appresso la diuisione detta, son del tutto simili a quelli, che fa la vena; eccetto che dalla parte di sotto dell'arteria, tosto poi, che è diuisa, ^t nascono certi rami tanto grandi, che paiono vene, li quali scendono appoggiati all'osso grãde, & entrano per gli suoi buchi, & vanno alla midolla, & alla parte di dietro dell'osso. ^u Gli due rami dell'arteria grande poco piu in giù di doue si diuisero, si diuidono in due rami, ^x vno di dentro, & minore, ^y l'altro di fuori, & maggiore; il minore tosto si torna a diuidere in altri due rami, vno piu in dentro, vn'altro piu in fuori. Quel ^z di fuori scende insieme con la ^a vena tra l'osso grande, & quel del gallone, p doue si separano l'uno dall'altro, gettando molti ramuscelli a muscoli, che cuoprono l'ossa dell'anche, & alla congiuntura del gallone. ^b Quel di piu in dentro ne gli huomini getta alcuni ramuscelli al collo, & fondo della vescica, & nell'intestino retto; nelle donne (nelle quali questo ramo ^c è grosso) getta molti ramuscelli al fondo della matrice, & a quel della vescica, & al collo della matrice. ^d Il resto di questo ramo cammina all'in giù, & nel scẽdere se gli inferisce ^e l'arteria, che diremo venir dal bellico a questa parte, Et di poi scẽde insieme con la ^f vena infino al buco dell'osso del pettignone; doue ^g se gli cõgiunge vn ramuscello del ramo di fuori. Et di poi passa per lo detto buco distribuendosi per gli muscoli, che l'atturano, & per que, che nascono dell'osso del pettignone, ne piu ne meno, che la uena, ^h congiungendosi anche il capo di questo ramo ad vn'altro ramo dell'arteria grande, il qual si distribuisce per lo quinto ⁱ muscolo, che muoue la coscia, come subito diremo. Perche il ^k ramo di fuori del tronco sinistro dell'arteria (quello, che anchora si deue intendere del destro) dopo l'esserli diuiso sopra l'osso grande scende per l'anguinaia infino alla gamba, & vn poco in nanzi che pertugi il peritoneo, getta ^l vn ramo dalla parte di nanzi, il quale pertugiando il peritoneo, & il muscolo attraversato del ventre, ^m monta per lo muscolo diritto, gettando alcuni ramuscelli a gli lati infino al cõgiungerli con ⁿ quella, che habbiamo detto scẽdere, ne piu ne meno, che fece la vena. Da poi che ha passato il peritoneo, mada ^o vn ramuscello alla cõgiuntura dell'osfa del pettignone, il quale non fa molti rami, come fece la ^p vena, ne manda ramo alcuno alla pelle, eccetto alcuni molto piccioli, che vanno alla pelle del membro. Dopo questo scende il ^q tronco per la gamba sotto la vena, gettando ^r vn ramo, che si distribuisce per gli muscoli, che abbracciano l'osso della coscia, senza mandar ramo alcuno alla pelle. Piu in giù ne getta ^s vn'altro, che si distribuisce per lo quinto muscolo, che muoue la coscia, & per que, che occupano la parte sua di dentro, scendendo infino appresso al ginocchio diuiso in molti ramuscelli; vno de quali si ^t congiunge al ramo, che habbiamo detto scẽdere per lo buco dell'osso del pettignone. Il tronco dell'arteria scende dall'anguinaia, riuoltandosi all'osso della coscia in tal forma, che va a passare p dentro ^u le due sue teste di dietro, scendendo sempre per lo chino, accompagnato sempre dalla vena piu grossa, che va per la gamba. Di questa arteria nascono nel calare per la coscia alcuni ^x rami, che si distribuiscono per gli muscoli, che occupano la parte di dietro della coscia, ^y accõpagnati da gli rami, che habbiamo detto nascer di quella vena, che scende per lo chino del ginocchio & si stende faccendosi molti rami per la polpa della gamba, tra pelle, & carne. Nondimeno l'arteria grãde nascõdendosi nel chino del ginocchio, ^z getta subito due rami, da ogni lato vno, che si distribuiscono per gli lati della congiuntura del ginocchio, nascõdendosi ogn' hora piu, & vn poco piu in giù getta dal lato di fuori ^a vn ramo, che scẽde a cãto del minor stinco, & si nascõde tra l' settimo & ottauo ^b muscolo, che muouono el piede, maddando alcuni ramuscelli a muscoli, che occupano la parte di nãzi della gãba infino sotto la forcella. Dopo questo scẽde i ^c tronco dell'arteria per dentro il ^d quarto muscolo, che muoue il piè, & il ^e due, che piegano gli terzi articoli delle quattro dita, & il ^f quinto, che muoue il piede, quasi a canto della ^g tela, che congiunge gli due stinchi per lo lungo. Passata la metà della gãba subito si sparte in due ^h rami, de quali quel di dentro passa tra l'osso del calcagno & il maggior stinco, alla pianta del piede, insieme con le corde de muscoli, che passano per questa parte, & nel passare manda vn ⁱ ramuscello alla cõgiuntura dell'osso del tallone col maggior stinco. Nella pianta del piede, nascõdendosi tra i ^k muscoli che piegano gli secondi articoli delle dita, & le corde di quelli, che piegano similmente gli terzi articoli, si sparte ^l in due ramuscelli, vno che va al dito indice, spartendosi anche in prima in altri due rami; & l'altro, che va al lato di dentro della parte di sotto del dito di mezzo,

L'arteria, che passa per lo buco dell'osso del Pettignone.

L'arteria, che va alla Gamba.

t tra le due
v
u ta. iiii. v.
x la med. g
y la med. f
z la med. o
a t.ii. r
b t.iiij. r r
c lib. iij. fig.
xxvi. v. x
d t.iiij. c
e la med. p
f lib. iij. h ij.
K, L
g t.iiij. c
h la med. o
i li.ii. t. viii.
f, c
k t.iiij. v, v
l la med. r
m lib. ii. t. vi.
dale al t
n ta. iij. Y
o t. iij. v
p t.ij. Δ
q t.iiij. f. t. v.
r t. iij. x
s la med. v
t la med. o
u lib. i. t. iij.
fra li duo.
16, 16
x t. iij. r
y t. v. f. t
z t. iij. Δ
a la mede. g
b lib. ii. t. vi.
f, v
c t. iij. o
d li. ij. t. xiii.
v
e li. ii. t. xiii.
Δ, g
f lib. ii. t. xv.
fi. xv. D, E
g la med. T
h t. iij. r
i la med. f
k li. ii. t. iij.
o
l t. iij. o

m la med. n mezzo, senza diuiderfi. m Il ramo di fuori de i due, che cominciano di sotto la metà della gāba dal ginocchio in giù, va similmente alla pianta del piede, ma tra l'osso del calcagno, & il minor stinco, insieme con le corde del settimo & ottauo musculo, che muouono il piede, mandando anchora vn^a ramuscello a questa congiuntura, & distribuendosi alle dita picciole, & al lato di fuori di quel di mezzo. Et sotto el tallone getta questo ramo vna arteria, maggior, che quella, che mandò alla congiuntura dell'osso del calcagno, & al minor stinco, la qual si distribuiscer per lo principio de muscoli, che storcono il dito grāde, & per gli re, che gli sono piu appresso verso la banda di fuori, & si sente manifestamente battere. Benche la distribution di questa arteria in questo luogo non meno è differente, che quella della vena, p perche molte volte si vede, che'l ramo, che passa tra'l calcagno, & il maggior stinco, mada ad ogni dito i suoi due ramuscelli, & allhora l'altro, che passaua tra'l minor stinco, & il calcagno, non arriua alla pianta del piede. Et dell'arteria, che si nasconde nel chino, nasce vn grosso ramo, che buca la 9^a tela, che congiunge gli due stinchi secondo il lungo, quando per la parte piu alta, quando per la piu bassa, secondo che'l ramo dell'arteria, che va a canto el maggior fusello, al settimo, & ottauo musculo, che muouono il pie, si finisce piu in giù, o piu in sù. Et come ha bucato la detta tela, va alla parte di nanzi della gamba, tra i muscoli, che occupano questa parte, passando insieme colle corde loro per sotto la 1^a legatura intrauersata, che sta nel collo del piede, distribuendosi per lo pettine del piede sotto e' muscoli, che storcono in fuori le dita sopra dette.

Come si distribuiscer l'arteria per lo Piede.

Delle Vene, & Arterie di dentro della Testa.

Cap. 13.

PERCHE parlando della Distributione delle vene & arterie, che montauano per lo collo, dicēmo, come alcuni rami loro entrauano nella testa, la distribution de quali non seguimmo allhora per schifare confusione; Sarà bene trattare hora particolarmente di quelli, cominciando da quelli della vena; e quali sono da ogni lato sei. Il primo (secondo l'ordine, che allhora contammo) è quel ramo, che montaua per gli buchi de processi de lati del collo. Il secōdo & terzo sono i due rami di dentro della vena giugulare; el vno de quali è piu grosso di quanti n'entrano per la testa, & entra per quel^o buco, per doue esce il sesto paio di nerui, mandando in prima alcuni ramuscelli alla parte dināzi de due primi nodi del collo; l'altro entra per vn^o buco, che è appresso il buco, di doue escono il terzo & quarto paio di nerui, senza essere accompagnato da alcuna arteria. Il quarto è la vena giugulare esteriore, la quale entra nella testa per lo^o buco, che è appresso il fine della commessura lambdoide nell'osso della collottola. Il quinto ramo è quel, che habbiā detto entrare per lo^o buco dell'osso cuneale, di doue esce il^o secōdo paio di nerui. Il sesto entra per quel^o buco dell'ottauo osso, che è il maggior de gli altri, & questo è, quāto tocca a gli rami delle vene. Di quelli dell'arterie, p il primo habbiā detto montare insieme col primo ramo della vena, per gli buchi de processi de lati de nodi del collo, & entrar con esso nella testa per lo medesimo buco. Il 9^o secōdo & terzo erano due rami dell'arteria del sonno; l'vno de quali habbiā detto entrare insieme cō la vena per lo buco del sesto paio di nerui; l'altro habbiā detto mōtar senza compagnia di vena, & entrare per vn particolar buco nella testa. Tutti questi rami vanno alla testa nella forma detta; ma, come entrano dentro, si distribuisceno, quando congiungendosi l'vno all'altro, quādo tornandosi a spartire nella forma seguente. Già habbiā detto, come la dura madre spartiu la parte destra delle ceruella dalla sinistra, & quella dināzi da quella di dietro, faccendo vn^o tramezzo simile ad vna Falce tra l'vno & l'altro. In questo tramezzo ci son certiⁱ seni, come vene, assai piu grossi, che gli rami, che mōtauo per la fronte, benche non son tondi, come vene, anzi fanno certiⁱ triangoli secondo il lungo, & perciò si vede in alcuni feriti batter questa membrana. A questi seni rispōdono le^e vene, & arterie, che entrano nella testa, & di loro nascono molti ramuscelli, che si vāno ad inserire nella secōda tela, che fascia le ceruella, chiamata la Pia madre, per la qual cāminano infino a vētricoli delle ceruella, faccendo varij offitij, chi di vena, chi d'arteria, & chi di vena & arteria. De gli sei rami di vena, & tre arterie, che habbiā detto montare da ogni lato, la^a prima vena, & la^a y prima arteria montano per gli buchi de processi de lati del collo; la seconda vena con la seconda arteria entrano nella testa per lo^o quarto buco dell'osso della collottola, che è da lati del buco della schiena, & entrando dietro l'arteria si perde subito senza passar

Sei paia di rami di vene vāno alla Testa.

Quante arterie vanno alla Testa.

I seni della dura madre.

Libro Sesto

Il primo, & se-
condo.

Il terzo.

Il quarto.

L'offitio di que-
sti seni.

Le vene, che
escono del quar-
to seno della du-
ra madre.

passar piu innanzi. Benche il Vesalio dica che cammina con la vena, faccedole cōpagnia; la quale entra nel principio del^a seno della dura madre dal suo lato, Che comincia appres- so doue questa vena & arteria entrano nella testa, & mōta attaccato all'osso della collot- tola, & nel montare riceue la quarta^b vena, che habbiā detto nascer della vena giugulare esteriore, & entrare pel suo particolar buco nella testa. Dopò questo mōta questo seno alquanto piu verso la collottola raggirandosi, come la quarta parte d'un cerchio, infino all'arriuare alla parte piu alta del celabro, che rispōde all'osso della collottola, doue si cō- giunge & il seno manco col destro, & d'amendue si fa come^d vna borsetta, che parimēte è attaccata all'osso della collottola, piu in giù del fine della commessura sagittale. Passata questa borsetta si fanno subito altri due seni nell'istessa dura madre, differēti in figura, & lunghezza Perche^e l'vno è piu lungo, & va a canto del craneo per mezzo della commes- sura sagittale, cāminando innanzi infino^f al processo dell'ottauo osso della testa, che di- uide i leggi od organi dell'odorare. Et nel medesimo modo, che si stendono il primo & secondo seno per la dura madre, tra le ceruella, & il celabro, per la parte, oue si congiun- gono al craneo, cosi questo terzo si distende per la medesima membrana o tela, per tutto quello spatio, nel quale si diuide la parte sinistra delle ceruella dalla destra. Il^g quarto se- no comincia dalla parte dinanzi, doue si cōgiungono gli due primi seni, & cammina di- ritto verso la parte dinanzi delle ceruella (senza scendere o montare) per tutto il lungo^h del celabro, infino all'arriuare a quelleⁱ parti, che diremo esser simili alle natiche. In que- sti quattro seni entrano le prime vene, & arterie, & da loro mandano alla dura & pia ma- dre i seguenti rami. In prima il primo & secondo mandano alla parte^k della dura madre (che cuopre il celabro) diuersi^l rami, & questi mandano altri^m piu piccioli alla pia ma- dre, che cuopre il medesimo celabro, & il separa dalle ceruella. ⁿ Del terzo seno nascono anchora molti, & molto grossi rami da ogni lato, che si distribuiscō per la pia madre, che cuopre, & abbraccia per di sopra amendue le parti delle ceruella, diuidendosi in mol- ti, & molto sottili rami, li quali mi paiono tanto impossibili a contare, quanto superfluo. Nascono anchora (oltre a questi rami) dalla parte piu bassa di questo seno^o alcuni ramu- scelli, che si distribuiscō per quella parte della dura madre, che diuide la parte destra delle ceruella dalla sinistra, & della parte piu alta del medesimo nascono altre^p molto for- tili venuzze, che si congiungono a quelle vene, che mōtano per la pelle della testa, & en- trano nel voto suo per certi buchi del craneo. ^q Escono anchora del quarto seno molti ramuscelli di vene, quasi tutte simili fra se stesse; perche, come questo seno arriua a quella parte delle ceruella, che diremo esser simili alle natiche, & getta alcuni ramuscelli, che na- scono della parte sua piu alta, & si spargono per quella parte della dura madre, che diui- de la parte destra delle ceruella dalla sinistra, & altri piu sottili, che nascono di poi nel pro- cesso de' suoi lati, & vāno a semminarsi per la dura madre, che fascia il celabro; fa vna^r cō- cavità per tutta la parte sua piu alta simile ad vna vena, la qual cāminando secondo il lun- go della testa per la parte piu bassa della dura madre (che habbiām detto spartir l'vna par- te delle ceruella dall'altra) arriua infino al tramezzo de' seni dell'organo dell'odorare, mā dādo nel cāmino dalla parte piu alta alcuni ramuscelli alla detta parte della dura madre. Oltre a questa notabil vena nascono anchora di questo medesimo seno nel medesimo luogo, che lui, a lati della sopra detta vena, ^s altre due vene, le quali vāno, ognuna dal suo lato, per sopra il^t corpo delle ceruella, che diremo esser simile ad vn callo, secondo tutto il lato della testa. Et nel passare manda alcuni^u ramuscelli alla pia madre, distribuendosi il sinistro per la parte sinistra, il destro per la destra. ^v Nascono di piu di questo seno della parte sua piu bassa, appresso la parte delle vene simile a testicoli, alcune venuzze, che si di- stribuiscō per la pia madre, che fascia il celabro; delle quali alcune distendendosi a die- tro montano alla parte piu alta del celabro; passando altre per le riualte sue piu basse, en- trano per la sustāza delle ceruella infino all'arriuare a i ventricoli dinanzi delle ceruella, doue si^y mescolano con vno viluppo di vene, & arterie, che iui si vede. Nasce di piu dal fin di questo seno dalla parte sua piu bassa appresso la parte delle ceruella simile a te- sticoli, ^z vna vena, che cammina dirittamente per mezzo di loro, & per sopra quella glandola simile ad vna pina, che è attaccata a gli testicoli delle ceruella, & per sotto el tetto del terzo ventricolo, chiamato Chamerato, a gli ventricoli delle ceruella; ^a doue fa certe pieghe simili alle secondine, per la qual cosa furono chiamate Choroides. A que- sta vena dipoi, che è nata, si congiungono alcune teluzze della pia madre, che abbraccia-

no gli

a t. iij. fi. ij. M
li. v. fi. ix. T
T. T. SSS.
b t. iij. fi. ij. E

c la mede. la
M, & la N si
congiungo
no all'O. li.
v. fi. vij. la P
& la Q si cō
giungono
all'R

d la mede. O'R
e la med. pp.
li. v. fi. j. CC
f li. vj. fi. iij. N

g t. iij. fi. ij. R
li. iij. fi. vij.
dal T al R
h lib. v. fi. vij.

i la mede. M
k la med. oo
l la med. sss
m la med. fi.

vij. xx
n t. iij. fi. ij. T
T. li. v. fi. ij.
CC

o ta. iij. fig. ij.
V V
p la med. xx

q la med. YY
aa

r la med. ecc

s t. iij. fi. ij. de
li. v. fi. iij. I I
t lib. v. fi. iij.

LL
u f
x lib. v. t. vij.
ss

y il g col y

z lib. v. fi. iij.
K. fi. vj. G. fi.
vij. V

a d

no gli rami della vena, & le pieghe simili alle secondine, sostentandogli nel peso. Questa vena, se ben nel nascere è vna sola, nō dimeno, come arriua a gli ventricoli, ^b si diuide in molti & molto sottili rami, che si vanno hora congiungendo, hora separando, come vna rete; & come ^c arriuanò alla parte di nāzi del terzo vetricolo, subito si sparte la vena tutta in due rami, ^d vno de quali va al ventricolo diritto, & ^e l'altro al manco. Restaci hora a dire la forma, nella quale queste venuzze simili alla rete si cōgiungono all'arterie, che vengono a questa parte; il che farò tosto, che habbia finito di contar l'historia dell'altre arterie, che si distribuiscono per le ceruella, infino all'arriuare a ventricoli. Et perche habbiā detto della prima secōda & quarta vena, & della prima & secōda arteria, hora resta solo a trattare della terza quinta & sesta vena, & della terza arteria. ^f La terza vena (che è la vena giugulare interiore) smāda vn ramuscello all'orecchio, che passa per lo buco dell'osso delle tēpie, cōmune a questo ramuscello, & ad vn ^h altro del quinto paio de nerui della testa; & subito si mette dentro del craneo, & si congiunge alla dura madre, facendo vn ⁱ seno, lūgo el quale nascono molti ramuscelli, che si spargono per la parte della dura madre dal suo lato, che fascia la parte piu bassa delle ceruella. Et di questi rami ^k nascono altri, che si distribuiscono per la pia madre, ne piu ne meno, che faccian quelli de quattro sopra detti seni. Et tra gli altri rami, che questa vena getta per la dura madre, ce ne è vno, che monta di sotto le tempie per la dura madre infino alla coronella, mandando nel mōtare molti ramuscelli a tutta questa tela. Nel medesimo modo si distribuisce per la dura madre la ^l quinta vena, che entra per lo secōdo buco dell'osso cuneale, per doue esce il secōdo paio di nerui; & la ^m sesta, che entra per lo maggior buco dell'osso, appresso a gli ⁿ instrumēti dell'odorare. Et cosi per gli rami di questa, come per que della terza, si fanno nel craneo per la parte di dentro alcuni ^o riuoli (come nel primo libro habbiā detto) ne quali piu sicuramente si conseruano. ^p La terza arteria entra nella testa, per vn particolar buco in trauersato; & subito si sparte in due rami grossi, & altri due sottili. De sottili ^q quel di fuori subito si cōgiunge cō la terza vena, & si distribuisce insieme con essa per la dura madre; ^r quel di dentro va ^s per vn particolar buco al concauo del naso, & diuidendosi in molti ramuscelli ^t ne manda vno alla punta del naso, che si sente manifestamente battere. ^u Gli rami grossi dopo l'esser montati alquanto appoggiati al craneo, cāminando verso nāzi subito si tornano a ^x congiungere; & di poi si tornano a diuidere in due rami disuguali. Il ^y minor de quali entra ^z per lo buco del ^a secōdo paio di nerui, & va insieme col ^b neruo della vista all'occhio, & mādā alcuni ramuscelli alla parte di dētro del musculo delle tempie. Il ^c maggiore montādo in sù buca la dura madre, appresso alla ^d glandola, che habbiām detto raccogliere la flemma del capo; & di poi, come arriua al largo della dura madre, si sparte vn'altra volta in altri due rami. ^e L'vno de quali diuidendosi in molti ramuscelli, si distribuisce per la parte della pia madre, che fascia le ceruella; ^f l'altro (accōpagnato da vna sottil tela della pia madre) si diuide in molti ramuscelli inuiluppati l'vn cō l'altro, & mōta ^p le pieghe delle ceruella, infino all'arriuare alla parte piu bassa del ventricolo diritto. Et indi cāmina in dietro, primieramēte verso la parte di dietro del sopradetto seno, prēdendo nel mōtare ^g vn ramuscello della vena, o ramo, che nasce dal quarto seno della dura madre; & si sparge ^p le doppiezze delle ceruella. ^h Passata l'ultima parte del detto ventricolo, cāmina innanzi pel suo mezzo infino a mescolarsi con l'altra parte della medesima arteria, che habbiā detto nascer del quarto seno della dura madre, & passar per sotto el tetto del terzo vetricolo. Di modo che del ramo diritto della terza arteria, & di questo ramo hora detto si fa quel viluppo d'arterie, simile alle secōdine, che si vede nel vetricolo diritto; & dell'vn ramo dell'arteria sinistra, che da il sōno, & d'vn'altro ramo, che esce del ramo, che nasce del quarto seno della dura madre, si fa il viluppo dell'arterie che si vede nel sinistro. Questo è, q̄l che tocca alla distributione delle vene & arterie delle ceruella. Restarebbe hora a dire del torcolo, & di quella rete marauigliosa tāto, della qual Galeno fa mentione. Non dimeno, anchor che si sappia certo che ha inteso per lo torcolo, alcuno spatio tra i seni della dura madre, nō si puo saper cer-
to, se ha inteso quella ^k parte, doue si cōgiunge il primo seno col secōdo, che è il principio del terzo & quarto, o il fine del quarto seno, che rispōde a gli testicoli delle ceruella, attēto che egli chiama alcune volte torcolo, l'vna parte, & alcun'altre volte l'altra. Et veramēte si puo intēdere d'amēdue, perche di loro si sprema il sangue a vetricoli, ne piu ne meno, che dal torcolo nella secchia; anzi qual si voglia de quattro seni potrebbe al mio

La distributio-
ne della terza
vena, che va al-
la testa.

Quella della
quinta vena,
& sesta.

Quella della ter-
za arteria.

del torcolo delle
ceruella, & del-
la rete marau-
gliosa.

Libro festo

giuditio per la medesima ragione hauere il medesimo nome. Della rete marauigliosa non farò mentione alcuna, perche non si vede ne gli huomini, come chiamamete sa, chi si voglia, che habbia fatto vna volta almeno o veduto fare anotomia di huomo. Et Gale-
no mi par degno di perdono cosi in questa parte, come in molte altre, perche il non ha-
uer potuto vedere la verita ne gli huomini, glie la fece cercar ne gli animali bruti, come
in questa parte fece nel bue, nel qual si vedeva forte di rete, simile a quella, che egli de-
scriue. Et con questo habbiamo finito la distributione delle vene & arterie per le ceruel-
la, eccetto che d'alcuni ramuscelli, che vanno alla sustanza loro; li quali per esser tanto
piccioli ne si possono seguir col coltello, ne anche con gli occhi.

Della Vena Arteriale, & della Arteria Venale. Cap. 14.

*Il nascimeto, et
distributione del
la vena arteria-
le.*

*Quel dell'arte-
ria venale.*

*L'offitio della
vena arteriale,
& della arteria
venale.
L'arteria vena-
le ha dentro san-
gue.*

REstaci a dire per compimento di questo libro, della terza vena, & della seconda Ar-
teria. La ^a Vena nasce della parte piu alta del ventricolo diritto ^b del cuore & scen-
de per lo lato diritto della canna del polmone, & diuidendosi subito in due rami, vno de
quali va a gli polmoni da man manca, & l'altro a quelli da man destra. Et ognun di loro
si va diuidedo nel medesimo modo in due rami, & gli due in quattro, & cosi di mano in
mano, facendosi sempre piu piccioli, insino che in questo modo ognun di due primi ra-
mi empie tutto il polmone del suo lato. La tunica di questa vena è come quella dell'arte-
rie; & percio fu ella chiamata vena arteriale. ^d L'arteria nasce dal lato manco della parte
piu larga del secondo ventricolo del cuore; & si distribuisce parimente per gli polmoni,
diuidendosi ^e prima in due, & da poi in molti rami, ne piu ne meno, che la vena arteria-
le. La tunica di questa arteria è sottile, & simile a quella delle vene; & per tal ragione fu
chiamato questo vaso arteria venale; & arteria fu chiamato, perche in esso si contiene san-
gue & aere, o spirito, come nell'altre arterie. L'offitio di questa vena, & arteria (secondo
tutti que, che in nanzi di me hanno scritto) è, della vena nutrire i polmoni solamente;
dell'arteria portar l'aere da gli polmoni al ventricolo manco del cuore; parèdo loro che
in questa arteria non potesse in modo alcuno essere sangue. Ma, se haueffero di cio fatto
esperienza (come ho fatta io molte volte insieme col Realdo, cosi in animali viui, come
in morti) hauerebbero ritrouato, che nò meno e piena questa arteria di sangue, che qual
si voglia dell'altre vene. Ne si può dire che poi, che l'huomo è morto, vi entri dètro; per-
che, si come, quando aprono alcuno animal viuo, nel tagliare si sparge tãto sangue, cosi
abbraccia il cuore quello, che ha, senza lasciarlo vscir fuori; & se punto di lui ne esce, piu
ragioneuol e che esca per la bocca dell'arteria grande, per la quale suole ordinariamente
vscire, che per alcun'altra parte. Maggiormente che si può aprire il cuore subito, & càuar
di quello tutto il sangue, & di poi guàrdare in questa arteria; la quale troueranno senza
fallo alcuno piena di sangue Hora essendo cosi, che in questa arteria e sangue, & che dal
ventricolo manco non vi può entrare (come dimostra il sito delle tele, che habbiamo det-
to ^f esser alla bocca dell'arteria) credo certo che dalla vena arteriale risudi il sangue alla
sustanza del polmone, doue si assottiglia, & dispone a poter piu facilmente còuertirsi in
spiriti; & di poi si mescola coll'aere, che entrando per gli rami della canna del polmone,
va insieme con esso all'arteria venale, & indi al ventricolo manco del cuore; mescolãdo
si col sangue alquanto piu grosso, che dal diritto ventricolo del cuore passa al sinistro (se
punto ve ne passa); perche io insino adesso non ho potuto vedere, per doue possa passa-
re; ma se passa, d'amendue questi sangui si fa vna materia, disposta a còuertirsi ne gli spi-
riti, che danno la vita. Questa mia oppenione, oltre che l' senso la conferma, perche pre-
supposto che nell'arteria venale si truoui sangue (come chi si voglia, che non si voglia
fidar del mio detto, potrà vedere), è necessario dire che da quella vadia al ventricolo mã-
co; è anche piu verisimile, che pensare che del sangue del ventricolo diritto del cuore (il
quale e molto poco differete da quel della vena grande) senza precederui altra maggior
dispositione, si possino creare subito gli spiriti, che danno la vita. Ma posto questo da
banda, perche e fuori di mio proposito, basti sapere, che nell'arteria venale senza dubio
alcuno e sangue in assai quantita, & non qualche poco (non manco nelli huomini, che
nel feto) & spirito assai, come, quanti che hanno scritto in nãzi di me, affermano. Quel
che iui faccia, ognuno da se potrà per suo spasso di poi pensarlo. Et con questo darò fine,
all'historia delle vene, & arterie, dando principio a quella de nerui.

Dichiaratione

a t.iii. fig. iiii.
b li. iiii. fi. vi.
I. fi. viii. C.
D
c t.iii. fig. iiii.
D

d t.iii. fi. iiii.
lib. iiii. fi. v.
G. fi. ix. CC
e t.iii. fi. iiii.
KL

f li. iiii. c. viii.

Tauola, I. II. Fig. I. II. III.

Dichiaratione delle Lettere, delle tre Figure del sesto libro. Le due delle quali mostrano vn'huomo, l'vna per la parte dinanzi, l'altra per quella di dietro, scorticato, & tolto via il grasso; & saluo il piu delle vene, di quelle, che vāno tra pelle & carne. Le quali anchor che in tutti non tenghino il medesimo ordine, numero, & forma di distribuirsi; pure le principali di loro hanno nel piu degli huomini vno istesso andare; principalmente quelle, delle quali sogliono comunalmente li Medici far cauar sangue. Delle quali ho procurato metter gli nomi tutti, che hanno fra loro, per satisfare alli Chirurghi, alli quali ho voluto in queste due figure compiacere.

La terza Figura reppresenta tutta la vena grande, libera dall'altre parti del corpo, perche si possa meglio cōprendere la forma, nella quale si distribuisce per tutto el corpo. E debbe si notare, che cosi per l'intendimēto di questa, come delle due sopradette; è di bisogno veder le tauole quarta & quinta del terzo libro. Et perche alcune lettere di quelle, che seguono, seruono a tutte le figure, (a ciò che meglio si possa conoscer l'ordine delle vene cutanee) notarò con ciascheduna il numero della figura.

- AAA 3. Queste tre lettere notano il nascimento della vena grande, & le radici sue, come nascono del fegato.
- a 3. Vn'altra radice, che viene dal concauo del fegato.
- B 3. La vena grande tra'l fegato, & la diaframa.
- C 3. Il ramo sinistro de i due, che vanno del tronco della vena grande della diaframa, de i quali vanno anche alcuni alla vescica del cuore.
- D 3. Il buco della vena grāde, doue si cōgiunge il cuore; il quale par cosi grāde, per rispetto dell'orecchia, o Ala dritta del cuore.
- E 3. La vena chiamata coronale, che circonda (come vna corona) la parte piu larga del

- cuore, mandando molti ramuscelli all'in giù per la sustanza sua infino alla punta.
- FF 3. La vena sola, o senza compagna; il cui principio & fine mostrano le GG.
- GG 3. Queste lettere mostrano gli rami della vena sola, che vanno a nutrire gli muscoli, che sono fra le coste.
- H 3. La strozza nella quale la vena grande si sparte in due tronchi.
- I 3. La vena, che va al braccio, & si sparte in due, in nāzi che arrine a quello.
- K 3. Il ramo, che nutrisce le tre coste piu alte del suo lato.
- L 3. La vena, che passa per sotto l'osso del petto, & si distribuisce per lo musculo diritto del ventre dal suo canto.
- M 3. Il fine della detta vena.
- NN 3. La vena, che passa per gli buchi de lati de nodi del collo, & entra nella testa, distribuendosi per la dura madre.
- O 3. La vena, che si distribuisce per gli muscoli, che occupano la parte piu bassa del collo, & la piu alta del petto.
- P 1. 3. La vena, che si distribuisce per gli muscoli, che cuoprono il petto, & per le mammelle & pelle loro.
- Q 2. 3. La vena, che va verso le spalle, & si distribuisce per gli muscoli, che occupano la parte di dentro della paletta della spalla, & per quelli, che le son vicini. Et qui si veggono anche li rami, che vanno alle glandole delle ascelle; de quali vno ne è notato tra la P & la R.
- R 1. 2. 3. Il ramo, che scende per lo lato del petto dal suo canto, & si distribuisce per lo musculo, che tira il braccio in giù verso dietro.
- S 3. La vena giugulare interiore, della quale escono alcuni rami, che si distribuiscono per la canna del polmone, & per gli nerui, che passano per questa parte.
- T 1. 2. 3. La vena giugulare esteriore.
- V 1. 2. 3. La diuisione di questa vena in due rami.
- X 1. 2. 3. Il ramo di dentro della vena giugulare esteriore, che va alla bocca, & a gli muscoli del gargarozzo & dell'osso hyoides, & di poi entra nella testa diuidendosi in tre rami.
- YZ 1. 2. 3. Quel di fucri, che va alla faccia. Et la Z mostra la punta di quel, che va alla faccia; & il 9 mostra quel, che mōta d'apresso il lagrimale, & si congiunge nel mezzo della fronte con la medesima vena dell'altro lato; & la α mostra la parte, che monta per le tempie; la * nota

Dichiar. delle Fig. del Lib. VI.

	quella, che va tra l'orecchie. Il resto di queste vene, che si distribuiscono per la testa, non ho voluto notar con lettere, perche le mostrerò tutte da perse in vna figura; ne anche si puotero notar qui tutti e rami per non causare confusione.		scela parte del bracciale & della palma, che risponde al dito picciolo, & il medesimo dito, diuidendosi in molti rami.
aa	1. 2. 3. La vena della testa; la vena di fuori del braccio; la vena grossa, il cui principio mostra la prima a nella terza figura; & la seconda mostra in tutte tre, doue comincia a scoprirsi, camminando tra pelle & carne.	m	1. 2. 3. La vena del fegato, la quale altri chiama nel braccio diritto quella del fegato; nel sinistro quella della milza; & altri quella delle ascelle.
b	1. 2. 3. Il ramo, che esce della parte di sopra del tronco del suo lato vn poco in nanzi, che sia diuiso; & va a nutrire e muscoli, che occupano il lato di dietro del collo.	n	1. 2. 3. Il ramo della vena del fegato, che si distribuisce per gli principij de muscoli, che distendono il gomito.
c	2. 3. Vn ramo della vena della testa, che va alla parte di fuori della paletta della spalla, parte tra pelle & carne, parte nascosto.	o	1. 2. 3. Vn ramuscello, che va alli detti muscoli, & alla pelle, che cuopre la parte di dietro del braccio.
dd	1. 2. 3. Vn altro ramo della vena della testa, innanzi, che si nasconda sotto l'omero; la qual si distribuisce per lo primo muscolo, che alza il braccio; & per la pelle, che'l cuopre.	p	3. Vn gran ramo, che scende in obliquo sotto el braccio, verso il tubercolo di fuori dell'osso dell'omero; & mandando alcuni ramuscelli a muscoli, che nascono di lui, cammina alquanto per la parte di fuori del braccio, insieme col quarto neruo di esso.
eee	1. 2. 3. Alcune venuzze, che nascono di quella testa, & si distribuiscono per la pelle di fuori del braccio, & per la parte dinanzi del primo muscolo, che piega il braccio.	q	3. La diuisione della vena del fegato in due rami; de quali quel, che è notato con le due qq, va sempre nascosto, & accompagna con l'arterie della mano.
f	1. 2. 3. Qui si sparte la vena della testa in tre rami, li quali alle volte paiono maggiori, alle volte minori.	r	1. 2. 3. L'altro ramo di questa diuisione, che fa la vena del fegato, & va sempre tra pelle & carne, diuidendosi in molti rami.
g	1. 2. 3. Il primo ramo di questi tre, il quale passa sotto e muscoli, che nascono del tubercolo di fuori dell'osso dell'omero.	s	1. 2. 3. Vn ramo, che nasce di quella del fegato, & si distribuisce parte per la pelle che cuopre la parte di nanzi del braccio, parte per quella, che cuopre quella di dietro.
h	1. 2. 3. Il secondo ramo di questi tre, il quale camminando insino al mezzo della sanguinella, si congiunge con vn ramo della vena del fegato, che è notato con la t; & d'amendue insieme si fa vna vena, che chiamiamo la commune, ò di tutto il corpo, che è notata con la a.	t	1. 2. 3. Il ramo di nanzi della vena del fegato, della diuisione, che si vede appresso il tubercolo di dentro dell'osso dell'omero; il quale va in obliquo alla sanguinella insino al congiungersi col ramo della testa, che è notato con la h; & di tutti due si fa la vena di tutto il corpo, che notarò con la a.
i	1. 2. 3. Il terzo ramo di questa diuisione, il qual va in obliquo sopra il minor fusello. insino alla parte di fuori del braccio, gettando alcuni ramuscelli alla pelle; il principal de quali, che dimostra la k, va alla pelle, che cuopre la parte di dietro della congiuntura del gomito. Et quando questo ramo arriua insino al bracciale, si congiunge con vn altro ramo della vena dell'arca, che è notato con la x; & il luogo, doue si congiungono, è notato con la l; & d'amendue si fa vna vena, che nutri-	b	1. 2. 3. Il ramo di dietro della vena del fegato, che si diuide appresso il tubercolo di dentro dell'osso dell'omero, & si diuide in molti rami.
k		a	1. 2. 3. Vn ramo, che nasce del sopra detto, & va per sotto el maggior fusello insino al bracciale, mandando alcuni ramuscelli nel passare a i luoghi vicini; & particolarmente vno al ramo della vena della testa, che monta sopra il bracciale appresso il dito picciolo.
x		u	2. 3. Il ramo di dietro della vena del fegato, che si diuide appresso il tubercolo di dentro dell'osso dell'omero, & si diuide in molti rami.
l		xx	1. 2. 3. Vn ramo, che nasce del sopra detto, & va per sotto el maggior fusello insino al bracciale, mandando alcuni ramuscelli nel passare a i luoghi vicini; & particolarmente vno al ramo della vena della testa, che monta sopra il bracciale appresso il dito picciolo.
		y	1. 2. 3. La vena, che va alla pelle, che cuopre la parte di dietro del gomito.
		zz	1. 3. Qui si notano molte vene, che si ueggono nella

nella

FIG. I


II



Dichiar. delle Fig. del Lib. VI.

	nella tauola del braccio, & quelle, che vanno alla pelle della palma. Ma la z piu alta nota la vena, che nasce del ramo di quella del fegato, notato con la t, & la piu bassa mostra e rami di questa medesima vena, che nascono del ramo, notato con le due xx, & vanno alla parte di dentro del braccio.		no alli buchi di nanzi dell'osso grande, & la x & la j mostrano gli altri ramuscelli di questo ramo.
q	1. 3. Il luogo, doue si congiungono le venuzze, che si distribuiscono per la pelle del pollice col ramo, che noterà la x.	a	3. La vena, che nasce del ramo di fuori notato con la s, & si congiunge con gli altri della vena di dentro, che è notata con la p appresso il buco dell'osso del pettignone.
a	La vena di tutto'l corpo, o la commune.		3. In questa parte passa questa vena per lo buco del pettignone, mandando senza gli altri molti rami, vno alla congiuntura della coscia.
	1. 2. 3. La diuisione della vena commune appresso la parte piu bassa del minor fusello appresso il bracciale.	a	2. 3. Vn ramo della vena, che passa per lo buco dell'osso del pettignone, & va alla pelle, che cuopre la parte di dentro della coscia.
γ	1. 3. Il ramo di fuori di questa diuisione, che va alla parte di fuori della mano, & manda vn ramuscello alla parte sua di dietro, che è notato con la s.	x	3. Il luogo, doue si congiunge questa vena col ramo della maggiore, che si distribuisce per la gamba, il qual noterà il 2.
δ	1. 3. L'altro ramo di questa diuisione, che va verso il dito di mezzo, & quel del cuore.	Γ	3. La vena, che si distribuisce per lo muscolo diritto, per la quale alcuni dicono esser participatione tra le mammelle & la matrice.
ε	3. La parte della vena grande, che nutrisce le parti piu basse del corpo.	Δ	1. 3. Vn ramo della vena, che va alla gamba, & manda vn ramo al membro, & alle parti vicine.
ζ	3. La vena, che va alla tela grassa, che cuopre l'arnione.	Θ	1. 3. Il primo ramo della vena, che va alla gamba; il quale cammina per la parte di dentro della gamba tra pelle, & carne, infino alla punta del piede.
η	3. La vena succiatrice, che va all'arnione del suo lato.	Λ	1. 3. Vn ramo di questa vena, che va alla parte di dentro dell'anguina--ie.
θ	3. La medesima, che va al lato manco.	ΞΞΞ	1. 2. Questi rami son delle vene, che no tanto nella terza figura con la ε.
ι	3. Il ramuscello, che nasce della succiatrice dell'arnione diritto, & si distribuisce per la tela grassa, che l'cuopre.	S	1. Questi rami vanno alle mammelle, & son parte di que, che nella terza figura notammo con la L.
κ	3. Li condotti del seme.	Ξ	1. 3. Vn altro ramo della medesima vena notata con la Λ, che va alla parte di fuori della coscia.
λλμ	3. Il luogo, doue questi condotti si cominciano a ritorcere come varici.	Π	3. Vn altro ramuscello della medesima, che si distribuisce nel primo, che muoue la gamba.
ν	3. I rami, che nascono della vena grande per tutto lo spatio, che durano i lombi.	Ν	1. 2. Vn altro, che va alla parte di nanzi del ginocchio, & a quella di dietro.
ξ	3. La diuisione della vena grande in due tronchi, che fanno la figura d'una γ, al riuerso.	Φ	1. 2. 3. In questa parte la vena, che è notata con la Θ, si diuide in molti rami, che si distribuiscono per la parte di dentro della gamba; & di questa parte soleano gli Antiqui cauar sangue.
ο	3. Vn ramuscello, che si distribuisce a trauer so per gli lombi, per lo peritoneo, & per gli muscoli del ventre.	Ψ	1. 3. Per questa parte passa questo ramo detto, & si comparte per lo pettine del piede.
π	3. Alcuni ramuscelli, che entrano per gli buchi piu alti dell'osso grande.		
φ	3. La diuisione del tronco sinistro della vena grande in due rami, de quali quel di dentro nota la p, quel di fuori la s.		
ρ	2. 3. Il ramo di fuori di quel, che notammo con la p, il quale si distribuisce per gli muscoli, che occupano la parte di fuori dell'osso dell'anca, & per la pelle delle natiche.		
ττ	3. Il ramo di dentro di quel, che notammo con la p; del quale alcuni ramuscelli van		

Vn ramo



Dichiar. delle Fig. del Lib. VI.

Ω	1. 3. Vn ramo della vena grande, che va alla gamba; il qual va alla congiuntura del gallone, distribuendosi per gli muscoli, che la cuoprono, & per la pelle.	19	3. La forma, nella quale le vene si distribuiscono per le dita.
GG	1. 2. Queste punte son de rami della vena Sola, che notamo con la G.		Figura. II.
I	1. 2. 3. Vn ramo, che va al settimo, & al nono muscolo, & alla pelle, che cuopre il lato di fuori della coscia.		Q Vesta Figura mostra il tronco della Vena Grande, che passa per la parte di dietro del fegato; diuiso d'alto a basso, & aperto, per che si possa vedere, come nasce dal fegato.
2	3. Vna vena grande, che si distribuisce per lo quinto muscolo, che muoue la coscia.	AA	BB. Li rami, che nascono del fegato.
3. 4.	2. 3. Di questi due rami insieme si fa la vena, che passa tra muscoli, che occupano la parte di dietro della coscia, & manda alcuni rami in su alla pelle, che cuopre la coscia, liquali son notati col 5. Ma la maggior parte loro, che è notata col 6, scende sotto la pelle per lo chimo del ginocchio, & per la polpa della gamba, diuidendosi in molti ramuscelli, che si distribuiscono per la pelle, che cuopre la polpa della gamba, ini, doue è il 7.	CC	Li rami, che nascono del fegato, & vanno alla vena caua.
5		D	La parte della vena caua, che passa per la diaframa.
6			Figura. I II.
7		A	Q Vesta Figura mostra l'andar de Fili delle tuniche delle vene; & la A mostra gli intrauer fati; la B & la C gli obliqui; la D gli diritti; & la E nota tutte le tre forti di fili insieme.
8	3. Vn ramuscello, che nasce della vena grande, & va per la parte di dentro della gamba.	BCD	
9	3. La diuisione della vena grande, che scende per la gamba tra le due teste della coscia.	E	
10	1. 3. Il ramo di dentro di questa diuisione, che si distribuisce per gli muscoli, che occupano il lato di dentro della polpa, & per la pelle di questa medesima parte, la quale è notata con la 11.		Tauola. III. Fig. I.
11			Q Vesta Figura mostra la distribuzione della vena chiamata Porta libera da tutte l'altre parti del corpo; la qual serue a tutte le membra della digestione.
12	1. 2. 3. Vna parte di questo ramo, che scende per la parte di dietro del tallone di dietro, al lato di dentro del piede.	AAA	AA. Queste cinque lettere mostrano la figura del fegato, & i due rami della vena porta, che si distribuiscono per quello.
13	3. Il ramo di fuori della diuisione detta, il qual subito si sparte in altri due rami disuguali.	1. 2.	3. 4. 5. Questi numeri mostrano cinque rami, ne quali questa vena si diuide per distribuirsi per la sostanza del fegato.
14	1. 3. Il ramo di fuori di questa diuisione.	B	Il tronco della vena porta subito, come esce del fegato.
15	1. 2. 3. Vn ramuscello, che nasce del sopra detto, & va al tallone di fuori.	CC	Due ramuscelli, che vanno alla vescichetta del fiele.
16	3. Il ramo di dentro della diuisione detta, il qual passa tra gli due stinchi, oue son se parati.	D	Vna vena, che va alla parte di dietro del fondo dello stomaco.
17	3. La diuisione di questo ramo, vna parte del quale passa tra l'osso del calcagno, & il maggior stinco della gamba, l'altra tra il calcagno, & il minore.	E	In questa parte la vena porta si diuide in due tronchi grandi; & la F mostra il tronco sinistro, & piu alto; la G il diritto, & il piu basso.
18	3. Vna venuzza, che nasce di questo ramo detto, la qual passa tra gli due stinchi sotto della legatura loro alla parte di sopra del peritoneo, congiungendosi ad alcuni altri, che similmente vanno per queste parti.	F	
		G	
		H	La vena, che va al lato diritto del fondo dello stomaco, mandando alcuni rami così a questa parte, come al lato diritto della tela di fuori della reticella.
		I	La vena, che va all'intestin duodeno, & al digiuno.

K	La Vena, che va al lato ritto della parte di dietro del corpo dello stomaco.	facendo le bocche delle vene, che chiamiamo le morene.
L	Quella, che va al lato ritto della tela di dentro della reticella, & alla parte dell'intestino grasso, che passa per questa parte.	Per dichiarazione di questa Figura aiutano anchora molto la seconda, terza, iij, x, xij, xij, xij, i & la xv del terzo libro, & anche l'ultima di questo.
M	Vn ramo del tronco sinistro, che va alle glandole, che si fanno nella tela di dentro della reticella.	Figura. II.
N OO	Vna notabil vena, che passa per sotto lo stomaco, tra lui, & la schiena, & monta verso la bocca sua; & in nanzi, che monta, getta due rami, vno ad vna parte, & vn altro ad vn'altra, che son notate con le due OO, & si spargono per la parte di dietro dello stomaco.	IN questa Figura si veggono le vene, & Arterie dell'vno de lati della testa, cominciando appresso doue entrano in quella.
P	Doue questo ramo si storce verso la bocca dello stomaco; & la Q dimostra, come si volge tutto intorno a lei.	A La vena giugulare interiore, quando vuole entrare nella testa.
Q	Il ramo della vena, che abbraccia la bocca dello stomaco; il quale camminando per lo stomaco in obliquo, manda alcuni rami al suo fondo, & pel cammino manda alcuni rami alla parte di dietro, & a quella di nanzi dello stomaco.	B L'arteria del sonno.
R	Vna conuenevol vena, che si distribuisce per la tela di dentro della reticella, & per la parte dell'intestino grasso, che tocca lo stomaco.	C La prima vena che va alla testa.
S	Il processo del tronco sinistro, quando arriva appresso la milza.	DE La seconda.
TT	La vena, che si distribuisce per lo lato manco della tela di dentro della reticella; la quale volsi qui metterla da per se; perche non si potea veder ben sotto dell'altre; & in essa la T mostra il tronco, dal qual nasce; la V la detta vena.	E La terza.
V	Vn ramo della vena piu alta, che va alla milza; il quale si distribuisce per la parte sinistra dello stomaco.	FG La quarta.
XX	Vn ramo della medesima vena.	G La quinta.
Y	Vna vena, che va al lato sinistro del fondo dello stomaco; la quale manda molti rami allo stomaco, et alla tela di fuori della reticella.	H La sesta.
Z	Queste lettere mostrano la distribution delle vene per la milza, & la figura medesima della milza.	K La prima arteria, che entra nel craneo.
aaa	La prima distributione del tronco ritto della vena porta per lo mesenterio.	IL La seconda.
bbb	La vena, che si distribuisce per l'intestino grasso, iui, doue si congiunge al retto.	L La terza.
c	La medesima vena, che va per sotto l'intestino retto mandando alcuni ramuscelli di vene, che abbracciano il fondamento: &	M Il primo seno della dura madre, o il diritto.
dd		N Il secondo, o sinistro.
		O Doue il primo & secondo seno si congiungono.
		TP Il terzo seno della dura madre.
		Q Il fin del terzo seno, che finisce nel processo dell'ottauo osso della testa, che diuide gli organi dell'odorato.
		R Il quarto seno della dura madre.
		SS Alcuni ramuscelli, che escono del ventricolo diritto, & si distribuiscono per la dura madre, & per la pia.
		TT Li rami, che escono del terzo seno, & si distribuiscono per la pia madre; li quali in questa figura sono tagliati.
		VV Li rami, che nascono del canto di sotto del terzo seno, & si distribuiscono per la parte della dura madre, che sparte le ceruella per mezzo, simile ad vna falce.
		XX Li rami del terzo seno, che si mescolano con altri ramuscelli, che entrano per la commessura sagittale.
		YY Alcuni ramuscelli, che escono del canto piu alto del quarto seno; & si distribuiscono per la dura madre, che sparte per mezzo il celabro.
		aa Alcuni ramuscelli, che nascono del canto diritto del quarto seno, & si distribuiscono

Dichiar. delle Fig. del Lib. VI.

	scono per la dura & pia madre dal suo lato.	By	Due rami ne quali si tornano a spartire quei, che stauano notati con le due u u; la B mostra la diuisione del suo ramo in molti, che si distribuiscono per la pia madre; & la y mostra quell'intrecciamento, che qui notammo con la s.
b	Vn ramo, che nasce del fin del quarto seno, & si distribuisce per tutta la parte piu bassa della tela simile alla Falce.		Vn ramo della seconda arteria della testa, che si sparge a muscoli del collo.
ccc	Alcuni ramuscelli, che escono del detto seno, & si distribuiscono per la detta tela, montando in su.	s	Figura. III.
de	Alcuni rami, che nascono del fine del quarto seno, & passano sopra la pia madre, per sopra il corpo calloso, secondo il lungo de i due ventricoli primi, l'vno per lo lato diritto, l'altro per lo manco.	φ	Q uesta figura mostra la distribuzione della Vena Arteriale, tolta via la sustanza del polmone; la cui bocca sta aperta, perche si vengano le tre tele, che sono in quella, che son notate cō questi numeri. 1. 2. 3.
f	Vn ramo, che esce del quarto seno, & si distribuisce per la pia madre, che cuopre il celabro.	A	Il luogo, doue nasce questa vena del ventricolo diritto del cuore.
g	Vn ramuscello, che nasce del sopra detto, & entra per gli circoli delle cernella, & per la parte piu bassa del ventricolo diritto, & si congiunge con l'arteria, che monta, & è notata con la y.	B	La tunica di dentro di questa vena, assai piu grossa, che quella di niun'altra.
h	Vn altro ramuscello, che nasce del medesimo sopra detto, & camina verso dietro sparrendosi in molti ramuscelli, che si distribuiscono per la dura, & pia madre.	C	La tunica di dentro di questa vena, simile a quella di qual si voglia arteria.
i	Il maggior ramo, che nasce del quarto seno; il quale passa per di sotto del corpo delle cernella, fatto a volta, & cammina infino alla parte di dentro del terzo ventricolo.	DE	La diuisione di questa vena in due tronchi; & la E mostra il tronco diritto, che si sparte in molti altri rami, che si distribuiscono per lo polmone nella forma, che qui si vede notata con le due G G; la F il sinistro.
kl	La diuisione di questo ramo in due; & la l mostra quello, che va al ventricolo diritto; la m quello, che va al manco.	GGF	Figura. II.
m	Vn ramuscello della terza vena, che va alle cernella, il qual va all'orecchie.		Q uesta Figura rappresenta l'Arteria Venale, tolta via la sustanza del polmone.
n	La figura della dura madre, per la qual si distribuisce la terza vena della testa, alla qual si congiunge sempre vn ramo della terza arteria, che notaremo con la y.	H	Il nascimento di questa arteria.
oo	Alcuni ramuscelli, che nascono delle sopra dette, & si distribuiscono per la pia madre.	I	La tunica di questa arteria.
pp	La diuision della terza, & maggior arteria, che va alla testa, subito come entra in quella.	KL	La diuisione di questa arteria.
q	Il ramo della terza arteria, che habbiamo detto congiungersi alla terza vena della testa.	MM	La forma della distribuzione di questa arteria.
r	Vn ramuscello della terza arteria, che va al voto della testa.		Figura. V.
s	Vn ramuscello di questo sopra detto, che arriva alla punta del naso.		Q uesta Figura rappresenta la vena del Bellico, la quale ordinariamente non entra nel fegato, diuidendosi in molti rami, come il Vesalio disse. Et la A nota la parte di questa vena, che comincia dal Bellico; la B quella, che s'inferisce nel fegato.
uu	Due gran rami della terza arteria.	A	Tauola. IIII. Fig. I.
a	Doue questi due rami si congiungono.	B	Q uesta Figura rappresenta tutta l'Arteria Grande, libera da tutte l'altre parti del corpo; la quale nasce del cuore, come nella seguente tauola si vedrà.
x	Vn ramuscello, che nasce di questa vnione di questi due rami, & va a gli occhi.		

TABVLA III. II LIB. VI.



Dichiar. delle Fig. del Lib. VI.


<i>A</i>	<i>Il nascimento dell'arteria grande, che è dal ventricolo manco del cuore.</i>	<i>V</i>	<i>per la mano, & per le dita.</i>
<i>BB</i>	<i>Due arterie chiamate coronarie, che circondano la parte piu alta del cuore.</i>	<i>Y</i>	<i>Il maggior tronco dell'arteria grande, che monta uerso la strozza, & si sparte in due rami disuguali.</i>
<i>C</i>	<i>La diuisione dell'arteria grande in due.</i>	<i>X</i>	<i>Il ramo sinistro di questa diuisione, che fa l'arteria del sonno.</i>
<i>D</i>	<i>L'arteria, che monta in obliquo alla prima costa del lato manco.</i>	<i>YZ</i>	<i>Queste due lettere mostrano il ramo diritto, che è molto maggiore che'l sinistro. Mostra la Y quello, che ua al braccio diritto, spartendosi ne medesimi rami, che habbiam detto spartirsi quel, che andò al sinistro; & la Z mostra l'arteria diritta del sonno.</i>
<i>E</i>	<i>Il ramo, del qual nascono que, che uanno a gli tramezzi delle prime quattro coste.</i>	<i>a</i>	<i>La diuisione dell'arteria del sonno in due rami; & la b mostra quel di dentro; la c & la d quel di fuori.</i>
<i>F</i>	<i>Vn ramo, che passa per gli buchi de processi de lati del nodo del collo; & cammina infino dentro della testa.</i>	<i>b</i>	<i>Li rami di questa arteria, che uanno alle fauci, & alla lingua.</i>
<i>G</i>	<i>Vn ramo, che va sotto l'osso del petto, & si distribuisce per gli muscoli, che sono fra le coste, & per gli muscoli del ventre.</i>	<i>c</i>	<i>La parte di questa arteria, che entra nella testa; & nell'arriuare a lei si sparte in due rami; de quali l'uno, che ua al seno manco della dura madre, è qui tagliato, perche si mostrerà di poi particolarmente.</i>
<i>H</i>	<i>Vn ramo, che va a muscoli, che occupano la parte di dietro del collo.</i>	<i>d</i>	<i>Il ramo di fuori dell'arteria del sonno, che ua alla parte di fuori della testa.</i>
<i>I</i>	<i>L'arteria, che va alla parte di dentro della paletta della spalla.</i>	<i>e</i>	<i>Vn ramuscello di questo, che ua tra i muscoli della faccia.</i>
<i>K</i>	<i>Vn ramo, che ua alla congiuntura dell'omero.</i>	<i>f</i>	<i>La distributione del ramo di fuori dell'arteria del sonno, appresso alle orecchie; ll cui ramo di nanzi notato con la g ua alle tempie; quel di dietro, che nota la h, ua tra l'orecchie, amendue tra pelle & carne.</i>
<i>L</i>	<i>Vn ramo, che va a gli muscoli, che occupano la parte di nanzi del petto.</i>	<i>g</i>	<i>Il tronco dell'arteria grande, che scende per sopra la schiena.</i>
<i>M</i>	<i>Vn'altro ramo, che scende per gli lati del petto, & si distribuisce per gli muscoli, che tirano le braccia in giù. Et tra la L, & la M, si uede un ramuscello di que, che uanno alle glandole dell'ascelle.</i>	<i>h</i>	<i>Li rami, che uanno dall'una parte, & dall'altra, all'otto coste piu basse.</i>
<i>N</i>	<i>L'arteria grande, che ua al braccio, insieme col ramo di dentro della uena del fegato. Et li ramuscelli, che si ueggono subito sotto lei, uanno a gli muscoli, che abbracciano l'osso dell'omero.</i>	<i>i</i>	<i>L'arterie della diaframa.</i>
<i>O</i>	<i>L'arteria, che ua per la parte di dietro dell'osso dell'omero, insieme col quarto neruo, che ua al braccio.</i>	<i>kkk</i>	<i>L'arteria, che ua alla parte piu bassa del mesenterio, & principalmente all'intestino grasso, dalla milza infino al rognone manco.</i>
<i>PP</i>	<i>Alcuni ramuscelli, che uanno alla congiuntura del gomito.</i>	<i>l</i>	<i>Certi rami, che nascono dell'arteria grande per tutto il lungo de lombi.</i>
<i>Q</i>	<i>Il ramo dell'arteria grande, che ua appoggiato al minor fusello.</i>	<i>λ</i>	<i>La diuisione dell'arteria grande appresso l'osso grande. Et queste lettere notano anche alcuni ramuscelli, che nascono della parte piu bassa dell'arteria, & uanno all'osso grande.</i>
<i>R</i>	<i>Vn ramuscello, che nasce del sopradetto, & ua alla mano tra'l primo osso del pollice, & quel della palma, che sostiene l'indice.</i>	<i>μμ</i>	<i>Il ramo di dentro del tronco sinistro della sopra detta diuisione.</i>
<i>S</i>	<i>Il ramo, che ua appoggiato al maggior fusello, & si distribuisce per la parte di dentro della mano.</i>	<i>vvv</i>	<i>Il ramo di fuori di questo ramo di dietro, che</i>
<i>*</i>	<i>Vn ramuscello, che ua al lato di fuori dell'osso della palma, che sostiene il dito picciolo.</i>	<i>ξ</i>	
<i>T</i>	<i>Il modo, nel quale l'arterie si distribuiscono</i>	<i>o</i>	

Tauola IIII. del Lib. VI.

137

TABVLA > IIII >

LIBRI > VI >



Dichiar. delle Fig. del Lib. VI.

	va a gli muscoli, che occupano il lato di fuori dell'osso dell'anca.		di questa arteria, dalla diaframa infino all'arterie del seme; che è quello spatio, che nella figura intera sta tra l, & la p. Et in questa seconda figura si mostrano due radici; nella intera, vna sola, come ordinariamente si ritrova.
π	Il ramuscello di dentro del ramo notato con la ζ il qual va alla vescica, al membro; & nelle donne alla matrice.		
pp	L'arterie, che nascono del bellico, vna per lato.		
ς	Il resto del ramo di dentro notato con la ζ, il qual va alla coscia, passando per lo buco del pettignone, & congiungendosi con vn'altra arteria, che notaremo con la Ϛ in quel luogo, oue si vede la ω.	m	La m nota il nascimento dell'arterie del seme; la n il ramo diritto; la o il ramuscello, che va alla tela di dentro della reticella; la p quella, che va al lato diritto dello stomacho verso la schiena appresso il fondo; la q quel, che va all'intestin duodeno; & al fin del digiuno; la r quel, che va al lato diritto dello stomacho, & mada alcuni ramuscelli allo stomacho, & alla tela di fuori della reticella; la s l'arterie, che vanno al fiele; la t quelle, che vāno al fegato; la u il ramo, che va alla milza; la x quel, che va per la parte di dietro dello stomacho, infino alla sua bocca; la y alcuni rami di questa arteria, che vanno alla parte dello stomacho, che risponde alla schiena; la z vn ramo, che abbraccia la bocca dello stomacho, come vna corona.
τ	Vna delle arterie, che monta al ventre, & al musculo suo diritto.	n	
υ	Vn ramuscello, che passa a canto l'osso del pettignone infino al membro.	o	
φ	Il tronco dell'arteria, che va alla gamba.	p	
χ	Vn ramuscello di questa arteria, che va a gli muscoli, che occupano la parte dinanzi della coscia.	q	
↓	Il ramo, che va al quinto musculo, che muoue la coscia, & a que, che occupano il lato di dentro della coscia.	r	
Γ	Il ramo, che va a gli muscoli, che occupano la parte di dietro della coscia.	s	
ΔΔ	I ramuscelli, che vanno al ginocchio; & in questa parte si nasconde l'arteria grande sotto el chino del ginocchio.	t	
Θ	L'arteria grande della gamba, che va per la parte di dietro della gamba.	u	
Ξ	Il ramo, che va alli muscoli, che abbracciano il minor stinco, & principalmente al settimo, & ottauo, che muouono il piede.	x	
Ξ	L'arteria, che passa tra'l tallone di dentro, & il calcagno, alla parte di sotto del piede.	y	
Π	Quella, che va alla parte piu bassa del piede, alle volte entra tra'l tallone di fuori, & il calcagno.	z	
Φ	Alcuni ramuscelli, che vanno alla congiuntura del calcagno col maggior stinco.	a	Vn'altro ramo, che abbraccia per di fuori il fondo dello stomacho.
Ψ	Vn'arteria, che va alla parte di sopra del piede.	β	Vn'arteria grande, che va alla tela di dentro della reticella, la qual parimente va all'intestino grasso.
Ω	La distributione dell'arterie per lo piede.	γ	Vn ramuscello, che va alla tela di sotto della reticella del lato manco.
		δδ	L'arterie, che vanno alla milza.
		ε	Quelle, che vanno al lato manco del fondo dello stomacho, & alla tela di fuori della reticella.
		ζζ	Certi ramuscelli, che escono di quelle, che vanno olla milza, & vanno al lato sinistro dello stomacho.
		ζ	Nella figura intera, & nella seconda, si vede questa lettera, che mostra l'arteria, che si distribuisce per la tela di fuori della reticella, & manda rami all'intestin digiuno, & alla parte dell'intestino grasso, dal fegato all'arnione ritto.
		θn	L'arteria, che va all'arnione diritto.
		ι	Quella, che va al sinistro.
		κκ	L'arteria del seme del lato diritto.
			Quella del sinistro.

Figura I I.

PErche hebbi paura, che la gran moltitudine dell'arterie & lettere non causasse maggior confusione, ho voluto far dipigner da per se, separato dal corpo, vn pezzo del tronco

Figura

Figura III.

Questa Figura mostra vna parte dell'arteria grande, nella qual si vede il modo, nel qual nascono di lei li rami, che vāno tra le coste.

Tauola V.

Queste Figure mostrano insieme l'arteria grande, & la vena caua; il che si fa ad effetto, che si possa vedere, doue vanno insieme, & doue si separano. Et le lettere latine maiuscole notano alcune parti, che non sono ne vene, ne arterie; & quelle lettere, che non segnano figura alcuna, si hāno da cercare nella decima.

AA	La diaframa.
B	Vna parte della vescica del cuore, iui, doue si congiunge alla diaframa.
C	Il cuore posto al suo luogo.
DD	DD. Le quattro parti, nelle quali si sparte il polmone.
E	La canna del polmone.
FF	Vna gran parte della parte di fuori del fegato, la quale si vede più chiaramente nella quarta figura, notata similmente con due F.
GG	Il concano del fegato.
H	La vescica del fiele.
O	Il concano della milza.
P	La parte di nanzi dell'arnione diritto.
Q	L'arnione sinistro.
S	Questa lettera nella settima figura nota la vescica dell'huomo, nell'ottaua quella della donna.
T	Il tronco della vena grande tra'l cuore, & la diaframa.
VX	Il luogo, doue nascono la vena, & arteria coronale, & insieme il lato più largo del cuore.
T	La punta del cuore.
Z	Li rami della vena, & arteria coronale, che si spargono per lo cuore.
a	Qui entra la vena grande nel ventricolo diritto del cuore.
b	L'Ala diritta del cuore.
c	La punta dell'ala sinistra.
d	Il tronco della vena arteriale.
e e	Il processo dell'arteria venale, & della ve-

	na arteriale per lo lato ritto, in nanzi che entrino ne polmoni.
f	Il tronco dell'arteria grande.
g	Il tronco dell'arteria grande, che scende all'ingiù.
h	Il ramo sinistro del tronco dell'arteria grande, che monta in sù, il qual va al braccio sinistro.
i	La maggior parte di questo tronco detto, & insieme la diuisione sua in due rami disuguali; de quali quel, che è notato con la k, è l'arteria diritta del sonno; quel che è notato con la l, è la sinistra.
k	L'arteria, che va al braccio diritto.
l	Qui passano i nerui della diaframa, il cui principio si vede.
m	Il principio della vena sola, la cui distribuzione si vede nella prima figura di questa tauola; perche nella terza lo sturbano e polmoni.
nn	La diuisione della vena grande nella strozza; & da ogni lato appresso la p nasce vna vena, che passa sotto l'osso del petto insino al bellico; il cui processo mostra la seconda figura. Nella quale la parte sinistra (che è notata con la q) si ha da congiungere al principio della medesima vena, che è nella figura grande notata con l'istessa lettera; la diritta (che è notata con la *) si ha da congiungere col principio, che è notato nella figura grande tra la z & la m.
o	Il principio d'alcune vene, che vanna alle coste più alte.
p	La vena, che passa per gli processi de lati del collo, & va a dare nel secondo seno della dura madre, accompagnata da una arteria.
q	Il primo seno della dura madre.
*	Il secondo.
r	Il terzo.
ss	Il quarto.
tt	La uena dell'arca.
uu	Quella della testa.
xx	Alcuni rami tagliati, che uanno alla parte dinanzi del petto, & alle spalle.
y	La uena giugulare interiore.
z	La diuisione della uena giugulare interiore.
a	La uena giugulare esteriore.
βγ	Vn ramo di questa uena, che ua al collo; & la θ nota la parte, che ua dietro l'orecchie; la ι la parte, che ua alla coronella; la κ quella, che ua alla faccia, & alla fronte; la λ quella, che ua al secondo se-
δ	
ε	
ζ	
ηθ	
ι	
κ	
λ	

Dichiar. delle Fig. del Lib. VII.

μ	no della dura madre; la μ mostra due rami, che entrano nella testa, l'vno per l'ottano osso di quella, l'altro per lo buco del secondo paio di nerui.	b	picciolo, & all'annulare.
ν	Alcune lettere di quelle, che seguono, si veggono nel lato manco; & la ν mostra vna parte dell'arteria, che va alla testa, dopo l'hauer gettato vn ramo, che va con la vena giugulare esteriore alla faccia, alla fronte, & dietro l'orecchie.	c	Vn ramo della vena del fegato, che si distribuisce per la pelle, che cuopre la parte di nanzi & di dentro del braccio.
ξ	Il ramo dell'arteria del sonno, che va al primo seno della dura madre.	d	Il ramo, che va a gli muscoli, che distendono il gomito.
ο	Il maggior ramo di questa arteria, che entra pel suo particolar buco nella testa.	e	Il ramo, che accompagna il quarto neruo del braccio insino alla parte di fuori del gomito.
π	Vn'altro ramo suo, che va al naso.	ff	La diuisione della vena del fegato in due.
ρ	Vn ramo, che va al lato diritto della dura madre.	g	Il tronco della vena del fegato, che uà nascosto per lo braccio accompagnato dall'arteria.
στ	Li rami dell'arteria del sonno, li quali alcuni pensano far quella rete tanto maravigliosa.	h	Il ramo di questo tronco, che va a canto del maggior fusello, & manda alcuni ramuscelli al pollice, all'indice, & in parte a quel di mezzo.
υ	Il ramo, che va a gli occhi.	i	Vn ramo dell'arteria, che accompagna la sopradetta vena, che uà alla parte di fuori della mano tra'l pollice, & l'indice.
φ	Il ramo, che va alla pia madre, che fascia il fondo delle ceruella.	k	Il ramo del tronco, che uà a canto del minor fusello, & si distribuisce al picciolo, all'annulare, & in parte a quel di mezzo.
χ	L'intrecciamento simile alle secondine.	l	La diuisione della vena del fegato, che va tra pelle & carne.
ψ	Il sesto paio de nerui della testa, che è tagliato, iui, doue scende a canto la canna del polmone.	m	Il ramo di questa vena, che fa la commune, o quella di tutto il corpo.
ω	Il neruo del lato diritto di que, che si riuoltano, chiamati Reuersui.	n	La vena commune ò di tutto il corpo.
1	Il tronco sinistro del sesto paio di nerui.	o	La diuisione della vena commune.
2	Il neruo reuersiuo del lato manco.	p	Vn ramo della vena commune, che va alla palma della mano, mescolandosi con alcuni altri ramuscelli.
3	Il neruo, che va al cuore.	q	Il ramo della vena del fegato, che uà a canto del maggior fusello, & getta diuersi rami alla pelle; il capo della quale si congiunge ad vn ramo della vena della testa, iui, doue si uede la π.
4	La vena, che va alla parte di dietro del collo, & della collottola.	qq	Le vene, che uanno per la tauola del braccio, & per la palma della mano.
5	La vena, che va alla parte di dietro dell'osso della spalla.	r	7.8. Questa lettera mostra nella settima & ottana figura il bellico.
	Quindi in nanzi se bene non nominaremo l'arteria, facilmente si vedrà con le vene, con le quali va accompagnata.	fff	7.8. La vena, che uà dal bellico al fegato; la quale si congiunge con la uena, che si uede nella quarta figura, notata parimente con la s.
6	La vena, che va alla pelle, che cuopre il braccio.	t	7.8. Il condotto, per lo quale orina la creatura, quando sta nel uentre della madre.
7	La vena della testa, la qual qui comincia a camminar tra pelle & carne.	uuuu	7.8. Le due arterie, che nascono del bellico.
8	Vn ramo della vena della testa, che va alla parte piu alta del gomito.	e	Vn neruo, che nasce de nerui dello stomaco, & uà al concauo del fegato.
9	Vn ramo della vena della testa, che fa quella di tutto il corpo.		
a	Vn ramo della vena della testa, che va per sopra il minor fusello, & per la parte di fuori del gomito, insino alla giunta del maggior fusello, & al bracciale; & congiungendosi ad vn ramo della vena del fegato, che è notato con la p, va al dito		

Note

6v, q, t ss	Note il Lettore, che la terza Figura contiene tutta la Vena chiamata Porta, & l'Arteria, insieme con vna parte della tela di dietro della reticella, che sta sotto el fondo dello stomaco. Contiene di piu la milza, & le vene, & arterie, che passano per lo mesenterio. Et tutta questa figura si ha da congiungere con la grande nel concauo del fegato, iui, doue si veggono le s, v, q, t, le quali in amendue le figure si corrispondono. Notano poi le due ss cosi nella maggior figura, come nella terza, il condotto della collera, che va all'intestino duodeno.	mmmm	Le vene, & arterie, che nascono di quelle, che vanno alla milza, & vanno allo stomaco; non dimeno le principali, che vanno al lato manco del fondo dello stomaco; son notate con la n.
t	3. 10. Il tronco della vena Porta.	ooo	3. Le vene, & arterie, che vanno a gl'intestini.
u	3. 10. L'arteria, che s'inserisce nel fegato, & insieme vn nerueto.	pp	3. Il tronco della principal arteria, che va a gl'intestini.
q	3. 10. Vn neruo, & vn'arteria, che vanno alla vescichetta del fiele.	qq	La minor arteria, che va a gl'intestini.
x	3. 10. Le vene, che vanno alla medesima vescichetta.	rr	3. Le glandole dello stomaco, che seruono a sostentar queste vene dette.
+	3. Una vena, & vn'arteria, che vanno alla parte di dietro dello stomaco appresso il suo fondo.	f	Il buco della diaframa, per lo qual passa la canna della gola, & insieme vn seno, che si fa nel fegato in questo luogo.
o	3. 10. La vena, che va allo stomaco, iui, doue il gobbo suo risponde al lato diritto della schiena.	t	La legatura del fegato, che l'lega con la diaframa.
a	3. Vna vena, vn neruo, vn'arteria, che si distribuiscono per lo lato diritto del fondo dello stomaco.	u	L'arteria grande, che passa per la diaframa, & vn suo ramo, che passa al lato diritto della diaframa.
b	3. Il minor tronco della diuisione della vena porta.	x	Il tronco della vena grande.
c	3. Il maggiore.	y	Il ramo sinistro, che va alla tela grossa dell'arnione del suo lato.
d	3. La vena, & arteria, che si distribuiscono per la maggior parte all'intestin duodeno.	a	La vena, & arteria, che vanno all'arnione diritto.
e	3. Vna vena, & vn'arteria, che vanno al lato diritto della tela di sotto della reticella.	β	La vena, che va alla tela grossa dell'arnione diritto.
ff	3. La radice dell'arteria, che si distribuisce al fegato, allo stomaco, alla milza, alla reticella, & alla vescichetta del fiele.	γ	La vena, & arteria, che vanno all'arnione manco.
g	3. La vena, & l'arteria, che abbracciano la bocca dello stomaco, come vna corona, la quale piu chiaramente si vede nella terza tavola del terzo libro.	δ	Il condotto sinistro del seme.
h	3. La vena, & l'arteria, che vanno alla tela di sotto della reticella, & alla parte dell'intestino duodeno, che è attaccato allo stomaco.	ε	Il condotto del lato ritto.
ij	3. Le glandole, che in questa parte sono per sostentar le vene, che si diuidono.	ζ	Il nascimento dell'arterie del seme.
k	3. La vena, che va al lato manco della tela di sotto della reticella.	η η	5. 10. Doue si congiungono la vena, & arteria del seme. Nella quinta figura notammo il testicolo manco con la tela sua propria, che l'cuopre, la quale mostrano le due η.
l	3. Le vene, & arterie, che vāno alla milza.	ι	5. Quel musculo, che gli è attaccato.
		κ	5. In questa parte rompono il peritoneo la vena, & arteria del seme,
		μ	5. Il corpo chiamato varicoso, & l'intertestamento della vena con l'arteria.
		ν	La tunica del testicolo sinistro.
		ξ ξ	5. Il vaso del seme, che si riuolge in sù.
		ο ρ	5. Doue questo vaso monta sopra l'osso del pettignone.
		π	5. Doue si riuolge il vaso diritto del seme.
		σ τ	5. Doue si congiungono questi vasi del seme, che è nel collo della vescica.
		φ	5. Doue s'inseriscono questi vasi.
		χ χ	7. Le glandole del collo della vescica, nella quale li vasi del seme s'inseriscono.
		ψ ψ	7. 8. Il canale commune al seme, & all'orina.
		ω ω	6. 7. 8. Il musculo, che abbraccia il collo della vescica.

Dichiar. delle Fig. del Lib. VI.

ææ 6. 7. Il membro, & li suoi corpi, de quali si fa.

aa Le vene, & arterie, che vanno a nodi de lombi, & a muscoli, che l'abbracciano.

b La diuisione della vena grande, & dell'arteria.

cc Alcuni ramuscelli d'arterie, che vanno a buchi dell'osso grande.

d La diuisione del tronco sinistro della diuisione detta.

e Vn ramuscello del ramo di dentro di questa diuisione, che va alle natiche, & a muscoli, che sono attaccati all'anche.

f Vn altro buco del sopra detto ramo, che va alla vescica, & alla matrice.

g Vna parte dell'arteria, che nasce dal bellico; il cui principio si vede nella settima, & ottaua figura.

h Vna parte del ramo di fuori della diuisione detta, che si congiunge col sesto del ramo di dentro.

i Il fin del ramo di dentro; il quale passa per lo buco del pettignone, & si distribuisce per gli muscoli, che occupano la parte di dentro dell'ossa de galloni.

k Il luogo, doue gli vni rami si congiungono a gli altri, così della vena, come dell'arteria.

l 2. 10. Vn rampollo del ramo di fuori, che monta insino al bellico.

mm Vna vena, che scende per la parte di dentro della coscia & della gamba, tra pelle & carne, insino a piedi gettando pel cammino alcuni tralci.

n Vn ramo, che va alla parte di nanzi del gallone, tra pelle & carne.

o Quella, che si distribuisce per gli muscoli, & per la pelle, che cuopre la parte di fuori della coscia.

p Quella, che va a muscoli della parte di nanzi della coscia.

q Il luogo, doue questa vena si congiunge con quella, che passa per lo buco dell'osso del pettignone.

r In questa parte si ritorce la maggior uena, che va alla gamba, uerso l'osso della coscia.

st Alcuni rami, che uanno a muscoli, che occupano la parte di dietro della coscia, & la pelle che cuopre questa parte, insino alla polpa della gamba.

u La diuisione, che fa la vena sotto el chino del ginocchio; & li rami, che si distribuiscono per i muscoli, che nascono delle teste

dell'osso della coscia.

x La maggior uena di questa diuisione; la quale si distribuisce insino al piè, per la pelle, che cuopre la parte di fuori della gamba.

y La uena, & arteria, che uanno attaccate allo stinco minore.

a Il ramo della maggior diuisione del tronco detto, che si distribuisce insino alle dita per la pelle, che cuopre la parte di dentro della gamba.

β Vn altro ramo di questo medesimo tronco, che va alla polpa, & arriuu insino al calcagno.

γ Vn ramo del tronco grande, che va insino al pettine del piede & le dita, tra i muscoli, che occupano la parte dinanzi della gamba.

δ Il resto del maggior tronco, che scende tra i muscoli, che occupano la parte di dietro della gamba, tra il maggiore stinco & il calcagno, & va al piede, mandando alcuni ramuscelli alla parte più bassa delle dita.

Figura. IX.

Questa Figura rappresenta la Matrice della donna insieme con li suoi instrumenti necessari alla generatione. Le lettere della quale non ho voluto dichiarar qui, per hauerle già dichiarate nella figura xxviii del terzo libro.

Solo resta d'auuizare il Lettore per compimento di questo libro, che le Figure tutte, che sono in questa tauola, si hanno da congiungere all'intera, nella forma seguente.

La prima (che dinota la distributione della vena sola) si congiunge, iui, doue si vede la o, in amendue le figure.

La seconda (che rappresenta la vena, & arteria del lato diritto, che scende per sotto l'osso del petto insino al bellico; & quelle, che montano dall'anguinaie insino al bellico) si congiunge, doue nella dichiarazione della figura intera habbiamo detto, alla p, & alla l.

La terza (che rappresenta la distributione



Dichiar. delle Fig. del Lib. VI.

butione della vena porta insieme cō l'arterie, che l'accompagnano, & vna gran parte della tela di sotto della reticella, & la milza, si congiunge al concauo de fegato, doue si veggono le ψ .

La quarta, che rappresenta la parte di sopra del fegato) si congiunge alla A.

La quinta, che mostra gli testicoli, & le tele loro, le vene, & arterie del seme, si congiunge, doue si vede la η .

La sesta si congiunge alla settima; perche la settima rappresenta la vescica, & il membro per la parte di nanzi, insieme con li vasi del bellico.

La sesta mostra solo il membro, & il collo della vescica. Et facemmo questa sesta figura, perche si potesse piegare il membro, & fare la figura della S.

L'ottaua, che mostra la vescica della donna insieme con li vasi del bellico, & con li condotti dell'orina, si congiunge alla nona, iui doue si vede la η ; & la nona si congiunge alla grande, doue si vede la medesima lettera.

Fine del Sesto libro.

LIBRO SETTIMO

dell' Historia della Compositione
del corpo humano,

COMPOSTA PER GIOVANNI
VALVERDE MEDICO;

NEL QUALE SI TRATTA
de Nerui.

Che cosa sia neruo, & delle differenze, &
nascimenti loro. Cap. 1.



El libro passato habbiam trattato de canali, che nascono de due primi principij, chiamati le vene, & arterie; hora restaci à trattare di que, che nascono del terzo. E adunque da sapere, che, se ben parlando comunamente, si chiamano nerui non meno le corde de muscoli, & le legature delle congiunture, che gli instrumenti, per gli quali la virtu del sento si distribuisce a tutte le membra; non dimeno in questo libro (così come ne gli altri) io sempre intenderò gl' instrumenti del sentire, e quali solo nascono della testa. E adunque il neruo vn corpo lungo, &

Che cosa chiamino neruo comunamente.

Che cosa sia Neruo. I nerui nascono delle ceruella.

I nerui non nascono del cuore.

tondo, & massiccio al parere; il cui nascimento, & principio non è (come alcuni pensano) la duramadre o il cuore, ma le ceruella, & la midolla spinale, come disse Hippocrate; & Erasistrato, Lyco, Andrea, Marino, Herosilo, Galeno, Vesalio, & il Realdo han confermato, & ognuno lo puo facilmente vedere. Perche del cuore non si vede già mai uscire neruo alcuno; anzi si distribuisce per quello (come al suo luogo diremo) a vn molto sottil ramo del sesto paio de nerui, che nascono delle ceruella, del quale haurebbe egli poco bisogno, se fusse principio loro. Ne anche nascono della dura madre; anchor che in questo siano da scusare quegli, che lo hanno detto; perche essendo tutti e nerui inuiluppati con essa, & con la pia madre, come sono gli alberi con le scorze, facilmente si puote ro ingannare mirandogli dalla parte di fuori. Gli aiutò anche a pensarlo il vedere, che le ceruella non hanno sentimento alcuno, & che la dura & pia madre lo hanno molto acuto; la qual cosa insieme col vedere che la parte di dentro de nerui manca in tutto del sentire, hauendola quella di fuori molto acuto, mi ha fatto anche a me non tener per tanto determinato, come molti pensano, che'l sentimento nasca dalle ceruella. Ma postò questo da parte, che non tocca all' historia, dico che, chi considera ben i nerui dalla banda di dentro, vedrà che nascono delle ceruella, o della midolla spinale; & che la sustanza loro è simile alla parte, doue nascono. Et perche la midolla (come habbiam detto) è piu dura, che le ceruella, così anchora i nerui, che nascono di quella, son piu duri, che que che nascono delle ceruella; & di mano in mano piu, secòdo che piu vāno verso la schiena, infino all' arriuare all' osso grāde, di doue nascono e nerui piu duri di tutto'l corpo. Sono anche i nerui piu duri o teneri, secondo che piu sono corti o lunghi; & per cio i nerui, che vāno all' orecchie, alla lingua, al palato, & a gli occhi, son piu teneri, anchor che di q̃sti, que, che fanno alcuni circoli pel cammino, come fa il terzo paio, s' induriscano piu, secondo che'l luogo, per doue passano, e piu secco; il che non e senza grā mistero. Perche, si come i cinque sentimenti esteriori, per gli quali, veggiamo, vdiamo, gustiamo, odoriamo, & sentiamo, hauea di bisogno d' vn' instrumento per riceuer queste virtù, che fusse tenero, perche gli raggi o spetie, che continuamente escono dalle cose, piu facilmete il mouessero o alterassero, se erano questi nerui duri, non poteano far ben suo offitio; così que, che seruono al mo-

Differenza tra i nerui in durezza.

Perche son piu teneri l' vn neruo, che l' altro.

Libro settimo

al mouimento, se eron teneri, non poteano senza romperfi ogn'hora, muouer la machina del nostro corpo. Di questo si caua, che de nerui, alcuni seruono al senso, alcuni altri al moto; al sentire seruono que, che vanno ^b a gli occhi, ^c all'orecchie, al ^d naso, al palato, alla bocca dello stomaco, alle palme delle mani, & a tutta la pelle; al mouimento seruono tutti gli altri. Ma non percio voglio dire, che i nerui, che seruono al mouimento, siano priui del sentire, come hanno pensato alcuni, ingannati dal vedere che molte volte accade perdere il sentimento restando il mouimento libero, & al contrario. Perche, quando alcuna parte perde solo il sentimento, è, perche i rami de nerui, che vengono alla pelle, han patito, restando quei de muscoli salui; &, quando si perde il mouimento solo, accade al contrario. Et se alcuno mi domandasse, che vuol dire, che quelli, che vanno alla pelle, non la fanno muouere (essendo nerui) come fanno quei, che vanno a i muscoli, risponderai io, che si come vna medesima virtù ci fa vedere, vdire, odorare, & gustare, per gl'istessi nerui; & ogni cosa di queste fa in vn particolar luogo del nostro corpo, che è proprio organo di tal'opera, & non in alcun'altro; così ne piu ne meno ci fa muouere medianti i nerui, che vanno a muscoli, & sentire medianti que, che vanno alla pelle, alla bocca dello stomaco, & a gli intestini, & a tutte l'altre parti del corpo, che sono habili a riceuere il sentimento. Ma tornando alle differenze de nerui, son'oltre di questo differenti i nerui nel nascere. Perche alcuni, & principalmente i piu teneri, nascono con vn principio continuato, come fanno ^e que de gli occhi. Altri nascono con molti principij, come cordicelle, le quali vanno sempre separati, come fa ^f il terzo, quarto, & quinto paio de nerui della testa. Alcuni altri, anchor che nascano con molti principij, tosto che sono usciti del craneo, si tornano a congiungere, & fanno vn tronco. La qual cosa accade principalméte nel piu de nerui, che nascono della schiena, ^g & nel setto, & settimo paio della testa; anzi tutti i nerui, tagliandogli al trauerso, paiono molti fili d'ordoncini congiunti insieme. Son differenti di piu e nerui nel modo di distribuirsi. Perche alcuni si distribuiscono per vna parte sola, senza mandar ramo alcuno all'altra, come fanno que de gli occhi. Altri si spartono in diuersi rami, che vanno, gli vni alla pelle, gli altri a muscoli, altri all'ossa, ^h come fa il terzo paio, che nasce della testa. Alcuni altri vanno senza diuideri o congiungeri ad alcun'altro neruo, ⁱ come fa il secondo paio, che nasce della testa, anchor che se gli appressi vn poco la radice minore del terzo paio, che nasce similmente della testa. Alcuni altri si mescolano o congiungono fra se stessi, ^k come fa il neruo d'vn occhio con quel dell'atro. Alcuni si congiungono ad altri, tosto, che escono della schiena, facendo vna rete, o cordone di cappel da Cardinale, come si dipinge, ^l come fanno que, che vanno al braccio. Sogliono anchora alcuni far differenza tra nerui, che alcuni son voti di dietro o pertugiati, & alcun'altri massicci; ma io infino adesso non ho potuto vedere neruo alcuno pertugiato. Et quel, che e dicono di que dell'occhio, guardandogli alla candela, & anche al Sole mi pare cosa da ridere. Et per cio posto questo da parte, sarà bene incominciar a trattare in particolare della distributione di tutti e nerui, cominciando da que, che nascono dalle ceruella.

Tutti gli nerui
sentono.

Perche alcuni
nerui danno sen-
timento, al-
cun'altri moui-
mento.

Differenza de
nerui nel nasce-
re.

Nella distribu-
zione.

Niuno neruo e
pertugiato.

b t.i. fi. i. ii. G
c la med. a
d fi. ii. P

e t.i. fig. i. ii.
G K
f la med. M,
Z, a

g fig. i. ii. c, v

h fig. ii. M
i fi. ii. K

k fig. i. I, H

l t. iiii. fi. i. ii.

Quante paia di nerui nascano dalle ceruella, et dalla nuca
in nanzi, che esca pel craneo. Cap. 2.

Per questo mira
tutte le Figure
del libro quin-
to.

G la habbiamo detto, come le ceruella si spartono in due parti, vna di nanzi, & vn'altra di dietro; & che quella di nanzi chiamiamo ceruella, quella di dietro Celabro. Anchora dicemmo che la parte di nanzi, per di sopra si spartiu in destra & sinistra, & per di sotto era tutta continuata; & che di essa, & non del celabro nasceua la midolla spinale. Et anche dicemmo, come le ceruella haueano due ventricoli, vno sinistro, vn'altro destro, li quali amendue si veniuano a congiungere in vna concauità, che chiamiamo il terzo ventricolo; dal quale va vn picciol riuolo all'altro, che si fa tra la midolla spinale & il celabro, che alcuni chiamauano il quarto. Hora sarà ben trattare de nerui, che nascono di loro, li quali tutti nascono della parte piu bassa delle ceruella, & della midolla spinale in nanzi, che esca del craneo, & non in modo alcuno del celabro, come alcuni han pensato. Questi nerui, che nascono della testa, se ben molti de piu saui Anatomisti dicono, che sono sette paia, cioè sette nerui da vn lato, & sette da vn altro, non dimeno guardandogli con

- a** *fi. i. E. fi. ii.* con diligenza, molto meglio potremmo dire che son noue, aggiungendoui ^a vn paio, che
F va all'organo dell'odorare, che eglino non chiamano neruo, perche nõ esce fuori del cra-
b *fi. i. ii. L. M* neo; & diuidendo il terzo paio ^b in due, come con molta gran ragione si potrebbe fare;
c *la med. d.* & cõtando vn'altro ^c paio, che nasce appresso il principio del quinto, del qual niun di lo-
apresso alla ro fece mentione. Ma per seguire il medesimo ordine, che gli Antichi, gli contarò tutti
a sotto el numero di sette paia, cominciando dal primo, che serue alla vista.

Del primo, et secondo paio de Nerui delle Ceruella. Cap. 3.

- a** *fig. ii. G* **N** Asce ^a il primo paio de Nerui delle ceruella, ognuno dal suo lato, dal fondo delle
ceruella, appresso doue la parte piu stretta de i due ventricoli si viene a congiun- *Il nascimẽto del*
b *li. i. t. v. fi. i.* gere; ^b che è appunto sopra la glandola, che habbiam detto riceuer la flemma del ca- *primo paio.*
M po. Questi nerui sono i piu teneri & i piu grossi, che siano nel corpo, parlando semplice-
mente d'ogni neruo da per sè; & ognun di loro cammina tosto, che è nato, alquanto ver-
c *fi. i. H* so il suo compagno, infino che si vengono a congiungere, non pero incrociandosi, come *Gli nerui della*
d *li. i. t. v. fi. i.* alcuni han pensato, anzi faccendosi d'amendue vn ^c corpo quadro, che arriua infino ^d al *vista non si in-*
F centro o principio delle conche de gli occhi; doue si tornano a diuidere, & il diritto va *crociano.*
all'occhio diritto, il sinistro all'occhio sinistro. Come facilmente in Padoua il piu de gli
anni si può vedere; Perche cauandosi a ladroni in Vinegia pel primo furto vn'occhio, in-
trauiene che si tornano a prèdere indi ad vn anno o due, & si mādano a Padoua per far-
ne Anatomia; & in loro si vede che tutto il neruo di quel lato, di doue lor māca l'occhio,
è molto fiacco, & anche quasi secco, senza hauer patito l'altro niente. Oltre che io ho ve-
duto essere in alcuni, diuisione tra l'vn neruo & l'altro; & il Vesalio dice hauergli veduti
del tutto separati in vn huomo, il quale egli conosceua in vita, ne per cio vedea egli due
cose per vna. Hora camminādo ognuno di questi nerui dal suo lato, esce ^e per lo primo
bucò dell'osso cuneale, che è dal lato di dentro della radice della conca dell'occhio; & in-
serendosi a punto ^f nel mezzo della parte di dietro, che risponde alla pupilla dell'occhio,
senza diuiare piu a vna parte, che a vn'altra (come il Vesalio o non considerandoui be-
ne, o ingannato da gli occhi de gli altri animali disse) si conuerte ognuno ^g in vna tela, co-
me rete, che cuopre di dietro quasi tutta la metà^h dell'humor vitreo; & è alquanto simile
alla sustanza delle ceruella o piu propriamente alla reticella; per la qual cosa molti non
l'hanno voluta chiamar tela, ma reticella. Et cosi finiscono questi nerui senza far ramo al-
cuno, seruendo per condotti, per gli quai gli spiriti visui vanno a gli occhi; & i raggi, o
spetie, o similitudini delle cose a ventricoli delle ceruella, doue giudichiamo di quel, che
habbiam veduto; dal quale effetto han voluto molti dire, che erano forati, & per cio gli
chiamarono Poros opticos, che vuol dir canali o pertugi della vista. Pure io infino adesso
(come ho detto) non ho veduto in loro pertugio alcuno manifesto; ne picciol, ne grāde.
i *fi. i. ii. K. li.* ⁱ Il secondo paio de nerui nasce vn poco piu a dietro, che'l primo, da lati del fondo delle *Il secondo paio*
v. fi. xiii. xv. ceruella; & è assai piu fortile, che'l primo, ma piu duro, il che non fu fatto senza gran mi- *di Nerui.*
G stero Perche si distribuisce per ^k gli muscoli, che muouono gli occhi, & la palpebra supe-
k *lib. ii. r. xv.* riore, vlcendo del craneo per lo ^l secondo buco dell'osso cuneale accompagnato da vna
fig. xxi. xxi. vena, & vna arteria.
xxii.
l *li. i. t. v. fi. i.*
G

Del Terzo, et quarto paio de Nerui delle Ceruella. Cap. 4.

- a** *fi. i. ii. M. li.* **I** L Terzo paio comincia con due radici, ^a vna piu sottile, che l'altra, ma ben piu dura.
v. fi. xiii. I ^b La piu grossa nasce de lati delle ceruella, al medesimo piano, che gli altri due, vn po-
b *la med. L,* co piu a dietro. La sottile nasce piu in dietro, che la grossa, iui, doue comincia a nascere
H la ^c midolla spinale; & cammina dirittamente in nanzi per la parte piu bassa delle ceruel-
c *fig. i. D.* la, & forando la dura madre, s'accosta al ^d secondo paio; & insieme con esso esce ^e per lo
d *fig. i. ii. K* buco, per cui habbiam detto vscire il secondo. Et subito si sparte in quattro parti, ^f La
e *li. i. t. v. fi. i.* prima delle quali si distribuisce p lo grasso, che è tra muscoli de gli occhi; & di poi passa
G per que ^g buchi dell'osso della fronte, che habbiam detto esser nelle ciglia, & si distribui-
f *fi. i. N. li. ii.* sce ^h per gli muscoli della fronte. La ⁱ seconda parte scēde all'ingiu, & passa ^k per lo buco
c *li. i. t. v. fi. i.* del quarto osso della mascella superiore, che si uede nella punta della gota, & subito si di-
g *lib. i. t. iii.* uide
fi. i. t.
h *lib. ii. t. i. A*
i *fi. i. O*
k *lib. i. t. iii.*
fi. i. c.

*Dimisioe del piu
sottil ramo di
questo paio.*

Libro settimo

uide i molti ramuscelli, che si distribuiscono¹ per gli muscoli, che muouono il labbro superiore, & per lo medesimo labbro, & per le gengiue, che abbracciano e denti di nanzi.
^m Il terzo ramo passa per loⁿ buco commune al quarto, & quinto osso della mascella superiore, che si vede vn poco piu giu del lagrimale; & entra nel voto del naso, distribuendosi per la tela carnosu, che cuopre per la parte di dentro il naso. ° Il quarto ramo (che è manco grosso, che gli altri) esce per quella fessura, che si fa tra'l primo osso della mascella superiore, & l'osso cuneale, al lato di fuori del concauo dell'occhio, & si distribuisce per la parte di dentro del musculo delle tempie. Il p principio piu grosso del terzo paio nasce alquanto piu in nanzi, ma parimente da lati delle ceruella; & esce per lo^q settimo & ottauo buco dell'osso cuneale, & subito getta^r vn ramo, che si storce, & fa le riuolte, ne piu ne meno, che i vitici de i tralci delle viti o delle zucche, faccendosi di mano in mano piu duro, infino che si congiunge a due^s ramuscelli del quinto paio; & mescolandosi co loro si distribuisce per lo musculo delle tempie, per lo masticatore, & p tutti gli altri muscoli della faccia, & per la pelle sua. Gettato questo ramo scende alquanto piu; & manda poi vn'altro^t ramuscello, che si distribuisce per le gengiue, che abbracciano li denti. Dopo a questo, in nazi che arriue alla lingua, ^u getta dalla parte piu bassa vn ramo, che passa^x per lo musculo, che sta nascosto nella bocca, & va ad entrare^y per lo buco, che ha la mascella inferiore nella parte di dentro, appresso la punta delle ganascie o mascelle, & cammina in nanzi mandando ad ogni dente del suo lato vn ramuscello, infino che viene ad vscire per^z gli buchi, che si veggono da lati della punta della barba, distribuendosi anchora per lo labbro inferiore. ^a Il resto di questo ramo grosso va alla radice della lingua, & fa quella tela, che la cuopre, mediante la quale gustiamo qual si sia sapore, madando alcuni ramuscelli alla sustanza della lingua; & cosi si termina la distributione di tutto il terzo paio di nerui. Il quarto^b paio nasce vn poco piu a dietro, che'l terzo, & è piu sottile, & piu duro di quello; ma camminando vn poco in nanzi si cõgiunge al piu sottil ramo di quello; & amendue insieme escono^c per lo buco detto, & si vano a distribuire per lo palato, faccendo la^d tunica, che'l cuopre. Per la qual cosa piu ragioneuolmẽte potremmo dire, che questo paio, & il ramo sottile del terzo facessero vn paio, attento che amenduni seruono al gusto; & il nascimento & distributione loro è piu congiunto.

Del Quinto paio de Nerui delle Ceruella.

Cap. 5.

Il quinto paio.

IL quinto paio^a è vn poco piu grosso che'l^b quarto; & nasce della metà di quella parte della midolla, che è tra le ceruella, e i nodi del collo, cominciando con molti ramuscelli, li quali tutti si tornano subito a congiungere. Et cosi passa per lo^d secondo buco dell'ossa delle tempie, che pare lumaca ouero chiocciola, & va alla concauirà dell'orecchie, doue questo quinto paio si diuide in molti ramuscelli, che si distendono, come tela, per le concauità dell'orecchio, faccendo vna gran parte dell'organo dell'udire. Et oltre a questi ramuscelli ne fa particolarmente altri due, che entrano, ^e l'vno per lo^f quarto buco di questo osso, che è intrauerfato, per lo qual passa anchora vna picciola^g vena, che va all'organo dell'udire; & questo ramo poco poi, che è vlcito si congiunge^h col ramo del terzo paio, che habbiamo detto storcersi come i vitici de i tralci. L'altro esce per loⁱ terzo buco di questo osso, che è molto picciolo, & torto, & attrauerfa per^k lo musculo che muoue la mascella inferiore, che è nascosto nella bocca, chiamato il masticatore; & come arriua al lato di nanzi di questo musculo, si cõgiunge al detto ramo del terzo paio, distribuendosi per gli muscoli delle guance, & per la pelle, che gli cuopre; & cosi finisce tutta la distributione di questo neruo. Ma è da notare che appresso il principio di questo paio alquanto in dietro^l nasce vn'altra radice assai piu sottile & diua di quello, la qual camminando per sotto le ceruella in nanzi, trapassa la dura madre, & esce^m per lo quinto buco dell'osso cuneale, & si distribuisce per loⁿ musculo, che è nascosto nella bocca, & per quel delle tempie, al qual vano cinque rami di nerui, il primo della radice piu sottile del terzo paio di nerui, il secondo della piu grossa, il terzo, & quarto, della piu grossa radice del quinto paio, il quinto della piu sottile. Et questo fu fatto, perche questo musculo hauesse piu forza, come al suo luogo dicemmo.

Vn'altro paio di nerui, che nasce appresso al quinto.

I lib. ii. ta. i. H.F

m fig. ii. P
n lib. i. t. iiii.
fig i s
o fig. ii. Q

p fig. i. ii. M
q li. i. t. v. fi. i.
Q
r fi. ii. R
f fig. i. iii. b, c

t fig. ii. S
u fig. ii. T
x li. ii. t. vi. O
y lib. i. t. iiii.
fi. viii. F

z la med. fi.
vii. G
a fig. ii. Y, Y

b fig. i. ii. Z
c li. i. t. v. fi. i.
Q
d fig. ii. el Z
piu basso.

a t. i. fig. i. ii.
aa. li. v. fi. ix.
M fi. xiii. L
b fig. i. ii. Z
c fig. i. ii. a
d li. i. t. v. fi. i.
a

e t. i. fi. i. ii. b
f lib. i. t. iiii.
fi. vi. v.
g lib. vi. t. iiii.
fi. ii. n.
h fig. ii. R
i li. i. t. v. fi. i.
b
k li. ii. t. iiii.
Δ

l fi. i. ii. d. li. v
fi. xiii. L
m lib. i. ta. v.
fi. i. S
n li. ii. t. vi. A

Del

a fi. ij. e. li.
v. fi. ix. N

b lib. vj. t. iij.
fi. ij. l. C

c fig. ij. f
d lib. ij. t. ix. r

e fig. ij. v
f lib. vj. t. v. fi.

g fig. ij. o
h la med. g

i li. v. t. v. fi. x.
v. v

k fig. ij. h

l t. ij. x. *

m fi. ij. k k
n lib. ij. t. iij.

o la med. S
p li. ij. t. v. P

q t. j. fi. iij. P.
fig. ij. l

r la mede. E.
li. vj. t. iij. Y

s t. j. fi. ij. m.
fi. iij. Q Q

t fig. j. M

u la med. B
x R. fi. ij. o

y S, S. fi. ij. p

z fi. ij. q
a la med. r

b li. iij. fi. vj.
h

c la med. I

d fi. ij. fi. iij.
fi. xij. xij.

T, V

e fi. ij. t

HA il Sesto paio di nerui ^a il suo principio alquanto piu a basso, che'l quinto; & nasce con molti principij separati, li quali si cògiungono subito, & fanno vn corpo, che passa insieme col ^b minor ramo dell'arteria del sonno, & il maggior dell'arteria giugulare interiore per lo buco commune all'osso della collottola, & a quel delle tempie, & al cuneale. Et subito, come esce, getta ^c vn ramo, che si distribuisce per gli muscoli, che occupano la parte di dietro del collo, & principalmente per ^d lo secondo, che muoue la palette della spalla. Dopo a questo cammina, ^e attaccato al settimo paio & ^f all'arteria del sonno medianti certe tele, infino a gli lati del gargarozzo, doue se gli ^g cògiunge vna parte del settimo paio, che lo fa piu grosso; & tosto poi manda alcuni ^h ramuscelli al trauerso de muscoli del gargarozzo. Fatto questo scende per gli lati del gargarozzo, ⁱ accompagnato dall'arteria del sonno, & dalla vena giugulare interiore, infino dentro del petto; doue subito mada ^k vn ramo picciolo al lato piu basso di dètro della prima costa, il qual passa sotto la tela, che cuopre le coste, & per le radici delle medesime coste, prendendo alcuni ramuscelli de ^l nerui, che nascono della schiena, & vanno a gli tramezzi loro; pure tosto che questo ramo passa la diaframa si distribuisce (come diremo) per le mèbra della digestione. Oltre a questo ramo nascono ^m del sesto paio vn poco piu in giù di questo ramo detto ⁿ altri ramuscelli, che si distribuiscono per lo ^o settimo, che muoue la testa, che nasce dell'osso del petto, & della clauicola, & finisce nel processo simile alla māmella; & per ^p lo muscolo, che muouel'osso hyoide, & per ^q quello, che nascèdo di questa parte, va alla prima cartilagine del gargarozzo. Fatto questo entra questo paio di nerui nel voto del petto; & passando tra le vene, & arterie giugulari, ^r il neruo del lato diritto getta dal lato di dentro, quando tre, quādo due rami, che seguono l'uno l'altro, & fanno certi nerui, che si riuoltano subito per sotto ^s l'arteria, che va al braccio; & congiungendosi amenable ^t due si fanno ^u vno, che rimonta attaccato al lato destro della canna del polmone, mediantevna ^x tela, che va infino al lato diritto del gargarozzo, appoggiandosi alla ^y glandola, che è attaccata alla radice del lato destro. Passata la glandola subito si sparte in molti rami, che si distribuiscono per gli muscoli del suo lato. Il neruo del lato manco dopo l'esser entrato nel voto del petto, scende dirittamente verso il cuore, fin che fuori delle tele del cuore, arriua al tronco ^z dell'arteria grāde, che habbiamo detto scendere all'ingù; & iui getta altri ^a tre ramuscelli, che si riuoltano per sotto la detta arteria, còuertendosi tutti in vno, che fa ^b il neruo sinistro, che si riuolta. Il quale monta, attaccato al lato manco della canna del polmone mediante vna tela, come habbiamo detto fare il diritto; & facendo il medesimo cammino si distribuisce, ne piu ne meno, p gli muscoli del gargarozzo del suo lato. L'offitio di questi nerui è dar virtù a muscoli, che aiutano a chiuder il gargarozzo, & per conseguente formar la voce, perche senza loro, anchor che parlassimo, nò teriamo intesi, come non s'ode il flauto, quando gli manca la linguuccia. L'esperienza di tal cosa si vede manifestamēte pigliando vn cane viuuo, & tagliando, o legando vno di questi nerui, & dipoi amendue; perche tagliandone vno, subito perde la metà della voce; tagliadogli amenable due non può in guisa niuna abbaiare. Dipoi che'l sesto paio ha gettato questi nerui, che ritornano in sù, chiamati per ciò da Latini Reuerfui, arriua al piu alto del cuore, & ^c getta certi mezzani rami alla tela, che cuopre gli polmoni, ^d & a quelle, che fasciano il cuore. Et de rami, che hanno al lato manco di questo sesto paio, nasce ^e vn ramuscello, che si distribuisce per la vescica del cuore, cominciando iui, doue si congiunge quella vescica col lato manco della vena arteriale; il quale è tanto fortile, che se non si vfa gran diligēza nel tagliare, facilmente si rompe. Questo ramuscello cammina attaccato ^f alla vena arteriale, distendendosi pel lato suo manco alquanto a dietro, infino all'arriuare alla parte piu alta del cuore, doue si diuide in assai fortili ramuscelli, che si distribuiscono per questa parte. ^g Il resto di questo paio di nerui, che habbiamo detto distribuirsi per le membra della digestione, passando per la diaframa, ognuno dal suo lato, scendono, il diritto al lato diritto dello stomaco, il sinistro al sinistro, attaccandosi a lui alquāto lentamente mediante vna tela. Et iui si spartono, ognuno in due, ^h che si volgeno al trauerso dello stomaco, così per la bocca, come per la parte sua di dietro, & dinanzi, in tal modo, che gli rami del lato destro

Il neruo destro
reuerfui.

Il sinistro.

L'offitio de nerui
reuerfui.

I rami di questi
nerui, che vanno
al Petto.

Que, che vanno
alle mèbra della
Digestione.

B B

stro

Libro Settimo

stro toccano il sinistro; & que del sinistro il destro. Et de gli due rami, che abbracciano il lato diritto della bocca dello stomaco, ne nasce vno, che scende per la parte di fuori del lo stomaco, secondo tutto il largo suo, infino al fondo, gettando pel cammino alcuni ramuscelli, cosi alla parte dinanzi, come a quella di dietro dello stomaco. Arriuato il ramo al fondo s' passa, appoggiato alla vena porta, infino al concauo del fegato, distribuendosi per la tela, che l'cuopre. ^h Il ramo destro di questo sesto paio di nerui (il quale nanzi al principio de nerui reuersiui habbiamo detto distendersi ⁱ per le radici delle coste, cõgiungendosi a nerui, che escono della schiena, & distribuirsi per gli muscoli, che sono fra le coste) dapoi che ha passata la diaframa appoggiato all'arteria grande, & passato al trauerfo per lo concauo del fegato, getta tre rami. ^k Il primo de quali va ^t alla tela di dentro della reticella; & distendendosi per essa all'ingiu, si sparte in alcuni ramuscelli; cioe in vno, che si distribuisce per lo lato destro di questa tela, & per la parte dell'intestino grasso, che si attacca a questa tela; & in vn' altro ^m tanto sottile, che alcune volte non si vede, il qual va all'intestino, che è attaccato al fondo dello stomaco, & al principio del digiuno; ⁿ & in vn' altro, che è assai piu grosso, & va alla tela di fuori della reticella, & arriuando alla parte diritta del fondo dello stomaco, manda alcuni ramuscelli, cosi allo stomaco, come alla reticella. Il ^o resto di questo ramo si distribuisce per lo concauo del fegato, & per la vescichetta del fiele. Il ^p secondo ramo si distribuisce per lo rognone diritto, & per la ^q tela grassa, che l'cuopre. Il ^r terzo si distribuisce per lo lato destro del mesenterio, & per gl'intestini, che sono attaccati a quello. Il ^s resto di questo ramo si distribuisce alla vescica, & nelle donne alla parte destra del fondo della matrice; benchè la vescica, & la matrice hanno anchora de gli altri nerui, che nascono della schiena. Il ramo sinistro cõpagno di questo fa quasi le medesime diuisioni, che l' diritto. Perche manda anchora, in prima ^t vn ramo alla tela di dentro della reticella, che si attrauerfa verso la milza; & nel cammino getta ^u due ramuscelli, che si distribuiscono per la tela di sotto della reticella, per la parte dell'intestino grasso, che in questo luogo s'attacca alla reticella. Et da poi ^x getta vn' altro ramuscello piu grosso, il quale andando al lato manco del fondo dello stomaco, si distribuisce per quello, & per la tela di fuori della reticella, alla qual manda molti ramuscelli. ^y Dopo questo de rami, che entrano nella milza, nascono ^z altri molto sottili, che vanno al lato manco dello stomaco, accompagnati dall'arterie, & vene, che habbiamo detto ritornare dalla milza a esso. ^a Il secondo ramo si distribuisce per lo mesenterio, & per gl'intestini del medesimo lato. ^b Il terzo va al rognone manco, alla vescica, alla matrice, & cosi finisce la distribuzione del sesto paio. Benchè alcune volte si son veduti andare de rami del mesenterio alcuni ramuscelli a gli testicoli.

Del Settimo paio de Nerui delle Ceruella.

Cap. 7.

SI come il settimo ^a paio de nerui delle ceruella è piu duro, che tutti gli altri, cosi ^b nasce di parte piu dura, cioe della midolla spinale, innanzi, che esca della testa, con molti principij separati; & quindi cammina vn poco innanzi, doue congiungendosi, di tutti si fa vn neruo, che ^c esce per lo secondo buco dell'osso della collottola. Et subito poi, che è uscito, si congiunge al sesto paio, ^d mandando alcuni ramuscelli ^e a muscoli, che nascono del processo simile ad vn puntaruolo, & di poi va infino alla radice della lingua, doue si diuide in ^f molti rami, che si distribuiscono per gli muscoli della lingua, & per que dell'osso hyoide, & del gargarozzo. Senza questi rami ne getta di piu vn' altro, appresso la radice della lingua, che si congiunge ad vn ^g ramuscello del sesto paio faccendolo piu grãde.

Della Midolla spinale, et de Nerui, che nascono di quella.

Cap. 8.

LA Midolla ^a spinale è inuolta con la dura & pia madre, ne piu ne meno, che le ceruella; alle quali è molto simile in sustanza, anzi verissimamente non è altra cosa, che parte delle ceruella, o vn processo loro (come nel quinto libro ^b dicemmo) ben che non ha polso come esse; per la qual cosa la dura madre non è separata da quella, come dalle ceruella. Ha di piu vna particolar tela neruosa & dura, la quale è sotto le sopradette;

La midolla spinale in che è differete da quella dell'altre ossa.

L'autore non ha considerato bene l'anatomia del cervello, perche se come la dura madre ne è separata dalla midolla spinale non ancora ne è separata dal cranio

& fu fatta, perche nel muouerfi la schiena non si rompesse la midolla sua, la quale è assai differente da quella dell'altre ossa. Perche la midolla è piu humida, & vntuosa, & per cio l'ossa si nutriscono di essa; il che non fanno di questa, la qual fu fatta solamente, perche di lei nascessero gli nerui, che non poteano nascere delle ceruella. Questa midolla scende per lo voto de nodi della schiena; & nel scendere, infino alla metà delle spalle è piu tenera, & tutta d'un pezzo, & getta i ^e nerui, come bottoni d'alberi; ^d da indi innanzi si diui de in molti ramuscelli (ne piu ne meno, che se vno congiungesse molte cordicciuole, & le infasciasse cō vna tela dalla banda di fuori); & di poi ^e per ogni buco pare che vada gettando vno di que ramuscelli, infino che arriuando al fine resta solo vno, che risponde al fine della midolla. Di questa midolla nascono cinquanta otto, o siano sessanta nerui, che sono vent'otto, o trenta per lato; cioè ^e del collo sette, ^g delle spalle dodici, ^h de lōbi cinque, ⁱ dell'osso grande sei; benchè tal volta i cinque piu bassi dell'osso grande son doppi, che è allhora, quando questo osso si fa di sei nodi; perche allhora li nerui escono per gli buchi di fuori, & per que di dentro. ^k La parte vltima della midolla (che esce dell'osso grande, & entra nel codione) ne è neruo, ne meno li ramuscelli, che ne nascono, meritano di esser chiamati di questo nome.

In che parti la midolla spinale par che sia fatta di molti fili.

Quante paio di nerui nascono della Midolla.

De Nerui, che nascono del Collo.

Cap. 9.

a li. i. cap. x.

S I è detto ^a che'l primo nodo del collo si congiunge all'osso della collottola, & al secondo osso del medesimo collo, di tal sorte, che gli processi de lati loro s'attaccano. Per questa ragione il primo, & secondo paio di nerui del collo non nascono, come gli altri, anzi nascono con due principij (quasi come habbiam detto far que dell'osso grāde) de quali l'uno ^b esce per la parte dinanzi del corpo del nodo, & l'altro per quella di dietro. Il primo esce per vn buco, che si fa tra il primo nodo del collo, & l'osso della collottola, appresso alla parte di dietro delle testicciuole, che si congiungono al detto nodo, & si distribuisce per lo ^d quarto, & quinto paio de muscoli, che muouono la testa. Et di questa parte di dietro di questo paio di nerui nasce ^e vn ramuscello, che si distribuisce per lo ^f musculo, che muoue la paletta della spalla. ^g Il secōdo principio è tanto sottile, che molte volte non si vede; & nasce della parte dinanzi della midolla spinale; & esce infra l'osso della collottola, & il primo nodo del collo, vicino a i lati di quella ^h legatura tonda, che habbiam detto legare il dente del secondo coll'osso della collottola; & si distribuisce, ⁱ per lo primo paio de muscoli, che muouono la schiena. Il secōdo paio fa nel medesimo modo due principij, de quali quel ^k di dietro (che è piu grosso, che quel ^l dinanzi, se ben anche è piu sottile) esce per gli lati del ^m processo di dietro di questo secondo nodo, & subito si ⁿ diuide in due rami disuguali. ^o Il piu grosso de quali cammina da nanzi a dietro, verso doue si cōgiungono li muscoli d'ogni lato, che occupano la parte di dietro del collo; & quiui si fa maggiore ^p congiungendosi ad vn ramo del terzo paio de nerui del collo; & così esce di mezzo de gli detti muscoli, & torna vn'altra volta verso la banda dinanzi, montando alla testa, doue ^q si diuide in molti rami, che si distribuiscono per tutta la pelle della testa. Il ^r piu sottil ramo si distribuisce p gli principij del terzo, & quinto paio de muscoli, che muouono la testa. ^s Il principio dinanzi di questo secōdo paio nasce dalla parte dinanzi della midolla spinale; & esce tra'l secōdo & primo nodo, al lato della radice del dente del secondo osso, distribuendosi per lo ^t primo paio de muscoli, che muouono la schiena. Il terzo ^u paio di nerui esce per lo buco, che si fa tra'l secondo & terzo nodo; & subito poi, che è vscito, si sparte in due rami. De quali ^x quel di dietro si storce verso dietro, nascondendosi tra'l ^y settimo, & ottauo musculo, che muouono la schiena, & dipoi tra'l ^z secondo paio, che muoue la testa, camminando verso il processo di dietro del secondo nodo del collo; & quindi s'allarga a lati del collo, passando per sopra ^a il musculo largo, & sottile, che habbiam detto aiutar a muouere la guācia, & in parte la mascella inferiore. ^b Il ramo dināzi si sparte in quattro ramuscelli. ^c Il primo di loro si distribuisce per lo primo, & secondo musculo, che muouono la schiena; & camminādo all'ingitū si cōgiunge ad vn ramuscello del quarto paio di nerui, che si distribuisce per gli muscoli detti. ^d Il terzo sormonta, & congiungendosi all'ultimo ramo del secondo paio di nerui, che si distribuisce per la pelle della testa, & per gli due muscoli, che la muouono, si congiunge

Distribuzione del primo paio de nerui del Collo.

Del secōdo.

Del terzo.

Libro Settimo

La distributio-
ne del quarto pa-
io de Nervi del
collo.

Quella del quin-
to.

Il neruo della
diaframa.

Il ramo dināzi
del quinto paio.

Quel di dietro.

La distributio-
ne del sesto paio
de Nervi del col-
lo.

giunge col quarto ramuscello; & amēduni si distribuifcono ^f per gli muscoli, che nasco-
no de processi de lati dell'ossa del collo, & le muouono da lati; & ^s per quello, che nascē-
do di questi medesimi processi tira la paletta in sù. ^h Il quarto paio de nerui esce per lo
bucò, tra l' terzo, & quarto nodo; & si sparte parimente in due rami. ⁱ L' ultimo de quali
cammina verso il processo di dietro del terzo nodo del collo, nascōdendosi tra i muscoli,
& mandādo loro nel passare alcuni ramuscelli; & quindi scēde tra gli muscoli dell' un la-
to, & dell' altro del collo, distribuēdosi per lo musculo largo & sottile, che habbiam det-
to aiutare a muouere le guance, & la mascella inferiore. Il ^k ramo dinanzi si sparte in tre
ramuscelli, cioè, ^l in vno, al qual si congiunge ^m l' altro ramuscello del terzo paio, & si di-
stribuifce per gli muscoli, che sono sotto la canna della gola, & piegano il collo; ⁿ & l' al-
tro, che si distribuifce per gli muscoli, che sōno attaccati a lati de nodi del collo, & il muo-
uono da banda; & per quel, che nasce de processi de lati del collo, & tira la paletta della
spalla in sù. ^o Il terzo è assai piu sottile, che i sopra detti; & scende infino a congiungerfi
con ^p vn ramo del quinto paio, che fa il ^q neruo della diaframa, come diremo. Il ^r quinto
paio esce per lo buco commune al quarto, & quinto nodo; & si sparte, ne piu ne meno,
che l' quarto, in due rami. De quali quel di ^s dietro si storce verso il processo di dietro de
nodi del collo, & si distribuifce nel medesimo modo, che l' ramo di dietro del quarto. Il
^t ramo dinanzi manda subito ^u vn ramuscello a muscoli, che piegano il collo; & dipoi ne
getta ^x vn' altro, al quale si ^y cōgiunge vn ramo del quarto paio, & vn' altro del sesto, & al-
le volte vn' altro del settimo (che è, quādo māca quel del quarto) cō quali si fa maggiore;
& cammina infino all' inferirsi nel mezzo della ^z diaframa, distribuendosi per tutta lei.
Nella qual cosa non posso fare, che io non mi matauigli della diligenza del Creator no-
stro, el quale essendo, che tutti li nerui entrano ne muscoli pel principio loro, & alla dia-
frama, per hauere il suo principio nel mezzo (come nel secondo libro dicemmo) non po-
tea mādare neruo alcuno de nodi del petto (se ben le stauano piu appresso), fece, che pas-
sāsero due rami del quinto paio de nerui del collo per mezzo del voto del petto; & che
ognuno dal suo lato attaccato all' e tele, che fanno il suo tramezzo, scēdessero ad inserirsi
nel principio della diaframa piu sicuri. ^a L' altro ramo dināzi di questo quinto paio è as-
sai piu grosso, che l' sopra detto; & di lui nascono ^b alcuni ramuscelli, che si distribuifcono
per gli ^c muscoli, che alzano la paletta della spalla; principalmente vno, ^d il qual nasce del
la parte di fuori di qsto ramo, & esce in fuori diuidendosi in molti rami, che si spargono
per la pelle, che cuopre il musculo, che alza il braccio. Et il suo resto nascōdendosi for-
to l' musculo detto, come arriua al collo della paletta della spalla, subito si sparte in due ra-
mi disuguali; ^e quel dināzi & piu sottile si distende sotto ^f la cōgiuntura della punta del
l'omero con la clauicola, & manda vn ramo alla parte del musculo, che alza il braccio,
che comincia dalla clauicola, & dalla pūta dell'omero, senza mandar ramo alcuno alla
pelle, eccetto vno ben picciolo, che si accompagna alquanto con la ^g vena della testa. ^h Il
ramo di dietro di questo paio di nerui, che è piu grosso, che quel dinanzi, & habbiā det-
to scendere nascōso tra muscoli, dopo l' hauer gettato vn ramuscello, che s' inserisce ⁱ nel
musculo, che nasce della paletta della spalla, & finisce nell'osso hyoide, passa per ^j lo seno
come vn mezzo cerchio, che habbiam detto farsi nel lato piu alto della detta paletta, ac-
cōpagnato da vna vena, & vn' arteria. Et subito getta vn' altro ramuscello, che ^m va al mu-
sculo, che occupa il seno, che si fa tra la spina di questa paletta, & il lato piu alto dell' iste-
sa; & alla parte del musculo, che alza il braccio, che nasce della pūta dell'omero, & della
clauicola. Benche questo ramo non si diuide tutto per questo musculo; anzi manda vn
ramuscello alla pelle, che cuopre la parte di fuori del braccio, il quale ^o passa per la parte
di fuori del fin del musculo, che alza il braccio. Et ne piu ne meno escono de nerui, che se-
guono, che vāno al braccio, alcuni ^p ramuscelli, che si distribuifcono per gli muscoli, che
muouono la paletta della spalla, inferendosi sempre nella parte lor di dentro. Il ^q sesto
paio nasce di sotto el quinto nodo del collo, mandando (come gli altri) il ^r ramo di die-
tro a muscoli, che muouono la testa, & il collo, & ad alcuni ^s di que, che muouono il pet-
to; benche questi riceuono principalmente li nerui del settimo paio del collo, & del pri-
mo del petto. ^t La parte dinanzi di questo sesto paio, dopo l' hauer gettato il ^u ramo, che
habbiam detto cōgiungerfi col ramo del quinto, & quarto paio, che fanno il neruo della
diaframa, si cōgiunge alle due paia, che seguono, ^x congiungendosi, & separādosi, come
fanno

e t.ij.ij. T
f lib.ij. t.viii.
C. t.ij.ij. H
g t.ij.ij. Q
h t.ij.4
i t.ij.ij. V
k la med. x
l t.ij. Y
m la med. r
n t.ij. a
o la med. b
p la med. e
q t.ij.ij. n
r t.ij. S
s t.ij. e
t t.ij.ij. d
u t.ij. dal d,
al G
x t.ij. e
y t.ij. la u fi
fa dil b, e, m
z li.ij. t.ij.ij. A
a t.ij.ij. t
b t.ij. r. r
c t.ij. r
d t.ij. ij. g
e la med. h
f li.ij. t.ij. a
g lib. vj. ta. ij.
a, a
h t.ij.ij. i
i t.ij. R, S
l li.ij. t.ij. fi.
ij.ij. a
m li.ij. t. xij.
H. H
n t.ij.ij. a
o lib. ii. ta. x.
passa fra l
P, & la d
p t.ij. ij. t.ij.
a, a
q t.ij. 6
r t.ij. x
t li.ij. t. xij. F
t.ij. l
u t.ij. la l cō
la e & cō la
b, p, far la m
x t.ij.ij. q

fanno gli cordoni de capelli da Vescoui, in quel modo, che si dipingono, & facendo insieme con loro i nerui, che si distribuiscano per lo braccio. Nondimeno particolarmente questo sesto paio mada vn ramo, che scende infino al concauo della paletta della spalla, & manda alcuni rami a muscoli, che alzano la detta paletta. Il 2° settimo paio esce per lo buco tra'l sesto, & settimo nodo del collo mescolandosi co' li suoi vicini (come habbiam detto) & distribuendosi la maggior parte per lo braccio; anzi del quinto, sesto, & settimo del collo, & del primo, & secondo del petto, si fanno tutti li nerui del braccio, come nel suo particolar capitolo diremo: Hora basti sapere, che di questo settimo paio alcune volte nasce vn ramuscello, che si congiunge a gli rami, che fanno il neruo della diaframa; & che ordinariamente getta vn ramo, che va verso dietro; il quale oltre a i rami, che manda a gli muscoli, che occupano la parte di dietro del collo, ne manda anchora alcuni b al musculo largo & sottile, che aiuta a muouere le guance; al quale tutti e nerui, che nascono del collo, eccetto il primo, mandano alcuni rami, li quali tutti si distendono per esso, secondo il filo della carne.

Quella del settimo.

De Nerui, che nascono de Nodi delle spalle.

Cap. 10.

IL primo paio di nerui, che nasce de nodi delle spalle, esce per gli buchi, che si veggo no tra'l settimo nodo del collo, & il primo delle spalle, ne piu ne meno, che gli cinque vltimi del collo. Et cosi ognuno di questi nerui si sparte subito in due rami, b de quali il primo, & il piu sottile, cammina verso li processi di dietro di detti nodi, nascodendosi tra gli muscoli, che sono attaccati alla parte di dietro del collo, & gettando pel cammino certi ramuscelli al c musculo, che nasce della prima costa; & s'inferisce ne processi de lati del collo, & lo muoue da lato, benche alquanto verso la banda di nanzi; & altri due, che muouono verso la banda di dietro la testa & il collo. Il resto suo, che arriua al processo di dietro del settimo nodo, cammina in obliquo, alquanto verso la parte di fuori; & torna dosi a separare dal processo di dietro, getta alcuni rami al secondo d musculo, che muoue la paletta della spalla; & al e quarto, che muoue la medesima paletta; & vltimamente al terzo. Il ramo di nanzi che e assai maggiore, che quel di dietro del settimo, s si congiunge parte al settimo neruo del collo, parte al secondo del petto, nella forma detta; & tutto egli si distribuisc per lo braccio, eccetto h vn ramo, che nasce al suo principio, & si congiunge a sopra detti, & cammina verso nanzi, secodo il lungo della prima costa infino al l'osso del petto, madado pel cammino alcuni ramuscelli al i musculo, che nasce della clauicola, & s'inferisce nella prima costa. Et il capo di questo ramo riuoltandosi in su si distribuisc per lo k settimo musculo, che muoue la testa; & l per gli altri due, che nascono del medesimo osso del petto, & s'inferiscono, l'uno nell'osso hyoide, l'altro nella cartilagine del gargarozzo simile ad vn scudo; benche alle volte per questi muscoli si compariono m alcuni rami del sesto paio de nerui della testa, & del terzo delle spalle. Il resto di questo paio si distribuisc per lo braccio (come diremo); & nel cammino passata l'ascella manda dalla parte di dietro n alcuni rami, che si distribuiscano per gli muscoli, che occupano la parte di dentro della paletta della spalla. Il o secondo paio nasce tra'l primo, & secondo nodo delle spalle, & manda, ne piu ne meno, che'l primo, vn p ramo a dietro, che si distribuisc, come egli. Dopo questo si congiunge vna buona parte di questo paio al primo del petto; di modo, che'l quinto, sesto, & settimo del collo, & il primo, & il secondo del petto si mescolano in tal modo, che non si distinguono gli vni da gli altri, & fanno vna rete (come di cappel da Vescouo,) della quale (come diremo) nascono tutti e nerui, che si distribuiscano per le braccia. q Il suo resto si distende tra la prima costa, & la seconda, infino all'osso del petto, gettando nel cammino alcuni rami a muscoli, che gli son vicini. L'altre r paia di nerui delle spalle (infino al primo nodo de lombi) quasi tutte nascono in vn medesimo modo, cio e, tosto che son nati, gettano due rami, Vno sottile, che va verso dietro, infino a processi di dietro de' nodi delle spalle, nascodendosi tra'l quarto s musculo, che muoue il petto, & il sesto, & uottauo, che muoue la schiena; & tra'l primo. & y secondo paio de muscoli, che muouono la schiena. Benche non solo si distribuiscano per questi muscoli, ma atriando alle punte de processi di dietro de nodi, scendono tra i muscoli BB 3 dell'uno

La distribuzione del primo paio di nerui delle spalle.

Il secondo paio de nerui delle spalle.

La distribuzione dell'undeci paia di nerui, della Spalle.

y t.iii. p
z t.ii. 7

a t.iii. r
b t.i. r

a t.ii. 8

b t.iii. u

c t.viii. C.
t.xiii. N

d t.ix. r. A
e t.x. r

f t.xi. F

g t.ii. iii. x

h t.ii. y

i t.iii. d

k t.iii. F

l t.iii. S. T.
t.v. p.

m t.i. fg. ii.
k, k

n t.iii. u

o t.ii. 9

p t.iii. s

q t.ii. s

r t.ii. dal. 10
infino al 10

s t.xii. A

t t.xiii. r

u t.xiii. y

x t.xii. r

y t.xiii. A,
B, C, D, E, F

z t.xiii. H

a t.xiii. O

Libro Settimo

dell'vno & quelli dell'altro lato; & s'inferiscono ne muscoli, che nascono di loro, che sono (oltre alcuni de sopra detti) il ^b quarto, & il ^c secôdo, che muouono la paletta della spalla; & il ^d quinto, che muoue il petto; & il ^e quarto, che muoue il braccio. Mandano oltre di cio questi rami alcuni piccioli ramuscelli alla pelle delle spalle appresso doue passano, benche non tanti, come i nerui, che vanno al petto, o alle mani, o al collo. La parte di nani di questi nerui manda alcuni ^f ramuscelli al ^g ramo del sesto paio de nerui delle ceruel la, che si distende per le radici delle coste di sotto della tela, che le abbraccia; & di poi si stende per gli tramezzi delle coste, accompagnato dalla ^h vena, & dalla ⁱ arteria, faccêdo il medesimo cammino & distributione, ch'elleno fanno. Di questi rami nascono nel cammino molti ^k ramuscelli, che si distribuisceno per gli muscoli, che lor son vicini, che sono il ^l secondo, che muoue il petto; & il ^m secondo, che muoue il braccio; & il primo, che muoue la paletta della spalla; & il ⁿ quarto, che muoue il braccio; & il secondo di que del ventre, guardando sempre in tutti il filo della carne. Manda parimente alcuni ramuscelli alla pelle del petto, & del ventre, senza tenere ordine alcuno; benche que, che vanno alle mammelle, hanno particolarmente molti ^p ramuscelli del quinto paio de nerui delle spalle, che va al quarto tramezzo delle coste, & per ciò hanno piu delicato senso. Hanno di piu l'vndecimo, & duodecimo paio altri ramuscelli, che s'inferiscono nel principio del ^q sesto musculo, che muoue la coscia, il quale diremo nascer in questa parte de lati de non di della schiena.

Li nerui, che vā
no alle mammel
le.

De Nerui, che escono de Nodi de Lombi. Cap. I I.

LI Nerui, ^a che escono de Nodi de Lombi, conuengono con gli altri in questo, che tosto, che sono usciti della schiena, mandano vn ^b ramo verso dietto, che si distribuisce per gli muscoli, che sono attaccati alla schiena; che sono il ^c quarto, che muoue il petto; & il ^d vndecimo, & ^e decimo terzo, che muoue la schiena. Ma gli rami di questi nerui, che si fanno appresso le punte de processi di dietro, tra gli muscoli dell'un lato, & que dell'altro, si distribuisceno principalmēte per la pelle, & per lo ^f quarto musculo, che muoue il braccio. Et li rami di nani si distribuisceno per gli muscoli del vētre; & anche per lo quarto che muoue il braccio, & per la pelle sua; & p lo nono ^g musculo, che muoue la schiena; & finalmente per lo ^h sesto, che muoue la coscia. Nasce anche particolarmente del secondo paio de nerui de lombi ⁱ un ramuscello, che si accompagna alle volte con l'arteria del seme dal suo lato, cioè quando il ramo del sesto paio de nerui della testa, che va a gl'intestini, non manda ramo alcuno al testicolo. Escono di piu delle tre prime paia di questi nerui alcuni ^k ramuscelli, che si congiungono a gli rami del sesto paio, che habbiam detto scendere attaccati alle radici delle coste, faccendogli piu grandi; & delle tre paia piu basse ne nascono altri, che si distribuisceno per la colcia, come diremo.

De Nerui, che nascono dell'Ossò Grande. Cap. I 2.

Quante paia di
nerui nascono
dell'Ossò gran-
de.

Dell'osso Grande ^a nascono ordinariamente cinque nerui, & alle volte sei. De quali ^b il primo nasce tra l'ultimo nodo de lombi, & il primo dell'osso grande, nell'istessa maniera, che habbiam detto nascer gli altri de lombi; eccetto, che del ramo, che cammina all'indietro, nasce particolarmente vn ^c ramuscello, che si distribuisce per gli muscoli, che nascono della punta del gallone, & principalmente per lo ^d primo, che muoue la coscia, mandādo alcuni ramuscelli alla pelle, che cuopre l'anguinaie. Del ramo dinanzi di questo paio vna parte si mescola co nerui, che vanno alla gamba; & l'altra va per la parte di dentro dell'osso dell'anca, mandando alcuni ramuscelli a muscoli del ventre, & al ^f settimo, che muoue la coscia. Le ^g cinque paia piu basse nascono in vn'altra particolare maniera; perche innanzi, che escano dell'osso, si diuidono in due rami; vno sottile, che esce per lo buco, che habbiā detto hauer questo osso nella parte di fuori; l'altro piu grosso, che esce per lo buco di dentro. Quel, che esce per lo buco della parte di fuori, si distribuisce principalmente per gli muscoli, che occupano la parte di dietro dell'osso del gallone, & dell'osso grande, cioè per ^h l'undecimo, & ⁱ decimo terzo musculo, che muouono la schiena; & per lo principio del ^k quarto, che muoue il braccio; & p lo quarto, che muoue

l t. ix. ii. t. x. muouere il petto; & per gli ¹ quattro primi, che muouono la coscia; & finalmente per
xj. z. * la pelle, che cuopre queste parti, & l'anguinaie. Que della banda dinanzi son piu gros-
fi, & si distribuifcono assai diuersamente; perche gli tre primi vanno alla gamba (come
da poi diremo); gli due vltimi a gli muscoli del fondamento, al collo della matrice, a quel
m t. ij. iij. 56 della vescica, & anche al membro. Et cosi finisce ^m la Midolla spinale, faccendo come
vna coda, che entra per l'osso del codione, & finisce in quello. Ma sarà bene tornare a
trattare de nerui, che si distribuifcono per le braccia, & gambe, cominciando da quei,
che vanno alle braccia.

De Nerui, che si distribuifcono per le Braccia.

Cap. 13.

a t. ij. iij. u. u. **G**IA habbiamo detto come ^a il quinto, sesto, & settimo paio de nerui del collo, &
5. 6. 7 il ^b primo, & secondo del petto si mescolauano, l'uno con l'altro, come vna rete, o
b t. ij. 8. 9. cordone di cappel da Vescouo, in tal modo, che difficilmente si può sapere, qual sia l'u-
no o l'altro. Di questa mescolanza di nerui nascono que, che vāno al braccio, senza guar-
dare ordine alcuno nel nascer piu dell'uno, che dell'altro. Pure per cōtargli, come gli hā-
no contati tutti, dirò che ^c il primo neruo, che va al braccio, nasce del ramo del ^d quinto
c t. ij. iij. r. r. paio di quelli del collo; & si distribuifce per la parte del ^e muscolo, che alza il braccio,
t. iij. R che nasce della paletta della spalla, camminando per la parte di fuori del braccio, infino
d t. ij. iij. i alla metà sua, & passando per sopra la tela carnosā, così egli, come tutti gli altri, che vāno
e t. x. c alla pelle, mādano alla pelle tra il grasso alcuni ramuscelli, sottili, come fili, senza guar-
dare ordine alcuno. Tutti gli altri nerui, che vanno al braccio, passano per l'ascella, compar-
tendosi in molti, & molto grossi rami; perche il ^f secondo nasce di quel intrecciamento,
f t. ij. iij. p o che ho detto far questi nerui, poi che son nati, & va al braccio, per sotto el ^g muscolo pri-
g t. iij. c mo, che piega il gomito, iui, doue si congiungono gli due suoi principij (che è, doue s'in-
ferisce ^h il muscolo, che congiunge il braccio al petto, & quel ⁱ che lo alza); & nasconden-
dosi sotto il principio di questo muscolo detto, che nasce del processo della paletta del-
la spalla, simile ad vn'anchora, mādā ad ogni principio di qsto muscolo ^k vn ramuscello.
Il quale scendendo all'ingiu s'allarga verso la parte di dietro di questo medesimo muscu-
lo; & scende, gettando alle volte vn ^l ramo al terzo neruo, verso la parte dinanzi del go-
mito, per sotto el muscolo primo, che l'piega; & mandando dal lato di fuori ^m vn ramu-
scello ⁿ al muscolo maggiore, che storce il minor fusello all'ingiu; & arriuādo alla sangui-
nella del braccio, scende per lo lato di fuori della ^o corda del primo muscolo, che piega il
gomito, distribuendosi per la pelle. Perche tosto, che esce di dentro i muscoli, si sparte in
due rami; de quali il ^p piu alto, & piu sottile, cāmīna insieme con la ^q vena della testa, per
sopra il minor fusello infino alla metà sua, & dipoi si storce verso la giunta del maggior
fusello, mandando a tutta la pelle, che cuopre il minore, molti ramuscelli; ^r il maggior de
quali cāmīnando sempre tra pelle & carne, passa la giunta del minor fusello, & arriua in
fino al secondo articolo del pollice. A questi ramuscelli si congiungono alle volte alcuni
altri di que, che nascono ^s di quello, che diremo gire alla palma della mano, che è il ramo
piu basso, & piu grosso della diuisione di questo secondo neruo appresso il gomito; il
quale subito si sparte in altri due rami, che vāno sotto el ^t ramo della vena della testa, che
si va a congiungere con vn'altro ramo della vena del fegato, & fanno la ^u commune.
L'un ramo di questi dopo l'hauer camminato sotto la detta vena, infino all'arriuare alla
commune, lascia la vena, & va tra pelle, & carne, mōtando alquanto verso il minor fusel-
lo, a canto del lato di dentro del ^v muscolo piu basso, che piega il bracciale, infino al suo
fine. L'altro ^z ramo scende piu in obliquo, che l principio della vena commune, & dipoi
si congiunge alla ^a maggior vena, che si vede nel braccio sotto la pelle, & cammina verso
il bracciale, & faccendo fine innanzi, che arriue alla metà de fuselli, si sparte in due rami;
b l'uno de quali scende appoggiato al minor fusello, l'altro ^c al maggiore; & amenduni
passano il bracciale, gettando certi ramuscelli, che si spargono per la palma della mano.
Et de ramuscelli, che si spargono p la polpa del dito pollice (chiamata il mōte di Venere)
nascono alle volte alcun'altri, che vāno al pettine della mano, & si ^d mescolano co nerui,
che si distribuifcono per la pelle, che cuopre la parte di fuori del primo articolo del pol-
lice; & cosi finisce di distribuifsi. Il ^e terzo paio di nerui, che va al braccio, nasce dell'in-
trecciamento

Di qual parte
nascono li ner-
ui, che vanno al
Braccio.

La distributione
del secōdo neruo
che va al brac-
cio.

La distributione
del terço.

Libro Settimo

Il quarto neruo
che va al brac-
cio.

trecciamento detto, vn poco piu in giù del secondo; & nell'arriuare al braccio getta f. vn ramo, che passa (tra pelle & carne) fra il musculo, che congiunge il braccio al petto, & quello, che alza l'istesso braccio. Ma, come arriua il terzo neruo al braccio, subito entra sotto el h primo musculo, che piega il gomito; & scendendo all'in-giù insieme col secondo neruo manda vn i ramuscello all'ultimo musculo, che piega il gomito, al quale tal volta ne viene vn altro del secondo neruo. Fatto che è questo, ordinariamente nasce k vn ramo del secondo neruo, che si congiunge a questo terzo, & lo fa maggiore; & alle volte non si congiungono l'uno all'altro. Ma sia, come si voglia, in questo luogo getta ordinariamente vn l ramo, che si distribuisce per la pelle, che cuopre la parte di nanzi del braccio, che gli è vicina; & di poi cammina per la parte di dentro del braccio infino alla sanguinella, scostandosi sempre vguualmente dal secondo paio, & passando per sopra il m tubercolo di dentro dell'osso dell'omero, & per lo lato di dentro del fine dell'ultimo n musculo, che piega il gomito. Passato il fine di questo musculo tosto si sparte in molti o ramuscelli, che si distribuiscono per gli muscoli, che occupano la parte di dentro del braccio, dal gomito alla mano, cio è, p per que, che piegano i secondi, & q terzi articoli delle quattro dita; & per r quello, che piega il terzo articolo del dito pollice; & s per quel, che nasce del tubercolo di dentro dell'osso dell'omero, & s'inferisce nell'osso della palma, che sostiene il dito indice. Dopo questo getta vn altro t ramo, che cammina per entro i muscoli, che piegano i secondi, & terzi articoli delle quattro dita, & il terzo del dito pollice a canto del minor fusello, accompagnato da vna u vena, & vna arteria infino al bracciale; & passa per sotto la x legatura intrauersata, mandando alcuni molto sottili ramuscelli y al musculo, che separa il pollice dall'altre dita; & a gli z due, che piega no il primo articolo di questo medesimo dito; & a quel della parte di dentro, che piega il primo osso del dito di mezzo; benchè a questo, & al musculo piu basso, che storce il braccio in sù, piu si dira che si appoggino questi nerui detti, che nò che si distribuiscono per loro. Dopo questo il neruo fa nella palma della mano tre rami; de quali il primo si sparte subito in due, che camminano, ognuno dal suo lato, alla patte di dentro del pollice; il secondo va al lato di dentro del dito indice, diuidendosi anche in altri due; il terzo va al lato di dentro del dito di mezzo verso l'indice, senza spartirsi in piu rami, camminando tutti essi infino alle punte delle dita. Il quarto neruo è il piu grosso di quanti ne vanno al braccio; & nasce del medesimo intrecciamento detto; & scende per lo braccio insieme con la b vena del fegato, & coll'arteria grande, & mandando alcuni piccioli rami a d muscoli, che distendono il gomito, in nanzi, che arriue alla metà dell'osso dell'omero, si storce in obliquo verso dietro, verso l'osso, attrauersando i detti muscoli. Ma in nanzi, che si storca del tutto, getta dalla parte di dentro e vn ramo, che passa tra questi f muscoli, & l'ultimo, che piega il gomito, alla parte di dentro del braccio; doue diuidendosi in molti ramuscelli si distribuisce per la pelle, che cuopre qsta parte. Gettato questo ramo, cammina il neruo verso dietro, infino che a poco a poco arriua alla parte di fuori del braccio; & getta dal lato di fuori s vn ramo, che esce verso la pelle, p h entro il musculo di fuori, che distende il gomito, & il principio del piu lungo, che storce il minor fusello in giù; & subito si distribuisce per la pelle, che cuopre la parte di fuori del braccio infino al gomito. Fatto questo il neruo cammina infino al tubercolo di fuori dell'osso dell'omero, & passa per i vn seno, che si fa nella parte sua di dietro; & passato che ha questo luogo, getta vn ramo, che k esce in fuori infino alla pelle, & cammina senza ordine alcuno infino al bracciale, gettando pel cammino molti ramuscelli, che si distribuiscono per la pelle, che cuopre la parte di fuori del braccio. Piu in nanzi il neruo si sparte in l due rami, che vāno na scosti al bracciale, L'uno m a canto del minor fusello, n tra'l lato piu alto del quarto musculo, che distende il bracciale, & il lato piu basso del musculo piu lūgo, che storce il minor fusello in giù; mandando pel cammino alcuni rami a questi muscoli, Et arriuatò che è al bracciale, passa p sotto la o legatura attrauersata, che è nella parte sua di fuori, per la quale dicemmo anche passare la corda diuisa del musculo, che distende il bracciale. Passato il bracciale subito si sparte in due p rami; de quali l'uno si torna tosto a spartire in altri due, che vanno al lato di fuori del dito pollice; l'altro anche si diuide in due; l'uno de quali va alla parte di fuori del dito indice, diuidendosi, ne piu ne meno, in due rami; il primo va senza spartirsi piu al lato di dentro della parte di fuori del dito di mezzo. q Il ramo di questo

f t.ii.v.
g li.ii.t.i.di-
ritamēto
dal L al Q
h t.vii.r
i t.ii. e.
k t.iii. x
l t.ii. x
m lib. i t. vi.
fi. vi. c
n t. vii. r
o ta. ii. 43. t.
iii. c
p li. ii. t. v. e
q li. ii. t. vi. e
r la mede. n
s t. iii. x
t t. iii. 44. ta.
iii. d
u li. vi. t. v. fi.
x. g
x li. i. t. iii. q
y li. ii. t. ii. i
z t. vi. x x
a ta. ii. iii. o
t. iii. e
b lib. vi. ta. v
fi. x. Z
c t. ii. p
d tauo. xi. e
d e f
e t. iii. o. ta.
iii. f
f ta. vii. tra l
P, & l'N
g t. iii. 32. ta.
iii. g
h lib. ii. t. xi.
tra l'S, & il
Y
i li. i t. vi. fi.
vi. p
k t. iii. 33. ta.
iii. h
l t. iii. 34. ta.
iii. i
m t. iii. 35. ta.
iii. k k
n lib. ii. t. ix.
tra l'Y & l'X
o lib. ii. ta. ii.
iii. 3.
p t. iii. 36.
q t. iii. 37.

r t. iij. 38.
 f t. ix. Z
 t la med. O
 u la med. A
 x t. x. A, E, II
 y t. iij. 42
 z t. iij. iij. *.
 t. iij. m
 a t. vii. fra' l' p
 & il N
 b lib. j. ta. vj.
 fig. vj. s
 c la med. V
 d t. ij. presso
 al 43. t. iij.
 c, n
 e t. v. O. t. vj.
 E
 f lib. vj. ta. v.
 fig. x. h g
 g li. ij. t. iij. O

h t. ij. 46. ta.
 iij. P
 i t. ix. tra' l' E
 & el A
 k tau. iij. 36.
 t. iij. q
 l t. ij. 48. 43.
 m li. vj. t. ij.
 u, x

questo neruo, che va a canto del maggior fusello, subito manda vn ramuscello al musculo, che distende il dito indice, quel di mezzo, & l'annulare; & vn altro al musculo, che distende il picciolo; & vn altro al terzo musculo, che distende il bracciale; & nel cammino manda vn ramuscello ad ogni musculo di que, che nascono del maggior fusello, tenendo sempre il filo della carne. Il resto del neruo finisce al fin del bracciale, diuidendosi in alcuni ramuscelli, che si spargono per la congiuntura. Il quinto neruo del braccio nasce dell'intrecciamento detto, piu in giu, che niuno de sopra detti; & cammina per la parte di dentro del braccio, nascosto tra'l musculo di fuori, che distende il gomito, & quel di dentro, che l'piega, attaccato sempre al quarto neruo senza far ramo alcuno, insino all'arriuare al tubercolo di dentro dell'osso dell'omero; alla cui vltima parte si riuolta passando per vn seno, che si fa in essa; & di poi si distribuisce quasi nel medesimo modo, che'l terzo, & per gli medesimi muscoli, che lui, facendosi anche vn ramo, che cammina appoggiato al minor fusello, per entro i muscoli, che piegano i secondi, & terzi articoli delle dita, accompagnato dalla vena, & arteria, che vanno per questo luogo; & cosi cammina insino alla palma della mano per sotto la legatura intrauersata. Et in prima getta vn ramo, che diuiso in due, si distribuisce per la parte di dentro del dito picciolo, vno per lato; & vn altro, che diuidendosi anche in altri due, va nel medesimo modo all'annulare; & dipoi getta vn altro, che va alla parte di fuori del lato di dentro del dito di mezzo, senza spartirsi in altro ramo, eccetto quando il terzo neruo non manda ramo alcuno al lato di dentro di questo dito di mezzo; perche all'hora questo ramo si diuide in due, & va ad amandue i lati di questo dito. Ma è da notare, che appresso la metà del minor fusello, nasce dal lato di fuori di questo neruo vn ramo, che cammina fra'l musculo piu basso, che distende il gomito, & il medesimo, che l'piega verso la parte di fuori del braccio; & diuidendosi in tre ramuscelli, si distribuisce per la parte di fuori del dito picciolo, & per l'annulare, & per quel di mezzo, nella forma istessa, che si distribuisce il quarto per l'altre dita, dando loro senso; come chiaramente si vede, quando stiamo appoggiati sopra il gomito. Perche se strigniamo il quarto neruo in modo, che non passi per lui la virtù del sentire, subito s'indormenta il pollice, & l'indice, & parte di quel di mezzo; & strignendo il quinto s'indormentano l'altre dita. Il sesto neruo nasce del fine dell'intrecciamento detto; & passa per l'ascella tra pelle & carne, insino al tubercolo di dentro dell'osso dell'omero, mandando pel cammino molti ramuscelli alla pelle, appresso doue egli passa. Giunto che è al tubercolo detto, subito si sparte in piu rami, che vanno, parte sotto e rami della vena del segato, parte sopra; & tutti insieme camminano secondo il lungo del maggior fusello, tra pelle & carne, insino appresso el bracciale, doue finiscono spargendosi per la parte di sotto del braccio; & in questa forma finisce la distribuzione di tutti gli nerui per lo braccio. Nella quale manifestamente si vede, in che modo possa facilmente perdere vn membro il sentire, & restar col mouimento, & al contrario. Perche, se si taglia il primo neruo, che si distribuisce per la parte di fuori del braccio, restando sani quelli, che si distribuiscono per gli muscoli, quella parte di pelle, per la quale si distribuua questo neruo, resta senza sentimento; senza per cio perder il mouimento alcuno nel braccio.

Il quinto.

La distribuzione del sesto neruo, che va al braccio.

Come possa vn membro perdere il sentimento restandogli il mouimento, & al contrario.

De Nerui, che si distribuiscono per la Gamba, & per lo Piede.

Cap. 14.

a t. ij. 57. 60.
 66. 71. t. iij.
 c 76.
 b ta. ij. 57. ta.
 iij. &
 c t. viij. O E

F A S S I de' nerui, che escono de tre nodi piu bassi delombi, & in parte di quel, che esce per lo primo buco dell'osso grande, & di quelli, che escono per gli tre piu bassi, vno intrecciamento simile a quel, che fanno i nerui, che si distribuiscono per lo braccio, benché molto maggiore. Di questo intrecciamento nascono quattro nerui, tanto disuguali in grossezza, quanto varij nel distribuirsi; perche di loro il primo, & il terzo sono piu sottili; il secodo piu grosso, che amedue, ma pur anche sottile; & il quarto è piu grosso, che tutti tre insieme. Il primo nasce della parte piu alta dell'intrecciamento detto, iui, doue il ramo dinanzi del terzo paio de nerui de lombi si congiunge al quarto paio de medesimi; & scende alla coscia per sotto il peritoneo, appoggiato a gli muscoli de lombi,

Quattro nerui vanno alla gamba.

Libro Settimo

lombi, & al lato di fuori della corda del sesto ^d musculo, che muoue la coscia. Et nell'ar-
riurare all'osso, getta vn ^e ramuscello, che scende per la pelle della parte dinanzi della co-
scia alquanto in fuori di lui fin circa el ginocchio; & di poi si nasconde tra gli muscoli; &
mandando vn ramuscello al ^f primo, che muoue la gamba, & l'altro al ^g settimo, & dipoi
vn'altro ^h al nono, scende in obliquo secondo il sito dei due primi muscoli di questi tre
detti, che muouono la gamba, infino al finire vicino al ginocchio. ⁱ Il secondo neruo na-
sce vn poco piu in giù, che'l primo, scontro la congiuntura del terzo & quarto nodo de
lombi; & passa per sotto la parte di dietro del peritoneo; & di poi scende alla coscia, ac-
compagnato dalla ^k vena, & arteria, che passano per l'anguinaie, gettando (tosto che ar-
riua alla coscia) vn ^l ramuscello dalla parte di dentro, che va infino al dito pollice, appog-
giato sempre al lato dinanzi della ^m vena, che habbiamo detto gire dall'anguinaie per lo la-
to di dentro della coscia & della gamba, tra pelle & carne, infino al ⁿ piede. Et si comela
vena manda diuersi rami alla pelle, appresso la qual passa, cosi anche fa il neruo; tra i qua-
li ^o il principale è quello, che manda alla parte dinanzi del ginocchio, diuidendosi in mol-
ti rami, che si distribuiscono per esso. Gettato questo ramo si nasconde ^p il neruo nella
coscia, insieme con la vena & arteria, distribuendosi per gli muscoli, che occupano la par-
te di dentro della coscia, & principalmente per lo ^q quinto musculo, che muoue la co-
scia, & per ^r l'ottauo, che muoue la gamba, col quale insieme scede appoggiato al lato di
dentro del ^s nono musculo, che muoue la gamba; & facendo fine, come il primo, innan-
zi che arriue al ginocchio, manda pel cammino alcuni ramuscelli alle tele, che fasciano
le vene, & arterie. Il ^t terzo neruo segue dietro il secondo, & nasce scontro della con-
giuntura del quarto, & quinto nodo de lombi, sotto del peritoneo; & passando per ^u lo
settimo musculo, che muoue la coscia, cammina infino al ^x buco dell'osso del pettigno-
ne, per lo qual passa alla coscia; ma innanzi, che passe, manda alcuni ramuscelli al ^y nono,
& al ^z decimo musculo, che muouono la coscia; & di poi a i ^a muscoli, che nascono del-
l'osso del pettignone, & muouono il membro. Fatto questo scende piu in giù, & subito
māda (ne piu ne meno, che i due nerui sopra detti) ^b vn ramuscello alla pelle, che cuopre
la parte di dentro della coscia, mandando vn ^c ramo al ^d secondo musculo, che muoue la
gamba, & vn'altro alla ^e parte del quinto, che muoue la coscia, & nasce dell'osso del per-
tignone. Il ^f quarto neruo della gamba (che segue dopo el terzo, & è ben sei volte piu
grosso di lui) si fa dell'ultimo neruo de lombi, & de rami dinanzi degli tre nerui, che se-
guitano; & non solamente è egli il piu grosso di tutto il corpo, ma anche il piu duro, &
gagliardo, perche nasce del fin della schiena; & scende per sotto el peritoneo, & per
quella ^h incastratura, che per questo effetto habbiamo detto farsi nella parte di dietro del-
l'osso del gallone. Et subito getta vn ⁱ ramo dalla parte di dietro, il quale camminando al-
quanto nascosto sotto ^k el primo musculo, che muoue la gamba, esce di poi fuori, man-
dando ^l alcuni ramuscelli alla pelle, che cuopre la parte piu bassa dell'anguinaie, & alla
parte di dietro della coscia, infino a piu della metà sua, & altri al terzo, quarto, & quinto
musculo, che muoue la gamba, & al quinto, che muoue la coscia. Fatto questo scende il
neruo tra li muscoli, che occupano la parte di dietro della coscia a canto dell'osso, fin a
piu della metà di lui; & iui māda ^m vn ramo alla ⁿ parte del quarto musculo, che muoue
la gāba, che nasce di mezzo l'osso della coscia, come se fusse musculo da per se; & di que-
sto ramo escono alcuni ramuscelli, che si distribuiscono per la pelle, che cuopre la parte
di dietro della coscia dal mezzo in giù. Di poi scende il neruo infino al chino del ginoc-
chio, per entro le due teste dell'osso di dietro della coscia; nella qual parte māda da ogni
lato ^o vn ramo, che si distribuisce per gli ^p muscoli, che nascono di queste teste, che sono
gli tre primi, che muouono il piede. Et in questa parte si ^q diuide quasi sempre in due
rami disuguali, che si distribuiscono per la gamba (anzi tutti e nerui, che vanno alla gam-
ba dal ginocchio in giù, nascono di questo quarto neruo, eccetto quel, ^r che habbiamo
detto nascer del secondo neruo della gamba, & distendersi per la parte di dentro della
coscia, & della gamba) & alle volte piu in giù; & ben rade volte si vede diuiso tutto infino
al nascimento, non ostante, che per esser fatto di molti fili insieme, che par, che siano in-
uolti con vna tela, facilmente, chi si voglia, il può diuidere non solo in due, ma anche in
quattordici, & quindici. Il ^s primo, & piu sottile ramo di questo neruo cammina per la
parte

La distribuzione
del secondo ner-
uo, che va alla
gamba.

La distribuzione
del terzo.

Quella del quar-
to.

Il quarto neruo
è fatto di molti
fili.

d t.viii. A
e ta.ij. 58.ta.
iii. x

f li.ij. t.iii. x
g t.v. A
h t.iii. o
i ta.ij. 60.ta.
iii. y

k lib.vj. ta.v.
fi.x. d
l ta.ij. 61.ta.
iii. d, d
m lib.vj. t.v.
fi.x.m
n t.ij. 62.
o la med. 64
p la mede.
t.iii. e

q t.viii. o, c
r t.v. ii
s t.iii. o

t tau.ij. 66.
t.iii. z
u t.vii. A
x li.j. t.j.r
y t.xv. fi.xvj.
F, G, H

z t.vii. p
a t.xvj. fi.xiii
xv. K, L
b tau.ij. 68.
t.iii. n

c tau.ij. 70.
t.iii. o
d t.xv. fi.xvj.
A

e t.ij. 65.
f t.vii. o, c
g t.ij. li. 71.
t.iii. i

h li.j. t.ij. 15.
i t.ij. 72.
k t.ij. ii
l t.ij. 73.

m ta.ij. 74.
t.iii. z
n t.x. p

o tau.ij. 75.
t.iii. o, o
p t.xij. o, p, o
q t.ij. 76.
r la me. 61.

s ta.ij. 77.
t.iii. o

parte di fuori verso la congiuntura di sopra de gli due stinchi, gettando nel cammino vn ^a ramo, che va tra pelle & carne per la parte di fuori della gamba, & per sopra il tallone di fuori; & arriua alla banda di fuori del piè, mandando pel cammino molti rami alla pelle, che cuopre queste parti dette. Gettato questo ramo ^a subito si nasconde tra'l ^a settimo, & ottauo muscolo, che muouono il piede, appoggiandosi al ^a sesto; & in questa parte getta ^a vn'altro ramo, che si comparte senza ordine alcuno per la pelle, che cuopre la parte dinanzi della gamba. Il resto di questo ramo di fuori passando (come habbiam detto) tra gli muscoli, che occupano la parte dinanzi della gamba, & mandando loro alcuni ramuscelli, s'appoggia alla ^a legatura, che congiunge gli due stinchi pel lungo; & alla metà di quella getta vn ^b ramo, che bucanola va a congiungerli con vn'altro ^c ramuscello del ramo di dentro di questo quarto neruo, & insieme con le corde, che distendono le dita, passa per la ^d legatura intrauersata, che in questa parte si vede; & va al pettine del piede, & nascondendosi piu sotto le corde, manda certi ramuscelli a lati della parte di sopra delle dita; ma innanzi, che arriue alla detta legatura, getta vn ^d ramo, che si distribuisce per la pelle, che cuopre questa legatura. Il ^e ramo di dentro di questo quarto neruo scende per la parte di dietro della gamba, nascondendosi tra'l ^f quarto, & quinto muscolo, che muouono il piè, & tra que due, che nascono del maggiore stinco, & piegano le dita, gettando vn ^g ramuscello, che si congiunge al rampollo del ramo di fuori, che habbiam detto bucare la tela, che lega gli due stinchi. Dopo questo scende passando per sotto la ^h legatura intrauersata, tra l'osso del calcagno, & il tallone di dentro, & va alla pianta del piè, doue s'appoggia a ⁱ muscoli, che in quella sono, mandando ad ogni lato della parte di sotto delle dita vn picciol ramuscello. In questo modo si distribuisce il quarto neruo ordinariamente; se ben alle volte il ramo di fuori suole finire, innanzi che arriue al piede; & delle volte accade, che del ^k ramo di fuori non nasce quel ramuscello, che buca la tela detta, che lega gli due stinchi della gamba, ne si congiunge col ramo di dentro. Anzi come questo ramo di dentro arriua alla parte di dietro di questa tela, getta vn ^l ramo, che bucando la detta tela, scende per entro i muscoli, che stanno nella parte dinanzi della gamba; & passando per sotto la legatura intrauersata, che sta nel collo del piè, manda ad ogni dito due ramuscelli. Et con questo habbiam finito la distributione di tutti i nerui. Resta hora per compimento dell'historia trattare de sentimenti dell'odorare, gustare, & toccare.

De Sentimenti dell'Odorare, Gustare, & Toccare. Cap. 15.

VA R I E opinioni sono state tra i Medici, & Philosophi dell'instrumento dell'odorare, causate tutte dal poco conoscimento, che della composition dell'huomo era tra loro. ^a Hora nascono della sustanza delle ceruella, appresso la parte dinanzi de due primi ventricoli, appresso il nascimento de ^c nerui della vista, due processi, bianchi, sottili, & teneri, quasi della medesima sustanza, & figura, che gli altri nerui, che nascono delle ceruella, benche alquanto piu teneri, & meno tondi; e quali camminano dirittamente innanzi (attaccandosi nel cammino alle ceruella mediante la pia madre) insino all'arriuare a i ^d seni, che si fanno nell'ottauo ^e osso della testa, & sono diuisi mediante il processo suo piu alto; appresso alla parte di dietro de quali, distaccandosi questi processi delle ceruella, s'inferisce ognuno nel suo seno, stendendosi innanzi insino alla parte dinanzi di loro. L'offitio di questi processi, o nerui, è riceuere l'humore, o essalatione, che esce delle cose odorose, & entra pel naso al voto o concauità, che si fa nell'osso della fronte, & nel cuneale; nella qual parte habbiam detto disponersi l'aere, che entra pel naso alle ceruella (ne piu ne meno, che ne polmoni si dispone quel, che va al cuore) & si comunica a questi nerui l'humore o vero odore delle cose per alcuni de buchi dell'ottauo osso della testa, & per loro va a gli ventricoli delle ceruella, ne piu ne meno, che habbiam detto passare le spetie o similitudini delle cose per gli nerui della vista. L'organo del gusto già tutti fanno che è la lingua, aiutata dal palato; laqual di quanti muscoli sia fatta, già nel secondo libro si disse; & nel sesto contammo le vene, & arterie,

Perche sono state varie opinioni dell'organo dell'odorare. Il nascimento di questo organo.

Del gusto.

Libro Settimo De Nerui.

**Cōpendio di tut
to'l Libro.**

& arterie, che le danno nutrimento, & vita; & nel settimo gli nerui, medianti e quali gusta gli cibi, che sono della maggior radice del terzo paio delle ceruella, che habbiamo detto distribuirsi per la tela di sopra della lingua, dandole virtù di gustare; come ne fa intera fede il vedere, che se per disgratia manca questo neruo (come in alcuni già naturalmente si è veduto) non piglia gusto alcuno de cibi. Dell'istrumento del toccare non ci è cosa noua, che dire; perche al principio di questo libro dicemmo, che niun neruo manca di tal senso. Habbiamo posti li fondamenti, & armatura di questa humana fabbrica, che sono l'ossa, & cartilagini; & di poi trattammo delle legature, & sua copertura, che sono le legature, la pellicola, la pelle, il grasso, la tela chiamata Carnosa, li muscoli; & vltimamente la tela che fascia tutte queste ossa chiamata Periostrion. Ponemmo poi in questa fabbrica tre principij, che le dan sostegno, vita, & sentire, & tre sorti di canali, medianti li quali questi tre principij distribuiscono sua virtù per tutta quella.

Et vltimamente trattammo de ſenſi eſte-
riori. Et con queſto ho dato fine
a queſta hiſtoria, quanto piu
breuemente & ſuccin-
tamente ho
potuto,



Tauola I. Fig. I. & II.



Dichiaratione delle Lettere della Prima, & Secôda Figura de Nerui. La prima delle quali rappresenta le Ceruella, & il Celabro, toltone via le tele, che le fasciano, & volto quel di sotto, sopra, perche meglio si possa vedere il nascimento de nerui; & insieme si vede la parte della nuca, che sta dentro della testa. Nella seconda si vede il Nascimêto de Nerui dal lato diritto, insieme col processo loro. Et è da notare; che le lettere, che seguono; seruo no, parte alla prima figura, parte alla seconda, & alcune ad amendue; come notaremo con questi numeri. I. 2.

- A A** 1. 2. Le ceruella. **BB** 1. 2. Il celabro.
CC 1. 2. Li processi simili alle mammelle.
D 1. Il principio della nuca, o midolla spinale.
E 1. 2. La parte di qsta nuca, quâdo nuole vscir del craneo; la quale è tagliata appresso il primo nodo del collo.
F 1. 2. Gli instrumenti dell'odorare.
G 1. 2. Gli nerui optici, o il primo paio. Nondimeno nella prima figura questa lettera mostra il principio del sinistro; & nella seconda il processo suo insino all'occhio.
H 1. Dove si congiungono gli nerui optici, o della vista.
I 1. 2. La tunica dell'occhio, nella quale il neruo della vista si conuertere.
K 1. 2. Il secondo paio de nerui.
L 1. 2. La piu sottil radice del terzo paio.
M 1. 2. La piu grossa.
N 2. Il ramo della piu sottil radice, che va alla mascella superiore.
PP 2. Il ramo dell'istessa, che si cōuerte nella tela del naso, la quale mostra la P piu bassa.
Q 2. Vn altro ramo di questa radice, che va alle tempie.
R 2. Il ramo della maggior radice del terzo paio, simile a i viticci intorti, che fanno e tralci delle viti.
S 2. Il ramo della maggior radice del terzo paio, il qual va alla radice de denti masscellari superiori, & alle gengiue loro.
T 2. Vn ramo della maggior radice del terzo paio, che va alla mascella inferiore.
V 2. Certi bronchi di questo sopra detto ramo, che vanno al labbro superiore.

- XX** 2. Altri ramuscelli, che nascono del medesimo, & vanno alla radice de denti.
Y 2. Vna gran parte della maggior radice del terzo paio, che si distribuisce per la lingua.
Z 1. 2. Il quarto paio de nerui delle ceruella. Nondimeno la Z piu bassa nella secôda si gura dinota la tela del palato.
a 1. 2. Il quinto paio de nerui della testa, che va all'orecchie.
φ 1. 2. La parte di questo neruo, che va alle tempie.
b 1. 2. Il ramo del quinto paio, che nasce della parte sua dinanzi; il qual si congiunge col ramo, che notammo con la R.
c 1. 2. Il ramuscello del quinto paio, che entra per lo buco dell'osso delle tempie, chiamato il cieco; il quale si congiunge col ramuscello, che notammo con la b.
d 1. 2. Vn neruo, che nasce appresso il quinto paio, et si distribuisce per gli muscoli, che muouono la mascella inferiore.
e 1. 2. Il sesto paio di nerui, la distribuzione del quale si vede chiaramente nella seconda figura.
f 2. Vn ramo di questo paio, che va a gli muscoli, che occupano la parte di dietro del collo.
g 2. Altri rami, che vanno ad alcuni muscoli del gargarozzo.
h 2. Il ramo, che va alle radici delle coste del suo lato.
ii 1. 2. Certi pezzi di nerui, che vanno tra le coste, che si congiungono col ramo del sesto paio.
k 2. Li rami del sesto paio di nerui, che si distribuiscono per gli muscoli, che nascono della parte piu alta dell'osso del petto, & della clauicula, & camminano in sù.
l 2. Li rami di questo neruo, che fanno il recurrente del lato diritto.
m 2. Il neruo recurrente del lato diritto.
n 2. Alcuni rami di questo recurrente, che vanno al gargarozzo.
o 2. Li rami del sesto paio, che fanno il neruo recurrente del lato manco.
p 2. Il neruo recurrente del lato manco.
q 2. Alcuni rami del sesto paio, che vanno alle tele del polmone.
r 2. Quelli, che vanno alla tela, che fascia il cuore. Ma de ramuscelli del neruo sinistro nasce il neruo del cuore.
s 2. La parte di questo sesto paio, che va allo stomaco; & la forma, nella quale si diuide in due; & quel da manritta va all lato sinistro della bocca del-

Dichiar. delle Fig. del Lib. VII.

lo stomaco, & quel da man manca al lato
diritto.

- z. 2. La forma, nella quale questo paio si distribuisce per la bocca dello stomaco, & per le parti, che gli son vicine.
 u. 2. Il ramo, che va al lato diritto della bocca dello stomaco, & scende per sopra la parte sua piu alta infino al finire nel concauo del fegato, iui, doue si vede la x.
 x. 2. Il primo tralcio del ramo, che ve agli muscoli, che sono fra le coste del lato diritto.
 y. 2. Vn ramuscello, che nasce di questo tralcio; che va al lato diritto della tela di sotto, della reticella, & all'intestino grasso.
 z. 2. Vn altro ramuscello del medesimo, che va all'intestino duodeno, & al digiuno.
 a. 2. Vn ramo, che va al lato ritto del fondo dello stomaco mandado alcuni ramuscelli al lo stomaco, & alla tela di fuori della reticella.
 b. 2. Vn ramo, che va al fiele, & al fegato.
 c. 2. Il ramo, che va all'arnione diritto.
 d. 2. Vn altro, che va al lato diritto del mesenterio, & all'intestini dell'istesso lato.
 e. 2. Li nerui, che vanno al lato diritto della vescica.
 z. 2. Il primo tralcio dl ramo del sesto paio, che va alle radici delle coste del lato manco.
 θ. 1. 2. Due ramuscelli di questo tralcio, che vā no alla tela di dentro della reticella, & alla parte dell'intestino grasso, che passa sotto lo stomaco,
 η. 2. Li nerui, che vanno alla milza.
 ι. 2. Vn ramo del tralcio detto, che va al lato manco del fondo dello stomaco, mandando alcuni ramuscelli allo stomaco, & alla tela di fuori della reticella.
 κ. 2. Vn ramo, che ua al lato māco dl meseterio.
 λ. 2. Vn ramo, che va all'arnione manco.
 μ. 2. Li rami, che vanno al lato sinistro della ve
 ν. 1. 2. Il settimo paio di nerui. (scica.
 ο. 2. Vn ramo di qsto paio, che va agli muscoli, che nascono del pcesso simile al pūtaruolo
 ξ. 2. Doue il settimo paio si cōgiunge col sesto.
 π. 2. Molti ramuscelli di questo settimo paio, che si distribuiscono per molti muscoli della lingua, & dell'osso hyoide, & del gargarozzo.
 I. 2. 3. Questi tre numeri mostrano nella prima figura tre buchi; de quali per gli due da lati escono due rami dell'arterie del sonno, & vanno a gli due primi ventricoli; per quel di mezzo notato col 2, si purga la flemma delle ceruella del terzo ventricolo, & va all'imbuto, & alla glandola detta.

Figura. III.

SE ben nella prima, & seconda Figura furono notate tutte le sette paia de Nerui, che escono del capo, pure mi parue cosa cōueniente aggiungerui questa Terza, che rappresenta i Nerui, chiamati Recurrenti insieme con la canna del polmone, & vn pezzo dell'arteria grande,

- A Il nascimento dell'arteria grande del ventri-
colo diritto del cuore; nella qual parte fa
due arterie picciole, chiamate coronali.
B Il tronco di questa arteria che scende.
C Il ramo, che va al braccio sinistro.
D La parte dell'arteria grande, che monta insi-
no alla strozza.
E Quella, che va al braccio diritto.
F L'arteria diritta del sonno. G La sinistra.
H La canna del polmone.
I K Due rami, ne quali si sparte questa canna,
quando entra nel polmone.
L Il gargarozzo.
M Le glandole, che sono da lati della radice del
N Il tronco del sesto paio. (gargarozzo.
O Il sinistro.
P Gli rami del neruo diritto, che si riuoltano
in sù per sotto el ramo dell'arteria, che va
al braccio sinistro, & si congiungono tut-
Q Il neruo recorrente diritto. (ti in vno.
R Li rami del neruo manco, che si riuoltano
per sotto l'arteria grande.
S Il neruo recorrente sinistro, il quale alle vol-
te comincia con vn sol principio.


Figura. IIII.

Q Vesta Figura rappresenta tutta la Midolla Spinale, o la Nuca.

- A* Il principio di questa midolla, o nuca, che nasce dal fondamento delle cervella.
- BC* In questa parte comincia la midolla a non parere più dell'istessa sostanza delle cervella, anzi si divide in molti fili congiunti insieme, massimamente appresso la b.
- 3. 4. 5. 6. 7.* Questi numeri notano e nervi, che nascono della midolla, in nanzi che esca del cranio; & son radici di nervi, di que, che notano i medesimi numeri.
- D* Dalla B alla D si contiene nel lato sinistro la parte della midolla del collo, & sette nervi, che nascono di quella.
- E* Dalla D alla E nel lato dextro, et dal 7 al 19 nel diritto, si nota la parte di questa midolla, che

passä


TABVLA I. LIBRI VII.



Dichiar. delle Fig. del Lib. VII.


	passa per gli nodi delle spalle, & dodici paia di nerui, che nascono di quella.	3.	1. Il terzo paio de nerui.
F	Dalla E alla F nel lato sinistro, & dal 19 fin al 24 nel diritto, si nota la parte della midolla, che passa per li nodi de lombi, della qual nascono cinque paia di nerui.	O	1. 2. Il ramo di dietro del terzo paio, il quale si riuolta verso il processo di dietro del secondo nodo del collo, nascondendosi tra muscoli, che occupano questo luogo insino all'arriuare alla punta di questo processo. Et indi scende tra muscoli dell'un lato, & l'altro; & di poi va in obliquo verso e lati; & il medesimo cammino fanno tutti li rami di dietro insino al ventesimo quarto paio.
G	Dalla F alla G nel lato manco, & dal 24 insino al 30 nel diritto, si mostra vna parte della midolla, che passa per l'osso grande, della quale nascono sei paia di nerui. Di modo, che tutti son 30 paia di nerui, quelli, che nascono della schiena.	P	1. Il ramo di nanzi del terzo paio, il quale si sparte in quattro parti. La prima mostra la Q nella prima figura; la seconda la R in amendue, la qual si congiunge col ramo del quarto paio, che è notato cō la Y; la S nella prima mostra la terza parte, la qual si congiunge col ramo di dietro del secondo paio notato con la K; ui, done si vede la L nella seconda figura; la T mostra in amendue le figure la quarta parte di questo ramo.
H	Il fine della schiena, che fa come vna coda, & entra per l'osso del codione.		
Tauola. II. & III.			
	D i queste Figure la prima mostra la parte di nanzi de Nodi della schiena, & la secōda quella di dietro. Et perche le lettere seruono ad amendue, quelle, che seruono alla prima, nota l'i; quelle della seconda il 2.	4	Il quarto paio de nerui.
A	1. 2. Doue la midolla comincia a entrar nella schiena.	V	1. 2. Il ramo di dietro del quarto paio.
1. 2.	3. 4. 5. 6. 7. 1. Li sette nodi del collo, insieme con li nerui, che nascono di quelli.	X	1. 2. Il ramo dinanzi del quarto paio, il qual si diuide in tre parti. La prima mostra la Y nella prima figura, la qual si congiunge alla prima parte del terzo paio, che è notata con la R; & la a mostra nella medesima figura la seconda parte; la b la terza, la quale si congiunge al ramo del quinto paio, che notammo con la e.
8. 9.	10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 1. Li dodici nodi delle spalle.	Y	
20.	21. 22. 23. 24. 1. Li nodi de lombi.	a	
25.	26. 27. 28. 29. 30. 1. Li sei nodi dell'osso grande.	b	
B	2. Il primo nodo del collo.	5	1. Il quinto paio.
C	2. Il primo nodo delle spalle.	c	1. 2. Il ramo di dietro di questo paio.
D	2. Il primo nodo de lombi.	d	1. 2. Il ramo di nanzi, del qual nasce vn ramuscello, che passa tra la d & la 6.
E	2. Il principio dell'osso grande.	e	1. Vno tralcio del ramo di nanzi del quinto paio, che fa vna gran parte del ramo della diaframa.
F	2. Il ramo di dietro del primo paio de nerui della schiena.	f	1. 2. Il tronco del ramo di nanzi del quinto paio, il qual va per entro e muscoli alla punta dell'omero.
G	1. 2. Il processo del ramo di dietro del primo paio de nerui; & particolarmente il ramo, che va al processo del lato del primo nodo, & si distribuisce per alcuni muscoli di que, che muouono la testa.	tt	2. Alcuni ramuscelli di questo tronco, che vanno a muscoli, che alzano la paletta della spalla.
H	1. Il ramo dinanzi del primo paio.	g	1. 2. Vn altro ramo del tronco, che notammo con la f; il quale si distribuisce per la pelle, che cuopre l'omero, & per lo primo musculo, che muoue il braccio.
I	2. Il ramo di dietro del secondo paio; & particolarmente il minor suo ramo.	h	1. 2. Vn altro ramuscello del medesimo tronco, che s'inferisce in quella parte del musculo, che alza il braccio, che nasce della clauicola, & della punta dell'omero.
K	2. Il maggiore.	II	1. 2. Vn ramo del medesimo tronco, che s'inferisce in quella parte del musculo, che alza
L	2. La congiuntione del ramo del terzo paio (che si noterà con la S nella prima figura) col ramo del secondo paio, che notammo con la K.		
M	1. 2. La distribution del piu grosso ramo del secondo paio, alla pelle della collottola, et alla coronella.		
N	2. Il ramo di nanzi del secondo paio.		

il brac-



Dichiar. delle Fig. del Lib. VII.

	il braccio che nasce dalla spina della paletta della spalla.		coste, et vāno a muscoli, che lor sō vicini. Nōdimeno si ueggono piu chiaramēte nel lato māco, doue le due i i notano li rami, che vanno alla parte piu alta del musculo, che congiunge il braccio al petto.
6	1. Il sesto paio de nerui.	ii	
k	2. L'ultimo ramo de sesto paio.	κκ	1. Li rami, che vanno alla parte piu bassa del primo musculo, che muoue il braccio.
lm	1. Il ramo di nanzi del sesto paio; & la m nota vn ramuscello, che fa il neruo della diaframa.	λλ	1. Li rami de nerui, che scendono in obliquo a muscoli del ventre.
nn	1. 2. Il neruo della diaframa fatto di tre rami, che son notati cō la b, con la e, & cō la m.	μμ	1. Li rami, che vanno al musculo, che muoue il braccio in giù all'indietro.
oo	1. Come questo neruo si distribuisce per la diaframa.	ν	1. Li rami, che vanno alle mammelle.
p	2. Il ramo del sesto paio, che va al concavo della paletta della spalla, compartendosi in molti ramuscelli.	οο	1. Li rami del 18, & 19 paio, che vanno al sesto musculo; che muoue la coscia.
q	1. 2. Doue si congiunge il ramo di nanzi del sesto paio con que, che gli son vicini; & la parte sua, che va al braccio.	ππ	1. Il primo neruo, che va al braccio, il quale si distribuisce per la pelle, che cuopre la parte di fuori del braccio.
7	1. Il settimo paio.	ρ	1. 2. Il secondo neruo, che va al petto.
r	2. L'ultimo ramo del settimo paio.	ςς	1. Vn ramo di questo neruo, che va al primo musculo, che piega il gomito.
s	Doue si congiunge il settimo paio, cō que, che gli son vicini, & vanno al braccio.	τ	1. 2. Il terzo neruo, che va al braccio. Et non è da marauigliarsi, se stanno alquanto piu separati di quel, che si vede nel naturale, perche così fu di mestieri, perche si potessero distinguere.
ttt	2. Li rami del settimo paio, o verissimamente del terzo, che va al braccio, che notaremo con la T; li quali vāno a muscoli, che occupano questo luogo, et muouono la paletta della spalla, & il braccio.	υ	1. Vn ramo di questo terzo neruo, che va alla pelle tra i muscoli, che congiungono il braccio al petto, & quel che l'alza.
8	2. L'ottauo paio de nerui della schiena, & il primo delle spalle.	φ	1. Vn ramuscello del terzo neruo, che va al principio dell'ultimo musculo, che piega il gomito.
u	1. Il ramo di dietro dell'ottauo paio.	χ	1. Vn altro ramuscello del terzo paio, che va alla pelle della parte dinanzi del braccio.
x	1. 2. La congiuntione dell'ottauo paio col settimo, della quale vanno certi rami al braccio.	ψ	1. Qui si congiunge il terzo neruo del braccio col secondo; benché già molte volte notammo, che'l secondo neruo fa molto maggiore il terzo.
y	1. Il ramo di questo ottauo paio, che va a cāto della parte piu alta della prima costa infino all'osso del petto.	ω	1. Il secondo neruo, che va al braccio, passato che ha il luogo, oue si congiunge al terzo.
aa	2. Parecchi ramuscelli dell'ottauo paio, che è il quarto, che va al braccio, il qual si distribuisce per gli muscoli, che egli son vicini.	Γ	1. Vn ramuscello del secondo neruo, che va al principio del musculo piu lungo, che storce il maggior fusello del braccio in giù.
9	1. Il nono paio.	ΔΔ	1. Vn ramo del secondo neruo, che va a canto del minor fusello infino al bracciale; & va alla parte di fuori della prima congiuntura del pollice, tra pelle, & carne, come nota la Δ.
β	2. Il ramo di dietro di questo paio.	Θ	1. Vn ramo del secondo neruo alquanto piu grosso del sopra detto, il quale subito si sparte i due rami notati con la Δ & la Ξ.
δ	1. Il ramo di nanzi di questo paio, & quel, che va alla prima costa.	ΛΞ	2. Due ramuscelli di quel, che notammo con la Ξ, che vanno per la tanola del braccio infino alla palma.
ζ	1. Alcuni ramuscelli, che nascono di questo sopra detto, & si distribuiscono per gli muscoli, che occupano questa parte.	ΠΣ	
io	1. 1. 2. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 1. Le paia di nerui dal 9 al 20, le quali passano tra le coste, tenendo quasi tutti il medesimo ordine.		
nn	1. Li rami di questi nerui, che passano tra le coste, che si congiungono al ramo del sesto paio della testa, che passa per le radici del le coste.		
θθ	1. Li rami di questi nerui, che passano tra le		



Dichiar. delle Fig. del Lib. VII.

Φ	1. 2. Il quarto nervo, che va al braccio; il quale quantunque in amendue le figure sia ben notato, non è segnato con lettere nella prima, per non causare confusione.	49	49. 1. Vn ramo, che nasce del vntesimo paio, il quale va insieme con l'arteria del seme al testicolo.
Ψ	2. Li rami del quarto nervo, che vanno a muscoli, che piegano il braccio.	50	50. 1. La distribuzione de nervi de lombi per gli muscoli del ventre.
Ω	2. Vn ramo del quarto nervo, che va alla pelle, che cuopre la parte di dietro del braccio, & il gomito.	51	1. Li rami de nervi, che vanno a muscoli del ventre; li quali si distribuiscono per lo muscolo, che tira il braccio verso e lōbi.
32	2. Vn altro ramo del medesimo, che va alla parte piu bassadel lato di fuori del braccio	52	52. 2. Li rami di dietro de nervi, che escono de lōbi. Nōdimeno e rami, che nella prima figura rispōdono al 20, 21, & al 22, son que, che fanno maggiore il ramo del sesto paio de nervi della testa, che passa per le radici delle coste; et sono alcuni rami, che si distribuiscono per lo sesto muscolo, che muoue la coscia; et li rami, che rispōdono al 23, et 24, son que, che si distēdono p li muscoli, che piegano questa parte della
33	2. Vn altro, che va alla pelle, che cuopre la parte di fuori del braccio, dal gomito alla mano.	25	26. 27. 28. 29. 30. 1. Le sei paia (schiena. di nervi che nascono dell'osso grande; et li ramuscelli, che sono appresso e nervi, son que, che vanno alla vescica, alla matrice, & al fondamento.
34	2. La diuisione del quarto nervo, iui, doue s'appressa al tubercolo di fuori dell'osso dell'omero.	53	1. Li rami, che nascono del primo nervo dell'osso grande, che è il 25 della schiena; li quali vanno alla parte di dentro dell'osso del gallone, & a muscoli del ventre, che nascono di questa parte.
35	2. Il ramo piu alto di questa diuisione.	54	2. Vn ramo del medesimo nervo, che va alla parte de fuori dell'osso del gallone, & a muscoli, & pelle delle natiche.
36	2. Li ramuscelli di questo, che vanno alla parte di fuori del pollice, dell'indice, & di quel di mezzo.	55	2. Vn altro ramo del medesimo che va agli muscoli, che gli son vicini.
37	2. Il piu basso ramo della diuisione detta, il qual va a canto del maggior fusello.	56	1. 2. Il fine della midolla spinale.
38	2. Li rami di questo piu basso, li quali s'inseriscono ne muscoli, che nascono de tubercolo di fuori dell'osso dell'omero.	57	1. Il primo nervo, che va alla coscia.
39	40. 41. 2. Questi numeri che notano li bottoni di quel ramo piu basso, che vanno a canto el maggior fusello; li quali s'inseriscono ne principij di que tre muscoli, che nascono del maggior fusello secōdo il luogo suo.	58	1. Il ramo di questo nervo, che va alla pelle.
42	2. Il fin di questo ramo detto.	59	1. Vn altro ramo del medesimo, che va a muscoli.
*	1. 2. Il quinto ramo, che va al braccio.	60	1. Il secondo nervo, che va alla gamba.
43	1. La distribuzione del terzo, et quinto nervo di que, che vāno al braccio, per gli muscoli, che occupano la parte di dentro del braccio.	61	1. Il ramo di questo nervo, che va tra pelle & carne per la parte di dentro della coscia insino al piede.
44	1. Vn ramo del terzo nervo, che va a canto del minor fusello, & si distribuisce per lo lato di dentro del pollice, dell'indice, & di quel di mezzo.	62	1. La distributiōe di questo ramo per lo piede
45	1. Il ramo del quinto nervo, che va appresso al maggior fusello, & manda rami alla parte di dentro del picciolo, dell'annullare, & di quel di mezzo.	63	1. Alcuni ramuscelli, che nascono del ramo sopra detto, & si distribuiscono per la pelle, che abbraccia la parte di nanzi del ginocchio.
46	1. Vn altro ramo, che nasce di questo sopra detto, et va alla parte di fuori del dito picciolo, dell'annullare, et di quel di mezzo.	64	1. La parte del secondo nerno della gamba, che va tra i muscoli.
*	1. 2. Il sesto nervo; che va al braccio. (ciale.	65	1. Vn ramo di questa parte, che va al quinto muscolo, che muoue la coscia.
47	1. Il fin di questo sesto nervo appresso il braccio.	66	1. Il terzo nervo, che va alla coscia.
48	48. 1. Certi ramuscelli di questo sesto paio, che vanno alla pelle del braccio, appresso doue passa.	67	1. Vn ramo di questo nervo, che va al muscoli, che occupano il buco dell'osso del pettignone.
20	21. 22. 23. 24. 1. Cinque paia di nervi, che nascono de lombi.		

Vn altro

68	1. Vn altro ramo del medesimo, che va alla pelle.	ABC	Il fondo delle cervella da vn lato; & la A mostra la parte, che è appresso il naso, chiamata il processo simile alle mammelle; la B mostra la parte che entra in quel gran fosso, che si fa ne processi de lati del l'osso cuneale; la C mostra la parte di dietro delle cervella.
69	1. La parte del terzo neruo, che si nasconde tra muscoli.		
70	1. Il principal ramo di questa parte, che si distribuisce per lo secondo musculo, che muoue la gamba.		
71	1.2. Il quarto, & piu grosso neruo, che va alla coscia.	DD	Il celabro.
72	1.2. Il ramo di questo neruo, che si distribuisce quasi tutto per la pelle, che occupa la parte di dietro della coscia.	E	L'istrumento diritto dell'odorare.
73	1. Li rami del medesimo, che vanno a muscoli, che nascono della giunta dell'osso del gallone.	F	Il neruo dell'occhio diritto.
74	1. Il ramo del quarto neruo, che va alla parte del quarto musculo, che muoue la gamba, che nasce dell'osso della coscia; & di poi alla pelle, che cuopre la parte di dietro della coscia infino al chimo.	G	Done si congiungono e nerui della vista.
75	1. Li rami del medesimo, che vanno a muscoli, che nascono delle teste di sotto dell'osso della coscia.	H	La tela dell'occhio, nella qual si conuerste il neruo della vista.
76	1. La diuisione del quarto neruo della gamba in due rami disuguali, la quate fa tra le teste dell'osso della coscia, appresso il chimo del ginocchio.	I	Il secondo paio de nerui della testa.
77	1. Il piu sottil tronco, & di piu in fuori della diuisione detta.	KK	La minor radice del terzo paio.
78	78.1. Vn ramo del tronco di fuori, che va alla pelle della parte di fuori della gamba.	L	La maggiore.
79	1. Vn altro ramuscello, che va alla pelle della parte di nanzi.	M	Il quarto paio.
80	1. Il maggior trôco di dentro della diuisione.	N	La radice piu sottile del quinto paio.
81	1. Vn ramo di quel, che va alla pelle della parte di dietro della gamba.	O	La maggiore.
82	1. Vn ramo del tronco di fuore, che si congiunge a quel di dentro.	P	La tela, in la quale la maggior parte del quinto neruo si conuerste dentro dell'orecchia.
83	1. La distributione del tronco maggiore, per la parte piu bassa del piede.	QR	Li rami della maggior radice del quinto paio; de quali la R nota quella, che esce per lo buco particolare.
84	1. Una parte del ramo, che notâmo col 74, che va al pettine del piede.	S	Il sesto paio di nerui.
85	1. Vn ramo del tronco maggiore, che va alla pelle, che abbraccia la parte di nanzi del collo del piede.	T	Il settimo paio. Il processo di tutte queste sette paia si vede nella seconda figura della prima tauola.
86	1. Vn altro ramo del medesimo, che va al pettine, benché nascosto tra pelle & carne.	V	Il nascimento della midolla spinale di mezzo el fondo delle cervella.
			Done la midolla esce fuor del craneo.
		1.2.3	Tutti questi numeri, che seguono, mostrano li nodi della schiena. Gli sette primi, que del collo; gli 12, che seguono, que delle spalle; gli cinque piu in nanzi, que de lombi; gli sei vltimi, que dell'osso grande. Che sono in tutti trenta, de quali nascono trenta paia di nerui, d'ogni nodo vno, come in questa figura si vede, & piu lungamente nella seconda tauola.
		P	Il neruo sinistro della diaframa, il qual si fa del quarto, quinto, & sesto paio de nerui del collo, come in questa figura chiaramente si vede.
		Q	Vn ramo del quinto paio del collo, che va alla pelle, che cuopre la punta dell'omero, & al musculo, che alza il braccio.
		R	Il primo neruo del braccio, & i rami suoi, che vanno alla pelle.
		S	Il secondo, & i rami suoi, che vanno al musculo primo, che piega il gomito.
		T	Il terzo neruo, & suoi rami, che vanno alla pelle, che cuopre la parte di nanzi del braccio.

Il ramo

Tauola. IIII. Fig. I.

In questa Figura si veggono la Schiena, & tutta la parte di sotto delle cervella; come se vno, stando in piede, gettasse la testa verso dietro. Il che fu fatto, perche si potesse vedere il nascimento de nerui della testa.

Dichiar. delle Fig. del Lib. VII.

V	Il ramo di questo paio, che va all'ultimo muscolo, che piega il gomito.			tra pelle & carne. Il principio di tutti e nervi del braccio già l'abbiam detto; & qui si vede chiaramente senza esservi di bisogno di maggiore dichiarazione.
X	La parte del secondo nervo, che si congiunge al terzo.			
r	Vn ramo del secondo nervo, che va al principio del maggior muscolo, che sforza il minor fusello in giù.	rrr		Li nervi, che vanno tra le coste; li quali son tagliati, iui, doue le coste si storcono verso nanzi.
Z	La diuisione del secondo nervo in due rami disuguali.	ss		Li rami di questo nervo, che si storcono verso dietro.
a	Il minor ramo, che va a canto del minor fusello insino al pollice.	tt		In questa forma vāno e nervi a muscoli, che son sopra le coste.
b	Il più grosso ramo, il quale si sparte subito in due, ognuno de quali si vede chiaramente nella figura.	uu		Li rami, che si congiungono al ramo del sesto paio, che scende per le radici delle coste.
c	Li rami del terzo nervo, che si distribuiscono per gli muscoli, che occupano la parte di dentro del braccio dal gomito alla mano.	xx		Li rami de nervi; che nascono de nodi de lombi; li quali vanno a muscoli del ventre, & de lombi.
d	Il ramo del terzo nervo, che cammina per sopra il minor fusello, & manda alcuni ramuscelli al pollice, all'indice, & a quel di mezzo.	y		Vn neruetto, che in molti huomini va al testicolo, & in questa figura è tagliato.
ee	Il quarto nervo, che va al braccio; & la e più bassa nota li rami, che si distribuiscono per gli muscoli, che stēdono il gomito.	z		Li rami, che vanno al sesto muscolo, che muoue la coscia.
f	Il ramo di questo quarto nervo, che va alla pelle di dentro del gomito.	z		Il primo nervo della gamba. (pelle)
g	Vn altro ramo dell'istesso, che va alla pelle della parte di fuori, & a quella di dietro del braccio.	a		Il ramo di questo primo nervo, che va alla
hh	Vn altro, che va alla pelle della parte di fuori del gomito.	β		Vn altro ramo del medesimo, che si nasconde nella carne.
i	La diuisione, che fa questo quarto nervo appresso il gomito.	γ		Il secondo nervo, che va alla gamba.
kk	Vn altro ramo del medesimo quarto, che passa appresso il minor fusello, & manda alcuni rami alla parte di fuori del pollice, dell'indice, & di quel di mezzo.	δδ		Vn ramo di questo nervo, che va per la parte di dentro della gamba tra pelle & carne, insino al piede.
ll	Il ramo di questo quarto, che va appresso il maggior fusello, insino appresso il braccio le, & manda alcuni ramuscelli, che nascono della parte di fuori.	ε		Vn altro ramo di questo secondo nervo, che va a muscoli, che occupano la parte di nanzi della coscia.
m	Il quinto nervo, che va al braccio.	ζ		Il terzo nervo della gamba.
n	La distributione del quinto nervo per gli muscoli, che nascono del tubercolo di fuori dell'osso dell'omero.	η		Vn ramo di questo, che va alla pelle della parte di dentro della coscia.
oo	Il ramo del quinto paio, che va appresso il maggior fusello, & manda alcuni rami alla parte di dentro del dito picciolo, all'annulare, & alle volte a quel di mezzo.	θ		Vn altro ramo del medesimo, che va a muscoli.
p	Alcuni tralci di questo ramo, che vāno alla parte di fuori della mano; & manda alcuni ramuscelli al dito picciolo, all'annulare, & a quel di mezzo.	ιι		Il quarto nervo, della gamba, il cui nascimēto si vede chiaramente, come de gli altri.
qq	Il sesto nervo del braccio, & il processo suo	κκ		La distributione de rami di nanzi, & più bassi, che nascono dell'osso grande.
		λ		Il fin della midolla spinale.
		μ		Li rami del quarto nervo della gamba, che vanno alli principij de muscoli, che nascono della giunta dell'osso del gallone.
		ν		Vn altro ramo di questo medesimo nervo, che va alla pelle della parte di dietro della coscia insino a più della metà sua.
		ξ		Vn ramo, che va principalmente al quarto muscolo, che muoue la gamba, & di poi alla pelle della parte di dietro della coscia, insino al chino del ginocchio.
		ο		Li rami, che vanno a muscoli, che nascono delle teste più basse dell'osso della coscia.
		ππ		La diuisione del quarto nervo in due; et la π mostra il maggior tronco, la ρ il minore.

Vn ramo





FIG. II



Dichiar. delle Fig. del Lib. VII.

<i>s</i>	<i>Vn ramo del minor tronco, che va alla pelle di fuori della gamba infino al dito picciolo.</i>		
<i>τ</i>	<i>Vn altro ramo, che va appresso lo stinco minore tra i muscoli.</i>	<i>5.6.</i>	<i>7.8.9. Le radici de nerui tagliate appresso e nodi della schiena; & li nerui del braccio son tagliati, come arriuanò al braccio.</i>
<i>v</i>	<i>Vn ramuscello, che va alla pelle di nanzi della gamba.</i>	<i>A</i>	<i>Vna parte del quinto paio di nerui, che è il primo, che va al braccio.</i>
<i>φφ</i>	<i>Vn ramo del maggior tronco, che va alla pelle di dentro della gamba infino al pollice.</i>	<i>B</i>	<i>Il secondonervo.</i>
<i>χ</i>	<i>Vn altro ramo, che va alla pelle della polpa della gamba.</i>	<i>C</i>	<i>Il terzo.</i>
<i>↓</i>	<i>Vn altro, che passa per la legatura, che congiunge gli due stinchi secondo il lungo, & va infino alle dita del piede.</i>	<i>D</i>	<i>Il quarto, il quale in questa figura nasce della parte di dietro della cōgiuntione del quinto col sesto; & piglia vn ramo della congiuntione dell'ottauo paio col nono, il qual nota la E. Gli altri nerui di quali congiuntioni nascano, senza che io lo dica, si vede nella figura chiaramente.</i>
<i>ω</i>	<i>La principal parte del maggior tronco, che va alla pianta del piede, tra lo stinco maggiore, & il calcagno, & manda ad ogni dito vn ramuscello.</i>	<i>F</i>	<i>Il quinto neruo, che va al braccio.</i>
		<i>G</i>	<i>Il sesto; ma questo si vede meglio nella settima figura.</i>

Figura. II.

Questa Figura rappresenta l'Intrecciamento de Nerui, che si fa sopra la prima costa, del qual nascono que, che vanno alla mano, il quale nõ in tutte è d'una medesima maniera, anzi ne i piu è differente; ma in tutti


*Il fine dell' Anatomia del corpo humano,
di Giouanni Valuerde Medico.*

REGISTRO

*** A B C D E F G H I K L M N O O O P Q R S T V X Y Z
AA BB CC Tutti sono terni; eccetto A O O duerno.



In Vinetia, appresso i Giunti. M D LXXXVI.



98
390.250

6018 - 4
901
~~507~~
- 20/8

